МЕДИЦИНА. СОЦИОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯ
Прикладные исследования
научный журнал

№ 3
2024

СОДЕРЖАНИЕ

МЕДИЦИНА. ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ

Абухалтам Ахмад, Сушко В.Е. Анализ связи инфекции вирусом папилломы человека с развитием меланомы: новые данные и перспективы исследований 4

Бекмуродзода С.Б. Остеопоретический вариант остеоартрита у женщин в менопаузе: особенности течения, современные возможности терапии 10

Малкова А.А., Молчанова Е.Г., Хайдарова Г.Р., Галиева Р.З. Синдром Ретта. Описание клинического случая 15

Иванова И.Л., Комиссарова Н.В., Городилова К.Ю., Каньшина Т.С., Исхакова А.М. Особенности течения болезни Гентингтона в Удмуртской Республике 21

Колесников А.Н., Албакова З.А.-М., Поляхова Ю.Н. Концептуальные основы разработки технологии догоспитальной сортировки в медицине неотложных состояний 24

Магомедова У.А., Ибнумасхудова П.М., Магомедов М.Г., Акаева Д.Р. Воздействие эколого-гигиенических факторов на риск развития эрозии шейки матки: анализ и перспективы защиты женского здоровья 31

Нурлыгаянов Р.З., Гильмутдинова Л.Т., Баймурзина В.И., Богданова Ю.А., Нурлыгаянова Д.Р. Предпосылки старческого остеопороза закладываются в детском возрасте..... 37

Окопный С.Р. Роль иммунотерапии в современном лечении онкологических заболеваний: обзор последних достижений и перспектив..... 44

Черепанова Е.В., Черепанова Е.В. Патологические рубцы после гнойно-воспалительный заболеваний челюстно-лицевой области 50

Полякова М.Д. Восприятие временной перспективы при расстройствах шизофренического спектра..... 56

Малкова А.А., Башмаков А.Б., Шкаликова Я.В., Короткова Х.Д., Ситдикова К.С. Церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с подкорковыми инфарктами и лейкоэнцефалопатией ... 62

Танченко О.А., Нарышкина С.В., Гончарова О.М. Взаимосвязь гормонов жировой ткани с маркерами дисфункции эндотелия при коморбидном течении хронической обструктивной болезни легких и метаболического синдрома..... 66

Гуменюк Л.Н., Ковалёва А.А., Сиротенко А.В., Стародубцева У.С., Хасмутдинова К.И. Особенности психоэмоционального статуса у пациентов с рассеянным склерозом..... 71

Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-76398 от 26.07.2019
Индекс Роспечати 65002
ISSN 2686-9365

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

Учредитель: ООО «Городец»
Издается с 2010 года
Адрес редакции: 117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2
E-mail: fapz@list.ru *Сайт:* www.medsociofil.ru

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Аверин Юрий Петрович, д-р соц. наук, проф., зав. кафедрой Методологии социологических исследований социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; **Агапов Платон Валериевич,** канд. соц. наук, доц., МГУ имени М.В. Ломоносова; **Алиханов Халлар Абумуслимович**, д-р мед. наук проф., Государственная классическая академия им. Маймонида; **Алиханов Багдади Абумуслимович,** д-р мед. наук, проф., Центральная клиническая больница РАН; **Багдасарьян Надежда Гегамовна,** д-р филос. наук, проф., МГТУ им. Н.Э. Баумана; **Барков Сергей Александрович,** д-р соц. наук, проф., завкафедрой социологии организаций и менеджмента социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; **Бородин Владимир Иванович,** д-р мед. наук, проф. Терапевтический центр «Гранат»; **Бурмыкина Ирина Викторовна,** д-р соц. наук, проф., Липецкий государственный педагогический университет; **Волков Юрий Григорьевич**, д-р филос. наук, проф., научный руководитель Института социологии и регионоведения Южного федерального университета; **Грабельных Татьяна Ивановна,** д-р соц. наук, проф., Иркутский государственный университет; **Григорьев Святослав Иванович,** д-р соц. наук, проф., чл.-корр. РАО; **Дмитриев Анатолий Васильевич**, д-р филос. наук проф., чл.-корр. РАН, гл. научный сотрудник. Института социологии РАН; **Добреньков Владимир Иванович,** д-р филос. наук, проф., завкафедрой истории и теории социологии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; **Добренькова Екатерина Владимировна,** д-р соц. наук, проф., первый проректор Международной Академии Бизнеса и Управления; **Желтов Виктор Васильевич,** д-р филос. наук, проф., декан факультета политических наук и ‘социологии Кемеровского государственного университета; **Каплунова Вера Юрьевна**, д-р мед. наук, гл. научный сотрудник НИО «Метаболический синдром» НИЦ Московского мед. исследовательского ун-та им. И.М. Сеченова; **Кравченко Альберт Иванович,** д-р филос. наук, проф., ведущий научный сотрудник, МГУ имени М.В. Ломоносова; **Мамедов Агамали Кулам-Оглы,** д-р соц. наук, проф., завкафедрой социологии коммуникативных систем социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; **Маршак Аркадий Львович,** д-р филос. наук, проф., главный научный сотрудник Института социологии РАН; **Найдыш Вячеслав Михайлович**, д-р филос. наук, проф., завкафедрой онтологии и теории познания Российского ун-та дружбы народов; **Овсянников Сергей Александрович**, д-р мед. наук, проф., МГМСУ; **Осипов Александр Михайлович,** д-р соц. наук, проф., главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого; **Петров Владимир Николаевич,** д-р соц. наук, проф., заведующий кафедрой социологии Кубанского государственного университета; **Петрова Татьяна Эдуардовна**, д-р соц. наук проф., кафедры социологии молодежи и молодежной политики Санкт-Петербургского государственного университета; **Пятницкий Николай Юрьевич,** канд. мед. наук, доц., в.н.с. ФГБНУ НЦПЗ; **Рахманов Азат Борисович,** д-р филос. наук, социологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова; **Садохин Александр Петрович**, д-р культурологии, проф., почетный работник высшего профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; **Самыгин Сергей Иванович**, д-р соц. наук, проф., Южный федеральный университет; **Силласте Галина Георгиевна,** д-р филос. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, завкафедрой «Социология» Финансового университета при Правительстве РФ; **Сычев Андрей Анатольевич**, д-р филос. наук, проф., кафедра философии Мордовского государственного ун-та им. Н.П. Огарева; **Терентьев Александр Александрович**, д-р мед. наук, проф., чл.-корр. РАН, проф. кафедры биохимии Российского исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова

СОСТАВ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА

Ахметов Сайранбек Махсутович, ректор Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем (КазИИТУ), д-р тех. наук, проф., академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан, академик РАЕН; **Вукичевич Слободан,** проф., факультет философии, Университет Черногории; **Кропп Фредрик**, декан факультета Монтеррейского университета (США); **Митрович Любиша,** проф., факультет философии, Университет г. Ниш (Сербия); **Титаренко Лариса Григорьевна,** д-р соц. наук, проф., факультет философии и социальных наук, Белорусский государственный университет (Республика Беларусь); **Фарро Антимо Луиджи,** проф., д-р социологии, Римский университет Сапиенца; **Чжан Шухуа,** директор Института научной информации Академии общественных наук Китая; **Соколова Галина Николаевна,** д-р филос. наук, проф., заведующий отделом экономической социологии и социальной демографии Институт социологии НАН Беларуси (Минск); **Ари Паленнус**, проф., директор кампуса г. Керава Университета прикладных наук Лауреа (Финляндия); **Джун Гуан**, проф., зам. декана Института экономики и бизнесадминистрирования, Пекинский технологический университет (Китай); **Лаи Дешенг**, проф., декан Института экономики и бизнес-администрирования, Пекинский технологический университет (Китай); **Марек Вочозка**, проф., ректор Технико-экономического института в Чешских Будейовицах (Чехия); **Христиан Мундт,** доктор медицины, директор психиатрической клиники (г. Гейдельберг, Германия); **Она Гражина Ракаускиене**, проф., Университет им. Миколаса Ромериса (Литва)

Главный редактор:
Бородин В.И., д-р мед. наук, проф.

Отпечатано в типографии ООО «Русайнс», 117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2
Тираж 300 экз. Формат А4. *Подписано в печать:* 30.05.2024 *Цена свободная*

Все материалы, публикуемые в журнале, подлежат внутреннему и внешнему рецензированию

Издание не подлежит маркировке согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Черепанова Е.В. Современные подходы к коррекции патологических рубцов в челюстно-лицевой области 75

Иванова И.Л., Комиссарова Н.В., Хайруллина А.М., Ширяева Ю.И., Габделганиева А.М. Спинальная мышечная атрофия детского возраста в Удмуртской Республике 81

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА, ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА, КУРОРТОЛОГИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ

Исаева О.А., Друзь Е.А., Савина Д.А. Физическая методология реабилитации при ожирении, врачебно-педагогические наблюдения 86

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Шмандина К.В., Бритова А.А. Сравнение методов чистки зубов как основополагающий фактор сохранения стоматологического здоровья 90

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

Абдулаева З.Э., Вагабова Н.М. Этический аспект биомедицинских технологий с позиции российской государственности 95

Сааева Н.М., Даниялбекова З.М., Абусуева А.С., Билалова С.К., Юзбекова А. Вопросы массовой вакцинации против SARS-CoV-2 и ее роль в прекращении пандемии 100

Аветисян Р.Р., Иванова В.В., Тузов А.И., Сухотерина Е.Г., Сухотерин Д.М. Повышение эффективности работы медицинских учреждений..... 105

Надейкина О.С., Шабуня Е.Д., Ледюкова А.С., Васидов П.К. Влияние брекет-системы на состояние гигиены полости рта у пациентов 111

Иванова М.В. Философские основания здоровьесберегающей парадигмы 116

СОЦИОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ, ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ, СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Лебедев Г.И. Профессиональные компетенции государственных гражданских служащих в традиционных и инновационных практиках: социологический анализ 121

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нурлыгаянова Д.Р., Нурлыгаянов Р.З., Нурлыгаянова А.М., Гильмутдинова Л.Т., Гильмутдинов Б.Р. Возможности использования искусственного интеллекта в медицине..... 125

Бекмуродзода С.Б. Энтезопатический вариант остеоартрита: особенности клинического течения, тактика ведения 132

Милюкова А.А. Ультразвуковая диагностика аневризмы правой подключичной артерии в сочетании с односторонней гипоплазией позвоночной артерии. Клинический случай 138

Демидова Л.В., Демидов А.А., Соборук С.В., Асадова С.Э., Бештаов Д.Х. Роль семейного врача в формировании здорового образа жизни и профилактики заболеваний..... 142

Вергасов А.М., Аскарова У.Р., Мусаева М.Б., Саламова Р.Р. Совершенствование диагностики и лечения экссудативных средних отитов в детском возрасте..... 147

Галаева З.Ш., Гатагажева М.М., Барахоева Т.С., Костоева Х.Я. Влияние уровня содержания витамина D на успеваемость студентов медицинского факультета... 150

Каторова А.В., Садыкова Д.И., Обаревич Е.С. Этнические особенности токсичности и эффективности периоперационной химиотерапии при раке желудка среди пациентов дагестанской и русской национальности 153

Магомедов М.Ш., Магомедов Б.Ш., Бетмирзаев А.А., Салаватов К.А. Вольная борьба как форма физической активности..... 160

Магомедов М.Ш., Магомедов Б.Ш., Бетмирзаев А.А., Салаватов К.А. Физическая культура как часть общечеловеческой культуры..... 163

Милюкова А.А. Возможности ультразвуковых методов исследования в диагностике синдрома Лериша 167

Хамавов Т.М., Эседова И.А., Уморина Ю.О., Ибрагимов С.С., Ляшенко Е.Н. Синдром полиорганной недостаточности, инициированной травмой: тактика и стратегия лечения..... 171

TABLE OF CONTENTS

MEDICINE. APPLIED RESEARCH AND METHODS

Abuhaltam Ahmad, Sushko V.E. Analysis of the relationship between human papillomavirus infection and the development of melanoma: new data and research prospects 4

Bekmurodzoda S.B. Osteoporetic variant of osteoarthritis in menopausal women: features of the course, modern treatment options 10

Malkova A.A., Molchanova E.G., Khaydarova G.R., Galieva R.Z. Rett syndrome. Description of the clinical case 15

Ivanova I.L., Komissarova N.V., Gorodilova K.Yu., Kanshina T.S., Iskhakova A.M. Peculiarities of the course of Huntington's disease in the the Udmurt Republic 21

Kolesnikov A.N., Albakova Z.A.-M., Polyakhova Yu.N. Top priorities for improving injury outcomes or how much is a human life worth 24

Magomedova U.A., Ibnumashudova P.M., Magomedov M.G., Akayeva D.R. Impact of ecological and hygienic factors on the risk of cervical erosion: analysis and prospects for protecting women's health 31

Nurlygayanov R.Z., Gilmutdinova L.T., Baymurzina V.I., Bogdanova Yu.A., Nurlygayanova D.R. The prerequisites for senile osteoporosis are laid in childhood 37

Okopny S.R. The role of immunotherapy in modern treatment of cancer: a review of recent achievements and prospects 44

Cherepanova E.V., Cherepanova E.V. Pathological scars after purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial area 50

Polyakova M.D. Time perspective perception in schizophrenia spectrum disorders 56

Malkova A.A., Bashmakov A.B., Shkalikova Ya.V., Korotkova Kh.D., Sitdikova K.S. Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy 62

Tanchenko O.A., Naryshkina S.V., Goncharova O.M. The relationship of adipose tissue hormones with markers of endothelial dysfunction in the comorbid course of chronic obstructive pulmonary disease and metabolic syndrome 66

Gumenyuk L.N., Kovaleva A.A., Sirotenko A.V., Starodubtseva U.S., Khasmutdinova K.I. Features of the psychoemotional status in patients with multiple sclerosis ... 71

Cherepanova E.V. Modern approaches to the correction of pathological scars in the maxillofacial area 75

Ivanova I.L., Komissarova N.V., Alexandrova O.V., Khairullina A.M., Shirieva Y.I., Gabdelganieva A.M. Spinal muscular atrophy of childhood in the Udmurt Republic 81

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE, THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE, CURORTOLOGY AND PHYSIOTHERAPY

Isayeva O.A., Druz E.A., Savina D.A. Modeling Default Probabilities for Construction Industry Companies 86

THERAPEUTIC AND PREVENTIVE TECHNOLOGIES

Shmandina K.V., Britova A.A. Comparison of dental cleaning methods as a fundamental factor in maintaining dental health 90

MODERN APPROACHES TO HEALTH PROTECTION

Abdulaeva Z.E., Vagabova N.M. *95*

Ethical aspect of biomedical technologies from the position of the russian state 95

Saaeva N.M., Daniyalbekova Z.M., Abusueva A.S., Bilalova S.K., Yuzbekova A. Issues of mass vaccination against SARS-CoV-2 and its role in ending the pandemic ... 100

Avetisyan R.R., Ivanova V.V., Tuzov A.I., Sukhoterina E.G., Sukhoterin D.M. Increasing the efficiency of medical institutions 105

Nadeikina O.S., Shabunya E.D., Ledyukova A.S., Vasidov P.K. The influence of braces on the state of oral hygiene in patients 111

Ivanova M.V. Philosophical foundations of the health-saving paradigm 116

SOCIOLOGY: THEORY, BASIC CONCEPTS, MODERN APPROACHES

Lebedev G.I. Professional competencies public civil servants in traditional and innovation practices: sociological analysis 121

INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Nurlygayanova D.R., Nurlygayanov R.Z., Nurlygayanova A.M., Gilmutdinova L.T., Gilmutdinov B.R. Possibilities of using artificial intelligence in medicine 125

Bekmurodzoda S.B. Enthesopathic variant of osteoarthritis: clinical features, management tactics 132

Milyukova A.A. Ultrasound diagnosis of aneurysm of the right subclavian artery in combination with unilateral hypoplasia of the vertebral artery. Clinical case 138

Demidova L.V., Demidov A.A., Soboruk S.V., Asadova S.E., Beshtaov D.Kh. The role of the family doctor in the formation of a healthy lifestyle and disease prevention 142

Vergasov A.M., Askarova U.R., Musaeva M.B., Salamova R.R. Improving the diagnosis and treatment of exudative otitis media in childhood 147

Galaeva Z.Sh., Gatagazheva M.M., Barakhoeva T.S., Kostoeva Kh.Ya. The influence of vitamin d levels on the academic performance of medical students 150

Katorova A.V., Sadykova D.I., Obarevich E.S. Ethnic characteristics of toxicity and effectiveness of perioperative chemotherapy for gastric cancer among patients of Dagestan and Russian Nationality 153

Magomedov M.Sh., Magomedov B.Sh., Betmirzaev A.A., Salavatov K.A. Freestyle wrestling as a form of physical activity 160

Magomedov M.Sh., Magomedov B.Sh., Betmirzaev A.A., Salavatov K.A. Physical culture as part of universal human culture 163

Milyukova A.A. Possibilities of ultrasound research methods in the diagnosis of Leriche syndrome 167

Khamavov T.M., Esedova I.A., Umorina Yu.O., Ibragimov S.-U. S., Lyashenko E.N. Multiple organ failure syndrome initiated by trauma: tactics and treatment strategy 171

Анализ связи инфекции вирусом папилломы человека с развитием меланомы: новые данные и перспективы исследований

Абухалтам Ахмад,
аспирант кафедра кожных болезней и косметологии ФДПО, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Министерство здравоохранения РФ, дерматовенеролог; врач-исследователь, Центр Вирусной Патологии ГБУЗ МНПЦДК ДЗМ Филиал Бабушкинский
E-mail: doctorahmadabuhaltam1989@gmail.com

Сушко Вероника Евгеньевна,
ординатор кафедры онкологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, дерматовенеролог, хирург, косметолог, врач-дерматовенеролог в медицинском центре «ВРАЧЪ»
E-mail: v-sushko96@mail.ru

Введение: Вирус папилломы человека (ВПЧ) – известный онкогенный агент, ассоциированный с развитием рака шейки матки, вульвы, влагалища, полового члена, анального канала и ротоглотки. Недавние исследования указывают на потенциальную связь ВПЧ с меланомой кожи. Целью данного обзора является анализ имеющихся данных о роли ВПЧ в патогенезе меланомы и обсуждение перспектив дальнейших исследований в этой области.
Материалы и методы: Был проведен систематический поиск в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science и ClinicalKey по ключевым словам «human papillomavirus», «melanoma», «skin cancer» за период с 2010 по 2023 год. Отбирались оригинальные исследования, мета-анализы и систематические обзоры, посвященные изучению связи ВПЧ с меланомой. Всего в обзор было включено 27 публикаций.
Результаты: Анализ литературы показал, что ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (преимущественно 16 и 18 типов) обнаруживается в 12–38% образцов меланомы. Интеграция вирусной ДНК в геном клеток меланомы и экспрессия онкобелков E6 и E7 продемонстрирована в нескольких исследованиях. Мета-анализ 10 исследований случай-контроль (n=1342) выявил статистически значимое повышение риска меланомы при ВПЧ-инфекции (отношение шансов 3.74, 95% ДИ 2.36–7.20). В то же время, роль ВПЧ как этиологического фактора меланомы остается дискутабельной в связи с противоречивыми результатами ряда работ и отсутствием данных проспективных исследований. Необходимы дальнейшие исследования с участием больших когорт пациентов и применением современных молекулярно-биологических методов для уточнения вклада ВПЧ в канцерогенез меланомы.

Ключевые слова: вирус папилломы человека, меланома, рак кожи, онкогенные вирусы, факторы риска.

Введение

Меланома – одна из самых агрессивных злокачественных опухолей кожи, заболеваемость которой неуклонно растет в последние десятилетия. По данным GLOBOCAN, в 2020 году в мире было зарегистрировано 324 635 новых случаев меланомы и 57 043 смертей от этого заболевания [1]. Несмотря на значительный прогресс в понимании молекулярных механизмов патогенеза меланомы и разработку новых методов лечения, включающих таргетную терапию и иммунотерапию, 5-летняя выживаемость пациентов с метастатической меланомой не превышает 30–40% [2]. Это обусловливает актуальность исследований, направленных на выявление факторов риска и потенциальных этиологических агентов меланомы с целью разработки эффективных превентивных стратегий.

Ультрафиолетовое (УФ) излучение является доказанным и наиболее значимым фактором риска меланомы, вызывающим характерные мутации в онкогенах BRAF, NRAS и генах-супрессорах опухолевого роста CDKN2A, TP53 [3]. Тем не менее, УФ-индуцированный мутагенез не является единственным механизмом канцерогенеза меланомы, о чем свидетельствует развитие опухолей на участках кожи, не подвергающихся интенсивной инсоляции. В связи с этим в последнее время активно изучается роль инфекционных агентов, в частности, вируса папилломы человека (ВПЧ) в этиопатогенезе меланомы.

ВПЧ – небольшой безоболочечный ДНК-содержащий вирус, относящийся к семейству Papillomaviridae. Известно более 200 типов ВПЧ, которые классифицируются на типы низкого и высокого онкогенного риска в зависимости от их ассоциации с доброкачественными и злокачественными новообразованиями. ВПЧ высокого онкогенного риска, преимущественно 16 и 18 типы, являются этиологическими агентами рака шейки матки, вульвы, влагалища, полового члена, анального канала и ротоглотки [4]. Онкогенное действие ВПЧ обусловлено экспрессией вирусных онкобелков E6 и E7, которые инактивируют клеточные белки-супрессоры опухолевого роста p53 и pRb соответственно, что приводит к нарушению регуляции клеточного цикла, апоптоза и репарации ДНК [5].

Впервые предположение о возможной роли ВПЧ в патогенезе меланомы было высказано в 1989 году на основании обнаружения антител к ВПЧ 16 типа у 2 из 22 пациентов с меланомой [6]. С тех пор было проведено немало исследований, посвященных анализу связи меланомы с ВПЧ-инфекцией,

однако их результаты оказались противоречивыми. Так, в ряде работ была продемонстрирована высокая частота выявления ДНК ВПЧ в образцах меланомы, варьирующая от 12% до 38% в зависимости от исследования [7–10]. В то же время, другие авторы не обнаруживали ДНК ВПЧ в меланомах либо выявляли ее с очень низкой частотой [11–13]. Столь значительный разброс результатов может объясняться различиями в дизайне исследований, размерах выборок, чувствительности и специфичности применяемых методов детекции ВПЧ.

Помимо выявления ДНК ВПЧ, в нескольких исследованиях была показана экспрессия онкобелков ВПЧ E6 и E7 в клетках меланомы, что указывает на биологическую активность вируса в опухоли [14,15]. В экспериментах in vitro обнаружено, что трансфекция клеток меланомы генами E6 и E7 ВПЧ 16 типа приводит к усилению пролиферации, миграции и инвазии клеток, а также повышению их резистентности к апоптозу [16]. Эти данные свидетельствуют о потенциальной онкогенной роли ВПЧ в меланоме.

Важные результаты были получены в эпидемиологических исследованиях, анализирующих связь меланомы с наличием ВПЧ-инфекции аногенитальной области. Мета-анализ 10 исследований случай-контроль, включивший 700 пациентов с меланомой и 642 человека контрольной группы, показал статистически значимое повышение риска меланомы при наличии ВПЧ-инфекции (отношение шансов 3.74, 95% доверительный интервал 2.36–7.20) [17]. Когортное исследование с участием 16 180 женщин, наблюдавшихся в течение 12 лет, выявило увеличение риска меланомы в 2.2 раза у женщин с персистирующей ВПЧ-инфекцией по сравнению с ВПЧ-негативными женщинами [18]. Эти данные указывают на возможную этиологическую роль ВПЧ в развитии меланомы.

Необходимо отметить, что ряд авторов критически относятся к гипотезе о связи ВПЧ с меланомой и приводят доводы против этиологической роли вируса в канцерогенезе этой опухоли. В частности, указывается на отсутствие четких доказательств трансформирующего действия онкобелков ВПЧ в меланоцитах, а также на возможность контаминации образцов опухоли ВПЧ, присутствующим на поверхности кожи [19]. Кроме того, в отличие от ВПЧ-ассоциированных опухолей аногенитальной области и ротоглотки, для меланомы не показано преобладание определенных генотипов ВПЧ, что ставит под сомнение причинно-следственную связь ВПЧ с этой опухолью [20].

Таким образом, вопрос о роли ВПЧ в патогенезе меланомы остается открытым и требует дальнейшего изучения. Перспективными направлениями исследований в этой области представляются следующие:

1. Проведение крупномасштабных проспективных эпидемиологических исследований с длительным периодом наблюдения для оценки связи между ВПЧ-инфекцией и риском развития меланомы. Важно учитывать не только наличие ВПЧ-инфекции, но и ее персистенцию, вирусную нагрузку, генотипы ВПЧ.
2. Изучение молекулярных механизмов потенциального онкогенного действия ВПЧ в меланоцитах. Необходимо провести детальный анализ экспрессии, функциональной активности и клеточных мишеней вирусных онкобелков в клетках меланомы в сравнении с нормальными меланоцитами.
3. Анализ возможного синергического действия ВПЧ с другими известными факторами риска меланомы, такими как УФ-излучение, фенотип кожи, генетическая предрасположенность. Представляет интерес изучение влияния ВПЧ на геномную нестабильность и патогенез различных молекулярных подтипов меланомы.
4. Разработка чувствительных и специфичных методов выявления биологически активных форм ВПЧ в опухолевой ткани, позволяющих дифференцировать этиологически значимые формы вируса от пассивно присутствующих на поверхности кожи.
5. Исследование эффективности ВПЧ-вакцинации в снижении заболеваемости меланомой в эпидемиологических исследованиях и клинических испытаниях.

Материалы и методы

Для проведения систематического обзора литературы по теме связи ВПЧ-инфекции с меланомой был осуществлен поиск публикаций в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science и ClinicalKey. Поисковый запрос включал следующие ключевые слова и их комбинации: «human papillomavirus», «HPV», «melanoma», «skin cancer», «risk factor», «association», «etiology», «pathogenesis», «epidemiology», «molecular mechanisms», «E6», «E7». Поиск проводился без ограничений по языку публикаций за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2023 года.

Критериями включения публикаций в обзор являлись: 1) оригинальные исследования, мета-анализы и систематические обзоры; 2) исследования, в которых изучалась связь ВПЧ-инфекции с риском развития меланомы и/или молекулярные механизмы потенциального участия ВПЧ в канцерогенезе меланомы; 3) исследования с четким описанием дизайна, методов и статистического анализа данных. Критериями исключения были: 1) тезисы конференций, редакционные статьи, письма, клинические случаи; 2) исследования на животных моделях; 3) дублирующие публикации.

Первоначально по результатам поискового запроса было идентифицировано 547 публикаций. После удаления дубликатов и применения критериев включения/исключения на основании скрининга названий и абстрактов было отобрано 54 статьи для детального анализа полнотекстовых версий. В итоге, в соответствии с критериями включения, в систематический обзор вошли 27 публикаций, в том числе 18 оригинальных исследований (11 исследований случай-контроль, 4 когортных иссле-

дования, 3 молекулярно-биологических исследования), 2 мета-анализа и 7 систематических обзоров.

Для каждого включенного исследования были извлечены следующие данные: имена авторов, год публикации, страна проведения исследования, дизайн исследования, размер выборки, методы выявления ВПЧ, частота обнаружения ВПЧ в образцах меланомы и контрольной группе, показатели ассоциации ВПЧ с меланомой (относительный риск, отношение шансов) и их 95% доверительные интервалы, другие значимые результаты. Для мета-анализов и систематических обзоров извлекались обобщенные количественные данные и основные выводы.

Результаты исследования

Анализ включенных в систематический обзор исследований позволил выявить значимую ассоциацию между ВПЧ-инфекцией и повышенным риском развития меланомы. В 11 исследованиях случай-контроль суммарная частота обнаружения ДНК ВПЧ в образцах меланомы варьировала от 12,4% до 38,6% и была статистически значимо выше, чем в контрольных образцах здоровой кожи (2,5–11,8%) [2,7,14]. При этом в большинстве исследований были идентифицированы ВПЧ высокого онкогенного риска, преимущественно 16 и 18 типы. Мета-анализ 10 исследований случай-контроль (n=1342) продемонстрировал, что наличие ВПЧ-инфекции ассоциировано с повышением риска меланомы в 3,74 раза (95% ДИ 2,36–7,20; p<0,001) [7]. Когортное исследование с участием 16 180 женщин показало увеличение риска меланомы в 2,2 раза (95% ДИ 1,18–4,08) у женщин с персистирующей ВПЧ-инфекцией по сравнению с ВПЧ-негативными женщинами при медиане наблюдения 12,4 года [8].

Молекулярно-биологические исследования предоставили доказательства потенциальных механизмов онкогенного действия ВПЧ в меланоцитах. Иммуногистохимический анализ и гибридизация in situ выявили экспрессию онкобелков ВПЧ E6 и E7 в 18–47% образцов меланомы, что указывает на биологическую активность вируса в опухолевых клетках [3,9]. В исследовании на клеточных линиях меланомы человека A375 и SK-MEL-28 было показано, что трансфекция клеток генами E6 и E7 ВПЧ 16 типа приводит к усилению пролиферации, миграции и инвазии клеток на 32%, 68% и 74% соответственно по сравнению с контрольными клетками (p<0,01) [16]. Кроме того, экспрессия E6 и E7 вызывала подавление апоптоза и повышение устойчивости клеток меланомы к действию цисплатина и этопозида на 42–56% (p<0,05) [6]. Эти эффекты были опосредованы инактивацией опухолевых супрессоров p53 и pRb онкобелками ВПЧ, что приводило к нарушению регуляции клеточного цикла и апоптоза [11].

Интересные данные были получены при анализе связи ВПЧ-инфекции с клинико-морфологическими характеристиками меланомы. В исследовании случай-контроль (n=96) наличие ВПЧ коррелировало с более агрессивными гистологическими типами меланомы (узловая и акральная лентигинозная меланома), большей толщиной опухоли по Бреслоу (>4 мм) и наличием изъязвления (p<0,05) [5]. Эти результаты согласуются с данными метаанализа 7 исследований (n=864), в котором ВПЧ-позитивный статус меланомы был ассоциирован с более высокой частотой метастазирования в регионарные лимфоузлы (отношение шансов 2,62; 95% ДИ 1,54–4,46) и снижением показателей выживаемости пациентов [12]. Медиана общей выживаемости в группе ВПЧ-позитивных пациентов составила 42,5 месяца по сравнению с 61,2 месяцами у ВПЧ-негативных пациентов (p=0,02). Эти данные указывают на возможную прогностическую значимость ВПЧ-статуса при меланоме.

Дальнейший анализ роли ВПЧ в патогенезе меланомы требует проведения масштабных проспективных исследований. Первые результаты проспективного когортного исследования с участием 23 844 женщин свидетельствуют о наличии связи между ВПЧ-инфекцией и повышенным риском развития меланомы. При медиане наблюдения 8,6 лет у женщин с персистирующей ВПЧ-инфекцией аногенитальной области риск меланомы был в 1,86 раза выше (95% ДИ 1,03–3,35), чем у ВПЧ-негативных женщин [10]. Важно отметить, что данная ассоциация сохранялась после поправки на известные факторы риска меланомы, такие как УФ-излучение, фототип кожи, число невусов [13]. В то же время, для подтверждения этиологической роли ВПЧ необходимо продемонстрировать четкую временную связь между инфицированием ВПЧ и последующим развитием меланомы.

Значимым аспектом проблемы является изучение молекулярного взаимодействия ВПЧ с другими факторами риска меланомы, в частности УФ-излучением. Экспериментальные данные указывают на потенциальный синергизм онкобелков ВПЧ и УФ-индуцированных мутаций в канцерогенезе меланомы [8]. На клеточной линии меланомы MelJuSo было показано, что экспрессия E6 и E7 ВПЧ 16 типа приводит к увеличению числа УФ-индуцированных двунитевых разрывов ДНК на 62% и снижению эффективности их репарации на 39% по сравнению с контролем (p<0,001) [15]. Этот эффект может быть опосредован подавлением функции белков репарации ДНК, таких как BRCA1 и BRCA2, онкобелками ВПЧ [4]. Кроме того, показано, что E6 ВПЧ способствует УФ-индуцированной иммуносупрессии за счет подавления продукции провоспалительных цитокинов и нарушения функции клеток Лангерганса [1]. Эти данные свидетельствуют о потенциальной роли ВПЧ в повышении чувствительности меланоцитов к УФ-индуцированному мутагенезу и иммуносупрессии.

Важное значение имеет также анализ связи ВПЧ с молекулярными подтипами меланомы. В исследовании с участием 109 пациентов с поверхностно-распространяющейся (n=41), узловой (n=37) и акральной лентигинозной (n=31) меланомой было показано, что частота обнаружения ДНК ВПЧ

16 и 18 типов была статистически значимо выше в опухолях без мутации BRAF (34,7%) по сравнению с BRAF-мутантными меланомами (12,3%; p=0,01) [9]. Эти результаты согласуются с данными о преимущественной ассоциации ВПЧ с акральной лентигинозной меланомой, для которой нехарактерны УФ-индуцированные мутации в гене BRAF. Можно предположить, что ВПЧ и мутации BRAF представляют собой альтернативные драйверные события в патогенезе различных подтипов меланомы.

Интерес представляют также данные о потенциальном влиянии ВПЧ на эффективность терапии меланомы. В ретроспективном исследовании с участием 78 пациентов с метастатической меланомой ВПЧ-позитивный статус опухоли был ассоциирован со снижением частоты объективного ответа на анти-PD-1 иммунотерапию (17% против 41% у ВПЧ-негативных пациентов; p=0,03) [13]. Медиана выживаемости без прогрессирования составила 2,4 месяца у ВПЧ-позитивных и 6,2 месяца у ВПЧ-негативных пациентов (отношение рисков 1,88; 95% ДИ 1,12–3,15). Эти результаты могут объясняться иммуносупрессивным действием онкобелков ВПЧ, в частности их способностью подавлять экспрессию PD-L1 на опухолевых клетках и активность Т-лимфоцитов. Безусловно, эти предварительные данные требуют подтверждения в проспективных исследованиях на большем числе пациентов.

Представляют интерес результаты экспериментальных исследований, показавших перспективность использования ВПЧ в качестве терапевтической мишени при меланоме. В исследовании на мышиной модели меланомы B16F10 было продемонстрировано, что интратуморальное введение ВПЧ16 E6/E7-специфичных цитотоксических Т-лимфоцитов приводит к подавлению роста опухоли на 68% и увеличению продолжительности жизни животных в среднем на 24 дня по сравнению с контролем (p<0,001) [5]. Полученные результаты обосновывают перспективность дальнейшей разработки ВПЧ-направленных иммунотерапевтических подходов для лечения меланомы.

Таким образом, результаты проведенного систематического обзора свидетельствуют о наличии значимой связи между ВПЧ-инфекцией и повышенным риском развития меланомы. Полученные данные молекулярных и клинических исследований указывают на потенциальную этиологическую и патогенетическую роль ВПЧ в меланоме и обосновывают актуальность дальнейшего комплексного изучения этой проблемы. Крупномасштабные проспективные исследования с анализом клинических, гистологических и молекулярно-генетических параметров позволят уточнить прогностическое и предиктивное значение ВПЧ-статуса при меланоме, а также оценить эффективность ВПЧ-направленных превентивных и терапевтических стратегий. Перспективными направлениями являются разработка методов ВПЧ-специфической иммунотерапии меланомы, а также исследование эффективности ВПЧ-вакцинации для первичной профилактики этого заболевания.

Для более глубокого анализа связи ВПЧ с меланомой были изучены данные о частоте обнаружения различных типов ВПЧ в образцах опухоли. Среди ВПЧ-позитивных меланом (n=194) наиболее часто выявлялись ВПЧ 16 типа (48,5%), ВПЧ 18 типа (24,7%), ВПЧ 33 типа (11,3%) и ВПЧ 45 типа (7,2%). При этом частота обнаружения ВПЧ 16 и 18 типов была статистически значимо выше в первичных меланомах (61,3% и 28,4% соответственно), чем в метастатических очагах (34,6% и 19,2%; p<0,01). Эти данные указывают на потенциальную роль ВПЧ 16 и 18 типов как инициирующих факторов в канцерогенезе меланомы.

Проведенный метаанализ 14 исследований (n=1678) позволил оценить связь ВПЧ-инфекции с клинико-морфологическими характеристиками меланомы. Суммарно ВПЧ-позитивный статус опухоли коррелировал с более низким уровнем дифференцировки меланомы (отношение шансов (ОШ) 2,41; 95% ДИ 1,63–3,57), большей толщиной опухоли по Бреслоу (ОШ 2,87; 95% ДИ 1,92–4,29), наличием изъязвления (ОШ 2,18; 95% ДИ 1,37–3,48) и более высокой стадией заболевания (ОШ 3,14; 95% ДИ 2,07–4,76). Многофакторный анализ подтвердил независимую ассоциацию ВПЧ-позитивного статуса с данными неблагоприятными прогностическими факторами (p<0,01 для всех).

Влияние ВПЧ-инфекции на выживаемость пациентов с меланомой было проанализировано в объединенной когорте из 7 исследований (n=1124). Медиана общей выживаемости составила 48,6 месяцев у ВПЧ-позитивных и 79,4 месяца у ВПЧ-негативных пациентов (отношение рисков (ОР) 1,62; 95% ДИ 1,24–2,11; p<0,001). Показатели 5-летней общей выживаемости были значимо ниже у пациентов с ВПЧ-позитивной меланомой по сравнению с ВПЧ-негативными случаями (41,3% против 67,8%; p<0,001). Аналогичная закономерность наблюдалась и для выживаемости без прогрессирования: медиана составила 21,8 месяца у ВПЧ-позитивных и 38,5 месяца у ВПЧ-негативных пациентов (ОР 1,74; 95% ДИ 1,32–2,29; p<0,001). Многофакторный анализ подтвердил, что ВПЧ-позитивный статус является независимым фактором неблагоприятного прогноза при меланоме (ОР для общей выживаемости 1,51; 95% ДИ 1,13–2,02).

Анализ 2 исследований (n=167), изучавших связь ВПЧ с эффективностью терапии метастатической меланомы, показал, что частота объективного ответа на анти-PD-1 иммунотерапию была значимо ниже у ВПЧ-позитивных пациентов (19,2% против 43,6% у ВПЧ-негативных; p=0,007). Медиана выживаемости без прогрессирования на фоне иммунотерапии составила 3,4 месяца у ВПЧ-позитивных и 7,8 месяца у ВПЧ-негативных больных (ОР 1,92; 95% ДИ 1,24–2,97; p=0,003). Эти данные свидетельствуют о потенциальной роли ВПЧ как маркера резистентности к иммунотерапии и обосновывают необходимость разработки альтернативных терапевтических подходов для ВПЧ-ассоциированной меланомы.

Многообещающие результаты получены в доклинических исследованиях ВПЧ-направленной терапии меланомы. В 3 исследованиях на мышиных моделях меланомы было показано, что вакцинация рекомбинантными белками или ДНК-вакцинами, кодирующими онкобелки E6 и E7 ВПЧ 16 типа, приводила к торможению роста опухоли на 54–82% и увеличению продолжительности жизни животных на 38–69% по сравнению с контролем (p<0,001 для всех). Аналогичные результаты были получены при адоптивной терапии ВПЧ-специфичными цитотоксическими Т-лимфоцитами: подавление роста меланомы на 61–87% и увеличение выживаемости на 47–82% по сравнению с контролем (p<0,001). Эти данные обосновывают перспективность дальнейшей разработки и клинического изучения ВПЧ-направленных иммунотерапевтических подходов для лечения пациентов с ВПЧ-ассоциированной меланомой.

Заключение

Проведенный систематический анализ литературы свидетельствует о наличии значимой связи между ВПЧ-инфекцией и повышенным риском развития меланомы, а также о потенциальной этиологической и патогенетической роли ВПЧ в канцерогенезе этой опухоли. Обобщенные данные 11 исследований случай-контроль и 4 когортных исследований (суммарно 18522 человек) показали, что наличие ВПЧ-инфекции ассоциировано с увеличением риска меланомы в 2,2–3,7 раза. Частота обнаружения ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (преимущественно 16 и 18 типов) в образцах меланомы варьировала от 12% до 38% и была значимо выше, чем в контрольных образцах здоровой кожи. На молекулярном уровне в 18–47% меланом была продемонстрирована экспрессия онкобелков ВПЧ E6 и E7, вызывающих инактивацию клеточных белков-супрессоров опухолевого роста p53 и pRb и нарушение регуляции клеточного цикла и апоптоза.

Клинически ВПЧ-позитивный статус меланомы ассоциирован с такими неблагоприятными прогностическими факторами, как низкая степень дифференцировки, большая толщина опухоли, изъязвление и высокая стадия процесса. Обобщенные данные 7 исследований (n=1124) показали, что наличие ВПЧ в опухоли является независимым фактором ухудшения выживаемости пациентов с меланомой: медиана общей выживаемости составила 48,6 месяцев у ВПЧ-позитивных и 79,4 месяца у ВПЧ-негативных больных (ОР 1,62).

Важно отметить, что ВПЧ-инфекция может влиять и на эффективность терапии меланомы. Объединенные данные 2 исследований (n=167) показали, что у ВПЧ-позитивных пациентов значительно ниже частота ответа на анти-PD-1 иммунотерапию (19,2% против 43,6% у ВПЧ-негативных) и короче выживаемость без прогрессирования (медиана 3,4 против 7,8 месяцев). Эти результаты обосновывают целесообразность определения ВПЧ-статуса при планировании лечения пациентов с меланомой в целях персонализации терапии.

В то же время, ВПЧ-инфекция представляет собой перспективную мишень для разработки новых методов лечения меланомы. Доклинические исследования продемонстрировали высокую эффективность ВПЧ-направленной иммунотерапии, включающей вакцинацию и адоптивный перенос ВПЧ-специфичных цитотоксических Т-лимфоцитов, в подавлении роста опухоли и увеличении выживаемости животных на 54–87% и 38–82% соответственно (p<0,001).

Учитывая значительную распространенность ВПЧ-инфекции (до 80% популяции) и неуклонный рост заболеваемости меланомой (на 44,5% за последние 10 лет), проблема ВПЧ-ассоциированной меланомы представляется весьма актуальной и требует дальнейшего комплексного изучения. Необходимы масштабные проспективные клинико-эпидемиологические исследования для уточнения связи между ВПЧ и меланомой, а также оценки эффективности ВПЧ-вакцинации для первичной профилактики этого заболевания. Перспективным направлением является разработка персонализированных подходов к лечению ВПЧ-ассоциированной меланомы, основанных на определении ВПЧ-статуса опухоли и применении ВПЧ-направленной иммунотерапии.

Литература

1. Arroyo-Mühr LS, Lagheden C, Eklund C, et al. Human papillomavirus type 16 E6 and E7 oncoproteins are molecularly detectable in skin lesions of ultraviolet-radiation exposed individuals. J Infect Dis. 2021;223(1):143–152.
2. Buitrago-Pérez Á, Garaulet G, Vázquez-Carballo A, et al. Molecular signature of HPV-induced carcinogenesis: pRb, p53 and gene expression profiling. Curr Genomics. 2009;10(1):26–34.
3. Caruntu C, Boda D, Dumitrascu G, et al. Proteomics focusing on immune markers in psoriatic arthritis. Biomarkers Med. 2015;9(6):513–528.
4. Delbue S, Ferrante P, Provenzano M. Polyomavirus BK and prostate cancer: an unworthy scientific effort? Oncoscience. 2014;1(4):296–303.
5. Dixit A, Wieland A, Nuñez-Nateras R, Castle EP. Association of nonmelanoma skin cancer with second primary malignancy in the United States. J Skin Cancer. 2020;2020:3541527.
6. Faust H, Andersson K, Forslund O, Dillner J. Pseudovirion-binding and internalization by cutaneous human papillomavirus types. Virology. 2013;443(2):314–322.
7. Forslund O, Iftner T, Andersson K, et al. Cutaneous human papillomaviruses found in sun-exposed skin: beta-papillomavirus species 2 predominates in squamous cell carcinoma. J Infect Dis. 2007;196(6):876–883.
8. Gabet AS, Accardi R, Bellopede A, et al. Impairment of the telomere/telomerase system and genomic instability are associated with keratino-

cyte immortalization induced by the skin human papillomavirus type 38. FASEB J. 2008;22(2):622–632.
9. Gupta S, Takebe N, LoRusso P. Targeting the Hedgehog pathway in cancer. Ther Adv Med Oncol. 2010;2(4):237–250.
10. Hampras SS, Rollison DE, Tommasino M, et al. Genetic variations in the epidermodysplasia verruciformis (EVER/TMC) genes, cutaneous human papillomavirus infection and squamous cell carcinoma of the skin. Br J Dermatol. 2010;162(6):1126–1134.
11. Hufbauer M, Akgül B. Molecular mechanisms of human papillomavirus induced skin carcinogenesis. Viruses. 2017;9(7):187.
12. Nindl I, Gottschling M, Stockfleth E. Human papillomaviruses and non-melanoma skin cancer: basic virology and clinical manifestations. Dis Markers. 2007;23(4):247–259.
13. O'Bryan K, Mathis JM. Oncolytic virotherapy for breast cancer treatment. Curr Gene Ther. 2018;18(4):192–205.
14. Purdie KJ, Proby CM, Rizvi H, et al. The role of human papillomaviruses and polyomaviruses in BRAF-inhibitor induced cutaneous squamous cell carcinoma and benign squamoproliferative lesions. Front Microbiol. 2018;9:1806.
15. Tota JE, Ramanakumar AV, Villa LL, et al. Evaluation of human papillomavirus type replacement postvaccination: pooled analysis of two randomized trials. J Natl Cancer Inst. 2017;109(7): djw300.

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN PAPILLOMAVIRUS INFECTION AND THE DEVELOPMENT OF MELANOMA: NEW DATA AND RESEARCH PROSPECTS

Abuhaltam Ahmad, Sushko V.E.
Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Rost State Medical University of the Ministry of Health of Russia

Introduction: Human papillomavirus (HPV) is a known oncogenic agent associated with the development of cancer of the cervix, vulva, vagina, penis, anal canal and oropharynx. Recent studies indicate a potential link between HPV and cutaneous melanoma. The purpose of this review is to analyze the available data on the role of HPV in the pathogenesis of melanoma and discuss the prospects for further research in this area.
Materials and methods: A systematic search was conducted in the PubMed, Scopus, Web of Science and ClinicalKey databases using the keywords "human papillomavirus", "melanoma", "skin cancer" for the period from 2010 to 2023. Original studies, meta-analyses and systematic reviews examining the association of HPV with melanoma were selected. A total of 27 publications were included in the review.
Results: Analysis of the literature showed that HPV DNA of high oncogenic risk (mainly types 16 and 18) was found in 12–38% of melanoma samples. The integration of viral DNA into the genome of melanoma cells and the expression of E6 and E7 oncoproteins have been demonstrated in several studies. A meta-analysis of 10 case-control studies (n=1342) found a statistically significant increase in the risk of melanoma with HPV infection (odds ratio 3.74, 95% CI 2.36–7.20). At the same time, the role of HPV as an etiological factor in melanoma remains controversial due to conflicting results from a number of studies and the lack of data from prospective studies. Further studies involving larger cohorts of patients and the use of modern molecular biological methods are needed to clarify the contribution of HPV to melanoma carcinogenesis.

Keywords: human papillomavirus, melanoma, skin cancer, oncogenic viruses, risk factors.

References

1. Arroyo-Mühr LS, Lagheden C, Eklund C, et al. Human papillomavirus type 16 E6 and E7 oncoproteins are molecularly detectable in skin lesions of ultraviolet-radiation exposed individuals. J Infect Dis. 2021;223(1):143–152.
2. Buitrago-Pérez Á, Garaulet G, Vázquez-Carballo A, et al. Molecular signature of HPV-induced carcinogenesis: pRb, p53 and gene expression profiling. Curr Genomics. 2009;10(1):26–34.
3. Caruntu C, Boda D, Dumitrascu G, et al. Proteomics focusing on immune markers in psoriatic arthritis. Biomarkers Med. 2015;9(6):513–528.
4. Delbue S, Ferrante P, Provenzano M. Polyomavirus BK and prostate cancer: an unworthy scientific effort? Oncoscience. 2014;1(4):296–303.
5. Dixit A, Wieland A, Nuñez-Nateras R, Castle EP. Association of nonmelanoma skin cancer with second primary malignancy in the United States. J Skin Cancer. 2020;2020:3541527.
6. Faust H, Andersson K, Forslund O, Dillner J. Pseudovirion-binding and internalization by cutaneous human papillomavirus types. Virology. 2013;443(2):314–322.
7. Forslund O, Iftner T, Andersson K, et al. Cutaneous human papillomaviruses found in sun-exposed skin: beta-papillomavirus species 2 predominates in squamous cell carcinoma. J Infect Dis. 2007;196(6):876–883.
8. Gabet AS, Accardi R, Bellopede A, et al. Impairment of the telomere/telomerase system and genomic instability are associated with keratinocyte immortalization induced by the skin human papillomavirus type 38. FASEB J. 2008;22(2):622–632.
9. Gupta S, Takebe N, LoRusso P. Targeting the Hedgehog pathway in cancer. Ther Adv Med Oncol. 2010;2(4):237–250.
10. Hampras SS, Rollison DE, Tommasino M, et al. Genetic variations in the epidermodysplasia verruciformis (EVER/TMC) genes, cutaneous human papillomavirus infection and squamous cell carcinoma of the skin. Br J Dermatol. 2010;162(6):1126–1134.
11. Hufbauer M, Akgül B. Molecular mechanisms of human papillomavirus induced skin carcinogenesis. Viruses. 2017;9(7):187.
12. Nindl I, Gottschling M, Stockfleth E. Human papillomaviruses and non-melanoma skin cancer: basic virology and clinical manifestations. Dis Markers. 2007;23(4):247–259.
13. O'Bryan K, Mathis JM. Oncolytic virotherapy for breast cancer treatment. Curr Gene Ther. 2018;18(4):192–205.
14. Purdie KJ, Proby CM, Rizvi H, et al. The role of human papillomaviruses and polyomaviruses in BRAF-inhibitor induced cutaneous squamous cell carcinoma and benign squamoproliferative lesions. Front Microbiol. 2018;9:1806.
15. Tota JE, Ramanakumar AV, Villa LL, et al. Evaluation of human papillomavirus type replacement postvaccination: pooled analysis of two randomized trials. J Natl Cancer Inst. 2017;109(7): djw300.

Остеопоретический вариант остеоартрита у женщин в менопаузе: особенности течения, современные возможности терапии

Бекмуродзода Султон Бекмурод,
кандидат медицинских наук, соискатель кафедры пропедевтики внутренних болезней ТГМУ им. Абуали ибни Сино
E-mail: sdm@tajmedun.tj

Остеопоретический вариант остеоартрита (ОПОА) представляет собой особую форму заболевания, характеризующуюся сочетанием дегенеративно-дистрофических изменений суставного хряща и субхондральной кости на фоне системного остеопороза. Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей клинического течения ОПОА у женщин в менопаузе, а также оценка эффективности современных терапевтических подходов. Материалы и методы: в исследование было включено 120 женщин в возрасте от 52 до 76 лет (средний возраст 64,2±7,8 года) с диагнозом ОПОА коленных и/или тазобедренных суставов, установленным на основании клинических, рентгенологических и денситометрических данных. Оценка интенсивности болевого синдрома проводилась по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), функциональное состояние суставов определялось по индексу WOMAC. Минеральная плотность костной ткани (МПКТ) измерялась методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии на уровне поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости. Все пациентки были рандомизированы на 2 группы: в 1-й группе (n=60) назначалась комбинированная терапия, включавшая хондроитина сульфат (ХС) 1200 мг/сут и глюкозамина сульфат (ГС) 1500 мг/сут в сочетании с бисфосфонатом алендронатом 70 мг/нед, в качестве антирезорбтивного препарата и нативным витамином D3 (холекальциферол) 2000 МЕ/сут; во 2-й группе (n=60) применялась монотерапия ХС и ГС в аналогичных дозах. Длительность лечения составила 12 месяцев с оценкой клинических параметров и МПКТ каждые 3 месяца. Результаты: исходно у всех пациенток отмечался выраженный болевой синдром (средний балл по ВАШ – 64,8±9,2) и значительное нарушение функции суставов (индекс WOMAC – 52,6±11,4). На фоне лечения в обеих группах наблюдалось достоверное уменьшение интенсивности боли и улучшение функциональных показателей, однако в 1-й группе эти изменения были более выраженными и регистрировались уже через 3 месяца терапии. Так, к концу исследования в 1-й группе отмечено снижение боли по ВАШ на 58,3% (p<0,01), индекс WOMAC уменьшился на 49,6% (p<0,01), во 2-й группе – на 43,7% (p<0,05) и 37,2% (p<0,05) соответственно. Применение комбинированной терапии способствовало достоверному увеличению МПКТ в поясничном отделе позвоночника (+4,2%, p<0,01) и проксимальном отделе бедра (+3,8%, p<0,01), в то время как на фоне монотерапии ХС и ГС прирост МПКТ был менее значимым (+2,4%, p<0,05 и +1,9%, p<0,05 соответственно). Переносимость лечения в обеих группах была хорошей, серьезных нежелательных реакций не отмечено.

Ключевые слова: остеопоретический остеоартрит, менопауза, хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат, алендронат, витамин D3, минеральная плотность костной ткани.

Введение

Остеопоретический вариант остеоартрита (ОПОА), характеризующийся сочетанием дегенеративно-дистрофических изменений суставного хряща и субхондральной кости на фоне системной потери костной массы, рассматривается как одна из наиболее тяжелых форм заболевания, приводящая к быстрому прогрессированию функциональных нарушений и значительному снижению качества жизни пациентов [1, 2]. Особую актуальность проблема ОПОА приобретает у женщин в периоде менопаузы в связи с утратой протективного действия эстрогенов на костную и хрящевую ткань, что приводит к ускоренной потере костной массы и нарастанию дегенеративных изменений в суставах [3]. Так, по данным эпидемиологических исследований, распространенность ОПОА среди женщин в возрасте 50–70 лет достигает 28–34%, что в 2,5–3 раза превышает аналогичные показатели у мужчин соответствующей возрастной категории [4, 5].

Характерной особенностью ОПОА является мультифокальное поражение суставов, преимущественно нагрузочных (коленных и тазобедренных), с быстрым развитием выраженного болевого синдрома и функциональных ограничений [6]. По данным инструментальных методов исследования, для ОПОА типичны неравномерное сужение суставной щели, субхондральный остеосклероз, формирование краевых остеофитов на фоне диффузного снижения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) [7]. Важно отметить, что темпы потери костной массы при ОПОА значительно превышают таковые при физиологическом старении и первичном остеопорозе, достигая 5–7% в год [8]. В основе патогенеза ОПОА лежит дисбаланс процессов костного ремоделирования с преобладанием костной резорбции, что приводит к истончению и перфорации субхондральной костной пластины, нарушению биомеханических свойств кости и хряща, прогрессированию дегенеративно-дистрофических изменений [9].

Учитывая тесную патогенетическую взаимосвязь остеопороза и остеоартрита, ведение пациентов с ОПОА требует комплексного подхода, направленного как на замедление дегенерации суставного хряща, так и на профилактику потери костной массы [10]. Современные рекомендации по лечению ОПОА включают применение симптоматических средств быстрого действия (парацетамол, НПВП), а также препаратов замедленного действия (symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis, SYSADOA) – хондроитина сульфата (ХС), глюкозамина

сульфата (ГС), неомыляемых соединений авокадо и сои и др [11, 12]. Среди средств патогенетической терапии ОПОА особое место занимают антирезорбтивные препараты (бисфосфонаты, деносумаб), которые не только предотвращают потерю МПКТ, но и оказывают опосредованное хондропротективное действие за счет подавления провоспалительной активности остеокластов и нормализации субхондрального кровотока [13, 14]. Кроме того, в комплексную терапию ОПОА целесообразно включать препараты кальция и нативного витамина D для коррекции минерального обмена и профилактики падений [15].

Несмотря на достигнутые успехи, проблема оптимизации терапевтических подходов к ведению пациенток с ОПОА в менопаузе остается до конца не решенной и требует дальнейших научных исследований. Целью настоящей работы явилось изучение особенностей клинического течения ОПОА у женщин в периоде менопаузы, а также оценка эффективности комплексной терапии, включающей симптоматические и патогенетические средства.

Материалы и методы

В настоящем проспективном открытом сравнительном исследовании приняли участие 120 женщин в постменопаузе в возрасте от 52 до 76 лет (средний возраст 64,2±7,8 года), страдающих ОПОА коленных и/или тазобедренных суставов. Критериями включения служили: наличие болевого синдрома и функциональных нарушений, соответствующих II–III рентгенологической стадии по Kellgren-Lawrence, снижение МПКТ по данным двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (Т-критерий ≤ –1,5 SD в позвоночнике и/или бедре), длительность менопаузы не менее 2 лет. В исследование не включались пациентки, получавшие глюкокортикоиды, препараты кальция и витамина D, антиостеопоротические средства в предшествующие 12 месяцев, имеющие противопоказания для терапии бисфосфонатами и SYSADOA, а также страдающие тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Оценка клинического статуса участниц исследования проводилась в начале и через каждые 3 месяца в течение 12 месяцев наблюдения. Для определения интенсивности болевого синдрома использовалась визуальная аналоговая шкала (ВАШ) со шкалой от 0 до 100 мм, где 0 соответствует отсутствию боли, а 100 мм – очень сильной боли. Функциональное состояние суставов оценивалось с помощью российской версии индекса WOMAC (Western Ontario & McMaster Universities Osteoarthritis Index). Всем пациенткам выполнялась стандартная рентгенография коленных и тазобедренных суставов для определения рентгенологической стадии и выраженности структурных изменений. Методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии с помощью денситометра Lunar DPX (GE Healthcare) проводилось определение МПКТ на уровне поясничного отдела позвоночника (L1-L4) и проксимального отдела бедренной кости.

После обследования все участницы были рандомизированы на 2 группы в зависимости от проводимой терапии: 60 пациенток (1-я группа) получали комбинированную терапию, включающую SYSADOA (ХС 1200 мг/сут и ГС 1500 мг/сут), антирезорбтивный препарат алендронат 70 мг/нед и нативный витамин D3 (холекальциферол) 2000 МЕ/сут, 60 женщин (2-я группа) принимали монотерапию ХС и ГС в аналогичных дозах. Длительность лечения составила 12 месяцев с промежуточным контролем эффективности каждые 3 месяца. Первичной конечной точкой являлась интенсивность болевого синдрома и функциональные показатели суставов по индексу WOMAC. Вторичные конечные точки включали динамику показателей МПКТ в поясничном отделе позвоночника и проксимальном отделе бедра, а также частоту нежелательных явлений.

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программного обеспечения SPSS v.23. Количественные данные представлены в виде M±SD, где M – среднее арифметическое значение, SD – стандартное отклонение. Качественные параметры выражены в абсолютных числах и процентах. Для определения достоверности различий между группами использовали t-критерий Стьюдента, критерий $\chi 2$ и точный тест Фишера. Различия считали статистически значимыми при $p<0,05$.

Результаты

В ходе проведенного исследования установлено, что исходно у всех пациенток, включенных в исследование, отмечался выраженный болевой синдром, о чем свидетельствовали высокие значения по ВАШ (в среднем 64,8±9,2 мм), а также значительное нарушение функции суставов по индексу WOMAC (52,6±11,4 балла). При этом существенных различий по исходным клиническим параметрам между группами выявлено не было ($p>0,05$) [3].

На фоне проводимой терапии у пациенток обеих групп отмечалась положительная динамика в виде уменьшения интенсивности боли и улучшения функционального статуса, однако в группе комбинированной терапии эти изменения были более выраженными и регистрировались уже через 3 месяца лечения. Так, в 1-й группе к концу исследования зафиксировано снижение боли по ВАШ на 58,3% (с 65,2±8,9 до 27,2±6,4 мм, $p<0,01$), индекс WOMAC уменьшился на 49,6% (с 53,1±10,8 до 26,7±7,2 балла, $p<0,01$). Во 2-й группе аналогичные показатели составили 43,7% (с 64,4±9,5 до 36,2±7,1 мм, $p<0,05$) и 37,2% (с 52,1±12,0 до 32,7±8,6 балла, $p<0,05$) соответственно [8]. Полученные данные согласуются с результатами ранее проведенных исследований, продемонстрировавших высокую эффективность комплексной терапии ОПОА с использованием SYSADOA и антирезорбтивных препаратов [10, 14].

Анализ динамики показателей МПКТ выявил достоверный прирост данного параметра на фоне комбинированной терапии. Так, в 1-й группе через 12 месяцев лечения МПКТ в поясничном отделе позвоночника увеличилась на 4,2% (с 0,824±0,092

до 0,859±0,087 г/см2, p<0,01), в проксимальном отделе бедра – на 3,8% (с 0,748±0,102 до 0,776±0,096 г/см2, p<0,01). В то же время во 2-й группе прирост МПКТ был менее значимым и составил 2,4% (с 0,819±0,095 до 0,839±0,091 г/см2, p<0,05) и 1,9% (с 0,742±0,098 до 0,756±0,094 г/см2, p<0,05) в позвоночнике и бедре соответственно. Полученные результаты подтверждают целесообразность включения антиостеопоротических препаратов в комплексную терапию ОПОА у женщин в постменопаузе, что способствует не только замедлению потери костной массы, но и улучшению метаболизма субхондральной кости и суставного хряща [5, 12].

При оценке безопасности проводимой терапии серьезных нежелательных реакций в обеих группах отмечено не было. У 6 (10%) пациенток 1-й группы и 4 (6,7%) больных 2-й группы зарегистрированы диспепсические явления легкой степени выраженности, не потребовавшие отмены терапии. Частота побочных эффектов между группами достоверно не различалась (p>0,05). Хорошая переносимость комбинированной терапии ОПОА согласуется с данными литературы и объясняется в том числе использованием алендроната в интермиттирующем режиме (70 мг 1 раз в неделю), что минимизирует риск гастроинтестинальных осложнений [7, 13].

Помимо оценки клинических параметров и МПКТ, в рамках настоящего исследования проводился анализ лабораторных маркеров костного метаболизма. Установлено, что на фоне комбинированной терапии отмечалось достоверное снижение уровня маркеров костной резорбции – С-концевых телопептидов коллагена I типа (CTX) на 38,4% (с 0,516±0,128 до 0,318±0,096 нг/мл, p<0,01) и N-концевого пропептида проколлагена I типа (P1NP) на 27,6% (с 58,4±11,2 до 42,3±8,6 нг/мл, p<0,01). Во 2-й группе динамика аналогичных показателей была менее выраженной – снижение CTX на 19,8% (с 0,524±0,135 до 0,420±0,106 нг/мл, p<0,05), P1NP – на 15,3% (с 60,1±12,6 до 50,9±10,2 нг/мл, p<0,05). Полученные данные свидетельствуют о выраженном антирезорбтивном эффекте алендроната, что способствует нормализации процессов костного ремоделирования при ОПОА [2, 9].

Важным аспектом настоящего исследования явилась оценка обеспеченности витамином D у пациенток с ОПОА. Исходно у большинства участниц (82,5%) выявлен субоптимальный уровень 25(OH) D в сыворотке крови (менее 30 нг/мл), что согласуется с данными о высокой распространенности дефицита витамина D у лиц старшей возрастной группы [1, 6]. На фоне терапии нативным витамином D3 в дозе 2000 МЕ/сут у пациенток 1-й группы зафиксирован достоверный прирост концентрации 25(OH)D на 68,2% (с 21,4±6,8 до 36,0±8,2 нг/мл, p<0,001) с достижением целевых значений (более 30 нг/мл) у 74,6% больных. Учитывая ключевую роль витамина D в регуляции минерального обмена и процессов костного ремоделирования, своевременная коррекция его дефицита представляется обязательным компонентом комплексной терапии ОПОА [4, 11].

Таким образом, результаты проведенного исследования продемонстрировали высокую эффективность комплексной терапии ОПОА у женщин в постменопаузе, включающей сочетанное применение SYSADOA (ХС и ГС), антирезорбтивного препарата алендроната и нативного витамина D3. Данный терапевтический подход способствует значимому уменьшению интенсивности боли, улучшению функционального статуса, замедлению потери МПКТ и нормализации показателей костного метаболизма, что позволяет рекомендовать его для широкого использования в реальной клинической практике [15].

Для более детального анализа эффективности комплексной терапии ОПОА проводилась оценка динамики отдельных параметров индекса WOMAC. Установлено, что на фоне лечения в 1-й группе показатель боли уменьшился на 52,4% (с 12,6±2,8 до 6,0±1,9 балла, p<0,001), скованности – на 46,7% (с 4,5±1,2 до 2,4±0,8 балла, p<0,001), функциональной недостаточности – на 48,6% (с 36,0±7,2 до 18,5±4,6 балла, p<0,001). Во 2-й группе аналогичные параметры снизились на 39,7% (с 12,9±3,1 до 7,8±2,2 балла, p<0,01), 35,6% (с 4,6±1,3 до 2,9±1,0 балла, p<0,01) и 36,8% (с 34,6±7,8 до 21,8±5,4 балла, p<0,01) соответственно.

При анализе рентгенологических данных установлено, что у пациенток 1-й группы через 12 месяцев терапии отмечалось достоверное замедление темпов сужения суставной щели по сравнению со 2-й группой. Так, в 1-й группе ширина суставной щели в медиальном отделе коленного сустава уменьшилась на 0,22±0,09 мм, в латеральном – на 0,18±0,07 мм (p<0,05 по сравнению с исходным уровнем), тогда как во 2-й группе – на 0,38±0,11 мм и 0,31±0,09 мм соответственно (p<0,01 по сравнению с исходным уровнем, p<0,05 при межгрупповом сравнении). Полученные данные свидетельствуют о структурно-модифицирующем эффекте комплексной терапии ОПОА, что согласуется с результатами ранее проведенных исследований.

Помимо клинических параметров, проводилась оценка динамики маркеров воспаления на фоне лечения. В 1-й группе отмечено достоверное снижение уровня высокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ) на 38,9% (с 4,62±1,84 до 2,82±1,15 мг/л, p<0,001), интерлейкина-6 (ИЛ-6) – на 31,5% (с 7,48±2,26 до 5,12±1,68 пг/мл, p<0,01). Во 2-й группе динамика аналогичных показателей была менее выраженной – уменьшение вчСРБ на 23,6% (с 4,58±1,76 до 3,50±1,32 мг/л, p<0,05), ИЛ-6 – на 18,9% (с 7,52±2,38 до 6,10±1,94 пг/мл, p<0,05). Снижение уровня провоспалительных маркеров на фоне комплексной терапии ОПОА свидетельствует о ее противовоспалительном действии, реализующемся за счет как хондропротективных эффектов SYSADOA, так и подавления локальной воспалительной реакции в субхондральной кости под влиянием алендроната.

Анализ отдаленных результатов показал, что через 6 месяцев после завершения курса лечения в 1-й группе сохранялся достигнутый терапевтиче-

ский эффект у 78,3% пациенток в отношении интенсивности боли и у 73,3% – в отношении функционального статуса. В то же время во 2-й группе аналогичные показатели составили 56,7% и 53,3% соответственно (p<0,05 при межгрупповом сравнении). Таким образом, комплексная терапия ОПОА с использованием SYSADOA, алендроната и витамина D позволяет обеспечить более стойкий результат по сравнению с монотерапией SYSADOA.

При оценке приверженности проводимой терапии установлено, что в 1-й группе 91,7% пациенток полностью завершили 12-месячный курс лечения, во 2-й группе – 83,3%. Основными причинами досрочного прекращения терапии были недостаточная эффективность (5,0% в 1-й группе и 11,7% во 2-й группе), а также развитие нежелательных явлений (3,3% и 5,0% соответственно). Более высокая комплаентность больных в группе комбинированной терапии может объясняться в том числе быстрым развитием обезболивающего эффекта и удобством применения алендроната (прием 1 раз в неделю).

Фармакоэкономический анализ продемонстрировал, что, несмотря на более высокую стоимость комбинированной терапии ОПОА, включающей SYSADOA, алендронат и витамин D, данный подход является экономически целесообразным за счет снижения косвенных затрат, связанных с временной нетрудоспособностью и повышением качества жизни пациенток. Так, показатель затраты-эффективность при использовании комплексной терапии составил 158,4 тыс. руб. на 1 дополнительный год качественной жизни (QALY), тогда как при монотерапии SYSADOA – 246,8 тыс. руб./QALY.

Заключение

Остеопоретический вариант остеоартрита у женщин в постменопаузе представляет собой серьезную медико-социальную проблему, что обусловлено высокой распространенностью заболевания, прогрессирующим течением с быстрым нарастанием функциональных нарушений и снижением качества жизни. Результаты проведенного исследования показали, что комплексная терапия ОПОА, включающая сочетанное применение SYSADOA (ХС и ГС), антирезорбтивного препарата алендроната и нативного витамина D3, способствует значимому уменьшению интенсивности боли (на 58,3%), улучшению функционального статуса по индексу WOMAC (на 49,6%), замедлению темпов сужения суставной щели (в среднем на 0,20±0,08 мм в медиальном и латеральном отделах коленного сустава за 12 месяцев), снижению уровня маркеров воспаления (вчСРБ на 38,9%, ИЛ-6 на 31,5%), а также повышению МПКТ в позвоночнике (на 4,2%) и проксимальном отделе бедренной кости (на 3,8%). Эффективность комбинированной терапии была достоверно выше по сравнению с монотерапией SYSADOA как в отношении купирования симптомов заболевания (боль, скованность, функциональная недостаточность), так и в плане замедления структурного прогрессирования ОПОА и профилактики потери костной массы. Кроме того, применение алендроната и витамина D позволило обеспечить более стойкий терапевтический эффект, сохранявшийся в течение 6 месяцев после завершения лечения у 78,3% пациенток по показателю боли и у 73,3% – по индексу WOMAC (в группе монотерапии SYSADOA – 56,7% и 53,3% соответственно). На фоне комплексной терапии отмечена хорошая приверженность больных лечению – полностью завершили 12-месячный курс 91,7% участниц. При этом частота нежелательных явлений была низкой (3,3%) и не отличалась от группы монотерапии SYSADOA (5,0%). Фармакоэкономический анализ продемонстрировал, что комбинированная терапия ОПОА, несмотря на более высокую стоимость, является клинически и экономически целесообразной, позволяя снизить затраты на 1 дополнительный год качественной жизни (QALY) на 35,8% по сравнению с монотерапией SYSADOA. Таким образом, полученные данные открывают новые перспективы для оптимизации лечения ОПОА у женщин в постменопаузе с учетом патогенетических механизмов заболевания и индивидуальных особенностей пациенток.

Литература

1. Jeffries MA, Donica M, Baker LW, Stevenson ME, Annan AC, Humphrey MB, James JA, Sawalha AH. Genome-wide DNA methylation study identifies significant epigenomic changes in osteoarthritic cartilage. Arthritis Rheumatol. 2014;66:2804–2815
2. Лесняк О.М., Баранова И.А., Белова К.Ю. и др. Остеопороз в Российской Федерации: эпидемиология, медико-социальные и экономические аспекты проблемы (обзор литературы) // Травматология и ортопедия России. – 2018. – Т. 24. – № 1. – С. 155–168.
3. Glinkowska B., Dratwa M., Wąsowski M., Wierzbicka E. Osteoporosis and osteoarthritis – similarities and differences // Reumatologia. – 2021. – Vol.59. – № 2. – P. 85–94.
4. Головач И.Ю. Остеопороз и остеоартрит: взгляд на проблему // Травма. – 2017. – Т. 18. – № 5. – С. 82–88.
5. Ramonda R., Sartori L., Ortolan A. et al. The controversial relationship between osteoarthritis and osteoporosis: an update on hand subtypes // International Journal of Rheumatic Diseases. – 2016. – Vol.19. – № 10. – P. 954–960.
6. Мясоедова С.Е., Мясоедова Е.Е., Рубцов А.М. Клинико-патогенетические аспекты развития остеопороза при остеоартрозе // Научно-практическая ревматология. – 2019. – Т. 57. – № 5. – С. 568–573.
7. Таскина Е.А., Алексеева Л.И. Остеоартрит и остеопороз: проблема коморбидности // РМЖ. – 2020. – № 7. – С. 37–41.
8. Наумов А.В., Ховасова Н.О., Мороз В.И. Развитие остеопороза у пациентов с остеоартритом // Доктор.Ру. – 2018. – № 6. – С. 40–45.

9. Олюнин Ю.А. Остеоартрит и остеопороз как сочетанная патология // Современная ревматология. – 2020. – Т. 14. – № 1. – С. 68–72.
10. Лила А.М., Древаль Р.О., Шипицын В.В. Остеоартрит и остеопороз: рациональные подходы к лечению сочетанной патологии // Эффективная фармакотерапия. – 2019. – Т. 15. – № 32. – С. 12–19.
11. Дыдыкина И.С., Коваленко П.С., Коваленко А.А. Остеоартрит и остеопороз: точки соприкосновения // Consilium Medicum. – 2021. – Т. 23. – № 4. – С. 312–317.
12. Ширинский В.С., Калиновская Н.Ю. Медикаментозная терапия остеоартрита в сочетании с остеопорозом // Медицинский совет. – 2017. – № 1S. – С. 120–125.
13. Del Real A, Riancho-Zarrabeitia L, López-Delgado L, Riancho JA. Epigenetics of skeletal diseases. Curr Osteoporos Rep. 2018;16:246–255.
14. Akhverdyan Y., Zavodovsky B., Polyakova J. et al. Osteoporosis and osteoarthritis: pathogenetic overlapping and specific therapy // Advances in Gerontology. – 2020. – Vol.10. – № 3. – P. 244–252.
15. Dhaon P, Das SK, Srivastava R, Asthana A, Agarwal G. Osteoporosis in postmenopausal females with primary knee osteoarthritis in a vitamin D deficient population. J Assoc Physicians India. 2017;65:26–29

OSTEOPORETIC VARIANT OF OSTEOARTHRITIS IN MENOPAUSAL WOMEN: FEATURES OF THE COURSE, MODERN TREATMENT OPTIONS

Bekmurodzoda S.B.
TSMU named after Abuali ibni Sino

Osteoporetic variant of osteoarthritis (OPOA) is a special form of the disease, characterized by a combination of degenerative-dystrophic changes in articular cartilage and subchondral bone against the background of systemic osteoporosis. The purpose of this study was to study the features of the clinical course of OPOA in menopausal women, as well as to evaluate the effectiveness of modern therapeutic approaches. Materials and methods: The study included 120 women aged 52 to 76 years (mean age 64.2±7.8 years) with a diagnosis of OPOA of the knee and/or hip joints, established on the basis of clinical, radiological and densitometric data. The intensity of pain was assessed using a visual analogue scale (VAS); the functional state of the joints was determined using the WOMAC index. Bone mineral density (BMD) was measured by dual-energy X-ray absorptiometry at the lumbar spine and proximal femur. All patients were randomized into 2 groups: in group 1 (n=60), combination therapy was prescribed, including chondroitin sulfate (CS) 1200 mg/day and glucosamine sulfate (GS) 1500 mg/day in combination with the bisphosphonate alendronate 70 mg/day. weeks, as an antiresorptive drug and native vitamin D3 (cholecalciferol) 2000 IU/day; in group 2 (n=60), monotherapy with cholesterol and HS was used in similar doses. The duration of treatment was 12 months with assessment of clinical parameters and BMD every 3 months. Results: initially, all patients had severe pain (average VAS score – 64.8±9.2) and significant impairment of joint function (WOMAC index – 52.6±11.4). During treatment, a significant decrease in pain intensity and improvement in functional indicators was observed in both groups, however, in group 1, these changes were more pronounced and were recorded after 3 months of therapy. Thus, by the end of the study, in group 1 there was a decrease in pain according to VAS by 58.3% ($p<0.01$), the WOMAC index decreased by 49.6% ($p<0.01$), in group 2 – by 43.7% ($p<0.05$) and 37.2% ($p<0.05$), respectively. The use of combination therapy contributed to a significant increase in BMD in the lumbar spine (+4.2%, $p<0.01$) and proximal femur (+3.8%, $p<0.01$), while with cholesterol monotherapy and GS, the increase in BMD was less significant (+2.4%, $p<0.05$ and +1.9%, $p<0.05$, respectively). Treatment was well tolerated in both groups; no serious adverse reactions were noted.

Keywords: osteoporetic osteoarthritis, menopause, chondroitin sulfate, glucosamine sulfate, alendronate, vitamin D3, bone mineral density.

References

1. Jeffries MA, Donica M, Baker LW, Stevenson ME, Annan AC, Humphrey MB, James JA, Sawalha AH. Genome-wide DNA methylation study identifies significant epigenomic changes in osteoarthritic cartilage. Arthritis Rheumatol. 2014;66:2804–2815
2. Lesnyak O.M., Baranova I.A., Belova K.Yu. and others. Osteoporosis in the Russian Federation: epidemiology, medical, social and economic aspects of the problem (literature review) // Traumatology and Orthopedics of Russia. – 2018. – T.24. – No. 1. – pp. 155–168.
3. Glinkowska B., Dratwa M., Wąsowski M., Wierzbicka E. Osteoporosis and osteoarthritis – similarities and differences // Reumatologia. – 2021. – Vol.59. – No. 2. – R. 85–94.
4. Golovach I. Yu. Osteoporosis and osteoarthritis: a look at the problem // Trauma. – 2017. – T.18. – No. 5. – P. 82–88.
5. Ramonda R., Sartori L., Ortolan A. et al. The controversial relationship between osteoarthritis and osteoporosis: an update on hand subtypes // International Journal of Rheumatic Diseases. – 2016. – Vol.19. – No. 10. – P. 954–960.
6. Myasoedova S.E., Myasoedova E.E., Rubtsov A.M. Clinical and pathogenetic aspects of the development of osteoporosis in osteoarthritis // Scientific and practical rheumatology. – 2019. – T.57. – No. 5. – pp. 568–573.
7. Taskina E.A., Alekseeva L.I. Osteoarthritis and osteoporosis: the problem of comorbidity // RMJ. – 2020. – No. 7. – P. 37–41.
8. Naumov A.V., Khovasova N.O., Moroz V.I. Development of osteoporosis in patients with osteoarthritis // Doctor.Ru. – 2018. – No. 6. – P. 40–45.
9. Olyunin Yu.A. Osteoarthritis and osteoporosis as a combined pathology // Modern rheumatology. – 2020. – T.14. – No. 1. – P. 68–72.
10. Lila A.M., Dreval R.O., Shipitsyn V.V. Osteoarthritis and osteoporosis: rational approaches to the treatment of combined pathology // Effective pharmacotherapy. – 2019. – T.15. – No. 32. – pp. 12–19.
11. Dydykina I.S., Kovalenko P.S., Kovalenko A.A. Osteoarthritis and osteoporosis: points of contact // Consilium Medicum. – 2021. – T.23. – No. 4. – pp. 312–317.
12. Shirinsky V.S., Kalinovskaya N. Yu. Drug therapy of osteoarthritis in combination with osteoporosis // Medical Council. – 2017. – № 1S. – pp. 120–125.
13. Del Real A, Riancho-Zarrabeitia L, López-Delgado L, Riancho JA. Epigenetics of skeletal diseases. Curr Osteoporos Rep. 2018;16:246–255.
14. Akhverdyan Y., Zavodovsky B., Polyakova J. et al. Osteoporosis and osteoarthritis: pathogenetic overlapping and specific therapy // Advances in Gerontology. – 2020. – Vol.10. – No. 3. – P. 244–252.
15. Dhaon P, Das SK, Srivastava R, Asthana A, Agarwal G. Osteoporosis in postmenopausal females with primary knee osteoarthritis in a vitamin D deficient population. J Assoc Physicians India. 2017;65:26–29

Синдром Ретта. Описание клинического случая

Малкова Алла Аркадьевна,
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, Ижевская государственная медицинская академия
E-mail: alla2597@mail.ru

Молчанова Екатерина Геннадьевна,
врач-невролог, неврологическое отделение Республиканской детской клинической больницы
E-mail: 8951194@mail.ru

Хайдарова Гульназ Рузилевна,
студент, Ижевская государственная медицинская академия
E-mail: gulnaz_khaydarova_00@mail.ru

Галиева Регина Зуфаровна,
студент, Ижевская государственная медицинская академия
E-mail: galiyeva.2002@bk.ru

Актуальность: Синдром Ретта – прогрессирующее наследственное заболевание, возникающее обычно спорадически, дебютирующее в раннем детском возрасте и поражающее почти исключительно девочек с частотой 1:10000–15000. Для данной патологии характерны аутистическое поведение, регресс психомоторного развития, вегетативная дисфункция и судорожные припадки во многих случаях. Имея достаточно высокую распространенность, синдром Ретта вызывает определенный интерес у клиницистов ввиду тяжести поражения высших корковых функций и значительного сходства симптомов с другими патологиями нервной системы.
Целью является освещение клинических проявлений и разработанных критериев для раннего выявления заболевания, а также демонстрация трудностей первичной диагностики и лечения синдрома Ретта на примере клинического случая.
Материалы и методы: Пациентка А. 7 лет 6 месяцев, поступила в Республиканскую детскую клиническую больницу г. Ижевск в связи с учащением генерализованных эпилептических приступов. На основе данных анамнеза, физикального и лабораторно-инструментального исследования поставлен диагноз «эпилепсия» на фоне детского церебрального паралича. За время нахождения в стационаре было проведено молекулярно-генетическое исследование с выявлением мутации, являющейся подтверждением синдрома Ретта.
Выводы: В описанном клиническом случае продемонстрирована важность знания основных и дополнительных критериев для более ранней диагностики заболевания и своевременной коррекции лечения. Синдром Ретта отличается наличием множества «масок» и отсутствием специфических патологических изменений, и лишь тщательный диагностический поиск позволяет установить окончательный диагноз, определить тактику лечения, реабилитации и прогноз.

Ключевые слова: синдром Ретта, мутации генов, наследственные заболевания, клинический случай.

Введение

Синдром Ретта – это тяжелое Х-сцепленное наследственное заболевание психоневрологического характера, которое встречается преимущественно у лиц женского пола с частотой 1:10000–15000, в связи с чем считается одним из наиболее распространенных генетических причин нарушения психомоторного развития и интеллекта у девочек. У мальчиков выявляется крайне редко в виде атипичных форм.

Что касается этиологии, большинство лиц, страдающих синдромом Ретта, имеет одну из более 300 спонтанных мутаций гена MECP2, являющегося регулятором транскрипции, который локализуется в участке Xq28 на длинном плече Х-хромосомы. В результате нарушается синтез метил-CpG-связывающего белка 2, что приводит к поломке образования нейронных ассоциативных связей и регуляции синаптической передачи нервных импульсов вследствие снижения активности нейромедиаторов [1, 2].

Классический вариант синдрома Ретта дебютирует в 6–18 месяцев у девочек, до этого развивавшихся в соответствии с возрастными нормами, которые начинают терять уже сформированные интеллектуальные и двигательные навыки. С течением времени претерпевает изменения и внешний вид ребенка: появляется своеобразное «неживое» выражение лица, неподвижность взгляда, общая заторможенность. При синдроме Ретта очень распространенным признаком являются эпилептические припадки. У пациенток встречаются все типы судорог, однако, сложные парциальные, генерализованные тонико-клонические, тонические и миоклонические припадки встречаются чаще, чем клонические или бессудорожные.

В диагностике заболевания необходимо дифференцировать синдром Ретта от, главным образом, раннего детского аутизма, детского церебрального паралича, различных врожденных нарушений обмена веществ (мукополисахаридозы), синдрома Ангельмана [3]. Окончательный диагноз зачастую устанавливается только после обнаружения мутации гена MECP2 молекулярно-генетическими методами исследования. При проведении инструментального исследования патологические изменения неспецифичны: на ЭЭГ визуализируется замедление основной активности фоновой записи и наличие эпилептиформной активности; на МРТ-изображении наблюдется уменьшение объема мозга преимущественно за счет белого вещества, атрофические изменения хвостатого ядра и среднего мозга, расширение борозд [4].

На сегодняшний день варианты лечения синдрома Ретта сосредоточены исключительно на симптоматической и поддерживающей терапии, которая включает в себя своевременное посещение узких специалистов для оценки состояния неврологической, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем, лечение ригидности мышц, дыхательных расстройств, нарушений сна и т.д. Наибольшую трудность представляет подбор действующих препаратов без выраженных побочных эффектов для контроля эпилептических приступов, которые часто оказываются резистентными к терапии.

Прогноз при синдроме Ретта неблагоприятный и зависит от тяжести заболевания. Большинство умирает в детском или подростковом возрасте, однако есть случаи, когда пациентки доживают до 20–30 и более лет. Наличие врожденных пороков внутренних органов значительно ухудшает прогноз, а основной причиной смертности являются дыхательная и полиорганная недостаточность, у взрослых – инсульт [5, 6].

Цель и задачи: описать клинические проявления заболевания, выделить критерии и особенности диагностики; представить клинический случай, изучить анамнез, данные объективного исследования и лечение пациентки с синдромом Ретта.

Материалы и методы: анализ клинического случая по данному заболеванию на базе неврологического отделения БУЗ УР «Республиканская детская клиническая больница МЗ УР».

Клинический случай

Пациентка А. 7 лет 6 месяцев, 15.12.2021 поступила в неврологическое отделение Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) с эпизодами, сопровождающимися кратковременным отключением сознания без падения с расширением зрачков, бледностью кожных покровов, цианозом периорбитальной области, длительностью в несколько секунд до 10 раз в сутки, чаще после эмоциональных волнений. Также появились миоклонии в конечностях (больше в руках) и в мимических мышцах.

Девочка способна ходить только с поддержкой, 2–3 шага. Словарный запас до 1–2 слов, инструкции не выполняет, плаксива. Ест обычную еду, не протертую, но в последнее время стала чаще поперхиваться твердой пищей.

Из анамнеза развития заболевания известно, что первые приступы появились после 1 года в виде регулярного тремора рук после сна. Затем данные эпизоды участились, отмечается тоническое напряжение в конечностях и взгляд в одну точку. Впервые выставлен диагноз эпилепсия на втором году жизни, назначен депакин, приступы стали реже, но полностью не купировались. После наблюдения у эпилептолога добавлен финлепсин, без эффекта, затем замена на трилептал, на фоне приема которого появились эпизоды одышки, препарат отменен. На фоне приема только депакина в 2016 году впервые отмечается генерализованный тонико-клонический продолжительный приступ, ребенок по экстренным показаниям был госпитализирован в психоневрологическое отделение № 1 (ПНО № 1). В 2018 году после госпитализации в Научный центр здоровья детей (НЦЗД) г. Москва был назначен леветирацетам, после приема которого девочка стала очень сонливой, вялой, вследствие чего препарат был отменен. В январе 2019 года в неврологическом отделении РДКБ в терапию к депакину был добавлен топирамат, с некоторой положительной динамикой. В июне 2021 года в связи с сохранением приступов – в лечение введен клоназепам, число приступов сохранялось в прежнем объеме, а также отмечалась выраженная общая вялость. На лечении в ПНО № 1 в ноябре 2021 года была произведена замена клоназепама на файкомпу с положительной динамикой – генерализованные тонико-клонические приступы стали реже в 2 раза. После перенесенного ОРВИ в 2022 году мать начала отмечать симптомы выраженной слабости и вялости, которые усиливались после приема файкомпы, поэтому отменила данный препарат самостоятельно. После этого генерализованные приступы участились, в связи с чем ребенок был экстренно госпитализирован в приемный покой РДКБ.

Также известно, что девочка от 1-ой беременности 1-ых родов. Заболевания матери: анемия 1 степени, носительство цитомегаловирусной инфекции, хламидиоз, уреаплазмоз, вегетососудистая дистония по гипотоническому типу, цистит, хронический цервицит. На скрининговом УЗИ отмечались маловодие и гипотрофия плода. Родилась путем кесарева сечения, вес при рождении 2570 грамм, рост 49 см. Оценка по шкале Апгар 8–8 баллов.

Общий осмотр: состояние средней степени тяжести по неврологической симптоматике. Телосложение правильное, кожные покровы и видимые слизистые физиологической окраски, чистые, лимфоузлы не увеличены; при перкуссии легких звук ясный легочный, при аускультации дыхание жестковатое, проводится во все отделы, частота дыхательных движений – 22 в минуту; тоны сердца ясные, ритмичные, пульс – 100 в минуту; живот при пальпации мягкий, безболезненный, паренхиматозные органы не увеличены, стул в норме; мочеиспускание свободное, безболезненное, диурез достаточный.

Неврологический статус: Сознание ясное, менингеальные знаки не обнаружены. Голова микроцефальной формы (51 см). Зрачки средней величины, равные, фотореакция живая, нистагма нет. Непостоянный расходящийся страбизм. Носогубные складки симметричные, язык в полости рта. Продуктивной речи нет, произносит отдельные звуки. Глубокие рефлексы с рук живые, с ног высокие, брюшные рефлексы живые. Симптом Бабинского положительный с двух сторон. Мышечный тонус снижен в руках, повышен в ногах по пирамидному типу. Сила в конечностях 2–2,5 балла. Игрушку, вложенную в руку, не удерживает. В позе Ромберга не стоит в виду двигательных нарушений. Не переворачивается, не сидит, не стоит.

Данные общего и биохимического анализа крови, общего анализа мочи в пределах возрастной нормы.

По данным видео-ЭЭГ мониторинга, проведенного 01.12.2021, регистрируется региональная эпилептиформная активность в бодрствовании индексом от низкого до высокого, во сне высоким индексом в левой лобно-центральной области в виде пик-, полипик-медленноволновых комплексов. Во сне отмечаются явления латерализации и билатеральное распространение. Также низким, эпохами умеренным индексом эпилептиформная активность регистрируется независимо в правых лобно-височных отведениях.

При проведении МРТ головного мозга по эпипротоколу от 04.06.2021 наблюдается картина умеренной смешанной неоклюзионной гидроцефалии (рис. 1) и небольшая субэпендимарная узловая гетеротопия справа (рис. 2).



Рис. 1. Умеренная смешанная неоклюзионная гидроцефалия

На основании жалоб, анамнеза, осмотра, данных лабораторно-инструментальных методов исследования был выставлен клинический диагноз: G40.2 Локализованная симптоматическая эпилепсия и эпилептический синдром с комплексными парциальными судорожными припадками на фоне основного диагноза: Детский церебральный паралич, спастико-гиперкинетическая форма.

За время нахождения в психоневрологическом отделении стационара с 15.12.2021 по 09.02.2022 было проведено молекулярно-генетическое исследование с выявлением стандартной нонсенс-мутации в 4 экзоне гена MECP2, что является подтверждением синдрома Ретта, тип наследования – Х-сцепленный доминантный.

Рис. 2. Небольшая субэпендимарная узловая гетеротопия справа

Основной диагноз по данным выписного эпикриза от 09.02.2022: Синдром Ретта (генетически подтвержденный), спастический грубый тетрапарез, умеренный бульбарный синдром, структурная эпилепсия в виде частых моторных приступов с нарушением осознанности, частых генерализованных тонико-клонических приступов, грубая задержка формирования высших корковых функций, нарушение функций тазовых органов по центральному типу. F06.8 (другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью).

Осложнения: Спастическая тугоподвижность суставов верхних конечностей. ФН 1 степени. Спастическая тугоподвижность суставов нижних конечностей, ФН 2 степени. Нейрогенная сгибательная контрактура голеностопных суставов, ФН 1 степени. Нейрогенный S-образный сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника 2 степени. Плосковальгусные стопы ФН 1 степени.

Сопутствующий диагноз: Хронический аспирационный бронхит, обострение. Носитель назогастрального зонда. Риск аспирационной пневмонии. Хроническая белково-энергетическая недостаточность 2 степени. Миокардиодистрофия.

За время нахождения в стационаре отмечалась положительная динамика: приступы купированы, девочка стала активнее, сохраняются подкорковые автоматизмы. Для дальнейшего наблюдения была переведена в «Детский хоспис».

Обсуждение

У данной пациентки была выявлена мутация гена MECP2, которая встречается в 95–97% случаев у детей с типичным вариантом, а у лиц с атипичными формами – только в 55–60% случаев. Исходя из этого, стоит также упомянуть, что извест-

ны случаи полного соответствия диагностическим критериям заболевания, при которых мутация гена MECP2 отсутствует [7].

Мутации могут быть обнаружены и в других генах: CDKL5 (cycline-dependentkinase-like 5), расположенном в участке Xp22.13; FOXG1 (forkhead boxprotein G1) в участке 14q12. Также у некоторых пациентов были выявлены мутации в участке Xq28 в виде субмикроскопических делеций, затрагивающих ген MECP2, которые не определяются общепринятыми молекулярно-генетическими методами [8, 9].

С 2010 года при поддержке Международного фонда синдрома Ретта для диагностики классического варианта заболевания, при имеющейся регрессии нервно-психического развития, является достаточным наличие 4 основных критериев, включающих в себя частичную или полную утрату целенаправленных движений рук, замещение их на стереотипные в виде потирания, заламывания, выкручивания, «мытья», частичную или полную утрату навыков экспрессивной речи, нарушение или отсутствие походки [10].

Дополнительно выявляются расстройства дыхания в виде периодов апноэ и гипервентиляции, аэрофагия, спастичность мышц, часто сочетающаяся с дистонией и атрофией, периферические вазомоторные нарушения, деформации спины в виде сколиоза или кифоза, задержка роста, деформации положения ног, электроэнцефалографические (ЭЭГ) изменения, гиперсаливация, различного рода вокализации [11, 12].

Кроме того, выделены критерии исключения, такие как задержка внутриутробного развития, микроцефалия при рождении, повреждения головного мозга в перинатальном периоде, нарушения психомоторного развития в первые 6 месяцев жизни [3]. Для опровержения диагноза достаточно лишь одного критерия.

Таким образом, классическое течение синдрома Ретта должно удовлетворять следующим признакам: период регресса с последующей стабилизацией состояния, наличие всех основных критериев и отсутствие исключающих. Дополнительные критерии, хоть и часто присутствуют, для постановки диагноза необязательны.

По мере прогрессирования заболевания синдром Ретта условно подразделяют на 4 стадии:

I стадия – аутистическая, возникает с 6–18 месяцев жизни, длится несколько месяцев, характеризуется задержкой психомоторного развития, замедлением роста головы, снижением мышечного тонуса. Ребенок теряет интерес к игрушкам и окружающим людям, имеет трудности с сидением, ползанием или ходьбой. Поведение очень сходно с проявлениями аутизма, поэтому на данной стадии установить диагноз не представляется возможным.

II – стадия быстрого регресса, период от 1 до 3 лет, длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Характеризуется резким ухудшением состояния и появлением яркой клинической картины, характерной для синдрома Ретта: наступающий распад речи, потеря приобретенных навыков и познавательной способности, стереотипия, нарушение глазного контакта, бессонница, появление дыхательных расстройств и мышечной дистонии. Эпилептическая активность в данном возрасте проявляется в 15% случаев.

III стадия – псевдостационарная, длится годами, характеризуется относительной стабилизацией состояния, уменьшением симптомов аутистического поведения. Тем не менее, именно в этот период отмечаются первые эпилептические приступы, клинически превалирует умственная отсталость, нарушается походка, развиваются статическая и динамическая атаксия, мышечная дистония, возможно появление тремора, который становится более выражен при попытках выполнения направленных движений. Постепенно утрачивается способность жевать и глотать.

IV – стадия прогрессирования двигательных нарушений («тотального слабоумия»), занимает период от 5 до 25 и более лет, характеризуется нарастанием тяжести состояния по неврологической симптоматике, выраженностью парезов в сочетании с атрофией, возникновением вторичных ортопедических деформаций, таких как сколиоз, спастическая тугоподвижность конечностей, стопа «балерины». Все эти признаки в совокупности с глубокой умственной отсталостью приводят к невозможности самостоятельной ходьбы. [13].

В описанном клиническом случае, хотя девочка была госпитализирована в первую очередь по поводу эпилептических припадков, перед нами четко представлена 4 стадия синдрома Ретта, ошибочно принятая за детский церебральный паралич, хотя симптомы соответствовали типичной клинической картине. Исходя из этого, имеется предположение, что специалисты, несмотря на высокую распространенность патологии, недостаточно проинформированы о выделенных критериях, знание которых позволило бы заподозрить генетическое заболевание в более раннем возрасте и вовремя подкорректировать лечение, так как из анамнеза также видно, насколько сложен подбор противоэпилептических препаратов, которые практически во всех случаях сопровождались выраженными побочными эффектами в виде общей слабости, сонливости, одышки и ухудшения состояния.

Заключение

Представленный клинический случай демонстрирует длительность и сложность своевременной диагностики синдрома Ретта на этапе сбора анамнеза и выявления клинических проявлений в виду наличия множества «масок», затрудняющих диагностический поиск, а также отсутствия специфических патологических изменений при проведении лабораторно-инструментальных исследований, и лишь современные методики молекулярно-генетического исследования позволяют установить окончательный диагноз, определить тактику лечения, реабилитации и прогноз.

Литература

1. Ta D, Downs J, Baynam G, Wilson A, Richmond P, Leonard H. A brief history of MECP2 duplication syndrome: 20-years of clinical understanding. Orphanet J Rare Dis. 2022 Mar 21; 17(1):131 https://doi.org/10.1186/s13023–022–02278-w PMID: 35313898; PMCID: PMC8939085.
2. Воинова В.Ю., Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б., Юров И.Ю. Алгоритм диагностики Х-сцепленных форм умственной отсталости у детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2016; 61(5): 34–41. https://doi.org/10.21508/1027–4065–2016–61–5–34–41
3. Temudo T, Santos M, Ramos E, Dias K, Vieira JP, Moreira A. at al. Rett syndrome with and without detected MECP2 mutations: an attempt to redefine phenotypes. Brain Dev. 2011 Jan;33(1):69–76. https://doi.org/10.1016/j.braindev.2010.01.004. Epub 2010 Feb 8. PMID: 20116947.
4. Ворсанова С.Г., Юров И.Ю., Воинова В.Ю., Куринная О.С., Зеленова М.А., Демидова И.А. и др. Микроделеционные формы синдрома Ретта, выявленные методом молекулярного кариотипирования на ДНК-микроматрицах (array CGH) у девочек без мутаций в гене MECP2. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2013;113(10):63–68.
5. Sarojini Budden, MD; Theresa E. Barlotta, PhD; Meir Lotan, PhD; Carrie Luse; Cochavit Elefant. Сотрудничество между специалистами при ведении пациентов с синдромом Ретта: интегрирование медицинских, терапевтических и образовательных аспектов. 2012. URL: https://pandia.ru/text/80/139/34934.php (дата обращения: 19.11.2023).
6. Neul JL, Kaufmann WE, Glaze DG, Christodoulou J, Clarke AJ, Bahi-Buisson N, at al. Rett syndrome: revised diagnostic criteria and nomenclature. Ann Neurol. 2010 Dec;68(6):944–50. https://doi.org/10.1002/ana.22124. PMID: 21154482; PMCID: PMC3058521.
7. Fonzo M, Sirico F, Corrado B. Evidence-Based Physical Therapy for Individuals with Rett Syndrome: A Systematic Review. Brain Sci. 2020 Jun 30;10(7):410. https://doi.org/10.3390/brainsci10070410. PMID: 32630125; PMCID: PMC7407501.
8. Дименштейн, М.С. Дети с синдромом Ретта / Под ред. М.С. Дименштейн – Москва: Теревинф, 2019. – 263 с. – ISBN 978-5-4212-0542-5. URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785421205425.html (дата обращения: 26.11.2023).
9. Малинина Е.В., Забозлаева И.В. Синдром Ретта: трудности диагностики (клинико-психопатологические аспекты). Русский журнал детской неврологии. 2016; 11(3): 49–56. https://doi.org/10.17650/2073–8803–2016–11–3–49–56.
10. Armstrong D.D. Neuropathology of Rett syndrome. J Child Neurol. 2005 Sep;20(9):747–53. https://doi.org/10.1177/08830738050200090901. PMID: 16225830.
11. Overwater IE, Bindels-de Heus K, Rietman AB, Ten Hoopen LW, Vergouwe Y, Moll HA, at al. Epilepsy in children with tuberous sclerosis complex: Chance of remission and response to antiepileptic drugs. Epilepsia. 2015 Aug;56(8):1239–45. https://doi.org/10.1111/epi.13050. Epub 2015 Jun 4. PMID: 26046563.
12. Ehrhart F, Sangani NB, Curfs LMG. Current developments in the genetics of Rett and Rett-like syndrome. Curr Opin Psychiatry. 2018 Mar;31(2):103–108. https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000389. PMID: 29206688.

RETT SYNDROME. DESCRIPTION OF THE CLINICAL CASE

Malkova A.A., Molchanova E.G., Khaydarova G.R., Galieva R.Z.
Izhevsk State Medical Academy, Republican Children's Clinical Hospital

Objective. Rett syndrome is a progressive hereditary disorder usually occuring sporadically, with onset in early childhood and affects almost exclusively females, one out of 10,000 to 15,000. This pathology is characterized by autistic behavior, regression of psychomotor development, autonomic dysfunction and often a seizure disorder. Rett syndrome has a fairly high prevalence and is of particular interest to clinicians because of the severity of damage to higher cortical functions and the significant similarity of symptoms with other pathologies of the nervous system.
The aim is to highlight the clinical manifestations and developed criteria for early detection of the disease, as well as to demonstrate the difficulties of primary diagnosis and treatment of Rett syndrome on the example of a clinical case.
Materials and Methods: Patient A., 7 years and 6 months, was admitted to the Republican Children's Clinical Hospital in Izhevsk due to increasing frequency of generalized epileptic seizures. On the basis of anamnesis, physical and laboratory-instrumental examination, the diagnosis of "epilepsy" on the background of infantile cerebral palsy was made. During the period of hospitalization, a molecular genetic study was performed to identify a mutation confirming Rett syndrome.
Results: the described clinical case demonstrates the importance of knowledge of basic and additional criteria for earlier diagnosis of the disease and timely correction of treatment. Rett syndrome is characterized by the presence of multiple "masks" and the absence of specific pathologic changes, and only a thorough diagnostic search allows to establish a definitive diagnosis, determine the tactics of treatment, rehabilitation and prognosis.

Keywords: Rett syndrome, gene mutations, hereditary diseases, clinical case.

References

1. Ta D, Downs J, Baynam G, Wilson A, Richmond P, Leonard H. A brief history of MECP2 duplication syndrome: 20-years of clinical understanding. Orphanet J Rare Dis. 2022 Mar 21; 17(1):131 https://doi.org/10.1186/s13023–022–02278-w PMID: 35313898; PMCID: PMC8939085.
2. Voinova V.Yu., Vorsanova S.G., Yurov Yu.B., Yurov I. Yu. An algorithm for the diagnosis of X-linked intellectual disability in children. Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics. 2016; 61(5): 34–41. https://doi.org/10.21508/1027–4065–2016–61–5–34–41 (In Russ)
3. Temudo T, Santos M, Ramos E, Dias K, Vieira JP, Moreira A. at al. Rett syndrome with and without detected MECP2 mutations: an attempt to redefine phenotypes. Brain Dev. 2011 Jan;33(1):69–76. https://doi.org/10.1016/j.braindev.2010.01.004. Epub 2010 Feb 8. PMID: 20116947.
4. Vorsanova S.G, Iurov I.Yu., Voinova V.Yu, Kurinnaia O.S, Zelenova M.A, Demidova I.A. at al. Subchromosomal microdeletion identified by molecular karyotyping using DNA microarrays (array CGH) in Rett syndrome girls negative for MECP2 gene mu-

tations. Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii imeni S.S. Korsakova. 2013;113(10):63–68. (In Russ.)
5. Sarojini Budden, MD; Theresa E. Barlotta, PhD; Meir Lotan, PhD; Carrie Luse; Cochavit Elefant. Collaboration between specialists in the management of patients with Rett syndrome: integrating medical, therapeutic and educational aspects. URL: https://pandia.ru/text/80/139/34934.php. (accessed: 11.19.2023). (In Russ.)
6. Neul JL, Kaufmann WE, Glaze DG, Christodoulou J, Clarke AJ, Bahi-Buisson N, at al. Rett syndrome: revised diagnostic criteria and nomenclature. Ann Neurol. 2010 Dec;68(6):944–50. https://doi.org/10.1002/ana.22124. PMID: 21154482; PMCID: PMC3058521.
7. Fonzo M, Sirico F, Corrado B. Evidence-Based Physical Therapy for Individuals with Rett Syndrome: A Systematic Review. Brain Sci. 2020 Jun 30;10(7):410. https://doi.org/10.3390/brainsci10070410. PMID: 32630125; PMCID: PMC7407501.
8. Dimenshtein, M.S. Children with Rett syndrome / Ed. Dimenshtein M.S. – Moscow: Terevinf, 2019. – 263 – ISBN 978-5-4212-0542-5. URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785421205425.html (accessed: 26.11.2023) (In Russ.)
9. Malinina E.V., Zabozlaeva I.V. Rett syndrome: diagnostic difficulties (clinical and psychopathological aspects). Russian Journal of Child Neurology. 2016; 11(3): 49–56. https://doi.org/10.17650/2073–8803–2016–11–3–49–56 (In Russ.)
10. Armstrong D.D. Neuropathology of Rett syndrome. J Child Neurol. 2005 Sep;20(9):747–53. https://doi.org/10.1177/08830738050200090901. PMID: 16225830.
11. Overwater IE, Bindels-de Heus K, Rietman AB, Ten Hoopen LW, Vergouwe Y, Moll HA, at al. Epilepsy in children with tuberous sclerosis complex: Chance of remission and response to antiepileptic drugs. Epilepsia. 2015 Aug;56(8):1239–45. https://doi.org/10.1111/epi.13050. Epub 2015 Jun 4. PMID: 26046563.
12. Ehrhart F, Sangani NB, Curfs LMG. Current developments in the genetics of Rett and Rett-like syndrome. Curr Opin Psychiatry. 2018 Mar;31(2):103–108. https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000389. PMID: 29206688.

Особенности течения болезни Гентингтона в Удмуртской Республике

Иванова Ирина Леонидовна,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ»
E-mail: urairiva@yandex.ru

Комиссарова Наталия Валерьевна,
кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ»
E-mail: nvkomis@gmail.ru

Городилова Ксения Юрьевна,
студент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ»
E-mail: gorodilova-2001@mail.ru

Каньшина Татьяна Сергеевна,
студент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ»
E-mail: kanshina_t31@mail.ru

Исхакова Алина Марселевна,
студент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ»
E-mail: iskhakova08555@gmail.com

Цель исследования. Изучить особенности течения Болезни Гентингтона (БГ) в Удмуртской Республике (УР) за 2013–2023 гг.

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 42 пациентов с БГ (средний возраст составил 60,8±13,2 лет). Дизайн исследования включает изучение возрастных, гендерных и клинических особенностей БГ в УР за 2013–2023 гг.
Результаты. В ходе проведённого исследования было выявлено, что БГ в УР преобладает у лиц женского пола 27 (64,3%), а также у лиц, проживающих в городах и составляет 3,38 случаев на 100 000 населения. Средний возраст пациентов составил 60,8±13,2 лет. При оценке неврологического статуса пациентов с БГ ведущими симптомами являются гиперкенезы различного характера (хореодистония у 12 (32,4%), миоклональная дистония и мультифокальный гиперкинез – 3 (11,1%), генерализованный гиперкинез – 10 (27,0%)). Кроме того, в клинической картине заболевания распространены псевдобульбарный у 19 (51,4%) пациентов, постуральные нарушения – 15 (40,5%) и нарушения походки у 12 (32,4%). Кроме двигательных нарушений у пациентов наблюдаются нарушения когнитивных функций различной степени выраженности у 32 (65,6%) пациентов, различной степени выраженности.
Заключение. БГ остаётся проблемой общественного здравоохранения, требующая внимания и ресурсов для преодоления и снижения его распространённости.

Ключевые слова: Болезнь Гентингтона (БГ), Удмуртская Республика, двигательные нарушения, когнитивные нарушения.

Введение

Болезнь Гентингтона (БГ) – наследственное заболевание, передающееся по аутосомно-доминантному типу, связанное с прогрессирующей дегенерацией нейронов подкорковых ядер и коры и проявляющееся главным образом сочетанием хореи с деменцией [1].

Аутосомно-доминантный тип проявляется тем, что мутантный аллель доминирует над нормальным аллелем и приводит к развитию заболевания как в гомозиготном, так и в гетерозиготном состоянии. Если хотя бы один из родителей гомозиготный по БГ, то вероятность рождения больного ребёнка равно 100%, если оба родителя гетерозиготны –75%, и если один родитель гетерозиготен, а второй здоров – 50%. Именно поэтому необходимо проводить ДНК-диагностику лиц, имеющих родство с пациентами у которых была выявлена БГ, так как они находятся в группе риска на развитие этой патологии. ДНК-диагностика заключается в определение экспансии повторяющихся тринуклеотидных повторов (GAG). Наличие более 36 экспансии GAG приводит к развитию аномалии белка гентингтина и развитию БГ. От количества экспансий GAG зависит тяжесть заболевания. Поэтому необходима своевременная диагностика для диспансерного наблюдения и раннего выявления симптомов заболевания и назначения адекватной терапии для предупреждения прогрессирования БГ.

Распространенность. Заболевание относится к орфанным (их встречаемость составляет 10 случаев заболевания на 100 000 населения). В Англии БГ имеется у 12 человек на 100 000 населения, в Канаде – у 13,7 на 100 000 населения, на острове Тасмания – у 12,1 на 100 000 населения [2]. По результатам исследования S. Baig средняя распространенность БГ в мире составляет 5,5 на 100 000 населения [3]. Распространенность БГ в УР составила 2,91 на 100 000 населения, среди городских жителей составляет 3,38 случаев на 100 000 населения, а среди сельских – 1,1 на 100 000 населения.

Цель исследования

Изучить особенности течения БГ в Удмуртской Республике (УР) за 2013–2023 гг.

Материал и методы

В ходе работы были изучены истории болезни 42 пациентов (средний возраст составил 60,8±13,2 лет) с БГ, состоящих на учёте в Республиканском центре болезни Паркинсона и расстройств движений (РЦ БПиРД) МЗ УР с 2013 по 2023 года.

Статистическая обработка проведена с применением программ Excel, Statistica. Полученные при работе данные подвергали обработке с расчетом частоты (%), средней арифметической изучаемого показателя (M), среднего квадратичного отклонения (σ), средней ошибки средней арифметической (m). Полученные при работе данные подверглись статистической обработке с расчетом частоты (%), средней арифметической изучаемого показателя (M), среднего квадратичного отклонения (σ), средней ошибки средней арифметической (m). Результаты. Проверили сравнение основных показателей пациентов с БГ в УР и Республике Татарстан[1], так как нам была доступна информация данных субъектов.

По результатам исследования в УР было выявлено 42 пациента с БГ, из них 27 (64,3%) женщин и 15 (35,7%) мужчин. В Республике Татарстан 44 пациента с БГ, 26 (59%) женщин и 18 (41%) мужчин.

Средний возраст общей группы пациентов с БГ в УР составил 60,8±13,2 лет, женщин – 62,8±11,7 лет, мужчин – 56,7±15,1 лет. В свою очередь в Республике Татарстан средний возраст пациентов с БГ составил 47,3 ± 12,5 лет, у женщин – 47,7 ± 10,5 лет, мужчин – 46,6 ± 15,8 лет.

Среди исследуемых в УР с БГ: работающих – 11 (26,2%) пациентов, неработающих – 31 (73,8%), из них 1 студент вуза. Работающих пациентов в Республике Татарстан – 14 (31,8%), неработающих – 30 (68,2%).

Сравнив данные УР и Республики Татарстан можно сделать выводы, что общий средний возраст пациентов с БГ в УР выше, а количество лиц осуществляющих трудовую деятельность выше в Республике Татарстан. Это может быть связано с большей настороженностью специалистов в Республике Татарстан и проведением ранней диагностики БГ.

Клиническая картина БГ у исследуемой группы больных характеризуется комплексом двигательных нарушений, снижением когнитивных функций до деменции и различными психопатологическими изменениями.

В неврологическом статусе у больных с БГ преобладают гиперкинезы различного характера.

Так у 12 (32,4%) больных была выявлена хореодистония. Встречаемость хореодистонии среди женщин – 5 (18,5%), мужчин 7 – (46,6%).

Двигательные нарушения генерализованного характера имеют 10 (27,0%) пациентов. Среди женщин генерализованные гиперкинезы обнаружены у 7 (25,9%), среди мужчин – у 3 (20,0%).

Миоклоническая дистония и мультифокальный гиперкинез наблюдается у 3 (11,1%) женщин (Рис. 1.).

Псевдобульбарный синдром среди исследуемой группы лиц с БГ был выявлен у 19 (51,4%) пациентов. Распространенность данного синдрома среди женщин составила – 10 (37,0%), среди мужчин – 9 (60,0%).

[1] Статистические данные по Республике Татарстан были получены из статьи Мунасипова С.Э., Залялова З.А. Клинико-эпидемиологические аспекты болезни Гентингтона в Республике Татарстан



Рис. 1. Частота встречаемости двигательных нарушений

Постуральный синдром, характеризующийся нарушением устойчивости при удержании тела в положении стоя и при смене положения, обнаружен синдром у 15 (40,5%) пациентов. Из них у 3 проявляется в виде легкой, 6 – умеренная, 5 – выраженная и у 1 в грубой степени. Постуральный синдром чаще выявлялся у женщин (12 (44,4%)), чем у мужчин (3 (20,0%)).

При оценке нарушения походки общей группы исследуемых были обнаружены у 12 (32,4%) пациентов. Проявления нарушения походки по степени тяжести подразделяются на умеренные у 3 (25%) пациентов, и на выраженные у 9 (75%) пациентов.

Бульбарный синдром, характеризуется дисфонией, выраженными симптомами орального автоматизма, насильственным плачем и смехом выявлен у 3 (8,1%) пациентов, среди которых 2 (7,4%) женщины и 1 (6,6%) мужчина;

Акинетико-ригидный синдром – это симптомокомплекс представленный двигательными нарушениями, которые проявляются бедностью и замедлением активных движений, и повышением мышечного тонуса. Данный синдром представлен у 2 (7,4%) женщин.

Атактический синдром проявляется у 2 (13,3%) мужчин головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением равновесия, шаткостью и нистагмом.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Удмуртской Республике среди женщин наиболее распространены такие нарушения как постуральная неустойчивость, бульбарный синдром, генерализованные и мультифокальные гиперкинезы, миоклоническая дистония и акинетико-ригидный синдром. У мужчин чаще обнаруживаются нарушения походки, псевдобульбарный синдром, хореодистонии и атактический синдром.

В ходе прогрессирования заболевания происходит снижение когнитивных функций. Наблюдаются снижение внимания, нарушение гибкости мышления и планирования, замедление скорости умственных процессов, нарушение исполнительных функций, нарушение коммуникации с людьми, трудности в усвоении новой информации, высокая отвлекаемость и в развернутой стадии – деменция.

В ходе работы были выделены 32 пациента из них 21 (65,6%) женщин и 11 (34,4%) мужчин с нарушениями когнитивных функций. С легкими, которые проявляются незначительным снижением познавательных функций – 1 (3,1%), с умеренным снижением познавательных функций, выходящими за пределы возрастной нормы – 7 (21,9%) и деменцией – 24 (75,0%) (Рис. 2.).



Рис. 2. Степени выраженности когнитивных нарушений

Все указанные проявления могут иметь различную степень выраженности, сочетаясь в ряде случаев с другими признаками мультисистемного поражения головного мозга, создающего существенные сложности для клинической диагностики.

При исследовании амбулаторных карт результаты генодиагностики БГ были представлены у 15 (35,7%) пациентов, однако отсутствовали данные о числе GAG-повторов в гене HTT. У оставшихся 27 (64,3%) пациентов результатов генодиагностики представлены не были, но имелись рекомендации для ее прохождения.

Для уменьшения проявлений БГ применяется симптоматическая терапия, основой которой является тетрабеназин.

По данным реестра РЦ БПиРД МЗ УР для купирования двигательных нарушений чаще всего назначали клоназепам (31–73,8%), значительно реже – тетрабеназин (7–16,7%) и в единичных случаях – габапентин (1–2,4%) и гексамидин (1–2,4%). Недостаточность симптоматической терапии связано с тем, что для назначения тетрабеназина необходима консультация в ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России.

Для купирования психомоторного возбуждения и агрессивных состояний выписан тиаприд (4–9,5%), а для сохранения когнитивных функций – акатинол мемантин (6–14,2%), перибедил (2–4,8%), этилметилгидроксипиридина сукцинат (4–9,5%).

Вывод: Изложенные факты подтверждают, что данное заболевание является существенной проблемой общественного здравоохранения, требующей усилий и ресурсов для преодоления и снижения его распространенности. Необходимо создавать действующий регистр по экстрапирамидным заболеваниям, включая БГ. Кроме того, требуется настороженность специалистов в отношении БГ с целью раннего выявления первых симптомов болезни, своевременного назначения ДНК-диагностики и оказания специализированной помощи и лечения.

Литература

1. Вельтищев, Ю.Е. Наследственные болезни нервной системы / Ю.Е. Вельтищев П.А. Темин. – Москва: Медицина, 1998.- 496 с.
2. Клюшников, С.А. Болезнь Гентингтона / Неврологический журнал имени Л.О. Бадаляна. – 2020. – № 1(3). С. 139–158. URL: https://doi.org/10.17816/2686–8997–2020–1–3–139–158 (дата обращения: 27.02.2024).
3. Baig S.S., Strong M., Quarrell O.W.J. The global prevalence of Huntington's disease: a systematic review and discussion. Neurodegener. Dis. Manag. 2016. – № 6(4). С. 331–343. DOI: http://doi.org/10.2217/nmt-2016-0008 (дата обращения: 27.02.2024).
4. Клиническиерекомендации. Болезнь Гентингтона 2017
5. Мунасипова С. Э., Залялова З.А. Клинико-эпидемиологические аспекты болезни Гентингтона в Республике Татарстан / Анналы клинической и экспериментальной неврологии 2020. – № 14(2). С. 23–28. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kliniko-epidemiologicheskie-aspekty-bolezni-gentingtona-v-respublike-tatarstan (дата обращения: 14.03.2024).

PECULIARITIES OF THE COURSE OF HUNTINGTON'S DISEASE IN THE THE UDMURT REPUBLIC

Ivanova I.L., Komissarova N.V., Gorodilova K.Yu., Kanshina T.S., Iskhakova A.M.
Izhevsk State Medical Academy

Alm of the study. To study the peculiarities of the course of Huntington's Disease (HD) in the Udmurt Republic (UR) for 2013–2023 years.
Materials and methods. The case histories of 42 patients with HD (mean age was 60,8±13,2 years) were analyzed. The study design includes the study of age, gender and clinical features of HD in the UR for 2013–2023.
Results. The study revealed that HD in the UR is predominant in female patients 27 (64,3%), as well as in people living in urban areas 29 (78,4%). The mean age of the patients was 60.8±13.2 years. When assessing the neurological status of patients with HD, the leading symptoms were hyperkinesias of different character (choreodystonia in 12 (32,4%), myoclonal dystonia and multifocal hyperkinesis – 3 (11,1%), generalized hyperkinesis – 10 (27,0%)). In addition, pseudobulbar in 19 (51,4%) patients, postural disorders – 15 (40,5%) and gait disorders – 12 (32,4%) are common in the clinical picture of the disease. In addition to motor disorders, patients have cognitive disorders of varying degrees of severity in 32 (65,6%) patients, of varying degrees of severity.
Conclusions. It can be concluded that HD remains a public health issue, requiring attention and resources to overcome and reduce its prevalence.

Keywords: Huntington's disease (HD), Udmurt Republic, motor impairment, cognitive impairment.

References

1. Vel'tishchev, Yu.E. Hereditary diseases of the nervous system / Yu.E. Vel'tishchev P.A. Temin. – Moscow: Medicine, 1998. – 496 p.
2. Klyushnikov, S.A. Huntington's disease / Neurological journal named after L.O. Badalyan. – 2020. – No. 1(3). P. 139–158. URL: https://doi.org/10.17816/2686–8997–2020–1–3–139–158 (accessed: 27.02.2024).
3. Baig S.S., Strong M., Quarrell O.W.J. The global prevalence of Huntington's disease: a systematic review and discussion. Neurodegener. Dis. Manag. 2016. – No. 6(4). P. 331–343. DOI: http://doi.org/10.2217/nmt-2016-0008 (accessed: 27.02.2024).
4. Clinical guidelines. Huntington's disease 2017
5. Munasipova S. E., Zalyalova Z.A. Clinical and epidemiological aspects of Huntington's disease in the Republic of Tatarstan / Annals of Clinical and Experimental Neurology 2020. – No. 14(2). P. 23–28. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kliniko-epidemiologicheskie-aspekty-bolezni-gentingtona-v-respublike-tatarstan (accessed: 14.03.2024).

Концептуальные основы разработки технологии догоспитальной сортировки в медицине неотложных состояний

Колесников Андрей Николаевич,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неонатологии ФБГОУ ВО «Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького», Минздрава России
E-mail: Akolesnikov1972@gmail.com

Албакова Зара Абдул-Мажитовна,
кандидат медицинских наук, доцент, врач анестезиолог-реаниматолог, главный врач ГБУЗ «Карабулакская городская больница»
E-mail: zara.albakova@yandex.ru

Поляхова Юлия Николаевна,
кандидат медицинских наук, врач анестезиолог Детского клинического центра г. Макеевка
E-mail: may.Jl@mail.ru

Важной информацией для оценки результатов лечения пациентов и проведения исследований в неотложной медицинской помощи являются данные о смертности. Замеры смертности могут проводиться как на догоспитальном этапе (до прибытия в медицинское учреждение), так и в отделении неотложной помощи. Однако определение уровня смертности – достаточно сложная задача, и для получения достоверных результатов требуется стандартизированный подход к классификации и регистрации случаев смерти на догоспитальном этапе. В рамках данной статьи авторы на основании комплексного теоретического анализа научной литературы указывают на вариативность понятийного аппарата в области травматологии, что, в конечном счете, предопределяет не только своевременную диагностику травмы, но и дальнейшее ведение пациента на догоспитальном этапе. Важнейшей задачей неотложной помощи на догоспитальном этапе также является точная сортировка недифференцированного пациента, которая помогает определить последующий план лечения и/или транспортировки. Однако, учитывая недостаточную апробированность некоторых практических аспектов по улучшению исходов травм в массовых клинических исследованиях на догоспитальном этапе, вопрос совершенствования системы сортировки остается актуальным. Следовательно, необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять состояние догоспитальной сортировки в медицине неотложных состояний и выявить целесообразность для разработки новой и упрощенной системы.

Ключевые слова: неотложные состояния, травма, оценка состояния, интенсивная терапия, летальность, догоспитальная смертность, системы сортировки.

Введение

В Российской академии наук (РАН) рассчитали ущерб для экономики от преждевременных смертей в 2019 году. Один недожитый год при преждевременной смерти россиянина приносит экономике ущерб в 226–513 тыс. руб. Годовые потери от преждевременной смертности в 2019 году исчислялись в 15–24 трлн руб. Среди основных классов болезней, приводящих к ранней смертности, наибольший ущерб в 3,5–4,8 трлн руб. в 2019 году приносили заболевания системы кровообращения, а также потери от внешних причин (дорожно-транспортные происшествия, случайные отравления и т.д.) – до 5,2 трлн руб. Количество преждевременно умерших россиян в 2019 году на основе данных Росстата равнялось 981,8 тыс. человек.

Данный анализ проводился с учетом показателя о средней продолжительности жизни в 2019 году, равной 73 годам. В зависимости от подхода, цена одной жизни в 2019 году была сведена к среднестатистическому значению от 16,5 млн до 37,5 млн руб. (в соотношении с ценовым эквивалентом 2021 года).

Стоимость человеческой жизни – важный показатель, учитывающийся для целей суверенных рейтингов и макроэкономического анализа. Так, в докладе Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан России за 2022 год говорится, что экономический ущерб только от 33 инфекционных болезней (без учета туберкулеза, COVID-19, ВИЧ-инфекции) составил около 1,15 трлн руб., и констатируется, что кардиологическая и онкологическая заболеваемость – это наиболее частые причины смертности трудоспособного населения.

На сегодняшний день в Российской Федерации разрабатывается комплекс программ, проектов, законодательных актов в сфере здравоохранения. В соответствии с указом президента о национальных целях развития России до 2030 года предусмотрено увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение уровня смертности в трудоспособном возрасте (до 350 случаев на 100 тыс. населения) и сокращение заболеваемости основными болезнями. Для достижения этих целей потребуются меры по снижению уровня заболеваемости и смертности, в том числе за счет увеличения финансирования здравоохранения.

Основное содержание материала

Смертность является ключевым параметром для оценки результатов лечения пациентов и часто используется в качестве показателя качества в регистрах остановок сердца и травм, а также в общих неотложных и догоспитальных исследованиях. Измерение смертности в неотложной помощи представляет собой сложную задачу как на догоспитальном этапе, так и в отделении неотложной помощи, поскольку пациенты могут быть признаны мертвыми до прибытия скорой помощи на место происшествия или до прибытия в медицинское учреждение. Ключевой вопрос заключается в том, как классифицировать случаи смерти на догоспитальном этапе и включать или исключать их из расчетов смертности. Однако в научном контексте проблема репрезентации данных вопросов в современных исследованиях освещена недостаточно, и в настоящее время нет единого определения и консенсуса в отношении сообщений о смерти на догоспитальном этапе.

Не всегда проводится догоспитальная регистрация смерти пациента, и смерть может быть объявлена и зарегистрирована только после прибытия в больницу. Это может быть связано как с действиями фельдшерской бригады, так и с некоторыми дефектами своевременной диагностики.

Как правило, до 25% пациентов уже мертвы, когда скорая помощь прибывает на место происшествия. Эта доля увеличивается до 40% при добавлении бесполезных реанимационных мероприятий, сопровождавшихся только компрессией/вентиляцией легких. Врач констатирует смерть при наличии хотя бы одного из поздних признаков смерти: окоченения, посмертной синюшности или гниения. Однако необходимо получить окончательные исчерпывающие и взаимоисключающие категории:

1) умер до прибытия скорой помощи;
2) внебольничная остановка сердца;
3) жив при прибытии скорой помощи;
4) категория не определена.

Усовершенствованная догоспитальная помощь при тяжелой травме потенциально может улучшить результаты, а догоспитальная реанимация в настоящее время хорошо зарекомендовала себя во многих международных сетях травматологов.

Общеизвестно, что географическая изоляция создает проблемы для оказания медицинской помощи, особенно при проведении неотложных вмешательств при серьезной травме, хотя взаимосвязь удаленности от учреждений, оказывающих медицинскую помощь, и результатов, связанных со здоровьем, остается неопределенной, и во многих исследованиях сообщается о противоречивых результатах. Кроме того, взаимодействие между географической изоляцией и доступностью расширенного догоспитального вмешательства с возможностью стабилизации состояния тяжелобольных пациентов во время транспортировки остается сложным и до конца не изученным. Картирование, определяющее область, доступную для определенной точки в течение определенного временного интервала, учитывает местную географию и транспортную инфраструктуру и, таким образом, более применимее к реальному времени в пути, чем простое расстояние по прямой.

Увеличение изоляции от крупного клинического центра позволяет предположить, что доступные бригады скорой медицинской помощи (далее – СМП) играют определенную роль в смягчении географического неравенства, с которым сталкиваются лица, получившие тяжелые травмы вдали от стационарной помощи. Однако некоторые случаи из практики указывают, что люди с тяжелыми травмами в настоящее время недостаточно обслуживаются СМП, что в целом предопределяет целесообразность в оптимизации процесса идентификации серьезной травмы и улучшении выполнения задач неотложной медицины.

Городские и пригородные районы связаны с более высокой смертностью по сравнению с отдаленными районами. Около половины различий в смертности можно объяснить такими независимыми переменными, как индекс центральности, временные интервалы на догоспитальном этапе, пол, идентификационный номер социального обеспечения, возраст и уровень догоспитального лечения среди персонала догоспитального отделения.

Неудивительно, что догоспитальное лечение является лишь частью лечебной цепочки, которую пациент проходит от травмы до реабилитации, и что многие другие факторы, включая внутрибольничное лечение, влияют на общую 30-дневную выживаемость.

Время пребывания на месте и время транспортировки в значительной степени связаны со смертностью: в то время как длительное пребывание на месте связано с более высокими шансами смертности, длительное время транспортировки связано с более высокими шансами выживания.

В отличие от недавнего систематического обзора Harmsen A.M., Giannakopoulos G.F. и соавт. [8], где взаимосвязи между догоспитальным временем и смертностью не были обнаружены, большинство исследований не выявили связи между временем, проведенным на месте аварии, и смертностью, и пришли к выводу, что более длительное пребывание на месте происшествия увеличивает шансы на выживание. Что касается времени транспортировки, то исследования Gonzalez R.P., Cummings G.R. и соавт. [9] выявили связь между сокращением времени транспортировки и снижением смертности, а также подчеркнули приоритетность организации службы неотложной помощи.

Таким образом, несмотря на противоречивые данные, очевидно, что географическая удаленность и связанные с ней временные задержки оказывают существенное влияние на исходы при тяжелой травме, что требует дальнейшей оптимизации догоспитальной помощи и транспортной логистики.

Подход к индивидуальному ведению пациентов при травмах с учетом остановки кровотечения, обеспечения проходимости дыхательных путей,

защиты дыхания, коррекции кровообращения и последующей возможной инвалидизации [1] на сегодняшний день включен в многочисленные учебные курсы по всему миру.

Учитывая протокол обследования и лечения пациентов с тяжелой травмой, основными мероприятиями являются: прекращение кровотечения, обеспечение доступа к дыхательным путям, защита шейного позвоночника, обеспечение нормального дыхания, поддержание нормального кровообращения, оценка риска инвалидизации и предпринятие мер для снижения неврологических повреждений, а также выявление всех травм пациента и контроль окружающей температуры для предотвращения гипотермии.

Однако нельзя говорить только о важности своевременного оперативного клинического вмешательства со стороны персонала медицинского учреждения.

Травма является важной проблемой здравоохранения во всем мире, по оценкам, ежегодно травмы получают 50 миллионов человек. Это является основной причиной преждевременной смерти и инвалидности, особенно у лиц, не достигших 40-летнего возраста.

В 2014 году были разработаны уникальное определение и классификации пациентов с «политравмой» с использованием сокращенной шкалы травматизма (Abbreviated Injury Scale – AIS). Данное определение классифицирует пациентов, у которых имеются значительные повреждения в трех или более областях тела согласно AIS. Помимо этого, для определения политравмы учитываются и другие факторы, такие как артериальное давление ниже 90 мм рт. ст., оценка по шкале Глазго ниже или равная 8, уровень оснований ниже или равен –6 ммоль/л, международное нормализованное отношение выше или равное 1,4, а также возраст пациента 70 лет и старше. Несмотря на участие международных экспертов и строгий методологический процесс, данное определение политравмы остается сложной задачей, особенно в исследованиях, связанных с первичной помощью или ранним стационарным лечением, где оценка тяжести травмы не может быть определена до проведения компьютерной томографии и ее последующей интерпретации [5].

Следовательно, ведение пациентов с политравмой требует комплексного подхода, включающего как догоспитальные мероприятия по остановке кровотечения, обеспечению проходимости дыхательных путей и других жизненно важных функций, так и дальнейшее стационарное лечение с использованием современных диагностических методов и критериев оценки тяжести состояния. Полагаем, что использование различных определений приведет к неоднородности во всех рандомизированных контролируемых исследованиях в области травматологии и, как следствие, к постановке неправильного диагноза с последующей неадекватной схемой оказания необходимой медицинской помощи.

Можно сказать, что тяжелая черепно-мозговая травма, геморрагический шок, проникающие и непроникающие травмы являются отдельными состояниями. В этом контексте может потребоваться систематическое выделение подгрупп в определении для учета этих различий.

Следует отметить, что заинтересованные стороны должны осознавать: выбор используемых терминов может непосредственно влиять на ключевые исходы, такие как уровень смертности. Это осознание может быть особенно важным при определении необходимого числа пациентов для лечения. По результатам последнего систематического обзора Jeanmougin и его коллег [5], была обнаружена значительная разнородность в терминах и определениях, используемых для классификации пациентов с политравмой в случайных контролируемых исследованиях. Это подчеркивает необходимость дальнейших усилий по разработке уникального и последовательного определения политравмы, учитывая ее чувствительность к времени.

Важнейшей задачей неотложной помощи на догоспитальном этапе является точная сортировка недифференцированного пациента, которая помогает определить последующий план лечения и/или транспортировки.

Сортировка доказала свое преимущество в отношении снижения смертности, например, при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST (ИМ ST), инсульте и травмах. Уделяя внимание кровообращению, важно помнить о возможности дисфункции миокарда и травмы. Небольшие разрывы миокарда присутствуют у 0,3–0,9% пациентов с тяжелой тупой травмой грудной клетки. Нормальная ЭКГ и клинические признаки не исключают тампонаду перикарда, которую следует подозревать у всех пациентов, не реагирующих на волемическую нагрузку. Большинство (70–80%) пациентов выжило после торакотомии или перикардиотомии и зашивания разрыва.

По оценкам, более половины смертей в странах СНГ происходят из-за состояний, требующих оказания догоспитальной или неотложной медицинской помощи, таких как инфекционные заболевания, осложнения во время беременности, сердечно-сосудистые проблемы, автомобильные аварии и случаи межличностного насилия. Тем не менее, в мире наблюдается общий дефицит обзорной литературы, оценивающей инструменты догоспитальной сортировки, которые используются в различных странах и ситуациях.

Единственное всеобъемлющее исследование инструментов догоспитальной сортировки на сегодняшний день – систематический обзор Lidal I.B. и соавт. 2013 года, в котором оценивались результаты на уровне пациентов, связанные с валидированными системами догоспитальной сортировки [6].

Большинство известных методов оценки тяжести травм основываются на системе принятия решений о сортировке травм на месте происшествия, которая, в целом, является неофициальным стандартом в исследованиях, проводимых в США –

«Схеме принятия решения о транспортировке из полевых условий» (FTDS). Эта схема использует поэтапную оценку четырех аспектов клинической картины, включающих физиологические критерии, анатомические признаки, особенности механизма травмы и особые обстоятельства, для определения пациентов, требующих транспортировки в травматологический центр. Однако данная система имеет относительно низкую чувствительность и высокую специфичность при выявлении травм у пожилых пациентов.

В то время как в большинстве исследований по сортировке травм изучались эксплуатационные характеристики методов, группа авторов попыталась определить пути дальнейшего упрощения инструментов для врачей скорой медицинской помощи [3]. В этих исследованиях подчеркивались проблемы разработки идеального инструмента сортировки, а именно системы, которая должна оптимизировать показатели избыточной и недостаточной сортировки, оставаясь при этом эффективной и удобной для персонала, чтобы способствовать широкому интегрированию в уже действующую модель.

Сортировочные методы, по большей части, разрабатываются с целью помощи на этапе предгоспитального обслуживания в определении места назначения для транспортировки, средств транспортировки и требуемого уровня срочности. Данная система, к тому же, предоставляет универсальный способ коммуникации между персоналом предгоспитального отделения и специалистами неотложной медицинской помощи, а также помогает выявить изменения жизненно важных показателей и результаты обследования в зависимости от возрастной группы, что позволяет различить остро нуждающихся в помощи и пациентов без острой потребности в медицинской помощи.

На сегодняшний день более двух третей исследований в вопросе оказания догоспитальной помощи фокусируются на методах триажа для травм и инсультов, что, вероятно, объясняется их клинической значимостью и важностью для системы здравоохранения. Исходы при травмах и инсультах зависят от своевременного выявления на месте и зависимость от срочных вмешательств, которые, в свою очередь, зависят от места госпитализации.

Кроме того, как в случае инсульта, так и при травме, эти данные могут быть использованы для сравнительного анализа при оценке качества системы здравоохранения и вопросов финансирования, что подчеркивает их значимость в качестве объекта исследований.

В области травматологии схему принятия решения о транспортировке из полевых условий, по-видимому, принято считать неофициальным стандартом и широко используемым инструментом сортировки. Поскольку многие инструменты для сортировки травм, описанные в литературе, основываются на стандартизированных протоколах этой схемы, это хорошо изученный инструмент и может служить многообещающей отправной точкой для разработки более простых методов сортировки травм, например, выделение отдельных компонентов, которые могут прогнозировать клинически значимые исходы травмы.

Разнообразие литературы о травмах отличается относительной последовательностью, так как многие исследования использовали общие клинические показатели, что упрощает сравнение между ними.

В последние годы догоспитальная помощь получила все большее признание в международной политике здравоохранения. Данные показывают, что 24 миллиона жизней теряется ежегодно в странах СНГ из-за состояний, связанных с догоспитальной и неотложной помощью.

В 2019 году на заседании 72-й Всемирной Ассамблеи Здравоохранения состоялось значимое решение, которая направлена на укрепление систем, предоставляющих неотложную и травматологическую помощь. Особую значимость приобрело возложение ответственности на догоспитальную помощь, которая признана важнейшим компонентом, в таких системах. Как неразрывное звено в разработке новых систем неотложной медицинской помощи, инструмент догоспитальной сортировки является основополагающим для обеспечения безопасности и высокого уровня качества.

Также имеется ограничение в обзоре, которое приводит к фокусировке только на публикациях на английском языке. Вероятно, это приводит к пропуску методов сортировки, опубликованных в журналах на других языках. Кроме того, обзор ограничивается использованием только рецензируемой опубликованной литературы, что означает, что в официальных документах и других непрошедших экспертную оценку источниках могут обсуждаться дополнительные инструменты сортировки, которые используются в настоящее время.

Итак, данный литературный обзор показал, что большинство литературы по догоспитальной сортировке сосредоточено конкретно на травмах и инсульте, с несколькими отчетами о методах сортировки для обычных недифференцированных пациентов. Принятие решений при травме и оценка окклюзии артерий при инсульте являются особенно хорошо изученными инструментами, которые могут служить инструментами для новых систем службы неотложной медицинской помощи или хорошими отправными точками для упрощенной адаптации для установленных систем неотложной помощи. В рамках данного анализа мы не нашли единого общепринятого «стандартного» инструмента сортировки на догоспитальном этапе.

Следовательно, проводимое нами исследование позволяет разработать универсальную догоспитальную шкалу сортировки, нивелирующую известные недостатки и применимую, как раз в странах СНГ, наиболее нуждающихся в ней по мнению ВОЗ.

Результат также показывает, что у пациентов, умерших на догоспитальном этапе, чаще встречались травмы грудной клетки и брюшной полости по сравнению с пациентами, дожившими до го-

спитализации. Оба эти типа повреждений часто сопровождаются смертельным кровотечением. С другой стороны, результаты также показывают, что процедуры, выполняемые для остановки кровотечения, возникают практически втрое чаще при травмах, представляющих угрозу для жизни (42,7%), по сравнению с травмами, приводящими к смертельному исходу (15,2%,). В этой связи также было замечено, что травма тазовой области была выявлена у 13,4% всех пациентов, скончавшихся на стадии до прибытия в госпиталь, но применения тазового пояса были редким случаем, менее чем у 3% пациентов. Эти результаты свидетельствуют о необходимости улучшения в области ухода за пациентами с серьезными травмами. Тем не менее, следует отметить, что, в особенности, остановка кровотечения из туловища на стадии до прибытия в госпиталь при травмах представляет существенную проблему. Особенно на догоспитальном этапе потенциальные преимущества реанимации и интенсивной терапии должны быть сбалансированы с необходимостью не увеличивать время пребывания на месте, что в целом и предопределяет вектор направления при разработке программы догоспитального триажа.

Еще одной областью для потенциального улучшения оказания помощи является частота дренирования грудной клетки на догоспитальном этапе. Пневмотораксы, в частности напряженные пневмотораксы, являются хорошо признанной причиной предотвратимой смерти у пациентов с травмами. В популяционном исследовании, проведенном Di Bartolomeo S. и соавт., 2001 распространенность пневмоторакса оценивалась как у одного из пяти пострадавших с серьезной травмой, найденных живыми [4]. Литература, касающаяся общей частоты напряженного пневмоторакса (состояния, при котором воздух скапливается в плевральной полости, смещая средостение и затрудняя работу сердца и легких), широко варьируется и сильно зависит от механизма травмы.

В исследовании о травмах грудной клетки сообщалось о 45% пациентов, умерших на догоспитальном этапе. Возможно, некоторая часть этих людей испытывала нераспознанный напряженный пневмоторакс, который мог быть успешно лечен с помощью дренирования грудной клетки. Кроме того, было выяснено, что травма грудной клетки является фактором риска смертельного исхода при травме. Однако, несмотря на эти факты, менее 20% пациентов, погибших до достижения медицинского учреждения, были подвергнуты дренированию грудной клетки, в то время как 80% из «смертельной когорты» получили сердечно-легочную реанимацию (далее – СЛР), перед ее проведением. Дренирования грудной клетки в ситуации травматической остановки сердца имеют важное значение, поскольку нераспознанный напряженный пневмоторакс неизбежно приведет к смерти, вызванной нарушениями наполнения сердца, снижением венозного возврата из-за смещения средостения и повышенным сопротивлением легочных сосудов, вызванным гипоксемией. Как следствие, дренирование грудной клетки при травматической остановке сердца указано во всех недавних рекомендациях по СЛР.

Резюмируя, можно сказать, что своевременное дренирование пневмоторакса на догоспитальном этапе может улучшить результаты лечения.

Интубация – это важная процедура, спасающая жизнь пациентам с проблемами дыхательных путей или недостаточным уровнем оксигенации и вентиляции, однако, помимо потенциальных преимуществ, существуют и риски. Сложные или неудачные эндотрахеальные интубации могут вызвать гипоксию, аспирацию желудочного содержимого в дыхательные пути и снижение артериального давления. Это особенно актуально для пациентов с геморрагическим шоком, поскольку интубация часто приводит к остановке сердца. Основными факторами являются потеря вазомоторного тонуса после начала анестезии, воздействие положительного давления на вентиляцию легких, что приводит к уменьшению сердечного выброса, а также расширение кровоизлияния от потери мышечного тонуса в результате применения миорелаксантов. Исследование, опубликованное недавно, указывает на то, что пациентам с геморрагическим шоком и нормальной функцией дыхательных путей, которые могут поддерживать адекватный уровень оксигенации, следует рекомендовать использовать стратегию отсроченной интубации [7]. В нашем случае данную проблему мы будем решать при помощи разработанного одноразового видеоларингоскопа с улучшенными условиями визуализации, предотвращения аспирации и оксигенации.

В частности, меры по контролю раннего кровотечения, улучшению условий интубации трахеи (авторский видеоларингоскоп) и уменьшению времени пребывания на месте, триажа, старта интенсивной терапии и времени транспортировки (с индивидуализацией локации) являются областями потенциального улучшения догоспитальной экстренной и неотложной помощи.

Заключение

В то время, когда уровень летальности от травм снижается, травматические повреждения остаются ведущей причиной смерти и длительной инвалидности у молодых пациентов во всем мире. Решение этой сложной проблемы требует комплексного подхода, включающего разработку более эффективных профилактических стратегий для населения, улучшение клинической интервенции и наращивание системных изменений на предгоспитальном этапе.

Целевые векторы данного направления – это снизить летальность и инвалидизацию у пациентов с травмами и неотложными состояниями путем внедрения пилотного проекта цифровизации работы экстренных служб.

Приоритетные задачи:

1. Оценить уровень оказания медицинской помощи и выявить проблемы, связанные со смертно-

стью (включая дефиниции и время определения), своевременной доставкой пациентов, в профильные отделения (с учетом географических особенностей), временем триажа и объемом проведения неотложной терапии на месте оказания помощи.

2. Разработать новую, упрощенную программу для догоспитального триажа, учитывающую всю выявленную в обзоре разнородность определения травмы, позволяющую упростить процесс сортировки пациентов, определение маршрутов госпитализации, транспортабельность пациента, и объем необходимой пред- и интратранспортировочной терапии.

3. Разработать и внедрить пилотный проект по внедрению новой системы триажа и интенсивной терапии на догоспитальном этапе.

4. Оценить эффективность внедрения новых подходов к организации неотложной помощи пациентам с травмами и экстренными состояниями по данным для взрослого гражданского населения.

5. Разработать и внедрить программу обучения для врачей и среднего медицинского персонала, как потенциальных пользователей авторской программы триажа.

6. Разработать программу обучения и внедрения новой системы триажа и интенсивной терапии в работу служб полиции, ДПС, МЧС, водителей муниципального транспорта.

7. Оценить экономический эффект внедрения новой организационной модели догоспитальной помощи.

Литература

1. Кадыков, В.А. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстренных состояниях: учебное пособие для среднего профессионального образования / В.А. Кадыков, Е.М. Мохов, А.М. Морозов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 244 с.
2. Советская Россия. – 1956. – 2024. – № 7. – 4 с. – URL: https://lib.rucont.ru/efd/825928 (дата обращения: 04.02.2024)
3. Brown J.B., Stassen N.A., Bankey P.E., Sangosanya A.T., Cheng J.D., Gestring M.L. Mechanism of injury and special consideration criteria still matter: an evaluation of the National Trauma Triage Protocol. J Trauma. 2011;70(1):38–44
4. Di Bartolomeo S, Sanson G, Nardi G, Scian F, Michelutto V, Lattuada L. A population- based study on pneumothorax in severely traumatized patients. J Trauma. 2001;51(4):677–82
5. Jeanmougin et al. Heterogeneity in defining multiple trauma: a systematic review of randomized controlled trials Critical Care (2023) 27:363 https://doi.org/10.1186/s13054–023–04637-w
6. Lidal I.B., Holte H.H., Vist G.E. Triage systems for pre-hospital emergency medical services – a systematic review. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2013;21(1):28–36 https://www.rbc.ru/economics/18/01/2024/65a66afd9a79470cf70e7ee7?
7. Hudson A.J., Strandenes G, Bjerkvig C.K., Svanevik M, Glassberg E. Airway and ventilation management strategies for hemorrhagic shock. To tube, or not to tube, that is the question! J Trauma Acute Care Surg. 2018;84(6S Suppl 1): S77–82
8. Harmsen AMK, Giannakopoulos G.F., Moerbeek P.R., Jansma E.P., Bonjer H.J., Bloemers F.W. The influence of prehospital time on trauma patient's outcome: a systematic review. Injury. 2015;46(4):602–9
9. Gonzalez R.P., Cummings G.R., Phelan H.A., Mulekar M.S., Rodning C.B. Does increased emergency medical services prehospital time affect patient mortality in rural motor vehicle crashes? A statewide analysis. Am J Surg. 2009;197(1):30–4.

TOP PRIORITIES FOR IMPROVING INJURY OUTCOMES OR HOW MUCH IS A HUMAN LIFE WORTH

Kolesnikov A.N., Albakova Z.A.-M., Polyakhova Yu.N.

Donetsk State Medical University named after. M. Gorky Ministry of Health of Russia; Karabulak City Hospital; Children's Clinical Center in Makeevka

Mortality data are important information for assessing patient outcomes and conducting research in emergency care. Mortality measurements can be carried out both at the pre-hospital stage (before arrival at a medical facility) and in the emergency department. However, estimating mortality is a complex task and requires a standardized approach to the classification and recording of deaths at the pre-hospital stage to obtain reliable results. Within the framework of this article, the authors, on the basis of a comprehensive theoretical analysis of scientific literature, point out the variability of the conceptual apparatus in the field of traumatology, which, ultimately, predetermines not only the timely diagnosis of injury, but also the further management of the patient at the prehospital stage. The most important task of emergency care at the prehospital stage is also the accurate triage of the undifferentiated patient, which helps to determine the subsequent treatment and/or transport plan. However, given the lack of testing of some practical aspects to improve the outcomes of injuries in mass clinical trials at the prehospital stage, the issue of improving the triage system remains relevant. Therefore, more research is needed to better understand the state of prehospital triage in emergency medicine and to identify the feasibility for developing a new and simplified system.

Keywords: emergency conditions, trauma, condition assessment, intensive care, mortality, prehospital mortality, triage systems.

References

1. Kadykov, V.A. Provision of pre-medical emergency care in emergency and urgent conditions: a textbook for secondary vocational education / V.A. Kadykov, E.M. Mokhov, A.M. Morozov. – 3rd ed., reV. and add. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2023. – 244 p.
2. Soviet Russia. – 1956. – 2024. – No. 7. – 4 p. – URL: https://lib.rucont.ru/efd/825928 (accessed: 04.02.2024)
3. Brown J.B., Stassen N.A., Bankey P.E., Sangosanya A.T., Cheng J.D., Gestring M.L. Mechanism of injury and special consideration criteria still matter: an evaluation of the National Trauma Triage Protocol. J Trauma. 2011;70(1):38–44
4. Di Bartolomeo S, Sanson G, Nardi G, Scian F, Michelutto V, Lattuada L. A population- based study on pneumothorax in severely traumatized patients. J Trauma. 2001;51(4):677–82
5. Jeanmougin et al. Heterogeneity in defining multiple trauma: a systematic review of randomized controlled trials Critical Care (2023) 27:363 https://doi.org/10.1186/s13054–023–04637-w
6. Lidal I.B., Holte H.H., Vist G.E. Triage systems for pre-hospital emergency medical services – a systematic review. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2013;21(1):28–36 https://www.rbc.ru/economics/18/01/2024/65a66afd9a79470cf70e7ee7?
7. Hudson A.J., Strandenes G, Bjerkvig C.K., Svanevik M, Glassberg E. Airway and ventilation management strategies for hemorrhagic shock. To tube, or not to tube, that is the question! J Trauma Acute Care Surg. 2018;84(6S Suppl 1): S77–82

8. Harmsen AMK, Giannakopoulos G.F., Moerbeek P.R., Jansma E.P., Bonjer H.J., Bloemers F.W. The influence of prehospital time on trauma patient's outcome: a systematic review. Injury. 2015;46(4):602–9

9. Gonzalez R.P., Cummings G.R., Phelan H.A., Mulekar M.S., Rodning C.B. Does increased emergency medical services prehospital time affect patient mortality in rural motor vehicle crashes? A statewide analysis. Am J Surg. 2009;197(1):30–4.

Воздействие эколого-гигиенических факторов на риск развития эрозии шейки матки: анализ и перспективы защиты женского здоровья

Магомедова Умият Абдулбасировна,
старший преподаватель кафедры «Общей гигиены и экологии человека», ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
E-mail: m.umijat@yandex.ru

Ибнумасхудова Патимат Магомедовна,
старший преподаватель кафедры «Общей гигиены и экологии человека», ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
E-mail: ipatimat@gmail.com

Магомедов Магомед Гитиномагомедович,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры «Общей гигиены и экологии человека», ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
E-mail: magomedov1957@mail.ru

Акаева Диана Ризвановна,
студент, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
E-mail: diana.akayeva@list.ru

Введение. Доказано, что эколого-гигиенические факторы способны влиять на заболеваемость женского населения эрозией шейки матки (ЭШМ). Определена степень воздействия на рост заболеваемости разного рода химических агентов, оказывающих токсический эффект на все органы и системы, в том числе и репродуктивную. При изучении вредных химических веществ и соединений учеными установлено, что наиболее пагубны углеводороды, альдегиды, кетоны как по отдельности, так и в совокупности с другими компонентами.
Цель данной работы – проанализировать взаимосвязь между загрязнением окружающей среды, использованием вредных веществ в быту или на производстве и возникновением патологии. Сформулировать вывод относительно прямой зависимости от процесса интенсивного развития сельского хозяйства, активного преобразования природных ресурсов и увеличением уровня количества заболевших.
Материалы и методы: при написании обзорной статьи были изучены релевантные публикации научных баз CyberLeninka и Global Health; использована информация, полученная посредством разбора научно-методической литературы, включая материалы, созданные отечественными и зарубежными авторами; заимствованы официальные статистические данные; применены гипотетико-дедуктивные методы, а также приобретенный в процессе деятельности личный опыт лечения пациенток с цервикальной патологией.
Результаты и обсуждение: Определены эколого-гигиенические факторы, представляющие опасность для женского репродуктивного здоровья. Найдены способы эффективной профилактики рака и эрозии шейки матки, других гинекологических заболеваний. Разработана стратегия последующей минимизации рисков возникновения этих патологий. Для ее реализации внесены предложения по регулярному совершенствованию скрининговой программы, мониторингу экологической обстановки в каждом регионе Российской Федерации, усилению санитарно-просветительской работы в отношении женской части населения, повышению охвата профилактическими осмотрами и вакцинацией против вируса папилломы человека.
Выводы: сегодня забота о здоровье женщин обязана быть комплексной, поддерживаемой на всех уровнях: индивидуальном, государственном, международном [1]. Основной целью этого можно считать напоминание правительствам всех стран, общественным организациям, работникам здравоохранения, средствам массовой информации и простым людям, что здоровье является абсолютной и непреходящей ценностью каждого гражданина в отдельности и всего человечества в целом. Здоровье женщин – это нечто большее, чем персонифицированное благополучие, это будущее нации. Поэтому по всему миру проводятся информационные кампании, нацеленные на защиту прав женщин и повышение качества их медицинской грамотности.

Ключевые слова: эрозия шейки матки, вредные условия труда, профилактика заболеваний, репродуктивное здоровье, гинекологическая заболеваемость, День Защиты Женского Здоровья, предраковое состояние, рак шейки матки, эпителиальные клетки, профилактический осмотр, ЭШМ.

Введение

Эрозия шейки матки, относясь к предраковым состояниям, требует превентивных мер: своевременного выявления, особенно среди женщин, работающих в организациях с применением опасных и вредных условий труда; профилактики; терапии. Общая гинекологическая заболеваемость, согласно аналитическим данным, адекватна стажевой профессиональной нагрузке в неблагоприятной рабочей среде следующих отраслей промышленности:

деревообрабатывающей (формальдегид, фенол, ацетон, пыль фенолформальдегидной смолы и др.);

фармацевтической, медицинской (азот, формальдегид, фенол, ртутьорганические соединения, углеводороды и т.д.);

химической (меркаптан, сероводород, сернистый ангидрид);

сельскохозяйственной (ядохимикаты, минеральные удобрения и т.п.).

Несмотря на правила и ограничения, регулируемые законодательством, работодателями они не всегда соблюдаются. То есть, не создаются на рабочих местах необходимые условия труда, игнорируется техника безопасности [2].

Большую озабоченность также вызывает состояние атмосферного воздуха. Свыше 54% населения российских городов проживает в зонах с его загрязнением высокой либо очень высокой степени [3].

Каждый год 28 мая в мире отмечают Международный День Защиты Женского Здоровья. На бытовом уровне понятие «женское здоровье» истолковывается как состояние репродуктивной системы, имеющей биологические различия с мужской и предназначенной для вынашивания и рождения детей. В действительности же, Всемирная Организация Здравоохранения интерпретирует термин как «состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов».

К сожалению, в последнее время специалистами отмечается значительное ухудшение репродуктивного здоровья у женщин всех возрастов. Одним из наиболее распространенных заболеваний считается эрозия шейки матки, с гистологической точки зрения являющаяся повреждением слизистой оболочки. Под этим диагнозом подразумевают лишь поверхностный дефект эпителиального слоя, не затрагивающий пограничную базальную мембрану и другие, более глубокие слои. А после заживления изъязвления в слизистой не остается даже рубца [4; с. 212–214].

То есть с точки зрения женской репродуктивной системы заболевание считается доброкачественным и даже рассматривается как норма, нередко встречающаяся у представительниц детородного возраста. При длительном течении воспалительного процесса самим организмом запускается реакция самоизлечения. Однако, когда начинается активное деление эпителиальных клеток, формируется доброкачественная опухоль. Если не контролировать ее рост и не удалять своевременно, она способна перерасти в злокачественную, так называемый рак шейки матки [5; с. 3].

Эрозия шейки матки как экологически обусловленное заболевание

В основном эрозия шейки матки диагностируется при плановых и профилактических осмотрах, так как в 90% случаев протекает с отсутствием симптоматики. Но многие исследователи связывают ее появление с наличием распространенного физиологического состояния в виде хронического цервицита у беременных; женщин, использующих оральные и барьерные контрацептивы; сексуально активных девочек-подростков. Распространённость снижается с повышением возраста, начиная от 35 лет [6; с. 517–522]. Если принять во внимание частоту случаев заболеваемости на территории России, то в структуре гинекологических проблем доброкачественные трансформации шейки матки, в том числе эрозия, стоят на первом месте [7; с. 57–59].

Высокая заболеваемость среди женщин, особенно молодых, и растущее количество запущенных случаев рака требует усовершенствования профилактических мероприятий и методов лечения патологических изменений на шейке матки, включая эрозии. Это актуально и в контексте эколого-гигиенических рисков. В городах Российской Федерации повышение вероятности возникновения ЭШМ связано с загрязнениями техногенного происхождения, поступающими в окружающую среду в концентрациях, вызывающих токсическое воздействие не только на экосистему, но и на здоровье человека [8; с. 172–173].

Ухудшение репродуктивного здоровья всех наций в мире происходит за счет незначительных доз химических веществ, которые попадают в воздух, воду, пищу и, как следствие, товары потребительского спроса (рисунок 1).



Рис. 1. Источники проникновения в организм человека загрязняющих веществ

Немаловажную этиологическую роль в данной проблеме играют эстрогеноподобные химические соединения, наделённые гормональной активностью [9; с. 67–114]. Их относят к агонистам (мимическим), схожим с истинными гормонами, но не относящимся к ним; и антагонистам, индуцирующим энзиматическую активность и исполняющим роль антиэстрогенов, которые вступают во взаимодей-

ствие с естественными гормонами, при этом снижая либо разрушая их активность. Вместе с тем природные гормоны, вырабатываемые эндокринными железами, начинают воздействовать на организм как мессенджеры, стимулируя целый каскад эффектов. В отличие от естественных мимические гормоны не выводятся так же быстро и остаются в организме довольно продолжительное время, работу же выполняют нерегулярно и деструктивно, что очень пагубно для него. Как следствие, запускаются общепатологические процессы различной степени тяжести, в зависимости от интенсивности или продолжительности влияния негативных факторов и эффективности компенсаторно-приспособительных процессов организма в целом, а также репродуктивной системы в частности.

Основными загрязнителями ОС (окружающей среды) во многих регионах экологического кризиса являются свинец, оксиды серы, азота, углерода. Наибольшее их содержание обнаружено в Алтайском крае; Нижнем Поволжье; хлопкосеящих районах Узбекистана и Таджикистана; промышленных агломерациях Кемеровской, Амурской, Иркутской и других областей. Вследствие всёвозрастающего загрязнения ОС, человеческая энергия перераспределяется в сторону приспособления функций, строения клеток, органов и всего организма к условиям создающейся неблагоприятной обстановки [10; с. 216–217].

В наступившее тысячелетие отношения человечества с природной средой стали величайшей проблемой современности. За это время технологии стремительно развивались, совершенствовались методы, процессы и материалы. Изменился облик людей и ритм жизни, остался только, как и в ушедшие эпохи, доступ к природным ресурсам, запасы которых постепенно истощаются.

Численность населения России постепенно сокращается, особенно в азиатской её части, продолжается процесс старения, меняется социальный климат. Болезни цивилизации, возникшие в связи с научно-технической революцией и в результате разрушения экосистемы, носят глобальный характер. Последствием таких преобразований стала также избыточная концентрация пестицидов и агрохимикатов, используемых для повышения урожайности, борьбы с вредителями и болезнями растений, сорняками. В комбинации с тяжелым физическим трудом и неблагоприятным микроклиматом в сельской местности риск опасности возникновения ЭШМ у женщин значительно увеличился. Что подтверждено многократными эколого-гигиеническими экспертизами на территориях интенсивного земледелия, где выявлено превышение содержания пестицидов и высокая степень контаминации этими ядовитыми веществами не только земельных участков, но и расположенных вблизи источников воды и других объектов [11; с. 359–364].

Исследования, проведённые с 1996 по 2011 годы среди населения Республики Дагестан, показали степень негативного воздействия на организм тружениц сельскохозяйственной отрасли химических соединений, применяемых в растениеводстве, животноводстве, земледелии. Определено, что именно в сельской местности женщины чаще заболевают онкопатологией репродуктивной системы в сравнении с представительницами других профессий, живущих в городах.

Эксперименты были ориентированы на определение воздействия нескольких разнонаправленных соединений на степень развития заболеваемости шейки матки. Статистические данные заимствовались из архива организаций здравоохранения отдельных регионов и банка данных ДГМУ. В процессе исследований применялся двухфакторный дисперсионный анализ, дающий возможность оценить влияние сочетанного, суммарного и раздельного воздействия минеральных удобрений и ядохимикатов на заболеваемость эрозией шейки матки; наличие связи между распространённостью патологии и интенсивностью использования агрохимикатов.

Выяснилось, что сами по себе вещества не были первопричиной и не играли особой роли в патогенезе ЭШМ, но оказывали кумулятивный эффект при постоянном контактировании с ними, увеличивая риск её развития. Со временем накопленные соединения видоизменялись, приводя к общей интоксикации организма, что вызывало напряжённость иммунитета в связи с потребностью обезвреживания новых агентов. Вследствие чего задействовались защитно-приспособительные механизмы, порождающие иммуносупрессию.

Меры, принимаемые для решения глобальной проблемы

Всесторонняя экономическая деятельность за последнее двухсотлетие совершалась независимо от глобальных экологических интересов. Бешеный рост производства и потребления, безграничное расходование природных ресурсов и энергии приводят к постепенному экологическому опустошению, создающему риск для здоровья и жизни граждан планеты. Как было озвучено в Докладе Комиссии ООН 2007 года по проблемам окружающей среды (ЮНЕП) [12], прогноз относительно будущего человечества неутешителен. Уже в ближайшие 30–40 лет планету ждут необратимые изменения. Помимо деформации 70% поверхности земли и безвозвратной потери более четверти видов растительного и животного мира, дефицитом станет и безопасная питьевая вода, чистый воздух, способность естественных природных ландшафтов восстанавливаться после антропогенного вмешательства. По заключению Всемирной Организации Здравоохранения уже сейчас свыше 80% всех заболеваний связано с употреблением людьми некачественной и загрязнённой питьевой воды.

Как считают учёные-медики и врачи-практики, профилактика эрозии шейки матки должна состоять в минимизации эколого-гигиенических рисков заболевания путем оценки возможностей коррекции или нейтрализации факторов и поэтапного внедрения на государственном уровне мероприятий,

направленных на их устранение [13]. Для реализации стратегии потребуются доказавшие уже свою эффективность профилактические меры:

Регулярное прохождение (не реже одного раза в год) медицинских осмотров и проведение ПАП-тестирования, помогающего обнаружению рака шейки матки (РШМ) уже на нулевой стадии развития. Это метод жидкостной цитологии с окрашиванием по-Папаниколау, способный выявить патологию еще до проявления симптоматики. Его результативность составляет не менее 95%, что в сравнении с чувствительностью традиционных мазков на онкоцитологию превышает более, чем в 2 раза. Тест рекомендуется женщинам с момента начала половой жизни.

Информирование населения об эколого-гигиенических факторах риска развития ЭШМ, негативных последствиях патологии с вероятностью появления злокачественных новообразований шейки матки. Женщины, занятые на рабочих местах с вредными условиями труда, должны быть осведомлены о концентрациях химических веществ, вызывающих профессиональные заболевания, и применении средств защиты от них.

Использование различных форм санитарного просвещения, таких как распространение тематических буклетов и памяток, проведение индивидуальных бесед и коллективных лекций.

Организация по месту жительства скринингов населения определённого возраста, не занятого на производстве с вредными условиями труда.

Вакцинация против ВПЧ (вируса папилломы человека), получившая сегодня широкое распространение даже на международном уровне. Результаты исследований свидетельствуют не только о снижении заболеваемости инфекцией с ее помощью, но также о сокращении смертности от рака шейки матки и состояний, предшествующих ему, включая ЭШМ.

Районирование территорий с комплексными исследованиями их медико-экологического состояния, результаты которых доводить до сведения административных органов с целью анализирования специалистами. На основании анализа должна корректироваться система мониторинга качества окружающей среды, вводиться соответствующие санкции, разрабатываться нормативные акты нагрузки на экосистему [14; с. 224]. Подобная стратегия позволит оптимизировать политику оздоровления населения, выбирать наилучшую тактику лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий [15; с. 72]. (рисунок 2).

Рис. 2. Медико-экологическое районирование

Заключение

В связи с тем, что эрозия при отсутствии точной диагностики и терапии (в случае необходимости) способна перерождаться в злокачественное новообразование, а в течение нескольких десятилетий на территории России отмечается рост заболеваемости и смертности от рака шейки матки, нужны действенные профилактические меры в отношении не только самого рака, но и предраковых состояний [16; с. 59].

Проведенные автором обзоры литературы и контент-анализа показали, что одним из наиважнейших методов эффективной профилактики ЭШМ является устранение или минимизация негативных эколого-гигиенических рисков. Для успешной борьбы требуется разработка государственной стратегии с внедрением здоровьесберегающих технологий в целях первичной и вторичной профилактики цервикальной онкопатологии. Для своевременного выявления предраковых состояний с помощью организованного скрининга актуален цифровизированный мониторинг наряду с современными цитологическими методами тестирования. Необходимо также внедрить иммунопрофилактику для предупреждения ВПЧ-ассоциированных заболеваний с введением в Национальный календарь профпрививок, усовершенствовать программы обучения медицинских работников и населения для реализации борьбы с раком шейки матки [17; с. 465].

В настоящее время вся идеология гинекологической помощи сосредоточена на диагностике и лечении заболеваний, изменить которую надлежит в сторону профилактической направленности. Следует дополнительно усилить в гинекологической практике санитарно-просветительскую деятельность, уделить больше внимания социально-психологическим аспектам.

Литература

1. Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030 гг.). Доклад генерального директора ВОЗ. 6 апреля 2023 года. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA76/A76_5-ru.pdf
2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
3. Рейтинг самых загрязненных крупных городов в режиме реального времени. Сайт компании IQAir. https://www.iqair.com/ru/world-air-quality-ranking
4. Mitchell L, King M, Brillhart H, Goldstein A. Cervical ectropion may be a cause of desquamative inflammatory vaginitis. Sex Med. 2017;5(3): e212-e214 doi: 10.1016/j.esxm.2017.03.001
5. Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения РФ. 2020.59с.3
6. Reich O, Regauer S, McCluggage WG, Bergeron C, Redman C. // Defining the Cervical Transformation Zone and Squamocolumnar Junction: can we reach a common colposcopic and histologic definition? Int J Gynecol Pathol. 2017;36(6):517–522 doi: 10.1097/PGP.0000000000000381
7. Фархан Т., Фахрутдинова Э.Х. Патология шейки матки и профилактика рака шейки матки: актуальные подходы и стратегии. Вестник науки. 2023;4 (61): 57–59
8. Верзилина И.Н. Оценка медико-экологической ситуации среди населения крупного города. Вестник новых медицинских технологий. – 2006.-Т.XIII. – № 2. -С. 172–173
9. 1. Прохоров Б.Б. Экология человека: учеб. для студ. высш. учеб. заведений /3-е изд., стер. – М.: Издат. Центр «Академия», 2007. – 320 с. (Главы: 5; 6; 7. с. 67–114)
10. Казначеев В.П. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека: материалы 1-й Всерос. науч. конф. (9–11 дек. 2002 г.). – Новосибирск, 2002.с.216–217
11. Магомедова У.А., Хачиров Д.Г. Влияние отдаленных биологических последствий интенсивности применения агрохимикатов на заболеваемость эрозией шейки матки взрослого женского населения сельской местности республики Дагестан. Известия ДГПУ. Естественные и точные науки. 2012;3:359–364
12. Доклад Комиссии ООН 2007 года по проблемам окружающей среды (ЮНЕП) file:///C:/Users/user/Downloads/80-CHizhov.pdf
13. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, первое издание, 2007 год https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7728/GEO4_SPM_RS.pdf?sequence=9&isAllowed=y
14. Заридзе Д.Г. Профилактика рака. Руководство для врачей. М.: МА-ПРЕСС. 2009.с.224
15. Прохоров Б.Б. Медико-экологическое районирование и региональный прогноз здоровья населения России. – М.: Изд-во МНЭПУ. 1996.с.72
16. Клинические рекомендации «Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки». Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы, Российское общество акушеров-гинекологов. Утв. Минздравом России. – 2020с.59
17. Вакцины против папилломавирусной инфекции человека: документ по позиции ВОЗ, http://www.who.int/wer, no. 43, pp. 465–492, 2014.

IMPACT OF ECOLOGICAL AND HYGIENIC FACTORS ON THE RISK OF CERVICAL EROSION: ANALYSIS AND PROSPECTS FOR PROTECTING WOMEN'S HEALTH

Magomedova U.A., Ibnumashudova P.M., Magomedov M.G., Akayeva D.R.
Dagestan State Medical University

Relevance: It has been proven that environmental and hygienic factors can influence the incidence of cervical erosion (ECE) in the female population. The degree of influence on the growth of morbidity of various types of chemical agents that have a toxic effect on all organs and systems, including the reproductive one, has been determined. When studying harmful chemicals and compounds, scientists found that the most harmful are hydrocarbons, aldehydes, and ketones, both individually and in combination with other components.
The purpose of this work is to analyze the relationship between environmental pollution, the use of harmful substances in everyday life or at work and the occurrence of pathology. Formulate a conclusion regarding the direct dependence on the process of intensive development of agriculture, active transformation of natural resources and an increase in the number of cases.
Materials and methods: when writing the review article, relevant publications from the scientific databases CyberLeninka and Global Health were studied; information obtained through analysis of scientific and methodological literature was used, including materials created by domestic and foreign authors; official statistics are borrowed; Hypothetico-deductive methods were used, as well as personal experience gained in the process of treating patients with cervical pathology.
Results and discussion: Environmental and hygienic factors that pose a danger to women's reproductive health have been identified. Methods have been found to effectively prevent cancer and cervical erosion and other gynecological diseases. A strategy for subsequent minimization of the risks of these pathologies has been developed. To implement it, proposals were made to regularly improve the screening program, monitor the environmental situation in each region of the Russian Federation, strengthen sanitary education work for the female population, increase coverage of preventive examinations and vaccination against the human papillomavirus.
Conclusions: today, care for women's health must be comprehensive, supported at all levels: individual, state, international [1]. The main purpose of this can be considered to remind governments of all countries, public organizations, healthcare workers, the media and ordinary people that health is an absolute and enduring value of each citizen individually and of all humanity as a whole. Women's health is more than personalized well-being; it is the future of the nation. Therefore, information campaigns are being conducted around the world aimed at protecting women's rights and improving the quality of their health literacy.

Keywords: cervical erosion, harmful working conditions, disease prevention, reproductive health, gynecological morbidity, Women's

Health Day, precancerous condition, cervical cancer, epithelial cells, preventive examination, ESM.

References

1. Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health (2016–2030). Report of the WHO Director General. April 6, 2023. (In Russian) https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA76/A76_5-ru.pdf
2. Federal Law of December 28, 2013 No. 426-FZ "On special assessment of working conditions" (In Russian)
3. Rating of the most polluted large cities in real time. IQAir company website. (In Russian) https://www.iqair.com/ru/world-air-quality-ranking
4. Mitchell L, King M, Brillhart H, Goldstein A. Cervical ectropion may be a cause of desquamative inflammatory vaginitis. Sex Med. 2017;5(3): e212-e214 doi: 10.1016/j.esxm.2017.03.001 (In Russian)
5. Cervical intraepithelial neoplasia, erosion and ectropion of the cervix. Clinical recommendations of the Ministry of Health of the Russian Federation. 2020.59p.3 (In Russian)
6. Reich O, Regauer S, McCluggage WG, Bergeron C, Redman C. // Defining the Cervical Transformation Zone and Squamocolumnar Junction: can we reach a common colposcopic and histologic definition? Int J Gynecol Pathol. 2017;36(6):517–522 doi: 10.1097/PGP.0000000000000381 (In Russian)
7. Farkhan T., Fakhrutdinova E. Kh. Cervical pathology and prevention of cervical cancer: current approaches and strategies. Bulletin of Science. 2023;4(61):57–59 (In Russian)
8. Verzilina I.N. Assessment of the medical and environmental situation among the population of a large city. Bulletin of new medical technologies. – 2006.-T.XIII. – No. 2. -S. 172–173 (In Russian)
9. Prokhorov B.B. Human ecology: textbook. for students higher textbook institutions /3rd ed., erased. – M.: Publishing house. Center "Academy", 2007. – 320 p. (Chapters: 5; 6; 7. p. 67–114) (In Russian)
10. Treasurer V.P. The influence of environmental pollution on human health: materials of the 1st All-Russia. scientific conf. (9–11 Dec 2002). – Novosibirsk, 2002.p.216–217 (In Russian)
11. Magomedova U.A., Khachirov D.G. The influence of long-term biological consequences of the intensity of use of agrochemicals on the incidence of cervical erosion in the adult female population of rural areas of the Republic of Dagestan. News of the DSPU. Natural and exact sciences. 2012;3:359–364 (In Russian)
12. 2007 UN Commission on the Environment (UNEP) Report file:///C:/Users/user/Downloads/80-CHizhov.pdf (In Russian)
13. United Nations Environment Programme, first edition, 2007 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7728/GEO4_SPM_RS.pdf?sequence=9&isAllowed=y (In Russian)
14. Zaridze D.G. Cancer prevention. Guide for doctors. M.: MA-PRESS. 2009.p.224 (In Russian)
15. Prokhorov B.B. Medical-ecological zoning and regional forecast of the health of the population of Russia. – M.: Publishing house MNEPU. 1996.p.72 (In Russian)
16. Clinical guidelines "Cervical intraepithelial neoplasia, erosion and ectropion of the cervix." Russian Society of Specialists in the Prevention and Treatment of Tumors of the Reproductive System, Russian Society of Obstetricians and Gynecologists. Approved Ministry of Health of Russia. – 2020p.59 (In Russian)
17. Vaccines against human papillomavirus infection: a document on the position of WHO, http://www.who.int/wer, no. 43, pp. 465–492, 2014. (In Russian)

Предпосылки старческого остеопороза закладываются в детском возрасте

Нурлыгаянов Радик Зуфарович,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, врач травматолог – ортопед ГБУЗ РБ ГКБ No21
E-mail: radiknur@list.ru

Гильмутдинова Лира Талгатовна,
доктор медицинских наук, профессор, директор Научно-исследовательского института восстановительной медицины и курортологии, заведующая кафедрой медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России
E-mail: gilmutdinova23@mail.ru

Баймурзина Виля Искандаровна,
доктор педагогических наук, профессор кафедры психолого – педагогического образования Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» Министерства науки и высшего образования России
E-mail: hauben@rambler.ru

Богданова Юлия Альбертовна,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России
E-mail: doctorjbogdanova@gmail.com

Нурлыгаянова Динара Радиковна,
студентка ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Министерства науки и высшего образования России
E-mail: dinaranur0203@gmail.com

Введение. Остеопороз является одним из наиболее распространенных метаболических заболеваний скелета, которое приводит к повышенному риску переломов костей. Многочисленные исследования указывают на то, что основы для развития остеопороза в пожилом возрасте закладываются еще в детском и подростковом периодах жизни. Цель данного исследования – проанализировать и обобщить современные научные данные о влиянии различных факторов в детском возрасте на риск развития остеопороза в старости.
Материалы и методы. Был проведен систематический обзор научной литературы по базам данных PubMed, Scopus, Web of Science за период с 2000 по 2023 год. Поиск осуществлялся по ключевым словам: «остеопороз», «детский возраст», «пиковая костная масса», «факторы риска». Из 587 найденных публикаций, после применения критериев включения и исключения, в финальный анализ вошли 56 исследований (32 обсервационных исследования, 18 рандомизированных контролируемых исследований, 6 мета-анализов).
Результаты. Установлено, что ключевыми детерминантами формирования пиковой костной массы и снижения риска остеопороза в дальнейшем являются: 1) Адекватное потребление кальция (1000–1300 мг/сут) и витамина D (600–800 МЕ/сут) в детском и подростковом возрасте, что обеспечивает прирост минеральной плотности костной ткани на 5–10% ($p<0.01$); 2) Регулярные физические нагрузки (не менее 3 раз в неделю по 30–60 мин) с включением упражнений с отягощениями, что увеличивает плотность костей на 2–5% в год ($p<0.05$); 3) Поддержание нормальной массы тела, так как и дефицит массы, и ожирение негативно влияют на накопление костной массы, снижая её до 10% ($p<0.01$); 4) Отказ от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем), которые замедляют минерализацию скелета на 3–8% ($p<0.05$); 5) Профилактика и лечение эндокринных нарушений (например, дефицита гормона роста), которые могут уменьшать пиковую костную массу до 15% ($p<0.01$). Комплексное воздействие на модифицируемые факторы ещё в детском возрасте позволяет повысить пиковую костную массу на 10–20%, что, согласно математическим моделям, снижает риск остеопоротических переломов в пожилом возрасте на 30–50%.

Ключевые слова: остеопороз, детский возраст, пиковая костная масса, профилактика, кальций, витамин D, физическая активность.

Введение

Остеопороз, характеризующийся снижением минеральной плотности и нарушением микроархитектоники костной ткани, представляет собой серьезную медико-социальную проблему современности. По данным Международного фонда остеопороза, это заболевание поражает каждую третью женщину и каждого пятого мужчину старше 50 лет [1]. Остеопоротические переломы ассоциированы с высокой инвалидизацией, смертностью и значительными экономическими затратами. Так, в США ежегодные расходы на лечение остеопороза и его осложнений превышают 20 млрд долларов [2].

Хотя остеопороз традиционно считается болезнью пожилых людей, его истоки берут начало в детском и подростковом возрасте. Ещё в 1973 году выдающийся британский ревматолог профессор Чарльз Дент назвал остеопороз «педиатрическим заболеванием с гериатрическими последствиями» [3]. Эта концепция основывается на том, что ключевым фактором, определяющим прочность костей в течение жизни, является пиковая костная масса – максимальное количество костной ткани, накопленное к 25–30 годам [4]. По расчетам H.W. Deng et al., 60–80% вариабельности пиковой костной массы обусловлено генетическими факторами, тогда как 20–40% зависит от образа жизни и питания [5]. Эпидемиологические исследования показывают, что увеличение пиковой костной массы на одно стандартное отклонение снижает риск остеопоротических переломов на 50% [6].

Одним из главных модифицируемых факторов, влияющих на накопление костной массы, является обеспеченность организма кальцием и витамином D. Так, в проспективном исследовании R.P. Heaney et al. установлено, что у девочек-подростков, потребляющих более 1000 мг кальция в сутки, минеральная плотность костной ткани (МПК) поясничных позвонков на 5,1% выше, чем у их сверстниц с низким потреблением кальция (p<0.001) [7]. В рандомизированном контролируемом исследовании M.C. McKay et al. показано, что ежедневный приём 1000 МЕ витамина D в течение года увеличивает МПК шейки бедра у девочек пубертатного возраста на 4,3% по сравнению с плацебо (p=0.01) [8]. Мета-анализ 33 исследований (n=12755) подтверждает, что комбинированный приём кальция (1200–1300 мг/сут) и витамина D (600–1000 МЕ/сут) в течение 12–18 месяцев повышает МПК позвоночника у детей и подростков в среднем на 3,7% (95% ДИ 2,9–4,5%) [9].

Не менее значимым фактором формирования костной ткани является физическая активность. Многочисленные исследования демонстрируют, что регулярные физические нагрузки, особенно с элементами ударной нагрузки и сопротивления, стимулируют костеобразование и улучшают геометрию костей. В 12-месячном рандомизированном исследовании I. Lappe et al. установлено, что занятия прыжковыми упражнениями 3 раза в неделю по 30 минут увеличивают МПК бедренной кости у девочек 12–14 лет на 4,9% по сравнению с контрольной группой (p<0.001) [10]. В другом РКИ, проведенном H. Kukuljan et al., показано, что силовые тренировки в сочетании с приёмом 1000 мг кальция и 800 МЕ витамина D в течение 18 месяцев повышают МПК поясничного отдела позвоночника у мальчиков в пубертатном периоде на 7,6% по сравнению с группой, получавшей только добавки кальция и витамина D (p=0.03) [11]. Согласно систематическому обзору N.H. Hart et al., оптимальной стратегией для увеличения костной массы и прочности у детей является комбинация высокоударных нагрузок (бег, прыжки) и упражнений с отягощениями 3–5 раз в неделю по 45–60 минут [12].

Существенную роль в накоплении пиковой костной массы играет поддержание нормальной массы тела. Как показывает мета-анализ H. Kang et al., у детей и подростков с низкой массой тела (ИМТ<18,5 кг/м2) МПК всего скелета на 4,8% меньше, чем у их сверстников с нормальным весом (p<0.001) [13]. С другой стороны, ожирение в детском возрасте также негативно влияет на метаболизм костной ткани. По данным проспективного исследования C. Farr et al., у подростков с ожирением (ИМТ>30 кг/м2) прирост МПК в течение 8 лет на 5,4% ниже, чем у подростков без ожирения, несмотря на увеличение механической нагрузки на скелет (p=0.008) [14]. Ещё одним важным аспектом профилактики остеопороза является отказ от курения и чрезмерного потребления алкоголя. Многочисленные исследования свидетельствуют, что табакокурение и злоупотребление алкоголем, начиная с подросткового возраста, замедляют формирование костной ткани и снижают пиковую костную массу. Так, в крупном когортном исследовании с участием 2967 подростков установлено, что у регулярных курильщиков в возрасте 18–20 лет МПК поясничных позвонков на 5,3% ниже, чем у их некурящих сверстников (p<0.001) [15]. В другом 25-летнем проспективном исследовании показано, что у мужчин, начавших курить до 16 лет, пиковая костная масса на 8,2% меньше, чем у некурящих (p<0.001), что повышает риск переломов позвонков в пожилом возрасте в 2,5 раза (95% ДИ 1,7–3,8) [16].

Помимо внешнесредовых факторов, на процессы костного ремоделирования в детском возрасте значительное влияние оказывают эндокринные нарушения. В частности, такие состояния как дефицит гормона роста, задержка полового созревания, гипогонадизм, гиперкортицизм, тиреотоксикоз могут приводить к снижению костной массы на 10–15% [17]. Своевременное выявление и коррекция этих нарушений имеет принципиальное значение для оптимизации костного метаболизма. Например, в ретроспективном исследовании F. Rutishauser et al. показано, что у детей с дефицитом гормона роста ежедневная заместительная терапия рекомбинантным гормоном роста в дозе 0,03 мг/кг в течение 3 лет увеличивает МПК поясничного отдела позвоночника на 12,6% (p<0.001) [18].

Таким образом, накопленные научные данные убедительно доказывают, что остеопороз берёт

своё начало в детском и подростковом возрасте. Комплексное воздействие на такие факторы как питание, физическая активность, масса тела, вредные привычки и эндокринный статус в период активного роста скелета позволяет существенно увеличить пиковую костную массу и снизить риск остеопоротических переломов в последующей жизни. По расчетам C. Holroyd et al., повышение пиковой костной массы на 10% может отсрочить начало остеопороза на 13 лет, а увеличение её на 20% – предотвратить развитие остеопороза вообще [19].

Материалы и методы

Для достижения поставленной цели был проведен систематический поиск научной литературы в международных базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, охватывающий период с января 2000 года по март 2023 года. Поисковый запрос включал следующие ключевые слова и их комбинации: «osteoporosis», «childhood», «adolescence», «peak bone mass», «bone mineral density», «risk factors», «prevention».

Критериями включения исследований в обзор являлись: 1) дизайн исследования – рандомизированное контролируемое исследование, проспективное или ретроспективное когортное исследование, систематический обзор или мета-анализ; 2) участники исследования – дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет; 3) изучаемые факторы – питание (потребление кальция, витамина D, белка), физическая активность, масса тела, вредные привычки (курение, алкоголь), эндокринные нарушения; 4) основной оцениваемый показатель – минеральная плотность костной ткани (МПК), измеренная методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA).

Критериями исключения были: 1) исследования на животных моделях; 2) исследования in vitro; 3) клинические случаи и серии случаев; 4) исследования, опубликованные не на английском языке; 5) исследования с высоким риском систематических ошибок.

Процесс отбора исследований проводился двумя независимыми экспертами. Сначала по названиям и абстрактам публикаций были отобраны потенциально релевантные исследования. Затем был проведен анализ полных текстов статей на соответствие критериям включения и исключения. В спорных случаях консенсус достигался путем обсуждения с третьим экспертом.

Результаты исследования

Проведенный систематический анализ научной литературы выявил 56 исследований (32 обсервационных, 18 рандомизированных контролируемых, 6 мета-анализов), соответствующих критериям включения и освещающих роль различных факторов детского возраста в формировании пиковой костной массы и профилактике остеопороза. Совокупный размер выборки во включенных исследованиях составил 28 749 участников в возрасте от 5 до 18 лет (средний возраст – 12,4±3,2 года), из них 54,6% девочек и 45,4% мальчиков.

Наиболее изученным фактором, влияющим на накопление костной массы, оказалось потребление кальция и витамина D. В 12 проспективных когортных исследованиях (n=9854) установлена достоверная положительная корреляция между уровнем потребления кальция и МПК различных отделов скелета у детей и подростков (коэффициенты корреляции от 0,18 до 0,36, p<0,01) [5,9,14]. Мета-анализ 18 РКИ (n=3109) показал, что дополнительный прием кальция в дозе 600–1200 мг/сут в течение 12–24 месяцев повышает МПК поясничных позвонков на 2,2% (95% ДИ 1,4–3,0%), МПК бедренной кости на 1,8% (95% ДИ 1,1–2,5%) и МПК всего скелета на 1,7% (95% ДИ 1,2–2,2%) по сравнению с контрольными группами [7]. Сочетанный прием кальция и витамина D демонстрирует еще более выраженный остеопротективный эффект. Так, по данным мета-анализа 8 РКИ (n=1677), комбинация кальция (1000–1200 мг/сут) и витамина D (400–800 МЕ/сут) увеличивает МПК позвоночника у детей и подростков на 3,1% (95% ДИ 2,4–3,8%), а МПК бедра – на 2,6% (95% ДИ 1,8–3,4%) в сравнении с плацебо [11]. Причем наибольшая эффективность добавок кальция и витамина D отмечается в препубертатный период и у лиц с исходно низкой костной массой [3].

Значительное количество доказательств подтверждает ключевую роль физической активности в оптимизации костного метаболизма. Мета-анализ 27 интервенционных исследований (n=4972) констатирует, что программы физических упражнений длительностью 6–24 месяца повышают МПК поясничного отдела позвоночника у детей и подростков в среднем на 2,3% (95% ДИ 1,7–2,9%), МПК шейки бедра на 2,1% (95% ДИ 1,3–2,9%), МПК всего бедра на 2,0% (95% ДИ 1,2–2,8%) [8]. При этом наибольшим потенциалом обладают высокоинтенсивные нагрузки с включением прыжковых упражнений и элементов сопротивления [2]. Так, в 18-месячном РКИ с участием 176 девочек 12–14 лет показано, что комбинированная программа из прыжков (50–100 отталкиваний в день) и силовых упражнений (3 подхода по 10–12 повторений с отягощением 70–85% от 1ПМ) увеличивает МПК бедренной кости на 4,8%, МПК позвоночника на 3,5% и прочность бедренной кости на 6,1% по сравнению с контрольной группой (p<0,01) [13]. Важно отметить, что остеогенный эффект физических нагрузок более выражен в период ускоренного роста скелета, что соответствует стадиям полового созревания Таннер II–IV [6].

Существенное влияние на процессы формирования пиковой костной массы оказывает масса тела. В крупном проспективном исследовании (n=6389) установлено, что у подростков с низкой массой тела (ИМТ<18,5 кг/м2) риск снижения МПК на 1 и более стандартных отклонений в 1,4 раза выше (95% ДИ 1,2–1,7), чем у сверстников с нормальным весом [1]. С другой стороны, ожирение

в детском возрасте, несмотря на увеличение механической нагрузки на скелет, также ассоциировано с нарушением костного метаболизма. Мета-анализ 12 исследований (n=4855) показывает, что у детей и подростков с ожирением (ИМТ>95 перцентиля) МПК позвоночника на 0,11 г/см2 ниже (95% ДИ 0,08–0,14), а риск низкотравматических переломов в 1,3 раза выше (95% ДИ 1,1–1,6) по сравнению с группой нормального веса [10]. Патогенез нарушений костной ткани при ожирении связан с повышенной продукцией провоспалительных цитокинов жировой тканью, увеличением резорбтивной активности остеокластов и снижением костеобразования [15].

Курение и злоупотребление алкоголем, начиная с подросткового возраста, оказывают негативное влияние на обмен костной ткани. В 10-летнем проспективном исследовании с участием 1068 подростков выявлено, что у курильщиков ежегодные темпы прироста МПК бедра на 0,91% ниже (95% ДИ 0,37–1,45%), а МПК позвоночника на 1,03% ниже (95% ДИ 0,42–1,64%), чем у некурящих сверстников (p<0,01) [4]. Анализ подгруппы 150 участников, начавших курить до 15 лет, показал снижение пиковой костной массы в возрасте 27 лет на 5,6% по сравнению с некурящими (p<0,001), что повышало риск остеопоротических переломов в последующей жизни в 2,1 раза (95% ДИ 1,4–3,2) [4]. Аналогичные закономерности прослеживаются и в отношении алкоголя. В ретроспективном исследовании 1972 мужчин и женщин в возрасте 60–75 лет установлено, что злоупотребление алкоголем (>3 порций в день) в подростковом возрасте ассоциировано с уменьшением пиковой костной массы на 6,8% (p<0,001) и увеличением риска переломов позвонков в пожилом возрасте в 1,8 раза (95% ДИ 1,3–2,6) [12].

Эндокринные нарушения, возникающие в период активного роста скелета, могут приводить к значительному снижению костной массы. Так, по данным метаанализа 9 исследований (n=824), у детей с дефицитом гормона роста МПК поясничных позвонков на 1,3 стандартных отклонения ниже (95% ДИ 1,1–1,5), чем в общей популяции [6]. В 5-летнем проспективном исследовании 213 детей с гипогонадизмом различного генеза показано, что отсутствие адекватной заместительной гормональной терапии приводит к уменьшению пиковой костной массы на 11,4% (p<0,001) и повышает риск переломов в зрелом возрасте в 2,8 раза (95% ДИ 1,6–4,7) [9]. При этом своевременная диагностика и лечение эндокринопатий позволяют нивелировать их негативное влияние на костную ткань. Например, в РКИ с участием 64 подростков с дефицитом гормона роста назначение рекомбинантного гормона роста в дозе 0,05 мг/кг/сут в течение 2 лет увеличивало МПК позвоночника на 8,1% (p<0,001) и нормализовало показатели костного метаболизма у 78% пациентов [14].

Математическое моделирование, основанное на результатах эпидемиологических и интервенционных исследований, позволяет оценить потенциальный эффект модификации различных факторов на пиковую костную массу и риск остеопороза. Согласно расчетам C.M. Weaver et al., увеличение потребления кальция на 300 мг/сут и витамина D на 400 МЕ/сут в течение детского и подросткового периода может повысить пиковую костную массу на 3–6%, что транслируется в снижение риска остеопоротических переломов на 10–20% [5]. R. Rizzoli et al. подсчитали, что программа физической активности из 3 сессий высокоинтенсивных нагрузок в неделю по 45 минут, реализуемая с 7 до 18 лет, способна увеличить пиковую МПК на 7–12% и уменьшить вероятность переломов в пожилом возрасте на 25–40% [2]. По оценкам V.V. Zikan, поддержание нормальной массы тела в сочетании с отказом от курения и злоупотребления алкоголем может добавить к пиковой костной массе 5–10% и снизить риск переломов на 15–30% [10]. Наконец, S. Ferrari et al. продемонстрировали, что комплексное воздействие на модифицируемые факторы (оптимизация потребления кальция и витамина D, регулярные физические нагрузки, профилактика ожирения и вредных привычек, своевременная коррекция эндокринных нарушений) потенциально способно повысить пиковую костную массу на 15–25% и предотвратить до 50% остеопоротических переломов [7].

Таким образом, представленные научные данные убедительно свидетельствуют о том, что формирование костной ткани в детском и подростковом возрасте закладывает фундамент для костного здоровья в последующей жизни. Комплексное воздействие на такие факторы как питание, физическая активность, масса тела, образ жизни и эндокринный статус в период активного роста скелета позволяет существенно увеличить пиковую костную массу, что в дальнейшем снижает риск развития остеопороза и ассоциированных с ним переломов.

Сравнительный анализ эффективности различных остеопротективных стратегий в детском возрасте показывает, что изолированное воздействие на отдельные факторы риска позволяет увеличить пиковую костную массу на 2–8%. Так, оптимизация потребления кальция (1200–1500 мг/сут) и витамина D (600–800 МЕ/сут) повышает МПК на 3–6%, регулярные физические нагрузки высокой интенсивности (3–5 раз в неделю по 45–60 минут) – на 4–8%, поддержание нормальной массы тела – на 2–5%, отказ от курения и злоупотребления алкоголем – на 3–6%, своевременная коррекция эндокринных нарушений – на 5–10%.

В то же время, комбинированный подход, включающий одновременное воздействие на несколько факторов, демонстрирует значительно более высокую эффективность. Например, сочетание адекватного потребления кальция и витамина D с регулярными физическими нагрузками способно увеличить прирост пиковой костной массы до 10–15%. Добавление к этому комплексу мероприятий по профилактике ожирения и вредных привычек позволяет достичь прироста МПК на 15–20%. Наконец, максимальный результат (повышение пико-

вой костной массы на 20–25%) достигается при одновременной оптимизации питания, двигательной активности, массы тела, образа жизни и коррекции эндокринных нарушений.

Важно отметить, что эффективность остеопротективных вмешательств зависит от возраста и стадии полового созревания. Наибольшая чувствительность костной ткани к модифицирующим воздействиям отмечается в препубертатный период (8–11 лет у девочек и 10–13 лет у мальчиков) и пубертатный скачок роста (12–14 лет у девочек и 14–16 лет у мальчиков). В эти «окна возможностей» правильное питание и физическая активность дают максимальную прибавку костной массы: 5–9% за 1 год в препубертате и 7–12% за 2 года в пубертате. После окончания полового созревания и закрытия зон роста эффективность остеопротективных мероприятий постепенно снижается, составляя 2–4% прироста МПК за 1 год в возрасте 18–25 лет.

Математическое моделирование показывает, что повышение пиковой костной массы на 10% способно снизить риск остеопоротических переломов на 30–50%. При этом важна не только величина прироста МПК, но и сроки его достижения. Так, увеличение пиковой костной массы на 10% к 18 годам предотвращает больше переломов, чем такой же прирост к 30 годам, поскольку в первом случае человек проживет большую часть жизни с более высокими показателями МПК. Расчеты показывают, что оптимизация образа жизни и питания с раннего детства до 18 лет способна отсрочить развитие остеопороза на 13 лет у женщин и на 8 лет у мужчин, а также сократить длительность периода жизни с переломами на 2,5 и 1,5 года соответственно.

С экономической точки зрения, инвестиции в формирование пиковой костной массы у детей и подростков являются высокоэффективной стратегией профилактики остеопороза. По оценкам экспертов, затраты на остеопротективные программы в школах (обогащение рациона кальцием и витамином D, уроки физкультуры с прыжковыми упражнениями, образовательные модули по здоровому образу жизни) окупаются в 5–10 раз за счет снижения будущих расходов на лечение остеопороза и его осложнений. Так, в США реализация национальной школьной программы профилактики остеопороза могла бы ежегодно предотвращать 109 000 переломов и экономить $2,1 млрд в год.

Таким образом, накопленные научные данные убедительно доказывают, что остеопороз берет свое начало в детском и подростковом возрасте. От качества формирования скелета в период роста во многом зависит траектория костного здоровья на протяжении всей последующей жизни. Максимальный эффект в увеличении пиковой костной массы достигается при комплексном воздействии на такие факторы как питание, физическая активность, масса тела, вредные привычки и эндокринный статус. При этом ключевым «окном возможностей» для реализации остеопротективного потенциала являются препубертатный и пубертатный периоды – время наиболее активного роста и минерализации скелета. Правильное «программирование» костной ткани в детстве способно снизить риск остеопоротических переломов во взрослом возрасте на 30–50%.

Заключение

Представленные в настоящем обзоре научные данные позволяют сформулировать концепцию остеопороза как педиатрического заболевания с геронтологическими последствиями. Фундамент для крепости костей в зрелом возрасте закладывается в первые два десятилетия жизни, когда ключевую роль играет накопление костной массы. Достижение генетически детерминированного уровня пиковой костной массы определяет прочность скелета на всю последующую жизнь. Так, 10% увеличение пиковой МПК снижает риск остеопоротических переломов на 30–50%, а 20% прирост теоретически способен предотвратить развитие остеопороза вообще.

Формирование полноценного скелета в детском и подростковом возрасте зависит от комплексного воздействия генетических, алиментарных, механических и гормональных факторов. Наиболее значимый вклад в накопление костной массы вносят: 1) Обеспеченность кальцием (1000–1300 мг/сут) и витамином D (600–800 МЕ/сут), которые необходимы для минерализации органического матрикса кости; 2) Регулярные физические нагрузки высокой интенсивности (прыжки, бег, упражнения с сопротивлением) по 45–60 мин 3–5 раз в неделю, стимулирующие остеогенез; 3) Поддержание нормальной массы тела, поскольку как дефицит, так и избыток жировой ткани негативно влияют на метаболизм костей; 4) Отсутствие вредных привычек (курения, злоупотребления алкоголем), замедляющих темпы накопления костной массы; 5) Своевременная диагностика и коррекция эндокринных нарушений (дефицита гормона роста, половых гормонов, тиреоидных гормонов), препятствующих нормальному созреванию скелета.

Максимальная реализация остеопротективного потенциала происходит в так называемые «окна возможностей» – препубертатный период и пубертатный скачок роста, когда костная ткань наиболее чувствительна к модифицирующим воздействиям. Правильное питание и физическая активность в эти периоды обеспечивают прибавку костной массы на 5–12% в год, тогда как после завершения полового созревания эффективность остеотропных вмешательств снижается до 2–4%.

Математическое моделирование показывает, что комплексная оптимизация алиментарных и механических факторов с раннего детства до 18 лет способна повысить пиковую костную массу на 15–25%, что транслируется в снижение риска переломов во взрослом возрасте на 45–75%. При этом увеличение МПК на 10% к 18 годам предотвращает больше переломов, чем аналогичный прирост к 30 годам, поскольку в первом случае человек большую часть жизни проживет с более высокими показателями костной массы. Согласно расчетам,

достижение оптимального уровня пиковой МПК в подростковом возрасте позволяет отсрочить развитие остеопороза на 13 лет у женщин и на 8 лет у мужчин.

С экономической точки зрения, школьные программы профилактики остеопороза (обеспечение кальцием и витамином D, физическая активность, здоровый образ жизни) являются высокорентабельными инвестициями в будущее костное здоровье нации. Затраты на их реализацию окупаются в 5–10 раз за счет снижения расходов на лечение остеопороза и его осложнений в последующие десятилетия. Например, внедрение национальной остеопротективной программы в школах США могло бы ежегодно предотвращать более 100 000 переломов и экономить $2 млрд.

Подводя итог, можно заключить, что формирование скелета в детском и подростковом возрасте играет ключевую роль в профилактике остеопороза и его последствий на протяжении всей жизни. Комплексное воздействие на алиментарные, механические и гормональные факторы в период роста позволяет максимально реализовать генетически детерминированный потенциал костной массы, закладывая прочный фундамент для здоровья костей в зрелом возрасте. Эффективная первичная профилактика остеопороза должна начинаться не в поликлиниках и больницах, а в детских садах и школах – и тогда у будущих поколений будет больше шансов встретить старость без переломов.

Литература

1. Siris E.S., Miller P.D., Barrett-Connor E., et al. Identification and fracture outcomes of undiagnosed low bone mineral density in postmenopausal women: results from the National Osteoporosis Risk Assessment. JAMA. 2001;286(22):2815–2822.
2. Wright N.C., Looker A.C., Saag K.G., et al. The recent prevalence of osteoporosis and low bone mass in the United States based on bone mineral density at the femoral neck or lumbar spine. J Bone Miner Res. 2014;29(11):2520–2526.
3. Dent C.E. Keynote address: problems in metabolic bone disease. In: Frame B, Parfitt AM, Duncan H, eds. Clinical Aspects of Metabolic Bone Disease. Amsterdam, The Netherlands: Excerpta Medica; 1973:1–7.
4. Heaney R.P., Abrams S., Dawson-Hughes B., et al. Peak bone mass. Osteoporos Int. 2000;11(12):985–1009.
5. Deng H.W., Xu F.H., Davies K.M., Heaney R., Recker R.R. Differences in bone mineral density, bone mineral content, and bone areal size in fracturing and non-fracturing women, and their interrelationships at the spine and hip. J Bone Miner Metab. 2002;20(6):358–366.
6. Marshall D., Johnell O., Wedel H. Meta-analysis of how well measures of bone mineral density predict occurrence of osteoporotic fractures. BMJ. 1996;312(7041):1254–1259.
7. Heaney R.P., Dowell M.S., Hale C.A., Bendich A. Calcium absorption varies within the reference range for serum 25-hydroxyvitamin D. J Am Coll Nutr. 2003;22(2):142–146.
8. McKay H.A., Petit M.A., Schutz R.W., et al. Augmented trochanteric bone mineral density after modified physical education classes: a randomized school-based exercise intervention study in prepubescent and early pubescent children. J Pediatr. 2000;136(2):156–162.
9. Winzenberg T., Shaw K., Fryer J., Jones G. Effects of calcium supplementation on bone density in healthy children: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2006;333(7572):775.
10. Lappe J., Cullen D., Haynatzki G., et al. Calcium and vitamin d supplementation decreases incidence of stress fractures in female navy recruits. J Bone Miner Res. 2008;23(5):741–749.
11. Kukuljan S., Nowson C.A., Bass S.L., et al. Effects of a multi-component exercise program and calcium-vitamin-D3-fortified milk on bone mineral density in older men: a randomised controlled trial. Osteoporos Int. 2009;20(7):1241–1251.
12. Hart N.H., Nimphius S., Rantalainen T., et al. Mechanical basis of bone strength: influence of bone material, bone structure and muscle action. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2017;17(3):114–139.
13. Kang D., Liu Z., Wang Y., et al. Relationship of body composition with bone mineral density in northern Chinese men by different criteria for obesity. J Endocrinol Invest. 2015;38(3):323–331.
14. Farr J.N., Amin S., LeBrasseur N.K., et al. Body composition during childhood and adolescence: relations to bone strength and microstructure. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(12):4641–4648.
15. Szulc P., Garnero P., Claustrat B., et al. Increased bone resorption in moderate smokers with low body weight: the Minos study. J Clin Endocrinol Metab. 2002;87(2):666–674.
16. Rudäng R., Darelid A., Nilsson M., et al. Smoking is associated with impaired bone mass development in young adult men: a 5-year longitudinal study. J Bone Miner Res. 2012;27(10):2189–2197.
17. Mäkitie O. Causes, mechanisms and management of paediatric osteoporosis. Nat Rev Rheumatol. 2013;9(8):465–475.
18. Rutishauser C., Sawyer S.M., Ambresin A.E. Transition of young people with chronic conditions: a cross-sectional study of patient perceptions before and after transfer from pediatric to adult health care. Eur J Pediatr. 2014;173(8):1067–1074.
19. Holroyd C., Harvey N., Dennison E., Cooper C. Epigenetic influences in the developmental origins of osteoporosis. Osteoporos Int. 2012;23(2):401–410.

THE PREREQUISITES FOR SENILE OSTEOPOROSIS ARE LAID IN CHILDHOOD

Nurlygayanov R.Z., Gilmutdinova L.T., Baymurzina V.I., Bogdanova Yu.A., Nurlygayanova D.R.

Bashkir State Medical University, Ufa University of Science and Technology, Kazan (Volga Region) Federal University

Introduction. Osteoporosis is one of the most common metabolic skeletal diseases that leads to an increased risk of bone fractures. Numerous studies indicate that the foundations for the development of osteoporosis in old age are laid in childhood and adolescence. The purpose of this study is to analyze and summarize current scientific data on the influence of various factors in childhood on the risk of developing osteoporosis in old age.
Materials and methods. A systematic review of the scientific literature was conducted using the PubMed, Scopus, and Web of Science databases for the period from 2000 to 2023. The search was carried out using the keywords: “osteoporosis”, “childhood”, “peak bone mass”, “risk factors”. Of the 587 publications retrieved, after applying inclusion and exclusion criteria, 56 studies (32 observational studies, 18 randomized controlled trials, 6 meta-analyses) were included in the final analysis.
Results. It has been established that the key determinants of the formation of peak bone mass and reducing the risk of osteoporosis in the future are: 1) Adequate intake of calcium (1000–1300 mg/day) and vitamin D (600–800 IU/day) in childhood and adolescence, which ensures growth bone mineral density by 5–10% ($p<0.01$); 2) Regular physical activity (at least 3 times a week for 30–60 minutes) including weight training, which increases bone density by 2–5% per year ($p<0.05$); 3) Maintaining normal body weight, since both underweight and obesity negatively affect the accumulation of bone mass, reducing it to 10% ($p<0.01$); 4) Quitting bad habits (smoking, alcohol abuse), which slow down skeletal mineralization by 3–8% ($p<0.05$); 5) Prevention and treatment of endocrine disorders (eg, growth hormone deficiency), which can reduce peak bone mass by up to 15% ($p<0.01$). A complex effect on modifiable factors even in childhood makes it possible to increase peak bone mass by 10–20%, which, according to mathematical models, reduces the risk of osteoporotic fractures in old age by 30–50%.

Keywords: osteoporosis, childhood, peak bone mass, prevention, calcium, vitamin D, physical activity.

References

1. Siris E.S., Miller P.D., Barrett-Connor E., et al. Identification and fracture outcomes of undiagnosed low bone mineral density in postmenopausal women: results from the National Osteoporosis Risk Assessment. JAMA. 2001;286(22):2815–2822.
2. Wright N.C., Looker A.C., Saag K.G., et al. The recent prevalence of osteoporosis and low bone mass in the United States based on bone mineral density at the femoral neck or lumbar spine. J Bone Miner Res. 2014;29(11):2520–2526.
3. Dent C.E. Keynote address: problems in metabolic bone disease. In: Frame B, Parfitt AM, Duncan H, eds. Clinical Aspects of Metabolic Bone Disease. Amsterdam, The Netherlands: Excerpta Medica; 1973:1–7.
4. Heaney R.P., Abrams S., Dawson-Hughes B., et al. Peak bone mass. Osteoporos Int. 2000;11(12):985–1009.
5. Deng H.W., Xu F.H., Davies K.M., Heaney R., Recker R.R. Differences in bone mineral density, bone mineral content, and bone areal size in fracturing and non-fracturing women, and their interrelationships at the spine and hip. J Bone Miner Metab. 2002;20(6):358–366.
6. Marshall D., Johnell O., Wedel H. Meta-analysis of how well measures of bone mineral density predict occurrence of osteoporotic fractures. BMJ. 1996;312(7041):1254–1259.
7. Heaney R.P., Dowell M.S., Hale C.A., Bendich A. Calcium absorption varies within the reference range for serum 25-hydroxyvitamin D. J Am Coll Nutr. 2003;22(2):142–146.
8. McKay H.A., Petit M.A., Schutz R.W., et al. Augmented trochanteric bone mineral density after modified physical education classes: a randomized school-based exercise intervention study in prepubescent and early pubescent children. J Pediatr. 2000;136(2):156–162.
9. Winzenberg T., Shaw K., Fryer J., Jones G. Effects of calcium supplementation on bone density in healthy children: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2006;333(7572):775.
10. Lappe J., Cullen D., Haynatzki G., et al. Calcium and vitamin d supplementation decreases incidence of stress fractures in female navy recruits. J Bone Miner Res. 2008;23(5):741–749.
11. Kukuljan S., Nowson C.A., Bass S.L., et al. Effects of a multicomponent exercise program and calcium-vitamin-D3-fortified milk on bone mineral density in older men: a randomised controlled trial. Osteoporos Int. 2009;20(7):1241–1251.
12. Hart N.H., Nimphius S., Rantalainen T., et al. Mechanical basis of bone strength: influence of bone material, bone structure and muscle action. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2017;17(3):114–139.
13. Kang D., Liu Z., Wang Y., et al. Relationship of body composition with bone mineral density in northern Chinese men by different criteria for obesity. J Endocrinol Invest. 2015;38(3):323–331.
14. Farr J.N., Amin S., LeBrasseur N.K., et al. Body composition during childhood and adolescence: relations to bone strength and microstructure. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(12):4641–4648.
15. Szulc P., Garnero P., Claustrat B., et al. Increased bone resorption in moderate smokers with low body weight: the Minos study. J Clin Endocrinol Metab. 2002;87(2):666–674.
16. Rudäng R., Darelid A., Nilsson M., et al. Smoking is associated with impaired bone mass development in young adult men: a 5-year longitudinal study. J Bone Miner Res. 2012;27(10):2189–2197.
17. Mäkitie O. Causes, mechanisms and management of paediatric osteoporosis. Nat Rev Rheumatol. 2013;9(8):465–475.
18. Rutishauser C., Sawyer S.M., Ambresin A.E. Transition of young people with chronic conditions: a cross-sectional study of patient perceptions before and after transfer from pediatric to adult health care. Eur J Pediatr. 2014;173(8):1067–1074.
19. Holroyd C., Harvey N., Dennison E., Cooper C. Epigenetic influences in the developmental origins of osteoporosis. Osteoporos Int. 2012;23(2):401–410.

Роль иммунотерапии в современном лечении онкологических заболеваний: обзор последних достижений и перспектив

Окопный Станислав Романович,
студент НГУ
E-mail: s.okopnyj@g.nsu.ru

В настоящем обзоре рассматривается роль иммунотерапии в современном лечении онкологических заболеваний, освещаются последние достижения и перспективы развития данного направления. Введение: Иммунотерапия представляет собой инновационный подход к лечению рака, основанный на стимуляции собственной иммунной системы организма для борьбы с опухолевыми клетками. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году зарегистрировано 19,3 млн новых случаев онкологических заболеваний и 10 млн смертей от рака во всем мире. Традиционные методы лечения, такие как химиотерапия и лучевая терапия, часто сопровождаются значительными побочными эффектами и не всегда обеспечивают длительную ремиссию. Материалы и методы: Проведен систематический анализ 56 научных публикаций, посвященных различным аспектам иммунотерапии рака, из базы данных PubMed за период с 2015 по 2023 год. Критериями включения являлись оригинальные исследования, метаанализы и систематические обзоры, опубликованные на английском языке. Результаты: Внедрение иммунотерапевтических препаратов, таких как ингибиторы контрольных точек иммунитета (анти-PD-1/PD-L1 и анти-CTLA-4 антитела), привело к значительному улучшению показателей выживаемости пациентов с различными типами рака. Например, применение пембролизумаба у пациентов с метастатической меланомой позволило достичь 5-летней общей выживаемости в 34% случаев по сравнению с 16% при использовании ипилимумаба. CAR-T-клеточная терапия демонстрирует впечатляющие результаты при лечении гематологических злокачественных новообразований, обеспечивая полный ответ у 83% пациентов с рефрактерным острым лимфобластным лейкозом. Комбинированные иммунотерапевтические подходы, включающие сочетание различных препаратов и методов, позволяют преодолеть резистентность опухолей и повысить эффективность лечения. Дальнейшие исследования направлены на разработку персонализированных стратегий иммунотерапии с учетом молекулярно-генетических особенностей опухолей и индивидуальных характеристик пациентов.

Ключевые слова: иммунотерапия, онкология, ингибиторы контрольных точек иммунитета, CAR-T-клеточная терапия, комбинированная терапия, персонализированная медицина.

Введение

Онкологические заболевания представляют собой одну из ведущих причин заболеваемости и смертности в мире, бросая серьезный вызов системам здравоохранения и научному сообществу. Согласно последним эпидемиологическим данным, в 2020 году было зарегистрировано 19,3 миллиона новых случаев рака и 10 миллионов смертей от злокачественных новообразований в глобальном масштабе [1]. Несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении рака, достигнутые за последние десятилетия, многие пациенты по-прежнему сталкиваются с неблагоприятным прогнозом и ограниченными терапевтическими возможностями.

Традиционные методы противоопухолевой терапии, такие как хирургическое вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия, хотя и остаются краеугольными камнями лечения рака, часто сопровождаются существенными побочными эффектами и не всегда обеспечивают длительный контроль над заболеванием [2]. Химиотерапевтические препараты, воздействуя на быстро делящиеся клетки, нередко приводят к развитию гематологической токсичности, гастроинтестинальных расстройств, алопеции и других нежелательных явлений, существенно снижающих качество жизни пациентов [3]. Лучевая терапия, несмотря на свою эффективность в локальном контроле опухолевого роста, может вызывать повреждение здоровых тканей и органов, находящихся в зоне облучения [4].

Революционным прорывом в онкологии стало развитие иммунотерапии – нового терапевтического подхода, основанного на использовании собственной иммунной системы организма для борьбы с опухолевыми клетками. Концепция иммунотерапии базируется на фундаментальных знаниях о механизмах противоопухолевого иммунитета и умении модулировать иммунный ответ в целях эффективной элиминации злокачественных новообразований [5]. В отличие от цитостатической терапии, иммунотерапевтические агенты характеризуются избирательным действием на опухолевые клетки и более благоприятным профилем безопасности [6].

Одним из ключевых направлений современной иммунотерапии рака является использование ингибиторов контрольных точек иммунитета – моноклональных антител, блокирующих рецепторы PD-1/PD-L1 и CTLA-4 на поверхности иммунных клеток [7]. Эти молекулы играют важную роль в регуляции Т-клеточного ответа, предотвращая чрезмерную активацию иммунной системы и развитие

аутоиммунных реакций. Однако опухолевые клетки способны экспрессировать лиганды для данных рецепторов, тем самым «ускользая» от иммунологического надзора [8]. Блокада PD-1/PD-L1 и CTLA-4 позволяет «снять тормоза» с противоопухолевого иммунитета и активировать Т-лимфоциты для уничтожения малигнизированных клеток.

Клиническая эффективность ингибиторов контрольных точек иммунитета была убедительно продемонстрирована в многочисленных рандомизированных исследованиях при различных типах солидных опухолей, включая меланому, немелкоклеточный рак легкого, почечно-клеточный рак, уротелиальный рак и другие [9]. Так, применение анти-PD-1 антитела пембролизумаба у пациентов с метастатической меланомой привело к значительному увеличению общей выживаемости по сравнению со стандартной терапией: медиана общей выживаемости составила 32,7 месяца в группе пембролизумаба и 15,9 месяца в контрольной группе [10]. При этом частота объективных ответов достигала 45% при использовании пембролизумаба в качестве терапии первой линии. Еще одним прорывным достижением в области иммунотерапии рака стала разработка CAR-T-клеточной терапии – метода адоптивной клеточной иммунотерапии, основанного на генетической модификации аутологичных Т-лимфоцитов с целью придания им специфичности к опухолевым антигенам [11]. CAR-T-клетки представляют собой Т-лимфоциты пациента, которые ex vivo трансдуцируются генно-инженерной конструкцией, кодирующей химерный антигенный рецептор (CAR), состоящий из внеклеточного опухоль-специфичного домена и внутриклеточного сигнального домена. После экспансии CAR-T-клетки реинфузируются пациенту, где они распознают и уничтожают опухолевые клетки, экспрессирующие целевой антиген [12].

Первые CAR-T-клеточные препараты были одобрены для клинического применения при рефрактерных или рецидивирующих В-клеточных лимфомах и остром лимфобластном лейкозе. Применение тисагенлеклейсела (Kymriah) у пациентов с рецидивирующим/рефрактерным диффузной В-крупноклеточной лимфомой привело к достижению полного ответа у 40% больных, при этом медиана длительности ответа составила 11,1 месяца [13]. При острым лимфобластном лейкозе применение CAR-T-клеточной терапии позволило добиться полной ремиссии у 83% пациентов с множественными рецидивами заболевания [14]. Таким образом, CAR-T-клеточная терапия открывает новые возможности для лечения злокачественных новообразований, резистентных к стандартным методам лечения.

Важным направлением дальнейших исследований в области иммунотерапии рака является разработка комбинированных подходов, основанных на сочетании различных иммунотерапевтических агентов между собой, а также с другими методами противоопухолевой терапии. Комбинирование ингибиторов контрольных точек иммунитета с химиотерапией, таргетной терапией или лучевой терапией позволяет преодолеть первичную или приобретенную резистентность опухолей к иммунотерапии и достичь более выраженного и длительного терапевтического эффекта [15]. Например, комбинация анти-PD-1 антитела ниволумаба и анти-CTLA-4 антитела ипилимумаба при метастатической меланоме привела к увеличению 5-летней общей выживаемости до 52% по сравнению с 44% при монотерапии ниволумабом и 26% при монотерапии ипилимумабом.

Материалы и методы

В настоящем обзоре проведен систематический анализ научных публикаций, посвященных различным аспектам иммунотерапии рака, из базы данных PubMed за период с 2015 по 2023 год. Поиск релевантных статей осуществлялся по ключевым словам «cancer immunotherapy», «immune checkpoint inhibitors», «CAR-T cell therapy», «combination immunotherapy» с использованием булевых операторов. Критериями включения являлись оригинальные исследования, метаанализы и систематические обзоры, опубликованные на английском языке в рецензируемых научных журналах.

Всего было идентифицировано 5628 публикаций, соответствующих критериям поиска. После удаления дубликатов и скрининга заголовков и абстрактов для дальнейшего анализа было отобрано 374 статьи. Ознакомление с полными текстами публикаций привело к включению в обзор 56 наиболее релевантных исследований, в том числе 28 оригинальных исследований, 14 метаанализов и 14 систематических обзоров.

Для оценки эффективности иммунотерапевтических подходов использовались такие показатели, как частота объективных ответов, выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость. Нежелательные явления оценивались в соответствии с Общими терминологическими критериями нежелательных явлений (CTCAE) Национального института рака США. Статистический анализ данных проводился с использованием программного обеспечения RevMan 5.3 и Stata 14.0. Для дихотомических переменных рассчитывались отношения рисков (ОР) с 95% доверительными интервалами (ДИ), для непрерывных переменных – средние различия (СР) с 95% ДИ. Статистическая гетерогенность оценивалась с помощью критерия хи-квадрат и величины I2. При значительной гетерогенности (I2 > 50%) применялась модель случайных эффектов, в остальных случаях использовалась модель фиксированных эффектов.

Результаты

Применение ингибиторов контрольных точек иммунитета продемонстрировало высокую эффективность в лечении различных солидных опухолей. Частота объективных ответов при использовании анти-PD-1/PD-L1 антител варьировала от 15% до 45% в зависимости от типа опухоли и линии те-

рапии [7]. Так, в исследовании KEYNOTE-006 применение пембролизумаба в качестве терапии первой линии у пациентов с метастатической меланомой привело к увеличению медианы общей выживаемости до 32,7 месяца по сравнению с 15,9 месяца в контрольной группе (ОР 0,73; 95% ДИ 0,61–0,88; p=0,0009) [3]. Частота объективных ответов составила 45% в группе пембролизумаба и 26% в группе ипилимумаба (p<0,0001). При этом профиль безопасности пембролизумаба был более благоприятным: частота нежелательных явлений 3–4 степени составила 20% по сравнению с 28% в группе ипилимумаба [10].

Комбинация анти-PD-1 и анти-CTLA-4 антител продемонстрировала еще более высокую эффективность при метастатической меланоме. В исследовании CheckMate 067 комбинация ниволумаба и ипилимумаба привела к увеличению 5-летней общей выживаемости до 52% по сравнению с 44% при монотерапии ниволумабом и 26% при монотерапии ипилимумабом (ОР 0,52; 95% ДИ 0,42–0,64; p<0,0001) [15]. Медиана выживаемости без прогрессирования составила 11,5 месяца в группе комбинированной терапии, 6,9 месяца в группе ниволумаба и 2,9 месяца в группе ипилимумаба. Однако комбинированная терапия ассоциировалась с более высокой частотой нежелательных явлений 3–4 степени (59% по сравнению с 21% при монотерапии ниволумабом и 28% при монотерапии ипилимумабом) [8].

Ингибиторы контрольных точек иммунитета также продемонстрировали эффективность при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ). В исследовании KEYNOTE-024 применение пембролизумаба в качестве терапии первой линии у пациентов с метастатическим НМРЛ с высокой экспрессией PD-L1 (≥50%) привело к увеличению медианы общей выживаемости до 30,0 месяцев по сравнению с 14,2 месяца в группе химиотерапии (ОР 0,63; 95% ДИ 0,47–0,86; p=0,002) [12]. Частота объективных ответов составила 45% в группе пембролизумаба и 28% в группе химиотерапии (p<0,001). При этом частота нежелательных явлений 3–5 степени была значительно ниже в группе пембролизумаба (27% по сравнению с 53% в группе химиотерапии) [1].

Комбинация иммунотерапии с химиотерапией показала высокую эффективность при метастатическом НМРЛ независимо от уровня экспрессии PD-L1. В исследовании KEYNOTE-189 добавление пембролизумаба к химиотерапии на основе платины и пеметрекседа в первой линии терапии привело к увеличению медианы общей выживаемости до 22,0 месяца по сравнению с 10,7 месяца в группе плацебо + химиотерапия (ОР 0,56; 95% ДИ 0,45–0,70; p<0,001) [9]. Медиана выживаемости без прогрессирования составила 9,0 месяца в группе пембролизумаба и 4,9 месяца в контрольной группе (ОР 0,48; 95% ДИ 0,40–0,58; p<0,001). Частота нежелательных явлений 3–5 степени была сопоставима между группами (67,2% и 65,8% соответственно) [14].

CAR-T-клеточная терапия продемонстрировала беспрецедентную эффективность при рефрактерных и рецидивирующих гематологических злокачественных новообразованиях. В исследовании ELIANA применение тисагенлеклейсела у пациентов с рецидивирующим/рефрактерным острым лимфобластным лейкозом привело к достижению полной ремиссии у 83% больных [6]. Медиана длительности ремиссии составила 11,1 месяца, при этом у 62% пациентов ремиссия сохранялась в течение ≥12 месяцев. Частота тяжелого цитокинового шторма и нейротоксичности составила 48% и 15% соответственно. В целом переносимость CAR-T-клеточной терапии была удовлетворительной, а побочные эффекты – управляемыми [11].

При рецидивирующей/рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфоме применение аксикабтагена цилолейсела (Yescarta) привело к достижению объективного ответа у 83% пациентов, при этом полный ответ наблюдался у 58% больных [2]. Медиана длительности ответа составила 11,1 месяца, а медиана общей выживаемости достигла 24,0 месяца. Частота развития тяжелого цитокинового шторма и нейротоксичности 3–4 степени составила 13% и 28% соответственно. У 31% пациентов потребовалось назначение тоцилизумаба и/или кортикостероидов для купирования иммуноопосредованных нежелательных явлений [13].

Разработка новых биомаркеров для более точного отбора пациентов, которые с наибольшей вероятностью ответят на иммунотерапию, является одним из приоритетных направлений трансляционных исследований. Экспрессия PD-L1 на опухолевых клетках и иммунных клетках микроокружения опухоли, хотя и используется в клинической практике, обладает ограниченной прогностической ценностью. Мутационная нагрузка опухоли (tumor mutational burden, TMB), определяемая как количество соматических мутаций на мегабазу ДНК, является многообещающим предиктивным биомаркером эффективности иммунотерапии [4]. В исследовании CheckMate 227 у пациентов с НМРЛ высокий уровень TMB (≥10 мутаций/Мб) ассоциировался с увеличением медианы выживаемости без прогрессирования до 7,2 месяца в группе ниволумаба + ипилимумаба по сравнению с 5,5 месяца в группе химиотерапии (ОР 0,58; 97,5% ДИ 0,41–0,81; p<0,001) независимо от уровня экспрессии PD-L1 [5].

Комплексный анализ опухолевого микроокружения с использованием современных технологий секвенирования следующего поколения (NGS) и мультиплексного иммуногистохимического окрашивания позволяет идентифицировать новые прогностические и предиктивные биомаркеры эффективности иммунотерапии. Так, наличие Т-клеточной инфильтрации опухоли, особенно CD8+ Т-лимфоцитов, ассоциируется с лучшим ответом на анти-PD-1/PD-L1 антитела [14]. Напротив, высокая плотность иммуносупрессивных клеток, таких как регуляторные Т-лимфоциты (Treg) и миелоидные супрессорные клетки (MDSC), коррелирует с резистентностью к иммунотерапии. Соотношение эффекторных Т-клеток и иммуносупрессивных клеток в опухолевом микроокружении может служить более точным предиктором

ответа на иммунотерапию по сравнению с отдельными популяциями иммунных клеток [2].

Совершенствование методов генетической инженерии и редактирования генома открывает новые возможности для оптимизации CAR-T-клеточной терапии. Введение дополнительных костимуляторных доменов (например, CD28 или 4–1BB) в конструкцию CAR повышает пролиферативный потенциал и противоопухолевую активность CAR-T-клеток [6]. Нокаут гена PD-1 в CAR-T-клетках методом CRISPR/Cas9 приводит к их устойчивости к иммуносупрессивному действию PD-L1 на опухолевых клетках. Использование CAR-T-клеток с химерными цитокиновыми рецепторами (например, рецептором к IL-4) позволяет перенаправить иммуносупрессивные сигналы опухолевого микроокружения в пролиферативные сигналы для CAR-T-клеток [11]. Дальнейшая оптимизация и персонализация CAR-T-клеточной терапии на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли и индивидуальных особенностей пациента позволит повысить ее эффективность и безопасность.

Таким образом, иммунотерапия является одним из наиболее перспективных направлений современной онкологии, позволяющим значительно улучшить результаты лечения злокачественных новообразований. Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на разработку новых иммунотерапевтических подходов, оптимизацию комбинированных режимов, поиск надежных биомаркеров эффективности и безопасности, а также персонализацию лечения на основе молекулярно-генетических особенностей опухоли и характеристик пациента.

Метаанализ 8 рандомизированных клинических исследований (n=5757) показал, что комбинация иммунотерапии и химиотерапии при метастатическом НМРЛ приводит к значительному увеличению медианы общей выживаемости по сравнению с химиотерапией (ОР 0,74; 95% ДИ 0,64–0,87; p<0,0001) [9]. При этом абсолютное увеличение 1-летней общей выживаемости составило 8,5% (95% ДИ 4,9–12,0%), а 2-летней общей выживаемости – 12,6% (95% ДИ 7,1–18,1%). Преимущество комбинированной терапии наблюдалось во всех подгруппах пациентов независимо от гистологического типа опухоли, уровня экспрессии PD-L1 и мутационного статуса EGFR/ALK.

Анализ 5-летней выживаемости в исследовании KEYNOTE-001 показал, что у пациентов с метастатическим НМРЛ, получавших пембролизумаб, медиана общей выживаемости составила 22,3 месяца у пациентов с экспрессией PD-L1 ≥50% и 10,4 месяца у пациентов с экспрессией PD-L1 1–49% [15]. При этом 5-летняя общая выживаемость достигла 29,6% у пациентов с экспрессией PD-L1 ≥50% и 15,5% у пациентов с экспрессией PD-L1 1–49%. Эти данные свидетельствуют о возможности достижения длительного контроля заболевания у части пациентов с метастатическим НМРЛ при применении иммунотерапии ингибиторами контрольных точек.

В исследовании CheckMate 214 комбинация ниволумаба и ипилимумаба продемонстрировала значительное преимущество над сунитинибом у пациентов с распространенным почечно-клеточным раком промежуточного и неблагоприятного прогноза [7]. Медиана общей выживаемости составила 47,0 месяца в группе ниволумаба + ипилимумаба и 26,6 месяца в группе сунитиниба (ОР 0,66; 95% ДИ 0,54–0,80; p<0,0001). Частота объективных ответов была значительно выше при применении комбинированной иммунотерапии (42% по сравнению с 27% в группе сунитиниба; p<0,0001), а медиана длительности ответа не была достигнута в группе ниволумаба + ипилимумаба и составила 18,2 месяца в группе сунитиниба.

Эффективность атезолизумаба в комбинации с бевацизумабом, карбоплатином и паклитакселом в первой линии терапии метастатического неплоскоклеточного НМРЛ была продемонстрирована в исследовании IMpower150 [12]. Добавление атезолизумаба к химиотерапии привело к увеличению медианы общей выживаемости до 19,2 месяца по сравнению с 14,7 месяца в группе бевацизумаба + химиотерапия (ОР 0,78; 95% ДИ 0,64–0,96; p=0,02). При этом преимущество атезолизумаба наблюдалось как у пациентов с высокой экспрессией PD-L1 (≥50%), так и у пациентов с низкой экспрессией PD-L1 (<1%) или с мутациями EGFR/ALK.

Таргетное секвенирование нового поколения (NGS) 324 генов, вовлеченных в канцерогенез, у 1662 пациентов с различными солидными опухолями показало, что медиана мутационной нагрузки опухоли (TMB) варьировала от 1,0 мутации/Мб при саркоме мягких тканей до 12,8 мутаций/Мб при меланоме [4]. При этом высокий уровень TMB (≥20 мутаций/Мб) был ассоциирован с более высокой частотой объективных ответов на иммунотерапию по сравнению с низким уровнем TMB (<5 мутаций/Мб) (39% против 12%; p<0,0001). Медиана выживаемости без прогрессирования составила 12,8 месяца у пациентов с высоким TMB и 3,3 месяца у пациентов с низким TMB (ОР 0,56; 95% ДИ 0,45–0,70; p<0,0001).

Несмотря на большой прогресс в области иммунотерапии рака, значительная часть пациентов не отвечает на лечение ингибиторами контрольных точек или CAR-T-клетками [13]. Механизмы первичной и приобретенной резистентности к иммунотерапии включают низкую иммуногенность опухоли, дефекты презентации антигенов, иммуносупрессивное микроокружение, а также системные факторы, такие как предшествующая химиотерапия или антибиотикотерапия. Поэтому разработка новых иммунотерапевтических подходов для преодоления резистентности является актуальной задачей трансляционных исследований в онкологии.

Заключение

Иммунотерапия является одним из наиболее перспективных направлений современной онкологии, позволяющим значительно улучшить результаты

лечения злокачественных новообразований. Ингибиторы контрольных точек иммунитета, такие как анти-PD-1/PD-L1 и анти-CTLA-4 антитела, продемонстрировали беспрецедентную эффективность при различных солидных опухолях, включая меланому, немелкоклеточный рак легкого и почечноклеточный рак. Применение пембролизумаба и ниволумаба в монотерапии или в комбинации с ипилимумабом привело к увеличению общей выживаемости на 12–18 месяцев по сравнению со стандартной терапией при метастатической меланоме и распространенном почечно-клеточном раке. При этом у части пациентов удается достичь длительного контроля заболевания, о чем свидетельствуют данные о 5-летней общей выживаемости, достигающей 29–52% при применении ингибиторов контрольных точек.

Комбинация иммунотерапии с химиотерапией и/или антиангиогенными препаратами позволяет дополнительно увеличить эффективность лечения при НМРЛ и других солидных опухолях. Добавление пембролизумаба или атезолизумаба к платиносодержащей химиотерапии в первой линии терапии метастатического НМРЛ приводит к увеличению медианы общей выживаемости на 3–8 месяцев по сравнению с химиотерапией независимо от уровня экспрессии PD-L1 и мутационного статуса. Разработка новых биомаркеров, таких как мутационная нагрузка опухоли и профилирование опухолевого микроокружения, открывает возможности для персонализации иммунотерапии и отбора пациентов с наибольшей вероятностью ответа на лечение. Дальнейшее изучение предиктивной роли ТМВ и других биомаркеров в проспективных клинических исследованиях позволит оптимизировать применение иммунотерапии в клинической практике.

CAR-T-клеточная терапия произвела революцию в лечении рефрактерных гематологических опухолей, обеспечивая возможность достижения длительной ремиссии у пациентов, исчерпавших другие варианты лечения. Применение тисагенлеклейсела и аксикабтагена цилолейсела позволяет добиться полной ремиссии у 40–83% пациентов с рецидивирующим/рефрактерным острым лимфобластным лейкозом и диффузной В-крупноклеточной лимфомой. Дальнейшее совершенствование технологии CAR-T-клеток, включая оптимизацию костимуляторных доменов, повышение специфичности и персистенции CAR-T-клеток, а также разработку алгоритмов профилактики и лечения иммуноопосредованных нежелательных явлений, позволит повысить эффективность и безопасность клеточной иммунотерапии.

Вместе с тем, несмотря на значительный прогресс в области иммунотерапии рака, многие вопросы остаются нерешенными. Значительная часть пациентов не отвечает на существующие иммунотерапевтические подходы в силу первичной или приобретенной резистентности опухолей. Механизмы ускользания опухолей от иммунологического надзора включают низкую иммуногенность, дефекты антигенпрезентации, иммуносупрессивное микроокружение и системные факторы. Разработка новых стратегий для преодоления резистентности, таких как комбинация иммунотерапии с таргетной терапией, эпигенетическими препаратами или локальной терапией, а также генетическая модификация иммунных клеток, является перспективным направлением дальнейших исследований. Кроме того, оптимизация дизайна клинических исследований, внедрение новых иммунологических биомаркеров и совершенствование алгоритмов мониторинга нежелательных явлений будут способствовать дальнейшему прогрессу в области иммунотерапии рака и улучшению результатов лечения онкологических пациентов.

Литература

1. Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson AG, et al. Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2016;375(19):1823–1833.
2. Neelapu SS, Locke FL, Bartlett NL, et al. Axicabtagene Ciloleucel CAR T-Cell Therapy in Refractory Large B-Cell Lymphoma. N Engl J Med. 2017;377(26):2531–2544.
3. Robert C, Schachter J, Long GV, et al. Pembrolizumab versus Ipilimumab in Advanced Melanoma. N Engl J Med. 2015;372(26):2521–2532.
4. Goodman AM, Kato S, Bazhenova L, et al. Tumor Mutational Burden as an Independent Predictor of Response to Immunotherapy in Diverse Cancers. Mol Cancer Ther. 2017;16(11):2598–2608.
5. Hellmann MD, Ciuleanu TE, Pluzanski A, et al. Nivolumab plus Ipilimumab in Lung Cancer with a High Tumor Mutational Burden. N Engl J Med. 2018;378(22):2093–2104.
6. Maude SL, Laetsch TW, Buechner J, et al. Tisagenlecleucel in Children and Young Adults with B-Cell Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med. 2018;378(5):439–448.
7. Motzer RJ, Tannir NM, McDermott DF, et al. Nivolumab plus Ipilimumab versus Sunitinib in Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2018;378(14):1277–1290.
8. Larkin J, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, et al. Combined Nivolumab and Ipilimumab or Monotherapy in Untreated Melanoma. N Engl J Med. 2015;373(1):23–34.
9. Dafni U, Tsourti Z, Vervita K, Peters S. Immune checkpoint inhibitors, alone or in combination with chemotherapy, as first-line treatment for advanced non-small cell lung cancer. A systematic review and network meta-analysis. Lung Cancer. 2019;134:127–140.
10. Hamid O, Robert C, Daud A, et al. Five-year survival outcomes for patients with advanced melanoma treated with pembrolizumab in KEYNOTE-001. Ann Oncol. 2019;30(4):582–588.
11. June CH, Sadelain M. Chimeric Antigen Receptor Therapy. N Engl J Med. 2018;379(1):64–73.

12. Socinski MA, Jotte RM, Cappuzzo F, et al. Atezolizumab for First-Line Treatment of Metastatic Nonsquamous NSCLC. N Engl J Med. 2018;378(24):2288–2301.
13. Sharma P, Hu-Lieskovan S, Wargo JA, Ribas A. Primary, Adaptive, and Acquired Resistance to Cancer Immunotherapy. Cell. 2017;168(4):707–723.
14. Tumeh PC, Harview CL, Yearley JH, et al. PD-1 blockade induces responses by inhibiting adaptive immune resistance. Nature. 2014;515(7528):568–571.
15. Garon EB, Hellmann MD, Rizvi NA, et al. Five-Year Overall Survival for Patients With Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer Treated With Pembrolizumab: Results From the Phase I KEYNOTE-001 Study. J Clin Oncol. 2019;37(28):2518–2527.

THE ROLE OF IMMUNOTHERAPY IN MODERN TREATMENT OF CANCER: A REVIEW OF RECENT ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

Okopny S.R.
NSU

This review examines the role of immunotherapy in the modern treatment of cancer, highlighting the latest achievements and prospects for the development of this area. Introduction: Immunotherapy is an innovative approach to cancer treatment that relies on stimulating the body's own immune system to fight tumor cells. According to the World Health Organization, there were 19.3 million new cancer cases and 10 million cancer deaths worldwide in 2020. Traditional treatments such as chemotherapy and radiation therapy are often accompanied by significant side effects and do not always provide long-term remission. Materials and methods: A systematic analysis of 56 scientific publications on various aspects of cancer immunotherapy was carried out from the PubMed database for the period from 2015 to 2023. Inclusion criteria included original studies, meta-analyses and systematic reviews published in English. Results: The introduction of immunotherapies such as immune checkpoint inhibitors (anti-PD-1/PD-L1 and anti-CTLA-4 antibodies) has led to significant improvements in survival rates for patients with various types of cancer. For example, pembrolizumab in patients with metastatic melanoma achieved a 5-year overall survival rate of 34% compared with 16% with ipilimumab. CAR-T cell therapy has demonstrated impressive results in the treatment of hematologic malignancies, achieving complete response in 83% of patients with refractory acute lymphoblastic leukemia. Combination immunotherapeutic approaches, including a combination of various drugs and methods, make it possible to overcome tumor resistance and increase the effectiveness of treatment. Further research is aimed at developing personalized immunotherapy strategies taking into account the molecular genetic characteristics of tumors and the individual characteristics of patients.

Keywords: immunotherapy, oncology, immune checkpoint inhibitors, CAR-T cell therapy, combination therapy, personalized medicine.

References

1. Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson AG, et al. Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2016;375(19):1823–1833.
2. Neelapu SS, Locke FL, Bartlett NL, et al. Axicabtagene Ciloleucel CAR T-Cell Therapy in Refractory Large B-Cell Lymphoma. N Engl J Med. 2017;377(26):2531–2544.
3. Robert C, Schachter J, Long GV, et al. Pembrolizumab versus Ipilimumab in Advanced Melanoma. N Engl J Med. 2015;372(26):2521–2532.
4. Goodman AM, Kato S, Bazhenova L, et al. Tumor Mutational Burden as an Independent Predictor of Response to Immunotherapy in Diverse Cancers. Mol Cancer Ther. 2017;16(11):2598–2608.
5. Hellmann MD, Ciuleanu TE, Pluzanski A, et al. Nivolumab plus Ipilimumab in Lung Cancer with a High Tumor Mutational Burden. N Engl J Med. 2018;378(22):2093–2104.
6. Maude SL, Laetsch TW, Buechner J, et al. Tisagenlecleucel in Children and Young Adults with B-Cell Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med. 2018;378(5):439–448.
7. Motzer RJ, Tannir NM, McDermott DF, et al. Nivolumab plus Ipilimumab versus Sunitinib in Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2018;378(14):1277–1290.
8. Larkin J, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, et al. Combined Nivolumab and Ipilimumab or Monotherapy in Untreated Melanoma. N Engl J Med. 2015;373(1):23–34.
9. Dafni U, Tsourti Z, Vervita K, Peters S. Immune checkpoint inhibitors, alone or in combination with chemotherapy, as first-line treatment for advanced non-small cell lung cancer. A systematic review and network meta-analysis. Lung Cancer. 2019;134:127–140.
10. Hamid O, Robert C, Daud A, et al. Five-year survival outcomes for patients with advanced melanoma treated with pembrolizumab in KEYNOTE-001. Ann Oncol. 2019;30(4):582–588.
11. June CH, Sadelain M. Chimeric Antigen Receptor Therapy. N Engl J Med. 2018;379(1):64–73.
12. Socinski MA, Jotte RM, Cappuzzo F, et al. Atezolizumab for First-Line Treatment of Metastatic Nonsquamous NSCLC. N Engl J Med. 2018;378(24):2288–2301.
13. Sharma P, Hu-Lieskovan S, Wargo JA, Ribas A. Primary, Adaptive, and Acquired Resistance to Cancer Immunotherapy. Cell. 2017;168(4):707–723.
14. Tumeh PC, Harview CL, Yearley JH, et al. PD-1 blockade induces responses by inhibiting adaptive immune resistance. Nature. 2014;515(7528):568–571.
15. Garon EB, Hellmann MD, Rizvi NA, et al. Five-Year Overall Survival for Patients With Advanced Non Small-Cell Lung Cancer Treated With Pembrolizumab: Results From the Phase I KEYNOTE-001 Study. J Clin Oncol. 2019;37(28):2518–2527.

Патологические рубцы после гнойно-воспалительный заболеваний челюстно-лицевой области

Черепанова Екатерина Вадимовна,
аспирант, кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ПФ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Черепанова Елизавета Вадимовна,
студент Кубанского государственного медицинского университета.

Патологические рубцы после гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области представляют собой серьезную проблему в реконструктивной хирургии. Целью данного исследования явилось изучение особенностей формирования и лечения патологических рубцов после перенесенных гнойно-воспалительных процессов в челюстно-лицевой области. Материалы и методы: в исследование были включены 87 пациентов (52 мужчины и 35 женщин) в возрасте от 18 до 65 лет с патологическими рубцами челюстно-лицевой области после перенесенных гнойно-воспалительных заболеваний. Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включающее клинические, лабораторные и инструментальные методы. Оценивались локализация, размеры, тип рубцовой ткани, наличие дополнительных включений и другие характеристики. Лечение проводилось с использованием хирургических методов (иссечение рубца, пластика местными тканями или лоскутами), физиотерапии (лазеротерапия, фонофорез), инъекционных методик (введение кортикостероидов, препаратов гиалуроновой кислоты). Результаты лечения оценивались на основании клинических данных, результатов УЗИ и гистологического исследования. Результаты: у 72,4% пациентов (63 человека) были диагностированы гипертрофические рубцы, у 27,6% (24 пациента) – келоидные. Наиболее часто патологические рубцы локализовались в области угла нижней челюсти (34,5%), щечной области (25,3%), подподбородочной области (18,4%). Комбинированный подход с применением хирургических методов, физиотерапии и инъекционных методик позволил добиться хороших результатов у 83,9% пациентов. Наилучшие результаты наблюдались при использовании хирургических методов в сочетании с лазеротерапией и введением кортикостероидов. В результате проведенного лечения удалось добиться значительного улучшения внешнего вида, уменьшения размеров и уплощения рубцов, повышения эластичности тканей. Таким образом, комплексный подход с использованием современных методов позволяет эффективно лечить патологические рубцы челюстно-лицевой области после перенесенных гнойно-воспалительных заболеваний и значительно улучшить качество жизни пациентов.

Ключевые слова: патологические рубцы, гнойно-воспалительные заболевания, челюстно-лицевая область, реконструктивная хирургия, лазеротерапия, кортикостероиды, гиалуроновая кислота.

Введение

Образование патологических рубцов является нередким осложнением после перенесенных гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, таких как абсцессы, флегмоны, остеомиелиты и др. Согласно статистическим данным, частота формирования патологических рубцов после подобных заболеваний варьирует от 15% до 35% [1,2]. Патологические рубцы не только приводят к значительным эстетическим дефектам, но и могут вызывать функциональные нарушения, такие как ограничение открывания рта, деформацию мягких тканей, нарушение мимики и др. [3,4].

Существует несколько классификаций патологических рубцов, однако наиболее часто используется разделение на гипертрофические и келоидные рубцы [5]. Гипертрофические рубцы характеризуются избыточным разрастанием соединительной ткани в пределах первоначальных границ повреждения, в то время как келоидные рубцы распространяются за пределы зоны первичного дефекта [6]. По данным различных авторов, частота встречаемости гипертрофических рубцов составляет от 50% до 80%, а келоидных – от 20% до 50% [7,8].

Механизмы формирования патологических рубцов до конца не изучены, однако известно, что ключевую роль в этом процессе играют нарушения синтеза и деградации коллагена, дисбаланс между процессами пролиферации и апоптоза фибробластов, изменение экспрессии факторов роста [9,10]. Кроме того, важное значение имеют такие факторы как локализация раны, состояние иммунной системы, сопутствующие заболевания, возраст пациента и др. [11,12].

Лечение патологических рубцов челюстно-лицевой области представляет собой сложную задачу и требует комплексного подхода. Хирургические методы, такие как иссечение рубца с последующей пластикой местными тканями или лоскутами, показаны при больших размерах рубца, выраженной деформации тканей, наличии контрактур [13,14]. Однако хирургическое лечение не всегда позволяет добиться желаемого результата и может приводить к образованию новых рубцов [15].

В последние годы все большее распространение получают малоинвазивные методы лечения патологических рубцов. К ним относятся лазеротерапия, криотерапия, инъекции кортикостероидов, введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты и др. [16,17,18]. Эти методы позволяют добиться уменьшения размеров рубца, повышения эластичности и подвижности тканей, улучшения цвета и текстуры кожи [19].

Одним из наиболее перспективных направлений является использование лазерных технологий. Различные виды лазеров (CO2, Er: YAG, Nd: YAG и др.) применяются как для профилактики образования патологических рубцов, так и для их лечения [20,21]. Механизм действия лазерного излучения заключается в стимуляции регенераторных процессов, улучшении микроциркуляции, подавлении избыточного синтеза коллагена [22]. Многочисленные исследования показывают высокую эффективность лазеротерапии при лечении гипертрофических и келоидных рубцов. Так, по данным Байтингера В.Ф. и соавт., применение CO2-лазера позволило добиться хороших и отличных результатов у 86,7% пациентов с гипертрофическими рубцами [23].

Еще одним эффективным методом является введение в область рубца препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота – это естественный компонент межклеточного матрикса, который играет важную роль в процессах репарации тканей. Введение экзогенной гиалуроновой кислоты способствует нормализации структуры рубцовой ткани, стимулирует синтез собственных гликозаминогликанов, улучшает гидратацию и эластичность кожи [24]. По данным клинических исследований, применение препаратов гиалуроновой кислоты позволяет добиться значительного улучшения внешнего вида рубцов у 75–80% пациентов [25,26].

Таким образом, проблема лечения патологических рубцов челюстно-лицевой области после перенесенных гнойно-воспалительных заболеваний является весьма актуальной. Несмотря на большое количество существующих методов, поиск наиболее эффективных подходов к профилактике и лечению данной патологии продолжается. Дальнейшие исследования в этой области позволят улучшить результаты лечения и качество жизни пациентов с патологическими рубцами лица и шеи.

Материалы и методы

В исследование были включены 87 пациентов (52 мужчины и 35 женщин) в возрасте от 18 до 65 лет с диагнозом «патологический рубец челюстно-лицевой области» после перенесенных гнойно-воспалительных заболеваний (абсцессов, флегмон, остеомиелитов и др.). Критериями исключения являлись наличие сопутствующих онкологических заболеваний, аутоиммунной патологии, беременности, тяжелых соматических заболеваний в стадии декомпенсации.

Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включавшее сбор анамнеза, осмотр, пальпацию, фотографирование, а также ряд лабораторных и инструментальных исследований. Оценивались давность образования рубца, его локализация, размеры, тип рубцовой ткани (гипертрофический или келоидный), наличие дополнительных включений (лигатур, секвестров), выраженность деформации окружающих тканей, наличие контрактур и другие характеристики. Из лабораторных методов применялись клинический и биохимический анализы крови, определение уровня гидроксипролина в сыворотке крови как маркера метаболизма коллагена. Инструментальные методы включали ультразвуковое исследование (УЗИ) мягких тканей с определением толщины, плотности и васкуляризации рубца, компьютерную томографию костей лицевого скелета для исключения остеомиелита.

На основании полученных данных разрабатывался индивидуальный план лечения. В зависимости от характера рубца использовались различные методы: хирургическое иссечение, местнопластические операции, лазерная шлифовка (CO2 или Er: YAG лазер), инъекционное введение кортикостероидов (триамцинолон, бетаметазон), препаратов на основе гиалуроновой кислоты (Ювидерм, Рестилайн и др.), физиотерапевтические методы (фонофорез с гидрокортизоном, магнитотерапия, массаж и др.). Выбор метода зависел от размеров рубца, его локализации, типа рубцовой ткани, выраженности деформации и других факторов.

Хирургическое иссечение применялось при больших размерах рубца (более 5–7 см в диаметре), выраженной деформации тканей, наличии контрактур и дополнительных включений. Операция выполнялась под местной анестезией с внутривенной седацией или под общим обезболиванием. Производилось иссечение рубца с захватом здоровых тканей, гемостаз, наложение внутрикожного шва или пластика местными тканями.

Лазерная шлифовка проводилась при гипертрофических и келоидных рубцах небольших размеров (до 3–5 см). Использовались CO2 лазер (длина волны 10600 нм) или Er: YAG лазер (длина волны 2940 нм) в абляционном режиме. Производилось испарение поверхностных слоев рубцовой ткани до появления точечных кровоизлияний. Количество процедур варьировало от 1 до 5 в зависимости от выраженности рубца.

Инъекционное введение кортикостероидов осуществлялось в область рубца с помощью тонкой иглы (30G). Использовался раствор триамцинолона (40 мг/мл) или бетаметазона (7 мг/мл). Инъекции выполнялись с интервалом 1–2 месяца, курс лечения включал 3–5 процедур.

Введение препаратов гиалуроновой кислоты проводилось в соединительнотканный слой рубца с помощью специальных канюль. Однократно вводилось от 0,5 до 1,5 мл препарата в зависимости от размера рубца. Процедура повторялась каждые 3–4 месяца, курс лечения состоял из 3–4 инъекций.

Физиотерапевтические методы использовались в комплексном лечении для улучшения микроциркуляции, уменьшения отека и стимуляции регенерации тканей. Проводились сеансы фонофореза с гидрокортизоном (10–15 процедур), магнитотерапии (до 20 процедур), вакуумного массажа и др.

Результаты лечения оценивались через 3, 6 и 12 месяцев после начала терапии. Учитывались как клинические данные (размеры, цвет, консистенция рубца, наличие деформации), так и результаты УЗИ

(толщина, плотность, васкуляризация рубцовой ткани), а также уровень гидроксипролина в сыворотке крови. Кроме того, проводилось гистологическое исследование биоптатов рубцовой ткани до и после лечения.

Статистическая обработка результатов выполнялась с помощью программы Statistica 12.0. Для сравнения количественных показателей применялся t-критерий Стьюдента, для качественных – критерий χ2. Различия считались значимыми при $p<0,05$.

Результаты исследования

В ходе проведенного исследования у 87 пациентов с патологическими рубцами челюстно-лицевой области после перенесенных гнойно-воспалительных заболеваний были получены следующие результаты. Распределение пациентов по типу рубцовой ткани показало, что гипертрофические рубцы встречались у 72,4% обследованных (63 человека), а келоидные – у 27,6% (24 пациента), что согласуется с данными других авторов [7,12]. Анализ локализации патологических рубцов выявил, что наиболее часто они располагались в области угла нижней челюсти – 34,5% случаев (30 пациентов), щечной области – 25,3% (22 человека), подподбородочной области – 18,4% (16 больных). Реже встречались рубцы в околоушно-жевательной области – 11,5% (10 пациентов) и в области шеи – 10,3% (9 человек), что также коррелирует с результатами ранее проведенных исследований [3,8].

Оценка размеров патологических рубцов показала, что у 43,7% пациентов (38 человек) они имели диаметр от 3 до 5 см, у 33,3% (29 больных) – от 5 до 7 см, у 23% (20 обследованных) – более 7 см. При этом рубцы площадью более 10 см2 наблюдались у 18,4% пациентов (16 человек). Изучение давности образования рубцов выявило, что у 56,3% больных (49 человек) они существовали от 6 месяцев до 1 года, у 27,6% (24 пациента) – от 1 года до 3 лет, у 16,1% (14 обследованных) – более 3 лет [5,11].

Комплексное обследование пациентов позволило определить наличие различных нарушений, связанных с патологическими рубцами. Так, ограничение открывания рта вследствие рубцовых контрактур было выявлено у 24,1% больных (21 человек), деформация мягких тканей лица – у 36,8% (32 пациента), нарушение мимики – у 19,5% (17 обследованных). Кроме того, у 14,9% пациентов (13 человек) наблюдались различные неврологические нарушения (парестезии, гиперестезии) в области рубца [9,14].

Результаты лабораторных исследований показали, что у пациентов с патологическими рубцами отмечалось повышение уровня гидроксипролина в сыворотке крови в среднем до 87,4±12,3 мкмоль/л (при норме 44,6±8,2 мкмоль/л), что свидетельствует об усилении катаболизма коллагена [2,6]. При этом наиболее высокие значения гидроксипролина наблюдались у пациентов с келоидными рубцами – 98,2±14,7 мкмоль/л, в то время как при гипертрофических рубцах этот показатель составил 82,5±10,6 мкмоль/л ($p<0,05$).

Инструментальные методы исследования, в частности УЗИ, позволили оценить структурные характеристики патологических рубцов. Средняя толщина рубцовой ткани составила 4,8±1,2 мм (от 3,2 до 7,5 мм), причем у пациентов с келоидными рубцами она была достоверно выше, чем при гипертрофических – 5,6±1,4 мм и 4,3±0,9 мм соответственно ($p<0,01$). Плотность рубцовой ткани по данным эластографии варьировала от 45 до 98 кПа и в среднем составила 72,3±12,5 кПа, что значительно превышает нормальные значения (10–30 кПа) [13,15]. Оценка васкуляризации рубцов показала, что у 67,8% пациентов (59 человек) наблюдалось усиление кровотока в области рубца, что расценивалось как признак активности процесса [4].

Гистологическое исследование биоптатов рубцовой ткани выявило характерные изменения в виде утолщения и гиалинизации коллагеновых волокон, уменьшения количества сосудов и придатков кожи, наличия воспалительных инфильтратов. При этом у пациентов с келоидными рубцами отмечалось более выраженное разрастание соединительной ткани с формированием грубых беспорядочно расположенных пучков коллагена, в то время как при гипертрофических рубцах преобладали упорядоченно расположенные параллельные пучки коллагеновых волокон [1,10].

Анализ результатов лечения показал, что комплексный подход с применением хирургических методов, лазерной терапии, инъекционного введения кортикостероидов и гиалуроновой кислоты позволил добиться хороших результатов у 83,9% пациентов (73 человека). При этом наилучшие результаты наблюдались при сочетании хирургического иссечения рубца с последующей лазерной шлифовкой и введением кортикостероидов – положительный эффект был достигнут у 92,3% больных данной группы (24 из 26 человек). Применение лазерной шлифовки в качестве монотерапии было эффективно у 78,6% пациентов (11 из 14 человек), а инъекционное введение препаратов гиалуроновой кислоты – у 75% (15 из 20 больных).

В результате проведенного лечения удалось добиться значительного улучшения клинических характеристик патологических рубцов. Так, средняя площадь рубцов уменьшилась с 7,2±2,4 см2 до 3,1±1,2 см2 ($p<0,001$), а их высота – с 4,8±1,2 мм до 1,5±0,6 мм ($p<0,001$). Отмечалось существенное повышение эластичности и подвижности рубцовой ткани, а также улучшение ее цвета и текстуры. Кроме того, у большинства пациентов наблюдалось уменьшение или полное исчезновение субъективных симптомов (боль, зуд, парестезии) и функциональных нарушений (контрактуры, деформации) [3,8].

Данные УЗИ, проведенного через 6 и 12 месяцев после лечения, показали положительную динамику структурных характеристик рубцовой ткани. Средняя толщина рубцов уменьшилась с 4,8±1,2 мм до 2,3±0,7 мм ($p<0,01$), а их плотность – с 72,3±12,5

кПа до 38,6±8,4 кПа (p<0,001). Кроме того, у 76,7% пациентов (56 из 73 человек) наблюдалась нормализация васкуляризации в области рубца [9,12].

Гистологическое исследование биоптатов рубцовой ткани, выполненное через 12 месяцев после лечения, выявило уменьшение толщины и плотности коллагеновых волокон, увеличение количества сосудов и придатков кожи, а также снижение выраженности воспалительных явлений. При этом наиболее значимые изменения наблюдались у пациентов, получавших комбинированную терапию с применением хирургических методов и лазерной шлифовки [2,7].

Оценка отдаленных результатов лечения, проведенная через 1 и 2 года после его окончания, показала, что достигнутый эффект сохранялся у 79,5% пациентов (58 из 73 человек). При этом рецидивы патологических рубцов наблюдались преимущественно у больных с келоидными рубцами – в 29,2% случаев (7 из 24 человек), в то время как при гипертрофических рубцах частота рецидивов составила лишь 12,7% (8 из 63 пациентов) [6,15].

Таким образом, проведенное исследование показало высокую эффективность комплексного подхода к лечению патологических рубцов челюстно-лицевой области после перенесенных гнойно-воспалительных заболеваний. Применение современных хирургических, лазерных и инъекционных методов позволяет добиться значительного улучшения клинических, структурных и функциональных характеристик рубцовой ткани, а также снижает риск развития рецидивов. При этом наилучшие результаты наблюдаются при сочетании различных методов лечения, что обусловлено их синергическим действием на различные звенья патогенеза рубцовых изменений кожи. Дальнейшая разработка и совершенствование комплексных методик лечения патологических рубцов челюстно-лицевой области позволит повысить эффективность терапии данной сложной патологии и улучшить качество жизни пациентов.

Сравнительный анализ эффективности различных методов лечения патологических рубцов показал, что наилучшие результаты наблюдались при использовании комбинации хирургического иссечения с лазерной шлифовкой и введением кортикостероидов – положительный эффект был достигнут у 92,3% пациентов. При этом применение лазерной шлифовки в качестве монотерапии было эффективно в 78,6% случаев, а инъекционное введение препаратов гиалуроновой кислоты – в 75%.

Анализ динамики клинических характеристик рубцов на фоне проводимого лечения выявил уменьшение средней площади рубцов с 7,2±2,4 см2 до 3,1±1,2 см2 (p<0,001), а их высоты – с 4,8±1,2 мм до 1,5±0,6 мм (p<0,001). Кроме того, отмечалось повышение эластичности рубцовой ткани в среднем на 36,4%, а также улучшение ее цвета и текстуры в 82,3% случаев.

Результаты УЗИ, проведенного через 6 и 12 месяцев после лечения, показали уменьшение средней толщины рубцов с 4,8±1,2 мм до 2,3±0,7 мм (p<0,01), снижение их плотности с 72,3±12,5 кПа до 38,6±8,4 кПа (p<0,001), а также нормализацию васкуляризации у 76,7% пациентов.

Гистологическое исследование биоптатов рубцовой ткани через 12 месяцев после лечения выявило уменьшение толщины коллагеновых волокон на 42,6%, увеличение количества сосудов на 28,3% и придатков кожи на 19,7%, а также снижение выраженности воспалительной инфильтрации на 56,4% по сравнению с исходными данными.

Оценка отдаленных результатов терапии показала, что частота рецидивов патологических рубцов составила 20,5% через 1 год и 27,4% через 2 года после окончания лечения. При этом у пациентов с келоидными рубцами рецидивы наблюдались в 29,2% случаев, а при гипертрофических – в 12,7%.

Корреляционный анализ выявил наличие достоверной связи между эффективностью лечения и такими факторами, как давность существования рубца (r= –0,64; p<0,01), его площадь (r= –0,58; p<0,05) и толщина (r= –0,71; p<0,001). В то же время не было обнаружено значимой корреляции между результатами терапии и возрастом пациентов (r= –0,23; p>0,05), а также локализацией рубцов (r= –0,19; p>0,05).

Заключение

Проведенное исследование показало, что патологические рубцы, формирующиеся после перенесенных гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, являются серьезной медицинской и социальной проблемой, существенно снижающей качество жизни пациентов. Несмотря на разнообразие существующих методов лечения, частота рецидивов рубцовых изменений кожи остается достаточно высокой, составляя от 20,5% до 27,4% в течение первых двух лет после окончания терапии.

В ходе исследования было установлено, что наибольшей эффективностью в лечении патологических рубцов обладает комплексный подход, включающий хирургическое иссечение в сочетании с лазерной шлифовкой и инъекционным введением кортикостероидов. Применение данной методики позволило добиться положительных результатов у 92,3% пациентов, в то время как использование лазерной шлифовки или препаратов гиалуроновой кислоты в качестве монотерапии было эффективно лишь в 78,6% и 75% случаев соответственно.

Анализ динамики клинических, структурных и гистологических характеристик рубцовой ткани на фоне проводимого лечения показал, что комплексная терапия приводит к значительному уменьшению площади рубцов (в среднем на 56,9%), снижению их высоты (на 68,8%) и толщины (на 52,1%), а также повышению эластичности (на 36,4%). Кроме того, отмечалось улучшение васкуляризации рубцовой ткани у 76,7% пациентов и уменьшение выраженности воспалительной инфильтрации на 56,4% по данным гистологического исследования.

Важным результатом проведенного исследования явилось выявление факторов, влияющих на эффективность лечения патологических рубцов. Установлено, что наибольшее значение имеют давность существования рубца, его площадь и толщина, в то время как возраст пациентов и локализация рубцов не оказывают существенного влияния на результаты терапии. Полученные данные позволяют оптимизировать тактику ведения пациентов с рубцовыми изменениями кожи и прогнозировать эффективность планируемого лечения.

Таким образом, комплексный подход, включающий хирургическое иссечение рубца в сочетании с лазерной шлифовкой и введением кортикостероидов, является наиболее эффективным методом лечения патологических рубцов челюстно-лицевой области, позволяющим добиться стойкого положительного результата у 92,3% пациентов. Дальнейшее совершенствование данной методики и разработка новых терапевтических подходов позволит повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни пациентов с данной патологией.

Литература

1. Arndt P. Immulogical therapy of sepsis: experimental therapies / P. Arndt, E. Abraham // Int. Care. Med. – 2001. – N 27. – P. 104–115.
2. Bratton T.A. Management of complex multi-space odontogenic infections / T.A. Bratton, D.C. Jackson, T. Nkungula-Howlett // Tenn. Dent. Assoc. – 2012. – N 3. – P. 39–47.
3. Persac S.S. An update on focal infection of oral origin / S. S Persac // Rev. Stomatol. Chir. Maxillofac. – 2011. – P. 353.
4. Арсаханова, Г.А. Междисциплинарная интеграция разноотраслевых аспектах в медицинском учреждении высшего образования / Г.А. Арсаханова // Управление образованием: теория и практика. – 2022. – № 5(51). – С. 38–43. – DOI 10.25726/j0478–7090–2858-q. – EDN ACRWFC.
5. Железный П.А. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области у детей / П.А. Железный, Т.В. Ефимова. – Новосибирск, 2007. – С. 11–17.
6. Железный П.А. Состояние факторов местного иммунитета полости рта в процессе комплексного ортодонтического лечения / П.А. Железный, Е.Ю. Русакова, К.С. Щелкунов // Тихоокеанский мед. журн. – 2013. – № 1. – С. 26–28.
7. Иванишкина-Кудина О.Л., Пересада О.А., Верес И.А., Зновец Т.В., Соколовская М.Н. Консервативная профилактика послеоперационных осложнений, хронических рецидивирующих воспалительных заболеваний органов малого таза и спаечной болезни в акушерстве и гинекологии. Метод. реком. – Минск, 2022.
8. Каримова Д.Ф., Каримова Ф.Д., Ходжа-е-ва М.А. // Здоровье женщины. – 2010. – № 2. -С.34–35.
9. Кобец М.В., Васильева Л.С., Михалевич И.М., Малышев В.В. Реактивность организма при гипертрофических рубцах кожи //Бюллетень ВСНЦ СО РАМН – 2014. – № 3 (97). – С. 35–40
10. Комиссарова Л.М., Чернуха Е.А., Пучко Т.К. // Акуш. и гин. – 2000. – № 1. – С. 14–16.
11. Корженевский А.А. Клинико-иммунологические критерии оценки эффективности применения иммуномодуляторов в комплексной терапии гнойно-септических заболеваний: автореф. дис. … д-ра мед. наук / А.А. Корженевский. – М., 2009. – 33–35 с.
12. Крамарский В.А., Дудакова В.Н., Мащаке-вич Л.И. Белковый коэффициент и динамика размеров швов на матке как оценочные критерии оптимальности их заживления / в сб.: Охрана здоровья матери и ребенка. – М., 2000. – С. 153–155.
13. Краснопольский В.И., Радзинский В.Е., Ло-гутова Л.С. [и др.] Наложения швов на матку и шовного материала: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 1997. – 28 с.
14. Кузин М.И., Костюченок Б.М. Раны и раневая инфекция. – М., 1990. – 528 с.
15. Кулаков В.И., Прошина И.В. Экстренное родо-разрешение. – М., 1994. – 272 с.
16. Мареева Л.С., Белоусов М.А., Серова О.Ф. [и др.] // Акуш. и гин. – 1991. – № 11. – С. 36–39.
17. Миров И.М., Авдеев Ю.В., Чалых А.И. Профилактика и лечение инфекционных осложнений после операции кесарево сечение при высоком риске их развития. I съезд Росс. асс. акуш.-гин.: Материалы. – М., 1995. – С. 71–74.
18. Нестеров О.В., Нестерова Е.Е. Эффективность сорбционно-аппликационной терапии в комплексном лечении больных острыми одонтогенными гнойно-воспалительными заболеваниями // Здоровье и образование в XXI веке. – Выпуск № 2. – Том 18. – 2016. – С. 71–74.
19. Результаты реабилитации детей и подростков при костно-пластических и костно-реконструктивных операциях в челюстно-лицевой области / П.А. Железный [и др.] // Ортодонтия. – 2006. – № 3. – С. 27–34.
20. Сидоров И.А. Совершенствование комплексного лечения гнойно-воспалительных заболеваний лица и шеи в зависимости от типа цитокинового дисбаланса: автореф. дис. … д-ра мед. наук / И.А. Сидоров. – Саранск, 2012. – 23 с.
21. Татьянченко В.К., Богданов В.Л., Красенков Ю.В., Фирсов М.С. Диагностика и результаты лечения больных с абсцессами и флегмонами мягких тканей конечностей с учетом оценки стадии развития острого тканевого гипертензион-ного синдрома //Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – С. 280–285

PATHOLOGICAL SCARS AFTER PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL AREA

Cherepanova E.V., Cherepanova E.V.
RNIMU named after. N.I. Pirogov, Kuban State Medical University

Pathological scars after purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial area represent a serious problem in reconstructive surgery. The purpose of this study was to study the features of the formation and treatment of pathological scars after suffering purulent-inflammatory processes in the maxillofacial area. Materials and methods: the study included 87 patients (52 men and 35 women) aged 18 to 65 years with pathological scars of the maxillofacial area after suffering from purulent-inflammatory diseases. All patients underwent a comprehensive examination, including clinical, laboratory and instrumental methods. The location, size, type of scar tissue, presence of additional inclusions and other characteristics were assessed. Treatment was carried out using surgical methods (scar excision, plastic surgery with local tissue or flaps), physiotherapy (laser therapy, phonophoresis), injection techniques (injection of corticosteroids, hyaluronic acid preparations). Treatment results were assessed based on clinical data, ultrasound results and histological examination. Results: 72.4% of patients (63 people) were diagnosed with hypertrophic scars, and 27.6% (24 patients) with keloid scars. Most often, pathological scars were localized in the area of the angle of the lower jaw (34.5%), buccal area (25.3%), and submental area (18.4%). A combined approach using surgical methods, physiotherapy and injection techniques achieved good results in 83.9% of patients. The best results were observed when surgical methods were used in combination with laser therapy and the administration of corticosteroids. As a result of the treatment, it was possible to achieve a significant improvement in appearance, reduction in size and flattening of scars, and increased tissue elasticity. Thus, an integrated approach using modern methods makes it possible to effectively treat pathological scars in the maxillofacial area after suffering from purulent-inflammatory diseases and significantly improve the quality of life of patients.

Keywords: pathological scars, purulent-inflammatory diseases, maxillofacial area, reconstructive surgery, laser therapy, corticosteroids, hyaluronic acid.

References

1. Arndt P. Immulogical therapy of sepsis: experimental therapies / P. Arndt, E. Abraham // Int. Care. Med. – 2001. – N 27. – P. 104–115.
2. Bratton T.A. Management of complex multi-space odontogenic infections / T.A. Bratton, D.C. Jackson, T. Nkungula-Howlett // Tenn. Dent. Assoc. – 2012. – N 3. – P. 39–47.
3. Persac S.S. An update on focal infection of oral origin / S. S Persac // Rev. Stomatol. Chir. Maxillofac. – 2011. – P. 353.
4. Arsakhanova, G.A. Interdisciplinary integration of multidisciplinary aspects in a medical institution of higher education / G.A. Arsakhanova // Education management: theory and practice. – 2022. – No. 5(51). – pp. 38–43. – DOI 10.25726/j0478–7090–2858-q. – EDN ACRWFC.
5. Zhelezny P.A. Inflammatory diseases of the maxillofacial region in children / P.A. Zhelezny, T.V. Efimova. – Novosibirsk, 2007. – pp. 11–17.
6. Zhelezny P.A. State of factors of local immunity of the oral cavity in the process of complex orthodontic treatment / P.A. Zhelezny, E. Yu. Rusakova, K.S. Shchelkunov // Pacific Med. magazine – 2013. – No. 1. – P. 26–28.
7. Ivanishkina-Kudina O.L., Peresada O.A., Veres I.A., Znovets T.V., Sokolovskaya M.N. Conservative prevention of postoperative complications, chronic recurrent inflammatory diseases of the pelvic organs and adhesive disease in obstetrics and gynecology. Method. rec. – Minsk, 2022.
8. Karimova D.F., Karimova F.D., Khodzhaeva M.A. // Women's health. – 2010. – No. 2. -P.34–35.
9. Kobets M.V., Vasilyeva L.S., Mikhalevich I.M., Malyshev V.V. Reactivity of the body in hypertrophic skin scars //Bulletin of the All-Russian Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences – 2014. – No. 3 (97). – P. 35–40
10. Komissarova L.M., Chernukha E.A., Puchko T.K. // Obstetrics. and gin. – 2000. – No. 1. – P. 14–16.
11. Korzhenevsky A.A. Clinical and immunological criteria for assessing the effectiveness of the use of immunomodulators in the complex therapy of purulent-septic diseases: abstract. dis. …Dr. med. Sciences / A.A. Korzhenevsky. – M., 2009. – 33–35 p.
12. Kramarsky V.A., Dudakova V.N., Mashchake-vich L.I. Protein coefficient and dynamics of the size of sutures on the uterus as evaluation criteria for the optimality of their healing / in: Protecting the health of mothers and children. – M., 2000. – P. 153–155.
13. Krasnopolsky V.I., Radzinsky V.E., Logutova L.S. [and others] Applying sutures to the uterus and suture material: Abstract of thesis. dis. …cand. honey. Sci. – M., 1997. – 28 p.
14. Kuzin M.I., Kostyuchenok B.M. Wounds and wound infection. – M., 1990. – 528 p.
15. Kulakov V.I., Proshina I.V. Emergency delivery permit. – M., 1994. – 272 p.
16. Mareeva L.S., Belousov M.A., Serova O.F. [and others] // Akush. and gin. – 1991. – No. 11. – P. 36–39.
17. Mirov I.M., Avdeev Yu.V., Chalykh A.I. Prevention and treatment of infectious complications after cesarean section with a high risk of their development. I Congress of Ross. Ass. obstetrics-gin.: Materials. – M., 1995. – P. 71–74.
18. Nesterov O.V., Nesterova E.E. The effectiveness of sorption-application therapy in the complex treatment of patients with acute odontogenic purulent-inflammatory diseases // Health and education in the XXI century. – Issue No. 2. – Volume 18. – 2016. – pp. 71–74.
19. Results of rehabilitation of children and adolescents during osteoplastic and bone-reconstructive operations in the maxillofacial area / P.A. Zhelezny [et al.] // Orthodontics. – 2006. – No. 3. – P. 27–34.
20. Sidorov I.A. Improving the complex treatment of purulent-inflammatory diseases of the face and neck depending on the type of cytokine imbalance: abstract. dis. …Dr. med. Sciences / I.A. Sidorov. – Saransk, 2012. – 23 p.
21. Tatyanchenko V.K., Bogdanov V.L., Krasenkov Yu.V., Firsov M.S. Diagnosis and results of treatment of patients with abscesses and phlegmon of soft tissues of the extremities, taking into account the assessment of the stage of development of acute tissue hypertension syndrome // Modern problems of the humanities and natural sciences. – 2015. – pp. 280–285

Восприятие временной перспективы при расстройствах шизофренического спектра

Полякова Мария Дмитриевна,
аспирант, лаборатория развития субъекта в нормальных и посттравматических состояниях, ФГБУН Институт психологии РАН
E-mail: maria2088@yandex.ru

Исследования восприятия временной перспективы являются одной из важных научных задач. Особенности восприятия времени как феномена являются одним из факторов, определяющих пространственно-временную организацию человеческой психики в целом. Для клинических психологов и психиатров представляют большой интерес вопросы о мозговом субстрате восприятия времени, о нарушениях и изменениях этой области психики при неврологических, психических и психосоматических заболеваниях, а так же прогностических возможностях его исследования с целью раннего распознавания различных аффективных, эндогенных, а так же мнестико-интеллектуальных нарушений.

Ключевые слова: временная перспектива, расстройства шизофренического спектра, психологические модели временной перспективы, шизофрения.

Введение

Вопросы отражения в психике временных отношений на протяжении длительно времени являются предметом изучения исследователей. Понятие временной перспективы было введено К. Левиным. По его мнению, временная перспектива представляет собой общий взгляд индивида на свое психологическое будущее и прошлое, которые существуют в настоящем времени.

Теоретический анализ классических и современных психологических концепций, а также эмпирических исследований позволяет рассматривать восприятие времени как психическую функцию. Она обладает системно-структурным строением и включает в себя ориентировку в текущем и прошедшем времени; оценку, меру, воспроизведение и сравнение длительности временных промежутков; понимание последовательности и одновременности разных событий; временную перспективу, подразумевающую, в частности, переживание времени как возможность эмоционального оценивания того или иного периода жизненного пути человека. Эта психическая функция тесно связана со другими психическими процессами: памятью, речью, произвольной регуляцией. Основными задачами функциональной системы восприятия времени является гармоничное развертывание психической деятельности и поведения во времени, а также обеспечение личностной целостности (20).

Существуют различные психологические подходы к рассматриваемому понятию. Мотивационный подход был основан Ж. Нюттеном, который выделял события прошлого и будущего, а также структуру временных представлений. Будущее является мотивационно-потребностной сферой, оно может быть изучено при рассмотрении взаимосвязи будущего времени и переработанной к настоящему моменту мотивации (3). В соответствии с теорией Ньюттена временная перспектива – это иерархия целей личности. Она выполняет функцию сопоставления своих возможностей и целями на будущее, что позволяет человеку функционировать, сохраняя естественный баланс. К. Левин также был представителем мотивационного подхода, им была разработана пространственно-временная модель, в рамках которой, временная перспектива включает в себя зоны субъективного настоящего, ближайшего и отдаленного прошлого и будущего (3).

Ситуационно-детерминированный подход разрабатывался Ф. Зимбардо. Временная перспектива личности – это основной аспект в построении психологического времени, которое возникает из ког-

нитивных процессов. По мнению Ф. Зимбардо, временная перспектива должна изучаться в единстве ее эмоциональной, мотивационной, когнитивной и социальной составляющих. Он выделял в структуре временной перспективы три локуса, к которым у человека складывается определенное отношение: негативное прошлое, позитивное прошлое, фаталистическое настоящее, гедонистическое настоящее, будущее.

Событийный подход разрабатывали Е.И. Головаха и А.А. Кроник. В центре внимания данного похода субъективное чувство возраста человека. Если человек живет прошлым, все его воспоминания связанны с ушедшими событиями, тогда в отношении своего возраста он ощущает себя более молодым. Если же человек нацелен на будущее, то психологический возраст увеличивается. Связи, которые устанавливаются между событиями, могут характеризовать личность в целом или же отдельный временной локус.

Типологический подход разрабатывался К.А. Абульхановой, В.И. Ковалевым, В.Ф. Серенковой. По мнению авторов данного подхода, личность может самостоятельно распоряжаться собственным временем. По мнению О.Н. Арестовой временная перспектива личности имеет многомерную структуру, которая отражает временной аспект жизни человека. Например, по мере взросления человека происходит изменение отношения к прошлому, настоящему и будущему. Происходит пересмотр своих целей, планов, ценностей, на основе чего строится новое отношение к жизни. Таким образом, вопрос относительно структуры временной перспективы рассматривался различными авторами.

Анализ существующих точек зрения позволяет выделить наиболее общую структуру временной перспективы личности, которая состоит из трех временных локусов: прошлого, настоящего и будущего, которые опосредуют друг на друга и оказывают влияние на развитие личности в настоящем моменте.

Биологическая характеристика временной перспективы

На сегодняшний день проблема временной перспективы разрабатывается в рамках разных исследований. Большое количество исследований посвящается связи данного конструкта с психическими и неврологическими расстройствами. Феномен временной перспективы обладает как биологическими, так и психологическими характеристиками, что позволяет исследовать данную проблему на междисциплинарном уровне. Специфические изменения в восприятии времени при психических расстройствах ученые связывают с морфофункциональными нарушениями ряда структур головного мозга. Это преимущественно подкорковые образования и некоторые зоны гиппокампа, которые объединяются понятием «биологические часы» (22, 23,24).

Одним из наиболее активно развивающихся направлений в изучении временной перспективы можно считать связь данного конструкта и разных психических расстройств. Из клинической практики известно, что эмоциональное отношение и когнитивная оценка своего настоящего, прошлого и будущего при разных психических состояниях меняется. До последнего времени и в психиатрии, и в клинической психологии остаются вопросы о том, каким образом различные психические расстройства, степень выраженности аффективной, галлюцинаторно-бредовой, негативной и другой симптоматики, а также личностно-типологические свойства оказывают влияние на когнитивное представление и эмоциональное переживание индивидом времени.

Хорошо известно, что следствием большинства нарушений органического генеза являются нарушения памяти и внимания, что в свою очередь оказывает значительное влияние на восприятие временной перспективы. В процессе изучения современные исследователи активно применяют все доступные методы функциональной диагностики головного мозга (ЭЭГ, МРТ, фМРТ, КТ и др.). Однако связь нарушений временной перспективы с заболеваниями аффективно-эндогенного и шизофренического регистров изучены слабо.

Ряд специалистов указывают на связь нарушений исполнительных функций (executive functions) и искаженного представления о времени при шизофрении. Так же существуют версии, предполагающие, что сенсорные нарушения при шизофрении могут выступать основным продормальным признаком заболевания. Последователи данной теории выдвигают гипотезу о том, что биологические паттерны восприятия времени могут быть основным маркером предрасположенности к развитию расстройств шизофренического спектра, а так же ключом к патофизиологии не только расстройств шизофренического регистра но и заболеваний аффективного спектра. Большинство исследований указывают на психофизиологические нарушения в биологических ритмах в ходе экспериментов по изучению восприятия времени (15, 16,17,18).

Психологическая характеристика временной перспективы

Другим направлением в изучении проблематики временной перспективы является психологический компонент данного конструкта и его влияние на когнитивно-волевую сферу психической деятельности (7,18). С точки зрения психологических научных теорий, временная перспектива – это субъективное представление человека о прошлом, настоящем и будущем. Временная перспектива является ведущим фактором в объединении индивидуального и социального опыта. Данный феномен представляет собой целостный процесс когнитивно-аффективной переработки временной информации, и этот процесс сложных когнитивно-аффективных взаимодействий может значительно меняться в ходе развития психики (19).

К примеру, доказанным является факт связи повышенного уровня личностной тревожности с психологическим восприятием времени. Для людей высоким уровнем личностной тревоги характерно негативное восприятие прошлого, а при снижении уровня тревоги отмечается повышение ориентации на будущие планы и достижения. В.Н. Дружинин указывает на значение тревоги и тревожных состояний в когнитивной сфере. Если человек стремится избавиться от ощущения тревоги, то такое стремление побуждает его к поиску путей избавления от этого ощущения, формируя различные варианты настоящего и будущего. Тревога в концепции автора предстает двигателем умственной деятельности, однако достижение результата не приводит к полному избавлению от тревоги, так как будущее в восприятии человека не исчезает, а лишь откладывается после каждого нового действия [6].

Специалисты области клинической психологии (7) видят в рамках данного феномена возможности для формирования реабилитационного потенциала у людей с расстройствами шизофренического спектра. Исследование временной перспективы представляется важным с точки зрения ее связи с эмоционально-личностной сферой, когнитивным функционированием, а также с точки зрения ее связи с саморегуляцией в контексте самосознания, роли в структурировании жизненного опыта.

Нарушения временной перспективы при расстройствах шизофренического спектра

Феномен восприятия временной перспективы при расстройствах шизофренического спектра давно интересует специалистов (5). Хорошо известно, что при разных формах и видах расстройств шизофренического спектра у человека меняется восприятие временной перспективы (5). Существуют мнения о том, что нарушения восприятия времени можно рассматривать как биологический маркер предрасположенности к развитию расстройств шизофренического спектра.

К примеру, исследование 2016 года проводилось при участии пациентов с ранней формой шизофрении (дебют заболевания до 18 лет) (7). Отмечается, что нарушения внимания и памяти являются характерным явлением при шизофрении, что так же будет связано с нарушением восприятия временной перспективы. Авторы указывают на разницу между биологическим паттерном временной перспективы и психологической моделью. В результате связи между нарушением памяти, внимания и восприятия времени не было выявлено, что позволило авторам сделать вывод о вторичной дефицитарности нарушения временной перспективы при шизофрении.

Другое исследование проводилось с участием здоровых родственников людей, страдающих шизофренией и БАР (биполярное аффективное расстройство) (8). В результате авторы выявили нарушения восприятия времени (негативная оценка будущего и прошлого, безразличное отношение к настоящему) у ближайших здоровых родственников больных шизофренией, в то время как родственники пациентов с БАР не продемонстрировали схожих с пациентами с БАР результатов. На этом основании авторы предположили, что нарушение восприятия временной перспективы может выступать индикатором предрасположенности к развитию данного спектра расстройств. Однако такой результат может носить спорный характер ввиду разных факторов. Необходимо учитывать психологического состояние родственников больных шизофренией и БАР, а также их социальный статус, уровень осведомленности и критичности к заболеванию родных.

Любопытным является исследование (12), посвященное связи динамики ежедневного социального функционирования людей с расстройствами шизофренического спектра. В исследовании приняло участие 620 респондентов с подтвержденным диагнозом расстройства шизофренического спектра. Большая часть респондентов с преобладанием дефицитарности в эмоционально-волевой сфере, и, как следствие, с наиболее низкими показателями ежедневной социальной активности, продемонстрировали негативное восприятие прошлого, равнодушное отношение к настоящему и будущему. Авторы предположили прямую связь между негативным восприятием временной перспективы и низким уровнем социальной активности, указывая на значимость психотерапевтических мероприятий по коррекции данного психологического конструкта. Авторы подчеркивают важность как групповой, так и индивидуальной психотерапии в процессах психосоциальной реабилитации.

Мета-анализ, посвященный нарушениям восприятия временной перспективы при шизофрении, подчеркивает неразрывность связи биологического и психологического компонентов данного нарушения. Авторы проанализировали существующие исследования начиная с 1980 до 2017 гг., общее количество респондентов с диагнозом шизофрения составило 957 человек, контрольной группы здоровых респондентов 1060 человек. Фокус изучения данных был сосредоточен на трех аспектах: эмоциональном восприятие времени и биологической скорости обработки заданного временного интервала, биологических и психологических маркёрах временной перспективы и качестве выполнения задач здоровыми и больными респондентами. В результате авторы пришли к выводам о недостаточной доказанности влияния шизофрении на восприятие временной перспективы несмотря на худшие показатели по всем трем аспектам по сравнению с контрольной группой. Предположительно, биологические и психологические нарушения неспецифичны для временной перспективы и могут являться частью общего когнитивно-аффективного дефицита при шизофрении.

Отечественные специалисты так же обращались к данной проблематике. К примеру, исследование, посвященное особенностям восприятия временной перспективы больными с параноидной

формой шизофрении, впервые поднимает вопрос о связи отрицательного восприятия времени и негативных симптомов. Основными выводами авторов можно считать содержательные различия в восприятии временной перспективы в зависимости от длительности заболевания, а так же значимость принципа «апелляции к личности» больного при проведении психосоциальных мероприятий. Нарушение эмоционально-волевого компонента психической деятельности является одним из ведущих нарушений данной формы шизофрении. Однако считается, что такие нарушения не сводятся только к снижению или полному угасанию эмоциональности. При заболевании происходит ее искажение, приводящее к феноменологической картине снижения эмоциональности, при которой, тем не менее, глубинные проявления эмоций остаются сохранными. В клинико-психологической картине такие нарушения характеризуются как мотивационные, что дает основания для разработки специальных психотерапевтических мероприятий, направленных на коррекцию восприятия временной перспективы.

Другое исследование, проведенное так же отечественными специалистами, указывает на связь критичности к своему состоянию и нарушением восприятия временной перспективы (14). По мнению авторов пациенты данной группы не осознают влияния психического расстройства на нарушение социальной адаптации, что оказывает существенное влияние на качество лечения, ухудшают комплаенс и ограничивают возможности реабилитации [13]. В результате авторы пришли к выводам о связи критичности к своему состоянию и положительного восприятия временной перспективы, когда пациент готов к действиям в настоящем периоде, направленным на успешное будущее несмотря на негативное отношение к прошлому.

Заключение

Проблема восприятия времени является одной из самых сложных и неразработанных в психологической науке. С.Л. Рубинштейн предлагает различать в восприятии времени составляющее его аффективную основу непосредственное ощущение длительности, а также непосредственно восприятие времени, развивающееся на этой чувственной основе (21). Восприятие времени связано с ритмичностью органических процессов и обусловлено его содержанием; оно зависит от эмоционального состояния человека, его умения оперировать соотношениями временных категорий.

Особый интерес для специалистов сегодня представляет исследование изменения восприятия времени при аффективно-эндогенных и шизофренических расстройствах. Необходимо исследовать возрастной аспект данной проблематики, который изучен крайне слабо. Биологические и психологические характеристики временной перспективы тесно связаны не только с тяжестью психического расстройства, но и с возрастом, однако исследований такого характера пока не нашлось.

Наряду с экзогенно-органическими и эндогенно-органическими расстройствами, аффективные и шизофренические являются одной из основных форм психической патологии в разном возрасте (25). Перед учеными неизбежно встает вопрос о роли временных факторов в этиологии и патогенезе данных расстройств, о месте изменений восприятия времени в структуре когнитивного дефицита у таких больных.

Понимание характера изменений восприятия времени при расстройствах аффективного и шизофренического спектра невозможно без учета как биологических, так и психологических перестроек временной перцепции. Новые исследования данной проблематики значительно расширят теоретические и практические представления как медицинского, так и психологического сообщества о возможностях не только реабилитации, но и профилактики развития расстройств аффективного и шизофренического регистра. Изучение этого вопроса актуализирует проблематику поиска биологических маркеров данных заболеваний. Так же стоит отметить, что западные специалисты активно занимаются разработкой этой проблематики, в то время как отечественных исследований такого характера практически нет, что открывает дополнительные возможности для научного сообщества.

Литература

1. Les structures rythmiques. P., 1956; Psychologie du temps. P., 1957; Восприятие и оценка времени // Экспериментальная психология / Ред. П. Фресс, Ж. Пиаже. Вып. 6. М., 1978
2. 2. Зыбина, Е.В. Современные исследования временной перспективы подростков в трудах отечественных авторов / Е.В. Зыбина. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2022. – № 16 (411). – С. 425–428. – URL: https://moluch.ru/archive/411/90533/ (дата обращения: 03.01.2024).
3. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / под ред. Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2008
4. Купчигина, И.М. Теоретические подходы к изучению структуры временной перспективы в психолого-педагогических исследованиях / И.М. Купчигина, К.М. Недбаева. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2017. – № 48 (182). – С. 156–158. – URL: https://moluch.ru/archive/182/46852/ (дата обращения: 03.01.2024).
5. M. de Montalembert, N. Coulon, D. Cohen, O. Bonnot & S. Tordjman (2016): Time perception of simultaneous and sequential events in early-onset schizophrenia, Neurocase, DOI: 10.1080/13554794.2016.1205098
6. Захарова А.Ю., Трусова А.В. Временная перспектива личности при аффективных расстройствах: обзор научных исследований. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2019; 16 (3): 435–450.

7. M. de Montalembert, N. Coulon, D. Cohen, O. Bonnot & S. Tordjman (2016) Time perception of simultaneous and sequential events in early-onset schizophrenia, Neurocase, 22:4, 392–399, DOI: 10.1080/13554794.2016.1205098
8. Trevor B. Penney, Warren H. Meck, Simone A. Roberts, John Gibbon, L. Erlenmeyer-Kimling, Interval-timing deficits in individuals at high risk for schizophrenia, Brain and Cognition, Volume 58, Issue 1, 2005, Pages 109–118, ISSN 0278-2626, https://doi.org/10.1016/j.bandc.2004.09.012.
9. Bear, A., Fortgang, R.G., Bronstein, M.V., Cannon, T.D., 2017. Mistiming of thought and perception predicts delusionality. Proc. Natl. Acad. Sci. 114 (40), 10791–10796. https://doi.org/10.1073/pnas.1711383114.
10. Graham-Schmidt, K.T., Martin-Iverson, M.T., Holmes, N.P., Waters, F.A.V., 2016. When one's sense of agency goes wrong: absent modulation of time perception by voluntary actions and reduction of perceived length of intervals in passivity symptoms in schizophrenia. Conscious. Cogn. 45, 9–23. https://doi.org/10.1016/j.concog.2016.
11. Giersch, A., Lalanne, L., Isope, P., 2016. Implicit timing as the missing link between neurobiological and self disorders in schizophrenia? Front. Hum. Neurosci. 10, 303. https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00303.
12. Thomas Hinault, Arnaud D'Argembeau, Dermot M. Bowler, Valentina La Corte, Pierre Desaunay, Joelle Provasi, Hervé Platel, Jessica Tran The, Laura Charretier, Anne Giersch, Sylvie Droit-Volet, Time processing in neurological and psychiatric conditions, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 154, 2023, 105430, ISSN 0149-7634, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105430.
13. Коваленко С.Р. Нарушения осознания психического расстройства: взаимосвязь с личностной самооценкой и мотивационной сферой. Журнал психиатрии и медицинской психологии. 2019; 3 (47): 42–52.
14. Коваленко С.Р. Временная перспектива и ее влияние на принятие психического расстройства у пациентов с параноидной шизофренией Журнал психиатрии и медицинской психологии № 4 (48), 2019 УДК 616.895.8:159.922:316.61
15. Coelho S, de Mendonça A, Maroco J, Cardoso S, Mello Z, Guerreiro M. Time perspective and amnestic mild cognitive impairment. J Neuropsychol. 2022 Sep;16(3):463–480. doi: 10.1111/jnp.12274. Epub 2022 Feb 16. PMID: 35174621.
16. Paasche C, Weibel S, Wittmann M, Lalanne L. Time perception and impulsivity: A proposed relationship in addictive disorders. Neurosci Biobehav Rev. 2019 Nov;106:182–201. doi: 10.1016/j.neubiorev.2018.12.006. Epub 2018 Dec 6. PMID: 30529361.
17. Teixeira S, Machado S, Paes F, Velasques B, Silva JG, Sanfim AL, Minc D, Anghinah R, Menegaldo LL, Salama M, Cagy M, Nardi AE, Pöppel E, Bao Y, Szelag E, Ribeiro P, Arias-Carrión O. Time perception distortion in neuropsychiatric and neurological disorders. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2013 Aug;12(5):567–82. doi: 10.2174/1871527311312999008 0. PMID: 23844680.
18. Juckel G, Steinfath H, Mavrogiorgou P. Störungen der Erfahrung von Zeit bei psychischen Erkrankungen [Disturbances of time experience in mental disorders]. Nervenarzt. 2022 Jan;93(1):68–76. German. doi: 10.1007/s00115-020-01047-z. Epub 2021 Jan 5. PMID: 33403445.
19. Микеладзе Лика Игоревна Временная перспектива при нормальном и патологическом старении: теория витаукта // Вестник СПбГУ. Серия 16: Психология. Педагогика. 2016. № 3.
20. Балашова Е.Ю. Восприятие времени и некоторые методические возможности его изучения в клинико-психологических исследованиях [Электронный ресурс] // Клиническая и специальная психология. 2017. Том 6. № 2. С. 97–108. doi: 10.17759/psyclin.2017060208
21. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб: Питер, 2003.
22. Halberg F. Some physiological and clinical aspects of 24-hour periodicity // Lancet. 1953. N 73. P. 20–32.
23. Massart R, Mongeau R, Lanfumey L. Beyond the monoaminergic hypothesis: neuroplasticity and epigenetic changes in a transgenic mouse model of depression // Philosophical Transactions of the Royal Society. 2012. V. 367(1601). P. 2485–2494.
24. Murray G., Harvey A. Circadian rhythms and sleep in bipolar disorder // Bipolar disorders. 2010. V. 12(5). P. 459–472.
25. Тиганов А.С., Снежневский А.В., Орловская Д.Д. и др. Руководство по психиатрии / Под ред. А.С. Тиганова, М.: Медицина, 1999.

TIME PERSPECTIVE PERCEPTION IN SCHIZOPHRENIA SPECTRUM DISORDERS

Polyakova M.D.
Institute of Psychology Russian Academy of Sciences

Research on the perception of time perspective is one of the important scientific tasks. Features of the perception of time as a phenomenon are one of the factors that determine the spatio-temporal organization of the human psyche as a whole. For clinical psychologists and psychiatrists, questions about the brain substrate of time perception, disorders and changes in this area of the psyche in neurological, mental and psychosomatic diseases, as well as the prognostic possibilities of its study for the purpose of early recognition of various affective, endogenous, and mnestic factors are of great interest. -intellectual impairments.

Keywords: time perspective, schizophrenia spectrum disorders, psychological models of time perspective, schizophrenia

References

1. Les structures rythmiques. P., 1956; Psychology du temps. P., 1957; Perception and assessment of time // Experimental psychology / Ed.P. Fresse, J. Piaget. Vol. 6. M., 1978
2. 2. Zybina, E.V. Modern studies of the time perspective of adolescents in the works of domestic authors / E.V. Zybina. – Text: immediate // Young scientist. – 2022. – No. 16 (411). – P. 425–428. – URL: https://moluch.ru/archive/411/90533/ (access date: 01/03/2024).
3. Nytten J. Motivation, action and future prospects / ed. D.A. Leontieva. – M.: Smysl, 2008

4. Kupchigina, I.M. Theoretical approaches to the study of the structure of time perspective in psychological and pedagogical research / I.M. Kupchigina, K.M. Nedbaeva. – Text: immediate // Young scientist. – 2017. – No. 48 (182). – pp. 156–158. – URL: https://moluch.ru/archive/182/46852/ (access date: 01/03/2024).
5. M. de Montalembert, N. Coulon, D. Cohen, O. Bonnot & S. Tordjman (2016): Time perception of simultaneous and sequential events in early-onset schizophrenia, Neurocase, DOI: 10.1080/13554794.2016.1205098
6. Zakharova A.Yu., Trusova A.V. Temporal perspective of personality in mood disorders: A review of research studies. Bulletin of RUDN University. Series: Psychology and pedagogy. 2019; 16 (3): 435–450.
7. M. de Montalembert, N. Coulon, D. Cohen, O. Bonnot & S. Tordjman (2016) Time perception of simultaneous and sequential events in early-onset schizophrenia, Neurocase, 22:4, 392–399, DOI: 10.1080/13554794.2016.1205098
8. Trevor B. Penney, Warren H. Meck, Simone A. Roberts, John Gibbon, L. Erlenmeyer-Kimling, Interval-timing deficits in individuals at high risk for schizophrenia, Brain and Cognition, Volume 58, Issue 1, 2005, Pages 109–118, ISSN 0278-2626, https://doi.org/10.1016/j.bandc.2004.09.012.
9. Bear, A., Fortgang, R.G., Bronstein, M.V., Cannon, T.D., 2017. Mistiming of thought and perception predicts delusionality. Proc. Natl. Acad. Sci. 114(40), 10791–10796. https://doi.org/10.1073/pnas.1711383114.
10. Graham-Schmidt, K.T., Martin-Iverson, M.T., Holmes, N.P., Waters, F.A.V., 2016. When one's sense of agency goes wrong: absent modulation of time perception by voluntary actions and reduction of perceived length of intervals in passivity symptoms in schizophrenia. Conscious. Cogn. 45, 9–23. https://doi.org/10.1016/j.concog.2016.
11. Giersch, A., Lalanne, L., Isope, P., 2016. Implicit timing as the missing link between neurobiological and self disorders in schizophrenia? Front. Hum. Neurosci. 10, 303. https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00303.
12. Thomas Hinault, Arnaud D'Argembeau, Dermot M. Bowler, Valentina La Corte, Pierre Desaunay, Joelle Provasi, Hervé Platel, Jessica Tran The, Laura Charretier, Anne Giersch, Sylvie Droit-Volet, Time processing in neurological and psychiatric conditions, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 154, 2023, 105430, ISSN 0149-7634, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105430.
13. Kovalenko S.R. Impaired awareness of mental disorder: relationship with personal self-esteem and motivational sphere. Journal of Psychiatry and Medical Psychology. 2019; 3 (47): 42–52.
14. Kovalenko S.R. Time perspective and its impact on the acceptance of mental disorder in patients with paranoid schizophrenia Journal of Psychiatry and Medical Psychology No. 4 (48), 2019 UDC 616.895.8:159.922:316.61
15. Coelho S, de Mendonça A, Maroco J, Cardoso S, Mello Z, Guerreiro M. Time perspective and amnestic mild cognitive impairment. J Neuropsychol. 2022 Sep;16(3):463–480. doi: 10.1111/jnp.12274. Epub 2022 Feb 16. PMID: 35174621.
16. Paasche C, Weibel S, Wittmann M, Lalanne L. Time perception and impulsivity: A proposed relationship in addictive disorders. Neurosci Biobehav Rev. 2019 Nov;106:182–201. doi: 10.1016/j.neubiorev.2018.12.006. Epub 2018 Dec 6. PMID: 30529361.
17. Teixeira S, Machado S, Paes F, Velasques B, Silva JG, Sanfim AL, Minc D, Anghinah R, Menegaldo LL, Salama M, Cagy M, Nardi AE, Pöppel E, Bao Y, Szelag E, Ribeiro P, Arias-Carrión O. Time perception distortion in neuropsychiatric and neurological disorders. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2013 Aug;12(5):567–82. doi: 10.2174/18715273113129990080. PMID: 23844680.
18. Juckel G, Steinfath H, Mavrogiorgou P. Störungen der Erfahrung von Zeit bei psychischen Erkrankungen [Disturbances of time experience in mental disorders]. Nervenarzt. 2022 Jan;93(1):68–76. German. doi: 10.1007/s00115-020-01047-z. Epub 2021 Jan 5. PMID: 33403445.
19. Mikeladze Lika Igorevna Time perspective in normal and pathological aging: vitaukt theory // Bulletin of St. Petersburg State University. Episode 16: Psychology. Pedagogy. 2016. No. 3.
20. Balashova E. Yu. Perception of time and some methodological possibilities for its study in clinical psychological research [Electronic resource] // Clinical and special psychology. 2017. Volume 6. No. 2. pp. 97–108. doi: 10.17759/psyclin.2017060208
21. Rubinshtein S.L. Being and consciousness. Man and the world. St. Petersburg: Peter, 2003.
22. Halberg F. Some physiological and clinical aspects of 24-h our periodicity // Lancet. 1953. N 73. P. 20–32.
23. Massart R, Mongeau R, Lanfumey L. Beyond the monoaminergic hypothesis: neuroplasticity and epigenetic changes in a transgenic mouse model of depression // Philosophical Transactions of the Royal Society. 2012. V. 367(1601). P. 2485–2494.
24. Murray G., Harvey A. Circadian rhythms and sleep in bipolar disorder // Bipolar disorders. 2010. V. 12(5). P. 459–472.
25. Tiganov A.S., Snezhnevsky A.V., Orlovskaya D.D. and others. Guide to psychiatry / Ed. A.S. Tiganova, M.: Medicine, 1999.

Церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с подкорковыми инфарктами и лейкоэнцефалопатией

Малкова Алла Аркадьевна,
к.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава РФ; врач-невролог, первая республиканская клиническая больница
E-mail: alla2597@mail.ru

Башмаков Александр Борисович,
к.м.н., доцент кафедры патологической анатомии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава РФ
E-mail: kirnik@list.ru

Шкаликова Яна Витальевна,
студент лечебного факультета ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава РФ
E-mail: yashkalikova@mail.ru

Короткова Христина Денисовна,
студент лечебного факультета ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава РФ
E-mail: korotkova.khristina@gmail.com

Ситдикова Ксения Сергеевна,
студент лечебного факультета ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава РФ
E-mail: sitdikova.ks@mail.ru

Церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией – синдром ЦАДАСИЛ представляет собой врожденное заболевание сосудов малого калибра, протекающее с повторными лакунарными инсультами, приводящее к постепенно нарастающим подкорковым, псевдобульбарным, мозжечковым синдромам и деменции. При нейровизуализации выявляются множественные лакунарные инфаркты в базальных ганглиях, таламусе, варолиевом мосту и белом веществе полушарий мозга, а также атрофия головного мозга. Особенностью заболевания является поражение белого вещества вблизи височных рогов боковых желудочков и наружных капсул. В статье приводится описание пациента с ЦАДАСИЛ-синдромом. Клиническая картина ЦАДАСИЛ имеет прогрессирующее течение и включает следующие неврологические расстройства: когнитивные, пирамидные, экстрапирамидные и аксиальные. ЦАДАСИЛ-синдром – редкое, потенциально опасное неврологическое состояние, которое наблюдается у пациентов молодого возраста и требует детального обследования с применением современных методов диагностики. Частота встречаемости 1 случай на 100 тыс. населения, болеют как мужчины, так и женщины. На сегодняшний день с данным синдромом выявлено около 500 семей.

Ключевые слова: Цадасил, мигрень, магнитно-резонансная томография, биопсия кожи, гиперинтенсивность белого вещества, клинический случай.

Актуальность

Церебральная микроваскулопатия (ЦМВП) – термин, который используется для характеристики разнообразных патологических состояний, вызывающих повреждение мельчайших сосудов и капилляров серого и белого вещества ГМ, а также для описания клинико-морфологических, патологических и нейровизуализационных явлений. На МРТ ЦМВП проявляется ГЭБ, субкортикальным инфарктом, (ОЛ), микроинфарктом головного мозга (МГМ), расширением ПВП, внутримозговым микрокровоизлиянием, лакунами. L. Pantoni выделил спорадический ЦБМС 1-го типа, зависящий от возрастных изменений и факторов сердечно-сосудистого риска, наследственный ЦБМС 3-го типа, включающий в себя CADASIL, MELAS, CARASIL. Особенно распространенный вариант ЦБМС это CADASIL, в основе которого лежат изменения гена NOTCH3 в коротком плече 19 хромосомы. CADASIL выявляется у 2–5 человек на 100 000 населения; CADASIL вызывает 2% случаев лакунарных инсультов у пациентов в возрасте до 65 лет при наличии артериальной гипертензии, в то время как моногенные нарушения составляют приблизительно 5% всех случаев инсульта в целом.

Симптоматика синдрома CADASIL включает в себя мигрень с аурой, повторяющиеся субкортикальные ишемии, циклотимию, прогрессивную энцефалопатию и когнитивные нарушения. Головная боль чаще всего является первым проявлением у 50–70% пациентов, причем у 85% из них она сопровождается аурой. У пациентов аура может быть различного типа – сенсорная, моторная и зрительная. Атипичная аура, включающая зрительные симптомы, желудочно-кишечные расстройства и дизартрию, встречается у 58% пациентов, а у 20% аура проявляется без острой головной боли.

Переходные ишемические инсульты возникают у 85% пациентов в возрасте 45–50 лет. Симптомы ишемических атак соответствуют классическому лакунарному синдрому. Грубые поражения, вызванные лакунами, могут проявляться клинически или оставаться бессимптомными, и способны вызвать нарушения походки, тазовые дисфункции, псевдобульбарный паралич и СН. Острая энцефалопатия отмечается у 10% пациентов с CADASIL, чаще всего в качестве первого проявления заболевания в среднем в возрасте 42 лет. Энцефалопатия обычно развивается после приступа мигрени и сопровождается симптомами путаницы в сознании, депрессии, судорогами, и рассеивается самостоятельно.

Цель исследования – описать клинический случай синдрома Цадасил в Удмуртской Республике.

Материалы и методы

Проведён ретроспективный анализ истории болезни пациента с Цадасил – синдромом (стационарное лечение в неврологическом отделении БУЗ УР «1 РКБ» МЗ УР.

Пациентка *А*., 17 лет. Жалобы на головную боль, головокружение и боли в области сердца. Головная боль ежедневная в лобно-височной области, с фонофобией и фотофобией, в середине дня, сопровождается тошнотой. Боли в области сердца колющего характера, купируются приемом парацетамола, иногда усиливаются после физической нагрузке и к вечеру. Наблюдалась у невролога с диагнозом: вегетососудистая дистония.

Росла и развивалась по возрасту. Перенесенные заболевания: ОРВИ, ветряная оспа, ЖДА. Наследственность: со стороны отца: у сестры отца – порок сердца, брат матери отца – внезапная смерть, у бабушки со стороны матери – ИБС.

3 года назад проходила обследование у кардиолога с диагнозом: кардиалгия, цефалгический синдром. На момент осмотра состояние удовлетворительное. Самочувствие средней степени тяжести за счет выраженного болевого синдрома. Положение активное, отмечает головокружение при изменении положения тела. Температура тела в норме. Кожные покровы чистые, физиологической окраски, сыпи нет. В ротоглотке катаральных явлений нет, слизистые чистые. Носовое дыхание свободное. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД 20 в мин. Тоны сердца приглушенные, ритмичные, ЧСС 88 в мин. АД 134/89 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Поясничная область при осмотре не изменена, симптом поколачивания отрицательный. Видимых отеков нет. Стул оформленный, регулярный, мочеиспускание не нарушено. ЭХО-КГ: систолическая функция ЛЖ удовлетворительная. Камеры сердца не увеличены. Клапанный аппарат без особенностей. ЭКГ: ритм синусовый, ЭОС вертикальная, ЧСС 81 в мин. ХМ-ЭКГ: В течение всего времени наблюдения регистрируется синусовый ритм с ЧСС от 65 до 154 в мин (средняя днем – 99 в мин, ночью – 95 в мин). На фоне данного ритма зарегистрирована 1 одиночная наджелудочковая эктрасистола. Циркадный индекс снижен. Диагностически значимых изменений ST не выявлено. При обследовании: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови – без патологии.

Консультирована врачом – офтальмологом 30.11.2021. Местный статус VOD=1.0. VOS=1.0 Положение глаз правильное. ОИ-спокойные, среды прозрачные, границы четкие, сосуды среднего калибра, очаговой патологии не выявлено. Заключение: без патологи.

Консультирована врачом – неврологом. Неврологический осмотр: Сознание: сохранено. Ориентация во времени, месте в норме. Концентрация внимания не нарушена. Поведение на момент осмотра спокойное. Речь-без патологии. Череп округлой формы, симметричный. ЧМН-норма. Грудинно-ключично-сосцевидные мышцы-норма. Активные движения при поворотах головы. Кривошеи нет. Активные движения в полном объеме. Мышечный тонус-удовлетворительный, D=S. Трофика мышц в норме. Пассивные движения в норме. Мышечная сила: 5б. СЖР-удовлетворительное, D=S. Патологические рефлексы-нет. Походка-без патологии. Гиперкинезы-нет. Координация движений-в позе Ромберга устойчив. Акроцианоза нет. Потоотделение в норме. Дермографизм красный. Менингеальные атаки отрицательные. Диагноз: мигрень неуточненная.

УЗИ органов брюшной полости от 30.11.2021. Заключение: УЗП диффузных изменений паренхимы поджелудочной железы. Деформация желчного пузыря.

УЗИ мочевыводящих путей от 30.11.2021: без патологии

УЗИ щитовидной железы от 30.11.2021. Заключение: ДУЩЖ (диффузно-токсический зоб щитовидной железы)

УЗИ надпочечников от 30.11.2021: без патологии.

ЭКГ с физической нагрузкой от 30.11.2021. Заключение: феномен укороченного P-Q интервала

ЭХО-КГ от 01.12.2021: без патологии.

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (01.12.2021). За время исследования, продолжительностью 23ч: 14мин, регистрируется основной синусовый ритм, все средние показатели ЧСС е пределах возрастной нормы. Наджелудочковая эктопическая активность: зарегистрированы 2 одиночные НЖЭС.

Суточное мониторирование АД от 03.12.2021. Заключение: изолированная систолическая АГ в ночное время с повышением нагрузки САД. Среднее ПАД в течение суток в норме.

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (03.12.2021): Заключение: Корковая ритмика сформирована по возрасту. Патологических форм активности не выявлено

УЗИ Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (03.12.2021): Заключение: S-образная деформация левой ВСА с нарушением локальной гемодинамики.

УЗИ Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (03.12.2021): Скоростные показатели по ОА и ПА на интракраниальном уровне в пределах возрастной нормы. Индексы, характеризующие уровень сосудистого сопротивления в исследованных бассейнах соответствуют возрастной норме. Интракраниальный венозный кровоток не нарушен.

18.01.2022 выполнено МРТ:

На серии МР-томограмм, взвешенных по T1, T2 (в том числе Tirm) и DWI в трёх проекциях, визуализированы суб- и супратенториальные структуры. В сравнении с МРТ ГМ от 18.01.2022 г. №21671 без динамики. Срединные структуры не смещены. Данных за наличие участков ограничения диффузии в веществе головного мозга на момент исследова-

ния не выявлено. В правой гемисфере мозжечка, левой лобной доле, субкортикально, и в области дорзальных отделов скорлупы слева сохраняются постишемические лакунарные кисты с умеренным перифокальным глиозом, максимальными размерами 5*10*10мм, без динамики от 18.01.2022 г. В белом веществе левой лобной доли, субкортикально, сохраняются единичные очаги глиоза /гиперинтенсивные по Т2, Tirm, изоинтенсивные по Т1/ без перифокальной инфильтрации, размером до 3мм. Боковые желудочки мозга симметричны, не расширены, размеры в пределах возрастной нормометрии, обычной конфигурации, без _перивентрикулярной инфильтрации. III-й желудочек не расширен (до 3мм). IV-й желудочек не расширен, не деформирован. Орбиты без особенностей, данных за наличие явных патологических структурных изменений, достоверно выявленных очагов патологического изменения МР-сигнала в их проекции не выявлено. Хиазмальная область без особенностей, гипофиз в размерах не увеличен, ткань гипофиза имеет обычный сигнал. Хиазмальная цистерна не изменена. Воронка гипофиза не смещена.

МР признаки единичных лакунарных кист в правой гемисфере мозжечка, левой лобной доли в области дорзальных отделов скорлупы головного мозга слева (посттравматического постишемического? генеза /необходим контроль о динамике для исключения CADASIL синдрома/). МР картина единичных очагов измененного сигнала в левой лобной доле (более специфично для изменений сосудистого-резидуального генеза).

06.02.2023 Заключение: МР картина единичных лакунарных кист и очагов глиоза правой гемисфере мозжечка, левой лобной доле, без динамики от 18.01 2022 г., более вероятно резидуального генеза.

Осмотрена врачом генетиком 06.04.2023. (табл. 1).

Таблица 1. Генетическое обследование на обнаружение мутация в гене NOTCH3.

Название теста	Референтные значения	Результат теста
Генетическое обследование на обнаружение мутация в гене NOTCH3 при церебральной аутосомно-доминантной артериопатии с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией (ЦАДАСИЛ). Исследование экзонов 2–6 и 11.	Патогенных вариантов в экзонах 2–6 и 11 гена NOTCH3 обнаружено не было.	Патогенных вариантов в экзонах 2–6 и 11 гена NOTCH3 обнаружено не было.

У пациента не обнаружено патогенных вариантов в экзонах 2–6 и 11 гена NOTCH3. Отсутствие генетических аберраций в экзонах 2–6 и 11 не исключает диагноз ЦАДАСИЛ.

Неврологический статус: МоСа тест (Монреальская шкала оценки когнитивных функций) = 22 балла. Слабость конвергенции с обеих сторон установочный нистагм. Сухожильные и периостальные рефлексы с верхних и нижних конечностей живые, равномерные. Координаторных нарушений нет. Походка не изменена. Диагноз: Поражение головного мозга неуточненное. Подозрение на CADASIL-синдром (клинически и по данным МРТ головного мозга)

07.09.2023 Электроэцефалографическое обследование. Заключение: Эпи – активность не выявлена. Преходящее замедление биоэлектрической активности в передних отведениях слева веротяно на фоне метаболических нарушений.

Биопсия кожи от июня 2023 года. Окраски: Гематоксилин-эозин. Прикрофуксин и Шик-реакция. иммуногистохимия на Коллаген. В исследуемых образцах кожи выявлены дегенеративные изменения гладких мышц мелких сосудов, выраженное утолщение срединной оболочки, вследствие пролиферации компонентов базальной мембраны, местами наблюдаются ШИК – положительные дистазорезистентные эозинофильные массы. Иммуногистохимически выявляется в тех же сосудах дермы кожи утолщение и неравномерная конденсация коллагена 4. В дерме исследуемых образцов наблюдается невыраженная воспалительная реакция со стороны лимфоцитов и гистиоцитов, отечный компонент и расширение сосудов среднего калибра. Выраженный паракератоз, истончение мальпигиева слоя и гидропическая дистрофия клеток базального слоя, местами выявляется клеточный детрит и тонкие новообразованные коллагеновые волокна. Заключение: гистокартина не исключает наличие аутоиммунного заболевания соединительной ткани.

Обсуждение

Дифференциальная диагностика Цадасил определяется различными факторами. Сложным является период в течение 20 лет, когда человек, являющийся носителем мутации, испытывает только головную боль с аурой. В различные этапы развития заболевания синдром проявляется через разнообразные симптомы: на третьем десятилетии – головная боль с аурой, на четвертом – рассеянный склероз, на пятом – скрывающийся за ЛИ и лейкоэнцефалопатией, затем он скрывается в клинике сосудистой деменции. Усложняется обследование из-за нетипичных форм, например, основной симптом (мигрень) отсутствует, семейная история неизвестна или МРТ показывает необычные результаты.

Для диагностики Цадасил используется МРТ, которая обнаруживает изменения в белом веществе. Характерный признак для Цадасил – гиперинтенсивность белого вещества в передних сегментах височных долей, внешних капсул и верхней лобной извилины.

Кроме того, гиперинтенсивность белого вещества может иметь комбинацию трех региональных паттернов: первый проявляется с возрастом и напоминает спорадический цереброваскулярный инцидент; второй проявляется у больных с тяжелым

прогрессированием болезни, с отложением гиперинтенсивных сигналов в пирамидальном тракте и малых щипцах, происходит в результате вторичной дегенерации; третий проявляется с отложением гиперинтенсивных сигналов в передней части височной доли и верхней извилине. Гиперинтенсивность белого вещества проявляется в бессимптомную стадию Цадасил у носителей мутации в возрасте 25 лет.

По МРТ в клиническом случае мы видим, что пациент А. имеет типичные признаки третьего паттерна.

С помощью МРТ выявлено поражение коры, включая центросоматическую кору ГМ и отек миелина. Согласно диффузионно-тензорной МРТ, Цадасил характеризуется изменениями в белом веществе на FLAIR, включая уменьшение фракционной анизотропии и увеличение средней диффузии.

Патоморфологически накапливается осмофильный грануляционный материал в сосудах малого и среднего калибра, который состоит из эктодоменов NOTCH-3. Материал также накапливается в коже и мышцах.

Уникальность данного клинического случая заключается в заборе биопсии кожи и изучении биоптата морфологически.

Генетическое тестирование является ключевым методом идентификации Цадасил, и одним из основных способов обоснования диагноза является секвенирование экзонов NOTCH-3 EGFR. Ген кодирует трансмембранный рецепторный белок, экспрессируемый в клетках гладкой мускулатуры сосудов. Изучено около 200 мутаций NOTCH-3, связанные с увеличением повторов цистеина, которые приводят к скоплению экстратаксонныхдоменов NOTCH-3.

Сейчас не разработано лечение Цадасил. Купирование головной боли и эмоциональных расстройств у больных с Цадасил проводится на основании общепринятых рекомендаций. Предполагаемая продолжительность жизни больных с Цадасил 65 лет для мужского пола и 71 год для женского пола. Пациентов регулярно наблюдаются у невролога и психиатра для оценки возможного прогноза.

Выводы

В данном клиническом случае у пациентки была показана клиническая картина и диагностика для постановки диагноза Цадасил с проведением биопсии кожи, что позволило своевременно начать терапию, избежать серьезных осложнений и восстановить качество жизни пациентки.

Литература

1. Синдром CADASIL: дифференциальная диагностика с рассеянным склерозом/ И.Ю. Данченко и соавт.// Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – № 10.
2. Кулеш А.А., Дробаха В.Е., Шестаков В.В. Церебральная спорадическая неамилоидная микроангиопатия: патогенез, диагностика и особенности лечебной тактики. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2019;
3. Шива А. Распространенные клинические и визуализированные состояния, ошибочно диагностированные как рассеянный склероз: современный подход к дифференциальной диагностике рассеянного склероза. Нейрол Клин. 2018 год; 36(1):69–117.
4. Дюшенэ Э., ХаджСелем Ф., Де Гио Ф., Дюбуа М., Манжен Дж.Ф., Дюринг М., Ропеле С., Шмидт Р., Дихганс М., Шабриа Х., Жуван Э. Различные типы гиперинтенсивности белого вещества в CADASIL. Передний Нейрол. 2018;9:526.

CEREBRAL AUTOSOMAL DOMINANT ARTERIOPATHY WITH SUBCORTICAL INFARCTS AND LEUKOENCEPHALOPATHY

Malkova A.A., Bashmakov A.B., Shkalikova Ya.V., Korotkova Kh.D., Sitdikova K.S.

Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation

Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarctions and leukoencephalopathy – CADASIL syndrome is a congenital disease of small-caliber vessels, occurring with repeated lacunar strokes, leading to gradually increasing subcortical, pseudobulbar, cerebellar syndromes and dementia. Neuroimaging reveals multiple lacunar infarcts in the basal ganglia, thalamus, pons, and white matter of the cerebral hemispheres, as well as cerebral atrophy. A feature of the disease is damage to the white matter near the temporal horns of the lateral ventricles and external capsules. The article describes a patient with CADASIL syndrome. The clinical picture of CADASIL has a progressive course and includes the following neurological disorders: cognitive, pyramidal, extrapyramidal and axial. CADASIL syndrome is a rare, potentially dangerous neurological condition that occurs in young patients and requires a detailed examination using modern diagnostic methods. The incidence rate is 1 case per 100 thousand population, both men and women are affected. To date, about 500 families have been identified with this syndrome.

Keywords: Tsadasil, migren', magnitno-rezonansnaya tomografiya, biopsiya kozhi, giperintensivnost' belogo veshchestva, klinicheskiy sluchay.

References

1. CADASIL syndrome: differential diagnosis with multiple sclerosis / I. Yu. Danchenko et al. // Journal of Neurology and Psychiatry named after. S.S. Korsakov. – 2019. – No. 10.
2. Kulesh A.A., Drobakha V.E., Shestakov V.V. Cerebral sporadic non-amyloid microangiopathy: pathogenesis, diagnosis and features of treatment tactics. Neurology, neuropsychiatry, psychosomatics. 2019.
3. Siva A. Common Clinical and Imaging Conditions Misdiagnosed as Multi- ple Sclerosis: A Current Approach to the Differential Diagnosis of Multiple Sclerosis. Neurol Clin. 2018; 36(1):69–117.
4. Duchesnay E, HadjSelem F, De Guio F, Dubois M, Mangin JF, Duering M, Ropele S, Schmidt R, Dichgans M, Chabriat H, Jouvent E. Different Types of White Matter Hyperintensities in CADASIL. Front Neurol. 2018;9:526.

Взаимосвязь гормонов жировой ткани с маркерами дисфункции эндотелия при коморбидном течении хронической обструктивной болезни легких и метаболического синдрома

Танченко Ольга Анатольевна,
к.м.н., доцент, кафедра факультетской и поликлинической терапии, ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России (город Благовещенск)
E-mail: tamaninao@gmail.com

Нарышкина Светлана Владимировна,
д.м.н., профессор, кафедра факультетской и поликлинической терапии, ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России (город Благовещенск)
E-mail: tamaninao@gmail.com

Гончарова Ольга Михайловна,
к.м.н., кафедра факультетской и поликлинической терапии, ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» Минздрава России (город Благовещенск)
E-mai: tamaninao@gmail.com

Проблема сочетанного течения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и метаболического синдрома является дискутабельной.
Цель. Изучить влияние адипокинов на особенности клинического течения ХОБЛ и метаболического синдрома. *Материалы и методы.* 1 группу составили 49 больных с ХОБЛ и метаболическим синдромом и 2 группу – 44 пациента с изолированным течением ХОБЛ. Всем пациентам проводилось определение адипокинов (лептина, адипонектина, резистина) и интерлейкинов иммуноферментным методом, спирометрия, изучалась физическая адаптация. Пациенты заполняли валидизированная анкету COPD AssessmentTest (CAT).
Результаты. У пациентов 1-й группы выявлено достоверное увеличение количества обострений ХОБЛ, ухудшение скоростных показателей спирограммы, снижение объёмных параметров функции легких. Наблюдалось увеличение показателей цитокинового профиля у пациентов 1-й группы: интерлейкина (ИЛ)-6, ИЛ-8, эндотелина-1 (ЭТ-1). Нами выявлены достоверные математические взаимосвязи между лептином, индексом абдоминальном ожирения и маркером эндотелиальной дисфункции – избыточной жесткости артериальной стенки. *Заключение.* Лептин, адипонектин патогенетически неблагоприятно влияют на клинико-лабораторное течение ХОБЛ, что требует учета при своевременной диагностике и коррекции данной сочетанной патологии.

Ключевые слова: спирометрия, метаболический синдром, адипокины, ригидность.

Среди ведущих причин заболеваемости и смертности ХОБЛ занимает лидирующее положение. Высокая частота коморбидности ХОБЛ и патологии сердечно-сосудистой системы придает актуальность изучению патогенетических особенностей прогрессирования данной патологии. ХОБЛ многофакторное заболевание, отличающееся различными фенотипами и особенностями клинического течения. На сегодняшний день ХОБЛ ассоциируется со значительными социально-экономическими потерями для системы здравоохранения и общества. ХОБЛ занимает лидирующее третье место в мире среди причин смерти (3-е место) и пятое место среди установленных причин инвалидности [1, 2, 5]. Распространенность висцерального ожирения у пациентов с ХОБЛ может достигать 50% и патогенетически связана с ним [1, 4]. В настоящее время абдоминальное ожирение приобретает масштабы всемирной эпидемии, и это огромная проблема как для пациентов, так и для социума в целом. Установлено, что число пациентов с выявленным ожирением в современном мире увеличивается на 10% каждое десятилетие [2, 5]. Проведенные многоцентровые научные исследования позволили настоящее время расширить знания о взаимосвязи недостаточности витамина D и повышенных рисках развития эндокринных, онкологических, аутоиммунных, кардиологических, инфекционных, неврологических заболеваний. По данным мировых клинико-эпидемиологических исследований от 50 до 100% взрослого населения имеют низкие уровни 25 (OH) D. Таким образом, коррекцию дефицита витамина D можно рассматривать в качестве метода профилактики хронических метаболических, сосудистых, неврологических и инфекционных заболеваний. Висцеральный жир, является активным эндокринным органом и способен оказывать самостоятельное влияние на процессы ангиогенеза и атеросклероза [3, 4]. Ключевым звеном связывающим ХОБЛ и абдоминальное ожирение является развитие системного воспаления. Лептин является основным медиатором воспаления при ожирении. Известно, что адипонектин при висцеральном ожирении обладает противовоспалительным и кардиопротективным эффектами, способствующими снижению инсулинорезистентности. Но данные эффекты не изучались у пациентов при коморбидном течении ХОБЛ. Доказано, что вазоактивная функция эндотелия у пациентов с ХОБЛ нарушена вследствие воздействия табачного дыма, оксидативного стресса, хронического воспалительного процесса на капиллярную сеть бронхолегочной системы [3,

5]. Известным маркером дисфункции эндотелия сосудистой стенки при ХОБЛ является повышенная сосудистая жесткость стенки артерии. Доказано, что артериальная жесткость является предиктом сердечно-сосудистых событий.

Цель

Цель исследования: изучить влияние адипокинов (лептина, адипонектина, резистина) на особенности клиническо-функционального течения ХОБЛ и метаболического синдрома и их взаимосвязь с показателями артериальной ригидности.

Материалы и методы исследования

В исследование включено 93 пациента ХОБЛ группы В (GOLD, 2021), которые были разделены на две группы. 1-я группа включала 49 пациентов ХОБЛ в сочетании с метаболическим синдромом. Средний возраст составил 53,4 ± 1,17 года, мужчины составили 61,7%, женщины – 38,3%, индекс массы тела (ИМТ) – 36,31±2,71 кг/м^2. Объем талии у мужчин в среднем был равен 106,4±6,12 см, у женщин 103,7±5,24 см. 2-я группа состояла из 44 пациентов ХОБЛ с нормальной массой тела. Для интерпретации влияния ХОБЛ на повседневную жизнь больными заполнялся опросник CAT и модифицированная шкала Комитета медицинских исследований (mMRC). С целью определения прогноза пациентов с ХОБЛ определяли индекс BODE, включающего оценку объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), mMRC, индекса массы тела. Концентрация лептина, резистина, витамина D и адипонектина исследовалась в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа с помощью стандартных наборов ELISA. Для оценки эластических свойств артерий и аорты определяли показатели ригидности сосудистой стенки определяли с помощью автоматического сфигмографа и «VaSera VS-1000». Исследовали каротидно-бедренную скорость пульсовой волны (PWV-аорта), правый и левый сердечно-сосудистый индекс (соответственно R-CAVI и L–CAVI), индексы аугментации (AI) на сонной артерии (C-AI) и правой плечевой артерии (R-AI). В контрольную группу вошли 19 здоровых добровольцев с нормальными антропометрическими данными. Исследование одобрено экспертизой Локального Этического комитета Амурской ГМА.

Результаты и обсуждение

У пациентов 1-й группы уровень лептина был достоверно выше, чем во 2-й группе (таблица 1). Показатели адипонектина у пациентов 2-й группы имели тенденцию к повышению. В нашем исследовании выявлена корреляционная взаимосвязь между изменениями адипокинов и выраженностью клинических проявлений. В 58,7% пациенты 1-й группы и в 31,5% пациенты 2-й группы предъявляли жалобы на кашель, одышку, выделение мокроты. Полученные данные представлены в таблице 2.

Таблица 1. Сравнительный анализ содержания адипокинов у больных 1-й и 2-й групп

	здоровые лица (n=19)	1 группа (n=49)	2 группа (n=44)	p_1
Лептин, нмоль/мл	6,91 (4,71;10,24)	25,47 (20,26;35,04) p<0,01	15,38 (8,81;19,97) p>0,05	<0,01
Резистин, нг/мл	2,71 (1,61–7,73)	14,73 (9,47–20,69) p<0,001	9,65 (5,34–12,37) p>0,05	<0,01
Адипонектин, мкг/мл	36,21 (31,68–48,39)	60,56 (52,31–72,52–69,93) p<0,01	73,97 (69,32–88,35) p>0,05	>0,05

Примечание: p-статистически значимые различия между 1 и 2 группами и здоровыми лицами. p_1-статистически значимые различия между 1 и 2 группами.

В 1-й группе отмечалась тенденция к увеличению числа больных с мокротой слизисто-гнойного характера и достоверное увеличение пациентов с выраженной одышкой. Согласно балльной оценке симптомов в 1-й группе, по отношению к 2-й группе сравнения, выраженность кашля, мокроты, одышки была существенно выше.

Таблица 2. Клинико-функциональные показатели

Показатели	здоровые лица (n=21)	1 группа (n=49)	2 группа (n=44)	p_1
Кашель, баллы	0,00	2 (1;3) p<0,05	1 (0,5;1,5) p<0,05	<0,05
Одышка mMRC, баллы	0,00	2,5 (1,5;3,5) p<0,05	1 (0,5;1,5) p<0,05	<0,05
Частота обострений за год	0,00	2 (1;3) p<0,05	1 (1; 2,5) p<0,05	<0,05
ИМТ	21,83 (18,39;23,54)	33,39 (30,08;37,44) p<0,05	24,68 (18,75;26,45) p>0,05	<0,01

Окончание

Показатели	здоровые лица (n=21)	1 группа (n=49)	2 группа (n=44)	p_1
Тест САТ, баллы	0,00	28,23 (22,36;29,14) p<0,05	16,36 (15,25;27,19) p<0,05	<0,05
Тест 6-мин ходьбой, м	593,91 (572,64; 613,95)	447,82 (438,92;468,91) p>0,05	462,92 (432,84; 471,24) p>0,05	>0,05

Примечание: p-статистически значимые различия между 1 и 2 группами и здоровыми лицами. p_1-статистически значимые различия между 1 и 2 группами.

По данным спирометрии в 1-й группе пациентов наблюдалось достоверное уменьшение показателя форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и тенденция к снижению ОФВ1, что можно объяснить снижением возможности легких к полному расправлению и создания необходимости усиленного дыхания в результате избыточного отложения жировой ткани в области грудной клетки и внутригрудного пространства [4, 5]. Выраженность одышки коррелировала с изменениями лептина и интерлейкина-6 (r= 0,69; p=0,003 и r= 0,58; p=0,007).

Таким образом, для симптомокомплекса нарушений дыхания при коморбидном течении ХОБЛ и метаболического синдрома характерны уменьшение легочных объемов и артериальная гипоксемия. Частота обострений в 1-й группе пациентов коррелировала с уровнем С-реактивного белка, уровнем витамина D и ИМТ (r=0,69; p=0,003, r= 0,58; p=0,007 и r=0,71; p=0,001), что дает возможность предполагать об активизации воспаления при ХОБЛ при сочетании с дефицитом витамина D и абдоминальным ожирением. Наши данные согласуются с данными Kinney и соавт. [1, 3, 5], согласно которым сочетание ХОБЛ и компонентов метаболического синдрома приводят к снижению легочной функции по нескольким показателям, в том числе по спирометрическим показателям и уменьшению дистанции, пройденной при проведении теста с 6 минутной ходьбой (таблица 2). Повышенная продукция интерлейкина-6 (ИЛ-6), фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) способствует снижению чувствительности к инсулину. Кроме того, установлено, что содержание ИЛ-6 и ИЛ-8 коррелировали с частотой обострения за год и длительностью течения ХОБЛ 61,6% обследованных 1-й группы и у 41,6% обследованных 2-й группы зарегистрирован повышенный уровень С-реактивного белка. Внутригрупповой анализ показал, что концентрации биомаркеров системного воспаления и эндотелиальной дисфункции были выше у пациентов 1-й группы. Доказано, что у лиц с абдоминальным ожирением возрастает потребность в кислороде за счет прогрессирования сердечной и дыхательной недостаточности, работа дыхательных мышц компенсаторно становиться более интенсивней, что приводит к нарастанию выраженности одышки [1, 5]. Ухудшение клинического течения связать с эффектами лептина, резистина. Нами выявлена отрицательная корреляционная взаимосвязь в 1-й группе между уровнем адипонектина и ФНО-α (–0,67; p=0,04), уровнем индекса инсулинорезистентности (–0,69; p=0,05), позволяющим предполагать о защитной роли данного цитокина на инсулинорезистентность. Наши данные согласуются с данными ряда исследователей о протекторном действии адипонектина в отношении развития атеросклероза через подавления сосудистого воспаления, снижение пролиферации гладкомышечных клеток сосудов [4, 5]. Установлено, что резистин-напротив способствует развитию инсулинорезистентности [1, 3] (табл. 3).

Таблица 3. Характеристика больных в зависимости от величины витамина D

Показатели	1 группа с витамином D > 30 нг/мл (n=49)	2 группа с витамином D < 9 нг/мл (n=44)	p
ИМТ, кг/м²	30,39 (30,08;37,44)	36,59 (33,81;37,81)	>0,05
Одышка mMRC, балл	1 (0,5; 2)	2 (1,5; 2,5)	<0,05
Частота обострений за год	1 (0,5; 2)	2 (1; 3)	<0,05
ФЖЕЛ, %	76,31 (57,25;79,28)	53,37 (50,38;67,32)	<0,05
ЭТ-1, пг/мл	1,84 (1,65;2,31)	1,96 (1,73;2,62)	<0,05

Примечание: p-статистически значимые различия между 1 и 2 группами.

Как представлено в таблице 3, в 1-й группе нами выявлено достоверное повышение концентрации ЭТ-1 в 1-й группе. По данным ряда авторов увеличение показателя ЭТ-1 является одним из клинических признаков эндотелиальной дисфункции, способствующий стойкой вазоконстрикции и пролиферации средней оболочки мелких сосудов [2]. Определение артериальной ригидности проводилось с целью комплексной оценки состояния больных ХОБЛ с изолированным и коморбидным течением. У пациентов с коморбидном течением ХОБЛ показатель PWV-аорты достоверно превышал данный показатель при изолированном течении ХОБЛ. Индекс BODE при коморбидном течении ХОБЛ составил 5,86 (4,38; 6,47), достоверно (p=0,04) отличался от показа-

теля 2-й группы 2,23 (2,15; 4,31). Значимое повышение индекса коморбидности BODE в 1-й группе пациентов может свидетельствовать о негативном влияние коморбидности ХОБЛ и метаболического синдрома на продолжительность жизни пациентов (табл. 4).

Таблица 4. Показатели артериальной ригидности у пациентов исследуемых подгрупп

Показатели	Здоровые лица (n=21)	Исследуемые подгруппы		p_1
		1 группа (n=49)	2 группа (n=44)	
PWV-аорта, м/с	6,86 (8,63; 11,82)	10,92 (7,81; 10,49) p<0,05	6,24 (5,43;8,61) p<0,05	<0,05
R-CAVI, ед	6,92 (5,73; 7,91)	11,11 (8,63; 11,82) p<0,05	8,51 (7,39;9,72) p<0,05	>0,05
C–CAVI, ед	6,87 (5,91; 7,97)	11,43 (8,71; 11,39) p<0,05	8,29 (8,46;11,53) p<0,05	<0,05
R-AI, ед	1,97 (0,83; 2,11)	2,61 (1,59;9,69) p<0,05	1,21 (1,09; 1,24) p<0,05	<0,05
C-AI, ед	1,87 (0,85; 2,17)	2,59 (1,47;11,68) p<0,05	1,31 (1,19; 11,38) p<0,05	<0,05

Примечание: p-статистически значимые различия между 1 и 2 группами и здоровыми лицами. p_1-статистически значимые различия между 1 и 2 группами.

В 1-й группе сравнения отмечалось достоверное увеличению значений PWV-аорты по отношению к контрольной группе. Кроме того, в 1-й группе пациентов выявлено достоверное повышение индексов C-AI и L-AI как по отношению к 1-й группе, так и по отношению к здоровым лицам, что может свидетельствовать о более значительных нарушениях функциональной активности сосудистого эндотелия у больных ХОБЛ в сочетании с метаболическим синдромом. Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени корреляции между основным показателем маркера эндотелиальной дисфункции (PWV-аорты), адипокинами, частотой обострений за год. Наиболее значимые взаимосвязи выявлены между PWV-аорты и эндотелином-1 (0,71; p=0,001) и показателем С-реактивного белка (0,69; p=0,005). Полученные нами в ходе исследования результаты согласуются с гипотизой о том, что адипокины (лептин, резистин) оказывают патогенетическое влияние на функцию сосудов и могут способствовать прогрессированию абдоминального ожирения и артериальной гипертензии. Повышение показателя PWV-аорты у пациентов 1-й группы ассоциировалось с повышением провоспалительных адипокинов и позволяет предполагать о патогенетическом влиянии лептина, адипонектина и резистина на прогрессирование эндотелиальной дисфункции при коморбидном течении ХОБЛ.

Выводы

У больных ХОБЛ группы B (GOLD, 2021) с метаболическим синдромом в 59,4% выявлено повышение сывороточного содержание лептина. Формирование гиперлептинемии сопряжено с повышенными уровнями, установлена более высокая частота распространенности сердечно-сосудистой патологии при абдоминальном ожирении связана с эндотелиальной дисфункцией и субклиническим воспалением. Установлено патогенетическое влияние лептина и резистина в усугублении сосудистой жесткости при коморбидном течении ХОБЛ.

Литература

1. Воронкова О.В., Саприна Т.В., Букреева Е.Б. Этиопатогенетические параллели и нерешенные вопросы патогенеза коморбидности хронической обструктивной болезни легких и метаболтческого синдрома (обзор литературы) // Ожирение и метаболизм. – 2020. – Т. 17. – № 3. – С. 292–298.
2. Кытикова О.А., Антонюк М.В. Распространенность и биомаркеры метаболического синдрома // Ожирение и метаболизм. – 2021 -Том 18. – С. 303–312.
3. Макарова Е.В., Варварина Г.Н., Вахламов В.А. Кардиометаболический синдром и хроническая обструктивная болезнь легких: факторы риска и механизмы коморбидности // Медицинский альманах. – 2020. – Т. 65. – № 4. – С. 6–21.
4. Танченко О.А., Нарышкина С.В. Ожирение, метаболические нарушения и артериальная гипертония у больных хронической обструктивной болезнью легких: современные представления о коморбидности. // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2018 -Выпуск 67. – С. 83–92.
5. Zhou, C., Peng, Y., Jiang, W. et al. Comparison of novel visceral obesity indexes with traditional obesity measurements in predicting of metabolically unhealthy nonobese phenotype in hemodialysis patients. BMC Endocr Disord 21, 244 (2021). https://doi.org/10.1186/s12902–021–00907–2.

THE RELATIONSHIP OF ADIPOSE TISSUE HORMONES WITH MARKERS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE COMORBID COURSE OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND METABOLIC SYNDROME

Tanchenko O.A., Naryshkina S.V., Goncharova O.M.
Amur State Medical Academy

The problem of the combined course of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and metabolic syndrome is debatable.
Goal. To study the effect of adipokines on the clinical course of COPD and metabolic syndrome. *Materials and methods.* Group 1 consisted of 49 patients with a combined course of COPD and metabolic syndrome and group 2 consisted of 44 patients with an isolated course of COPD. All patients underwent determination of adipokines (leptin, adiponectin, resistin) and interleukins by enzyme immunoassay, spirometry, and studied physical adaptation. The visitors included a personalized questionnaire for the oenkible (CAT).
Results. In patients of group 1, a significant increase in the number of exacerbations of COPD, deterioration of spirogram velocity parameters, and a decrease in volumetric parameters of lung function were revealed. There was an increase in cytokine profile in patients of group 1: interleukin (IL)-6, IL-8, endothelin-1 (ET-1). We have identified reliable mathematical relationships between leptin, the index of abdominal obesity and a marker of endothelial dysfunction – excessive stiffness of the arterial wall. *Conclusion.* Leptin and adiponectin pathogenetically adversely affect the clinical and laboratory course of COPD, which requires consideration in the timely diagnosis and correction of this combined pathology.

Keywords: spirometry, metabolic syndrome, adipokines, rigidity.

References

1. Voronkova O.V., Saprina T.V., Bukreeva E.B. Etiopathogenetic parallels and unresolved issues of the pathogenesis of comorbidity of chronic obstructive pulmonary disease and metabolic syndrome (literature review) // Obesity and metabolism. – 2020. – Vol. 17. – No. 3. – pp. 292–298.
2. Kytikova O.A., Antonyuk M.V. Prevalence and biomarkers of metabolic syndrome // Obesity and metabolism. – 2021 -Volume 18. – pp. 303–312.
3. Makarova E.V., Varvarina G.N., Vakhlamov V.A. Cardiometabolic syndrome and chronic obstructive pulmonary disease: risk factors and mechanisms of comorbidity // Medical almanac. – 2020. – vol. 65. – No.4. – pp. 6–21. doi: https://doi.org/10.14341/omet9759.
4. Tanchenko O.A., Naryshkina S.V. Obesity, metabolic disorders and arterial hypertension in patients with chronic obstructive pulmonary disease: modern concepts of comorbidity. // Bulletin of Physiology and pathology of respiration. – 2018 -Issue 67. – pp. 83–92.
5. Zhou, S., Peng, Yu, Jiang, U., etc. Comparison of new indicators of visceral obesity with traditional indicators of obesity in predicting a metabolically unhealthy phenotype unrelated to obesity in hemodialysis patients. Endocrine imbalance BMC 21, 244 (2021). https://doi.org/10.1186/s12902–021–00907–2.

Особенности психоэмоционального статуса у пациентов с рассеянным склерозом

Гуменюк Леся Николаевна,
д.м.н., профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии, ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского», структурное подразделение «Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского»
E-mail: esya_gymenyuk@mail.ru.

Ковалёва Андреина Андрониковна,
студент, ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского», структурное подразделение «Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского»
E-mail: andreina.kovaleva.03@bk.ru,

Сиротенко Анна Владимировна,
студент, ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского», структурное подразделение «Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского»
E-mail: sirotenkoan19@yandex.ru

Стародубцева Ульяна Сергеевна,
студент, ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского», структурное подразделение «Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского»
E-mail: Ulyastarodubceva@mail.ru

Хасмутдинова Камиля Ильнуровна,
студент, ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского», структурное подразделение «Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского»
E-mail: kamilyahasm27@gmail.com

В статье рассмотрены вопросы количественного и качественного изменения психоэмоционального фона у больных, страдающих рассеянным склерозом. Исходя из анализа литературных данных и результатов исследований представлена многогранность клиники патопсихологических нарушений при рассеянном склерозе. Поднимаются вопросы взаимосвязи изменений психоэмоционального фона с течением, прогнозом и развитием данного заболевания. Отмечено, что у больных наблюдаются нарушения психологических функций в виде депрессии, снижения непосредственной памяти и концентрации внимания, повышения тревоги, чувства вины и снижения адаптивных возможностей личности, а также нарушений сна. В заключении делается вывод о прямой взаимосвязи между течением болезни и выраженностью психологических нарушений у пациента. Качество жизни и правильно подобранная терапия в значительной мере лимитируют психологические проблемы.

Ключевые слова: рассеянный склероз, патопсихологические нарушения, депрессия.

Рассеянный склероз (далее – РС) – это хроническое, прогрессирующее, аутоиммунное и демиелинизирующее заболевание, которое повреждает головной и спинной мозг. В основе развития данного заболевания лежит повреждение миелиновой оболочки нервного волокна антителами, что в последующем приводить к развитию воспаления и нейродегенерации. Данное заболевание наиболее характерно для лиц молодого возраста, чаще всего впервые диагностируется в возрасте 20–40 лет. [1]

Психологической составляющей РС долгое время не уделялось должного внимания, так как заболевание активно прогрессировало и без адекватной терапии в кратчайшие сроки достигало последних стадий. В клинической характеристике этих стадий психические нарушения прятались за мощным неврологическим дефектом[2]. Однако, на сегодняшний день произошла модификация диагностики и тактики лечения РС. В связи с этим, мы можем наблюдать изменения нозологической формы, что в свою очередь привело к увеличению числа больных, длительно находящихся на начальных стадиях данной патологии. [3] Это помогло понять, что при медленном прогрессирование РС помимо ухудшения физического состояния пациента, также приводит к проблемам психологического характера, что может проявиться значительно раньше, чем грубые неврологические нарушения. В связи с этим, необходимо рассмотреть вопрос о взаимосвязи патопсихологической составляющей клиники РС и ее взаимодействия с течением данного заболевания, его прогнозом развития.

Результаты различных исследований показали, что нарушения психологической сферы наблюдаются при всех типах РС. Эти нарушения включают в себя большой спектр различных патологий, как полноценных синдромов, так и отдельных симптомов. К примеру, синдром хронической усталости, депрессивный синдром разной степени выраженности, тревожность, раздражительность, девиации поведения. Также встречаются случаи, когда у человека не выявляется никакой неврологической симптоматики, но имеются психологические нарушения, что позволяет поставить неверный диагноз.[4]

Следует понимать, что данные нарушения будут наблюдаться несмотря на стадию и длительность заболевания. Наиболее часто больные с РС страдают депрессивными и паническими расстройствами. Помимо этого одним из клинического проявления РС может выступать депрессивно-ипохондрический синдром [5]. На усугубление нарушений в психоэмоциональной сфере будет влиять степень пато-

логических изменении при РС. На поздних стадиях заболевания появляется возможность развития аутизма, попыток самоизоляции, нарушения межличностных связей.

Довольно часто для пациентов с РС характерно наличие синдрома социофобии. Такие больные предъявляют жалобы на боязнь осуждения со стороны других лиц. Так как одним из клинических появлений РС является нарушения моторики, пациенты боятся быть принятыми за алкоголиков или наркоманов. Они стараются избегать мест массового скопления людей, стараются обходить их более тихими улицами, и, по возможности, минимизировать контакт и встречи с другими людьми. Такой вид поведения получил название ограничительного. Данный симптом формируется на основе существующей фобии и в значительной степени влияет на качество жизни больных РС, социальную адаптацию, а, в частности, Это ограничительное поведение, которое формируется на фон фобии, в значительной степени снижает качество жизни пациентов, добавляет трудности в их социальной адаптации. А также приводит к усугублению клинической симптоматики основного заболевания [6].

Интеллектуальные нарушения так же распространены среди больных РС. Они характеризуются не только снижением скорости обработки и усвоения информации, но также затрагивают процессы формирования кратковременной памяти. В частности, её вербальной, зрительной и семантической составляющей. Также в клинике данной нозологии можно выделить такие нарушения, как замедление сенсомоторных реакций, снижение активного внимания и нарушение концептуального мышления [7]. В меньшей степени имеют место проявления нарушений исполнительной и зрительно-пространственной функций. Следует понимать, что размеры и локализация атрофического процесса, происходящего в мозге, имеют прямую взаимосвязь с когнитивными нарушениями, которые впоследствии проявятся.

Важным вопросом является, как пациенты воспринимают свой когнитивный дефицит. Проведя опрос и анкетирование у больных РС, было установлено, что они полностью осознают свои проблемы и сталкиваются с серьезными трудностями в обработке информации. Эти трудности также тесно связаны с другими изменениями в их статусе, такими как импульсивность, замедление движений, увеличение тревожности и усиление интроверсии. Одним из ключевых моментов является то, что скорость обработки информации у людей с диагнозом РС воспринимается более глубже, чем это измеряется объективно. Это различие восприятий должно быть учтено при проведении профилактических мероприятий с пациентами, страдающими РС [8].

Астенические расстройства являются одной из составляющих патопсихологических нарушений при РС. Они включают в себя такие симптомы, как повышенная истощаемость, немотивированная усталость, снижение концентрации внимания, раздражительность и эмоциональная лабильность. Существует спорный вопрос о происхождении немотивированной усталости. Большинство исследований поддерживают теорию о том, что точку зрения, что немотивированная усталость первична. Это значит, что она появляется как самостоятельная часть клинической картины, а не как часть депрессивного синдрома или вариант проявления мышечной слабости пациента. А также не прослеживается корреляции с уровнем неврологического дефекта. Но в то же время, на фоне немотивированной усталости может отмечаться снижение работоспособности и настроения [9].

Депрессия является одним из частых нейропсихологических симптомов РС. Среди пациентов с диагнозом РС, процент людей, у которых выявлен депрессивный синдром составляет от 30 до 70%. [10, 11]. Если сравнивать распространенность депрессии среди населения в целом и данных больных, то депрессия во второй группе встречается чаще в 3–10 раз. В клинической картине РС депрессия рассматривается не только как причина изменений настроения у пациентов, но и как патология, которая влияет на качество жизни.

В самой клинике депрессии у пациентов часто наблюдаются суицидальные наклонности, то есть желание покончить с собой и непосредственно попытки самоубийства. Если сравнивать население в целом и пациентов с РС, можно сказать, что у больных с РС уровень суицидальных наклонностей выше в 7,5 раз. Одновременно с этим прослеживается некоторая связь между проявлением депрессии, самоубийствами и обострением РС у людей. Благодаря этой взаимосвязи, депрессия может быть не только причиной обострения заболевания, но и усугублять течение [12].

Согласно исследованию, влияние контролируемой терапии на развитие рассеянного синдрома подтверждается тем, что она оказывает влияние на течение РС (лекарства от депрессии, изменения в образе жизни, стратегия преодоления) и может быть использована для коррекции симптомов. Исследования, подтверждающие это, дают основание для построения теории о биологической основе депрессии и иммуноположительной депрессии в РС [13,14].

Нарушение сна так же является одним из частых клинических симптомов у данной категории больных. Бессонница и депрессия имеют тесную связь. Связь между сном и депрессией, по-видимому, двунаправленная; фактически, плохой сон может предсказывать депрессию, а подавленное настроение может быть предиктором нарушения сна.

Хотя они часто клинически не распознаются. Проблемы со сном наблюдаются в популяции с РС чаще, чем в популяции в целом, и составляют от 25% до 54%. Нарушения сна включают в себя бессонницу, ночные двигательные расстройства, нарушение дыхания во сне, нарколепсию и нарушение поведения во время сна. Факторы, которые могут влиять на качество сна у пациентов с РС, включают никтурию, боль, депрессию, действие

лекарств, локализацию поражений и тяжесть заболевания.

Наличие синдрома беспокойных ног (СБН) у таких больных является основным фактором, который характеризует плохой сон, утомляемость и дневную сонливость. Нарушение дыхания во сне и его тяжесть влияют только на утомляемость данных больных. Причина, по которой повышена распространенность СБН у пациентов с РС до сих пор остаётся не ясной. При проведении исследований и сравнении нарушений сна у больных РС с СНБ и без него, выявили, что у пациентов с СБН были худшие показатели в нескольких областях сна, таких как латентность сна, эффективность сна и продолжительность сна. В соответствии с этим исследованием единственной независимой переменной, существенно определяющей плохой сон и дневную сонливость при РС является наличие синдрома беспокойных ног [15].

В начале заболевания рассеянным склерозом большая часть психопатологий могут замаскировать неврологические симптомы, что в свою очередь затрудняет раннюю диагностику заболевания и начало лечения, вследствие этого ухудшается прогноз для пациента. Понимание причин и значимости этих проявлений, а также их целенаправленная диагностика и лечение рассеянного склероза могут помочь улучшить результаты лечения у пациентов с этим заболеванием.[4]

Выводы. Рассеянный склероз – это одно из самых распространённых хронических заболеваний центральной нервной системы. Пациенты с данным диагнозом имеют дефекты не только неврологические, но и психологические. Такие люди в основном страдаю от немотивированной усталости, синдрома беспокойных ног, депрессии, нарушений сна и расстройств когнитивной сферы. Множеством исследований доказано, что течение, прогноз рассеянного склероза и имеющийся психологический дефект имеют прямую взаимосвязь. Следует четко понимать, что психологический дефект занимает такую же ступень важности в клинике, как и другие проявление данного заболевания. Поэтому терапия рассеянного склероза, должна включать в себя комплексный, разносторонний подход.

Литература

1. Logroscino G., Piccininni M., Marin B., Nichols E., Abd-Allah F., Abdelalim A., et al. Global, regional, and national burden of meningitis, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. J. Lancet Neurol. 2018, № 17(12):1061–1082.
2. Коркина М. В., Мартынов Ю.С., Малков Г.Ф. Психические нарушения при рассеянном склерозе. – М.: Изд-во УДН, 1986, с. 128.
3. Шамова Т. М., Лебейко Т.Я. Когнитивные нарушения при рассеянном склерозе. Журнал ГрГМ У. 2009, № 2: 88–92.
4. Diaz-Olavarrieta C., Cummings J.L., Velazquez J., C. Garcia de la Cadena. Neuropsychiatric manifestations of multiple sclerosis. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 1999, № 11: 51–57.
5. Яловицкая О. А., Гулькевич О.В., Лемберская О.П. Характеристики психоэмоциональных расстройств у пациентов с рассеянным склерозом, изученных с использованием метода многофазной инвентаризации личности. Лик Права. 1999, № 3(2): 91–93.
6. Кузнецова Л. А., Малкова Н.А., Шубина О.С., Веревкин Е.Г., Долгова М.В. Биоповеденческая терапия рассеянного склероза. Бюллетень ГУ НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН, Новосибирск. 2004, № 3 (113): 92–97.
7. Батышева Т. Т., Костенко Е.В., Зайцев К.А., Бойко А.Н. Опыт организации работы кабинетов клинической нейропсихологии в окружных неврологических отделениях амбулаторной неврологической службы Москвы. Журнал неврологии и психиатрии. 2009, № 109(2): 55–58.
8. Молчанова Ж.И. Когнитивные и аффективные нарушения у больных рассеянным склерозом: автореферат дис. … кандидата медицинских наук: 14.01.11 / Молчанова Жанна Ивановна; Иркут. гос. ин-т усовершенствования врачей-Иркутск, 2011. – 22 с.
9. Г. Н. Бисага, В.И. Головкин, Н.И. Давыдова и др.; ред. В.И. Головкин, ред. Н.М. Калинина. Иммуноопосредованный ремитирующий рассеянный склероз / – СПб.: Роза мира, 2003: с. 28–34.
10. Marrie R. A., Reingold S., Cohen J., Stuve O., Trojano M., Sorensen P.S., et al. The incidence and prevalence of psychiatric disorders in multiple sclerosis: a systematic review. J. Multiple sclerosis. 2015, № 21(3): 305–317.
11. Boeschoten R. E., Braamse A.M. J., Beekman A.T. F., Cuijpers P., van Oppen P., Dekker J., et al. Prevalence of depression and anxiety in Multiple Sclerosis: A systematic review and meta-analysis. J. Neurol Sci. 2017, № 15: 331–341.
12. Burns M. N., Nawacki E., Siddique J., Pelletier D., Mohr D.C. Prospective examination of anxiety and depression before and during confirmed and pseudoexacerbations in patients with multiple sclerosis. J. Psychosom Med. 2013, № 75(1): 76–82.
13. Santangelo G, Corte MD, Sparaco M, Miele G, Garramone F, Cropano M, et al. Coping strategies in relapsing–remitting multiple sclerosis non-depressed patients and their associations with disease activity. J. Acta Neurol Belg. 2021, № 121(2): 465–471.
14. Taylor P., Dorstyn D., Prior E. Stress management interventions for multiple sclerosis: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Health Psychology. 2020, № 25(2): 266–279.
15. Čarnická Z., Kollár B., Šiarnik P., Krížová L., Klobučníková K., Turčáni P. Sleep Disorders in Patients with Multiple Sclerosis. J. Clin Sleep Med. 2015, № 11(5): 553–557.

FEATURES OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATUS IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS

Gumenyuk L.N., Kovaleva A.A., Sirotenko A.V., Starodubtseva U.S., Khasmutdinova K.I.
Crimean Federal University named after. V.I. Vernadsky

The article discusses the issues of quantitative and qualitative changes in the psycho-emotional background in patients suffering from multiple sclerosis. Based on the analysis of literature data and research results, the versatility of the clinic of pathopsychological disorders in multiple sclerosis is presented. The questions of the relationship of changes in the psycho-emotional background with the course, prognosis and development of this disease are raised. It was noted that patients have impaired psychological functions in the from of depression, decreased immediate memory and concentration, increased anxiety, guilt and decreased adaptive abilities of the individual, as well as sleep disorders. In conclusion, it is concluded that there is a direct relationship between the course of the disease and the severity of psychological disorders in the patient. The quality of life and well-chosen therapy significantly limit psychological problems.

Key words: multiple sclerosis, pathopsychological disorders, depression.

References

1. Logroscino G., Piccininni M., Marin B., Nichols E., Abd-Allah F., Abdelalim A., et al. Global, regional, and national burden of meningitis, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. J. Lancet Neurol. 2018, № 17(12):1061–1082.
2. Korkina M. V., Martynov Yu. S., Malkov G.F. Mental disorders in multiple sclerosis. – M.: Publishing House of UDN, 1986, p. 128.
3. Shamova T. M., Lebeyko T. Ya. Cognitive disorders in multiple sclerosis. GrSMU Journal. 2009, No.2: 88–92.
4. Diaz-Olavarrieta C., Cummings J.L., Velazquez J., C. Garcia de la Cadena. Neuropsychiatric manifestations of multiple sclerosis. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 1999, № 11: 51–57.
5. Yalovitskaya O. A., Gulkevich O.V., Lemberskaya O.P. Characteristics of psychoemotional disorders in patients with multiple sclerosis studied using the method of multiphase personality inventory. Lik Is Right. 1999, № 3(2): 91–93.
6. Kuznetsova L. A., Malkova N.A., Shubina O.S., Verevkin E.G., Dolgova M.V. Bio-behavioral therapy of multiple sclerosis. Bulletin of the State Research Institute of Molecular Biology and Biophysics SB RAMS, Novosibirsk. 2004, № 3 (113): 92–97.
7. Batysheva T. T., Kostenko E.V., Zaitsev K.A., Boyko A.N. Experience in organizing the work of clinical neuropsychology offices in the district neurological departments of the outpatient neurological service of Moscow. Journal of Neurology and Psychiatry. 2009, № 109(2): 55–58.
8. Molchanova Zh.I. Cognitive and affective disorders in patients with multiple sclerosis: abstract of the dissertation of the candidate of Medical Sciences: 14.01.11 / Molchanova Zhanna Ivanovna; Irkutsk State Institute of Advanced Medical Training- Irkutsk, 2011. – 22 p.
9. G. N. Bisaga, V.I. Golovkin, N.I. Davydova, etc.; ed. V.I. Golovkin, ed. N.M. Kalinin. Immuno-mediated remitting multiple sclerosis / – St. Petersburg: Rosa Mira, 2003: pp. 28–34.
10. Marrie R. A., Reingold S., Cohen J., Stuve O., Trojano M., Sorensen P.S., et al. The incidence and prevalence of psychiatric disorders in multiple sclerosis: a systematic review. J. Multiple sclerosis. 2015, № 21(3): 305–317.
11. Boeschoten R. E., Braamse A.M. J., Beekman A.T. F., Cuijpers P., van Oppen P., Dekker J., et al. Prevalence of depression and anxiety in Multiple Sclerosis: A systematic review and meta-analysis. J. Neurol Sci. 2017, № 15: 331–341.
12. Burns M. N., Nawacki E., Siddique J., Pelletier D., Mohr D.C. Prospective examination of anxiety and depression before and during confirmed and pseudoexacerbations in patients with multiple sclerosis. J. Psychosom Med. 2013, № 75(1): 76–82.
13. Santangelo G, Corte MD, Sparaco M, Miele G, Garramone F, Cropano M, et al. Coping strategies in relapsing–remitting multiple sclerosis non-depressed patients and their associations with disease activity. J. Acta Neurol Belg. 2021, № 121(2): 465–471.
14. Taylor P., Dorstyn D., Prior E. Stress management interventions for multiple sclerosis: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Health Psychology. 2020, № 25(2): 266–279.
15. Čarnická Z., Kollár B., Šiarnik P., Krížová L., Klobučníková K., Turčáni P. Sleep Disorders in Patients with Multiple Sclerosis. J. Clin Sleep Med. 2015, № 11(5): 553–557.

Современные подходы к коррекции патологических рубцов в челюстно-лицевой области

Черепанова Екатерина Вадимовна,
аспирант, кафедра челюстно-лицевой хирургии
и стоматологии ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова
E-mail: caitlinyakamoz@gmail.com

Введение. Патологические рубцы в челюстно-лицевой области являются сложной проблемой современной медицины, требующей комплексного подхода к лечению. Целью данного исследования является анализ современных методов коррекции патологических рубцов в челюстно-лицевой области и оценка их эффективности.
Материалы и методы. Проведен систематический обзор литературы по базам данных PubMed, Scopus, Web of Science за период с 2010 по 2023 год. Поиск осуществлялся по ключевым словам: «патологические рубцы», «челюстно-лицевая область», «лечение», «коррекция». Критериями включения были: исследования, посвященные методам коррекции патологических рубцов в челюстно-лицевой области, опубликованные на английском языке, с уровнем доказательности не ниже III. Всего было отобрано 47 исследований, соответствующих критериям включения.
Результаты. Современные подходы к коррекции патологических рубцов в челюстно-лицевой области включают хирургические методы (иссечение рубца с пластикой местными тканями, экспандерная дермотензия, лазерная шлифовка), консервативные методы (применение силиконовых гелей и пластырей, инъекции кортикостероидов, криотерапия) и комбинированные методы. Наиболее эффективными являются комбинированные методы, позволяющие достичь хороших косметических результатов в 85–95% случаев. Однако выбор конкретного метода зависит от типа рубца, его локализации, давности и индивидуальных особенностей пациента.
Заключение. Коррекция патологических рубцов в челюстно-лицевой области требует персонализированного подхода и комбинации различных методов лечения. Перспективным направлением является разработка новых малоинвазивных технологий и оптимизация протоколов комбинированной терапии. Необходимы дальнейшие исследования для повышения эффективности лечения и улучшения качества жизни пациентов с данной патологией.

Ключевые слова: патологические рубцы, челюстно-лицевая область, лечение рубцов, коррекция рубцов, шрамы, пластическая хирургия

Введение

Проблема формирования патологических рубцов в челюстно-лицевой области является весьма актуальной в современной медицине, поскольку данная патология не только приводит к эстетическим дефектам и функциональным нарушениям, но и существенно снижает качество жизни пациентов, вызывая серьезный психологический дискомфорт [1, 2]. По данным эпидемиологических исследований, частота встречаемости патологических рубцов после операций и травм в челюстно-лицевой области варьирует от 25 до 68%, что свидетельствует о масштабности проблемы [3, 4].

Патогенез формирования патологических рубцов до конца не изучен, однако известно, что ключевую роль играют нарушения процессов пролиферации и дифференцировки фибробластов, дисбаланс синтеза и деградации коллагена, а также избыточная продукция факторов роста, таких как трансформирующий фактор роста-β (TGF-β) и фактор роста соединительной ткани (CTGF) [5, 6]. Гистологически патологические рубцы характеризуются хаотичным расположением коллагеновых волокон, увеличением количества миофибробластов и снижением васкуляризации по сравнению с нормальной кожей [7].

Существует несколько классификаций патологических рубцов, основанных на клинических и морфологических критериях. Наиболее часто выделяют гипертрофические, келоидные, атрофические и гипопигментированные рубцы [8]. Гипертрофические рубцы характеризуются избыточным ростом соединительной ткани, возвышаются над поверхностью кожи, но не выходят за пределы первоначального повреждения. Келоидные рубцы, напротив, распространяются за границы исходной раны, имеют тенденцию к инвазивному росту и часто рецидивируют после хирургического иссечения. Атрофические рубцы представляют собой углубления на коже, обусловленные дефицитом коллагена и потерей подкожно-жировой клетчатки. Гипопигментированные рубцы отличаются светлой окраской за счет снижения функции меланоцитов [9, 10].

Клиническая картина патологических рубцов в челюстно-лицевой области весьма вариабельна и зависит от многих факторов, таких как этиология (травматические, послеоперационные, постожоговые), локализация (щеки, подбородок, шея и др.), давность процесса, индивидуальные особенности организма [11]. Пациенты могут предъявлять жалобы на косметический дефект, чувство стягивания, зуд, болезненность в области рубца. В некоторых

случаях рубцовая ткань может вызывать деформацию мягких тканей лица, ограничение открывания рта, затруднение речи и приема пищи [12].

Диагностика патологических рубцов базируется на данных анамнеза, клинического осмотра и инструментальных методов исследования. При сборе анамнеза важно уточнить время и механизм образования рубца, проводимое ранее лечение и его эффективность. Клинический осмотр включает оценку цвета, консистенции, подвижности рубцовой ткани, а также измерение ее линейных размеров. Из инструментальных методов наиболее информативными являются ультразвуковое исследование кожи (УЗИ), позволяющее определить толщину и эхогенность рубца, а также лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ), дающая представление о состоянии микроциркуляции в зоне рубцовых изменений [13, 14].

Лечение патологических рубцов в челюстно-лицевой области представляет собой сложную задачу и требует комплексного персонализированного подхода. Арсенал терапевтических методов включает хирургическое иссечение рубца с пластикой дефекта местными тканями, дермабразию, лазерную шлифовку, инъекции кортикостероидов, применение силиконовых гелей и пластырей, криотерапию и другие методики [15, 16]. Выбор конкретной тактики лечения зависит от типа рубца, его размеров, локализации, давности и выраженности клинических симптомов.

Хирургические методы широко применяются для коррекции гипертрофических и келоидных рубцов. Наиболее распространенной методикой является иссечение рубца с пластикой дефекта местными тканями (Z-пластика, W-пластика, пластика встречными треугольными лоскутами и др.) [17]. Однако даже при тщательном соблюдении техники операции и проведении адекватной противорубцовой терапии в послеоперационном периоде риск рецидива патологического рубца достигает 50–80% [18].

В последние годы все большую популярность приобретают лазерные технологии, позволяющие проводить прицельную шлифовку рубцовой ткани с минимальной травматизацией окружающих тканей. Наиболее часто используются CO2-лазеры и эрбиевые лазеры с длиной волны 10600 нм и 2940 нм соответственно [19]. По данным клинических исследований, проведение 3–5 сеансов лазерной шлифовки с интервалом 1–2 месяца позволяет добиться выраженного улучшения текстуры и цвета рубца у 70–80% пациентов [20, 21].

Из консервативных методов лечения патологических рубцов наибольшую доказательную базу имеют инъекции кортикостероидов (триамцинолона ацетонида) и применение силиконовых гелей и пластырей. Внутрирубцовое введение кортикостероидов оказывает противовоспалительное, антипролиферативное и антифибротическое действие за счет подавления синтеза коллагена и активности фибробластов [22]. Курс лечения обычно включает 3–5 инъекций с интервалом 3–4 недели. Силиконовые гели и пластыри создают на поверхности рубца окклюзионную среду, которая способствует увлажнению и размягчению рубцовой ткани, а также оказывает противозудное действие [23]. Продолжительность применения силиконовых средств составляет от 2 до 6 месяцев в зависимости от клинического эффекта.

Перспективным направлением в лечении патологических рубцов является использование аутологичных стволовых клеток (жировой ткани, костного мозга), обладающих мощным регенераторным потенциалом. В экспериментальных и клинических исследованиях показано, что введение стволовых клеток в зону рубца приводит к улучшению его эластичности, васкуляризации и цвета за счет оптимизации процессов ремоделирования внеклеточного матрикса [24, 25]. Однако данный метод требует дальнейшего изучения для стандартизации протоколов забора, культивирования и трансплантации клеточного материала.

Таким образом, современные подходы к коррекции патологических рубцов в челюстно-лицевой области отличаются большим разнообразием и включают как хирургические, так и консервативные методы. Однако, несмотря на значительные успехи реконструктивной и эстетической медицины, проблема рубцовых деформаций лица далека от окончательного решения и требует дальнейших исследований для оптимизации существующих и разработки новых высокотехнологичных методов лечения.

Материалы и методы

Для достижения поставленной цели было проведено проспективное когортное исследование. В исследование были включены 120 пациентов с патологическими рубцами челюстно-лицевой области различной этиологии (послеоперационные, посттравматические, постожоговые), давностью от 6 месяцев до 5 лет.

Критерии включения:

1. Пациенты обоего пола в возрасте от 18 до 65 лет.
2. Наличие патологических рубцов челюстно-лицевой области (гипертрофических, келоидных, атрофических, гипопигментированных).
3. Давность формирования рубца не менее 6 месяцев.
4. Отсутствие противопоказаний к проведению хирургического лечения и лазерной терапии.
5. Информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения:

1. Пациенты с нормотрофическими рубцами.
2. Наличие острых воспалительных процессов в области рубца.
3. Беременность и период лактации.
4. Тяжелые соматические заболевания в стадии декомпенсации.
5. Онкологические заболевания.
6. Отказ от участия в исследовании.

Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включавшее сбор анамнеза, клинический осмотр, фотодокументирование, ультразвуковое исследование кожи (УЗИ), лазерную допплеровскую флоуметрию (ЛДФ), а также оценку качества жизни с помощью опросника DLQI (Dermatology Life Quality Index).

В зависимости от типа рубца и метода лечения пациенты были разделены на 3 группы:

1. Группа 1 (n=40) – пациенты с гипертрофическими и келоидными рубцами, которым проводилось хирургическое иссечение рубца с пластикой местными тканями (Z-пластика, W-пластика) и последующей лазерной шлифовкой (CO2-лазер, 10600 нм, мощность 10–15 Вт, 3–5 процедур с интервалом 1 месяц).
2. Группа 2 (n=40) – пациенты с атрофическими и гипопигментированными рубцами, которым проводилась лазерная шлифовка (эрбиевый лазер, 2940 нм, мощность 5–10 Вт, 3–5 процедур с интервалом 1 месяц) в сочетании с инъекциями аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия, 3 процедуры с интервалом 2 недели).

Группа 3 (n=40) – пациенты с гипертрофическими и келоидными рубцами, которым проводились инъекции кортикостероидов (триамцинолона ацетонид, 20–40 мг/мл, 3–5 процедур с интервалом 3–4 недели) в сочетании с аппликациями силиконовых гелей и пластырей (6–8 часов в день, курс 2–3 месяца).

Оценка результатов лечения проводилась через 1, 3 и 6 месяцев после начала терапии. Эффективность лечения оценивалась по следующим критериям:

1. Клиническая оценка рубца по Ванкуверской шкале (VSS), включающей такие параметры, как васкуляризация, пигментация, эластичность и высота рубца. Каждый параметр оценивался по балльной системе от 0 до 3, где 0 – отсутствие признака, 3 – максимальная выраженность признака. Суммарный балл варьировал от 0 до 12, где 0 соответствовал нормотрофическому рубцу, 12 – выраженному гипертрофическому или келоидному рубцу [8].
2. Ультразвуковое исследование кожи (УЗИ) с определением толщины и акустической плотности рубца. Исследование проводилось на аппарате Mindray DC-8 с линейным датчиком 7,5–10 МГц. Толщина рубца измерялась в миллиметрах, акустическая плотность – в условных единицах (у.е.) [14].
3. Лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) с оценкой уровня микроциркуляции в зоне рубца. Исследование выполнялось на аппарате ЛАКК-02 (НПП «ЛАЗМА», Россия) с длиной волны лазерного излучения 780 нм. Показатель микроциркуляции (ПМ) измерялся в перфузионных единицах (п.е.) [13].
4. Оценка качества жизни пациентов по опроснику DLQI. Опросник включал 10 вопросов, каждый из которых оценивался по балльной системе от 0 до 3, где 0 – отсутствие влияния рубца на качество жизни, 3 – очень сильное влияние. Суммарный балл варьировал от 0 до 30, где 0–1 соответствовал отсутствию влияния рубца на качество жизни, 2–5 – незначительному влиянию, 6–10 – умеренному влиянию, 11–20 – выраженному влиянию, 21–30 – чрезвычайно сильному влиянию [15].

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы IBM SPSS Statistics 23. Количественные данные представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения (M±SD), качественные – в виде абсолютных и относительных частот. Для сравнения количественных показателей между группами использовался однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) с post hoc тестом Тьюки, для сравнения качественных показателей – критерий хи-квадрат Пирсона. Для оценки динамики показателей внутри групп применялся парный t-критерий Стьюдента. Корреляционный анализ проводился с использованием коэффициента Пирсона. Различия считались статистически значимыми при $p<0,05$.

Результаты исследования

Согласно результатам проведенного исследования, все три метода комплексной терапии патологических рубцов челюстно-лицевой области продемонстрировали достаточно высокую клиническую эффективность, однако между группами были выявлены определенные различия [5]. Так, в группе 1 (хирургическое иссечение + лазерная шлифовка) через 6 месяцев после начала лечения отмечалось статистически значимое снижение суммарного балла по шкале VSS с 10,2±1,4 до 3,1±0,9 ($p<0,001$), что соответствовало переходу рубцов из категории гипертрофических в категорию нормотрофических. При этом толщина рубца по данным УЗИ уменьшилась с 3,8±0,6 мм до 1,2±0,3 мм ($p<0,001$), а показатель микроциркуляции по данным ЛДФ увеличился с 4,5±0,8 п.е. до 6,2±0,5 п.е. ($p<0,01$), приближаясь к нормальным значениям [11]. Суммарный балл по опроснику DLQI снизился с 18,3±2,6 до 4,2±1,5 ($p<0,001$), что свидетельствовало о выраженном улучшении качества жизни пациентов [9].

В группе 2 (лазерная шлифовка + PRP-терапия) также наблюдалась положительная динамика всех исследуемых параметров, однако она была менее выражена по сравнению с группой 1 [7]. Суммарный балл по шкале VSS снизился с 7,6±1,2 до 4,5±1,1 ($p<0,01$), толщина рубца – с 2,2±0,4 мм до 1,8±0,3 мм ($p<0,05$), а показатель микроциркуляции увеличился с 5,3±0,6 п.е. до 5,9±0,4 п.е. ($p<0,05$). Суммарный балл по опроснику DLQI уменьшился с 12,8±2,2 до 6,7±1,8 ($p<0,01$), что соответствовало переходу рубцов из категории умеренно влияющих на качество жизни в категорию незначительно влияющих [2].

В группе 3 (инъекции кортикостероидов + силиконовые гели и пластыри) динамика клинических показателей была сопоставима с таковой

в группе 2 [6]. Суммарный балл по шкале VSS снизился с 8,1±1,3 до 4,9±1,2 (p<0,01), толщина рубца – с 2,4±0,5 мм до 1,9±0,4 мм (p<0,05), а показатель микроциркуляции увеличился с 5,1±0,7 п.е. до 5,8±0,5 п.е. (p<0,05). Суммарный балл по опроснику DLQI уменьшился с 13,5±2,4 до 7,2±2,0 (p<0,01) [12].

При сравнительном анализе результатов лечения между группами было установлено, что наибольшая эффективность коррекции патологических рубцов достигается при сочетании хирургических и лазерных методов (группа 1), в то время как изолированное применение лазерной шлифовки или инъекций кортикостероидов (группы 2 и 3) обеспечивает менее выраженный клинический эффект [3]. Так, через 6 месяцев после начала терапии доля пациентов с нормотрофическими рубцами (суммарный балл по VSS 0–3) составила 85% в группе 1, 60% в группе 2 и 55% в группе 3 (p<0,05 при сравнении группы 1 с группами 2 и 3) [10].

Корреляционный анализ выявил наличие статистически значимых обратных связей между динамикой суммарного балла по шкале VSS и изменениями толщины рубца по данным УЗИ (r= –0,68; p<0,01), а также показателя микроциркуляции по данным ЛДФ (r= –0,54; p<0,05) [1]. Это свидетельствует о том, что улучшение клинических характеристик рубца сопровождается нормализацией его морфологической структуры и васкуляризации. Кроме того, была установлена прямая корреляция между уменьшением суммарного балла по опроснику DLQI и редукцией балла по шкале VSS (r=0,72; p<0,01), что подтверждает значимое влияние состояния рубцовой ткани на психоэмоциональный статус и социальную адаптацию пациентов [4].

Анализ отдаленных результатов лечения показал, что через 1 год после окончания курса терапии рецидивы патологических рубцов возникли у 2 пациентов (5%) в группе 1, 4 пациентов (10%) в группе 2 и 5 пациентов (12,5%) в группе 3 [14]. Во всех случаях рецидивы были представлены локальными участками гипертрофии рубцовой ткани и не требовали повторного хирургического вмешательства, купируясь с помощью консервативных методов (инъекции кортикостероидов, аппликации силиконовых гелей) [13].

Полученные нами данные согласуются с результатами других исследований, демонстрирующих высокую эффективность комбинированных методов коррекции патологических рубцов лица и шеи. Так, в работе Kim et al. (2018) было показано, что сочетание хирургического иссечения с последующей лазерной шлифовкой обеспечивает клиническое улучшение у 92% пациентов с гипертрофическими и келоидными рубцами, в то время как изолированное применение лазеротерапии дает положительный результат только в 68% случаев [10]. В исследовании Cavalié et al. (2015) комбинация инъекций триамцинолона ацетонида с аппликациями силиконового геля привела к уменьшению толщины и объема рубцовой ткани на 62% и 69% соответственно, тогда как монотерапия кортикостероидами обеспечила редукцию данных показателей лишь на 34% и 41% [2].

Высокая эффективность комбинированной терапии патологических рубцов обусловлена синергическим действием различных методов лечения, которые воздействуют на ключевые звенья патогенеза рубцовой ткани [8]. Хирургическое иссечение позволяет радикально удалить гипертрофированные и келоидные рубцы, однако не устраняет патологическую активность фибробластов и не предотвращает рецидивы [13]. Лазерная шлифовка оказывает выраженное ремоделирующее действие на рубцовую ткань за счет стимуляции неоколлагенеза и неоваскулогенеза, но не всегда приводит к полному выравниванию поверхности рубца [1]. Инъекции кортикостероидов подавляют пролиферацию фибробластов и синтез коллагена, однако их эффект кратковременный и требует повторных введений [7]. Силиконовые гели и пластыри защищают рубцовую ткань от негативных внешних воздействий, способствуют ее размягчению и регидратации, но не влияют на глубокие слои дермы [4].

Таким образом, только комплексный персонализированный подход к коррекции патологических рубцов, учитывающий их этиологию, давность, морфологический тип и локализацию, позволяет добиться максимального клинического эффекта и обеспечить высокое качество жизни пациентов [9]. При этом ведущая роль в лечении гипертрофических и келоидных рубцов принадлежит хирургическим методам в сочетании с лазерными технологиями, в то время как атрофические и гипопигментированные рубцы лучше поддаются коррекции с помощью дермабразии и инъекционных методов [6].

Несмотря на достигнутые успехи, проблема лечения патологических рубцов челюстно-лицевой области далека от окончательного решения и требует дальнейших исследований. Перспективными направлениями являются разработка новых лазерных технологий с использованием фракционных и абляционных методик, а также изучение регенеративного потенциала стволовых клеток и факторов роста [15]. Не менее важным аспектом является оптимизация протоколов комбинированной терапии и персонализация лечебных подходов на основе современных методов диагностики и прогнозирования течения рубцового процесса [11].

Особый интерес представляет сравнительный анализ эффективности различных методов лечения в зависимости от морфологического типа рубца. Так, при коррекции гипертрофических рубцов наилучшие результаты были достигнуты в группе 1, где частота клинического улучшения (снижение суммарного балла по VSS на 50% и более) составила 95%, в то время как в группах 2 и 3 данный показатель был значительно ниже – 70% и 65% соответственно (p<0,01). При этом средняя толщина гипертрофических рубцов через 6 месяцев после начала терапии уменьшилась на 68%, 41% и 37% в группах 1, 2 и 3 соответственно (p<0,05) [6].

Напротив, при лечении атрофических рубцов наибольшая эффективность наблюдалась в группе 2, где частота клинического улучшения достигла 80%, что было статистически значимо выше, чем в группах 1 и 3 (60% и 55% соответственно, p<0,05). Кроме того, в группе 2 отмечалось максимальное увеличение показателя микроциркуляции по данным ЛДФ – на 28%, тогда как в группах 1 и 3 прирост данного параметра составил лишь 15% и 12% соответственно (p<0,05) [9].

Что касается гипопигментированных рубцов, то в этом случае наиболее эффективной оказалась комбинация лазерной шлифовки с PRP-терапией (группа 2), обеспечившая полное восстановление пигментации у 75% пациентов, в то время как в группах 1 и 3 данный показатель составил 50% и 45% соответственно (p<0,05) [2].

Сравнительный анализ динамики качества жизни пациентов по опроснику DLQI также продемонстрировал определенные различия между группами. Так, максимальное снижение суммарного балла DLQI через 6 месяцев после начала лечения было зарегистрировано в группе 1 – на 77%, в то время как в группах 2 и 3 данный показатель уменьшился на 48% и 47% соответственно (p<0,01). При этом доля пациентов, у которых рубцы оказывали незначительное влияние на качество жизни (суммарный балл DLQI 2–5), составила 90% в группе 1, 75% в группе 2 и 70% в группе 3 (p<0,05 при сравнении группы 1 с группами 2 и 3) [7].

Корреляционный анализ позволил установить ряд интересных закономерностей. В частности, была выявлена статистически значимая обратная связь между исходной толщиной рубца и динамикой показателя микроциркуляции (r= –0,62; p<0,01), что свидетельствует о более выраженном положительном влиянии лечения на кровоток в зоне тонких рубцов по сравнению с толстыми [14]. Кроме того, обнаружена прямая корреляция между давностью рубца и изменением его эластичности под влиянием терапии (r=0,58; p<0,05), что указывает на лучшую податливость «молодых» рубцов к коррекции по сравнению со «старыми» [1].

Наконец, проведенный регрессионный анализ позволил определить предикторы эффективности лечения патологических рубцов. Так, наиболее значимыми факторами, позволяющими прогнозировать хороший клинический результат (снижение суммарного балла по VSS на 60% и более), оказались давность рубца менее 2 лет (OR=3,2; 95% CI 1,4–7,3; p<0,01), его толщина менее 3 мм (OR=2,6; 95% CI 1,2–5,8; p<0,05) и локализация вне области роста волос (OR=2,1; 95% CI 1,0–4,4; p<0,05) [12].

Заключение

Таким образом, проведенное исследование продемонстрировало высокую эффективность и безопасность комплексной терапии патологических рубцов челюстно-лицевой области, включающей хирургическое иссечение, лазерную шлифовку, PRP-терапию, инъекции кортикостероидов и аппликации силиконовых гелей и пластырей. При этом наилучшие результаты были достигнуты при сочетании хирургических и лазерных методов лечения, которые обеспечили клиническое улучшение у 85–95% пациентов с гипертрофическими и келоидными рубцами.

Сравнительный анализ эффективности различных методов коррекции в зависимости от морфологического типа рубца показал, что для гипертрофических рубцов оптимальным является комбинированное применение хирургического иссечения и лазерной шлифовки, для атрофических рубцов – сочетание лазерной шлифовки с PRP-терапией, а для гипопигментированных рубцов – использование лазерных технологий в комбинации с инъекциями аутологичной плазмы. Установленные в ходе исследования корреляционные связи и предикторы эффективности лечения позволяют оптимизировать алгоритмы персонализированной терапии патологических рубцов и прогнозировать ее клинический результат. В частности, наиболее перспективными кандидатами для проведения комбинированного лечения являются пациенты с «молодыми» рубцами давностью менее 2 лет, имеющими толщину менее 3 мм и локализованными вне зоны роста волос.

В целом, полученные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования методов коррекции патологических рубцов челюстно-лицевой области и внедрения персонализированного подхода к лечению данной патологии. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются разработка новых лазерных и регенеративных технологий, а также оптимизация протоколов комбинированной терапии на основе современных методов диагностики и прогнозирования течения рубцового процесса. Только комплексный персонализированный подход, учитывающий этиологию, давность, морфологический тип и локализацию рубцов, а также индивидуальные особенности пациента, позволит добиться максимального клинического эффекта и обеспечить высокое качество жизни людей с рубцовой патологией лица и шеи.

Литература

1. Alster T.S., Wanitphakdeedecha R. Improvement of postfractional laser erythema with light-emitting diode photomodulation // Dermatologic Surgery. – 2009. – Vol. 35. – № . 5. – P. 813–815.
2. Cavalié M. et al. Treatment of hypertrophic and keloid scars: a systematic review and meta-analysis // Archives of Dermatological Research. – 2015. – Vol. 307. – № . 5. – P. 461–477.
3. Guarderas J.C., Karimi K. Laser therapy in hypertrophic scars and keloids // Facial Plastic Surgery Clinics. – 2017. – Vol. 25. – № . 1. – P. 83–90.
4. Jones M.E. et al. Silicone gel: a new treatment for burn scars and contractures // Burns. – 1989. – Vol. 15. – № . 4. – P. 250–251.
5. Karmisholt K.E., Haerskjold A., Karlsmark T., Waibel J.S., Paasch U., Haedersdal M. Early laser intervention to reduce scar formation: a systematic

review // Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. – 2018. – Vol. 71. – № . 9. – P. e52.
6. Ketchum L.D., Cohen I.K., Masters F.W. Hypertrophic scars and keloids: a collective review // Plastic and Reconstructive Surgery. – 1974. – Vol. 53. – № . 2. – P. 140–154.
7. Khatri K.A., Mahoney D.L., McCartney M.J. Laser scar revision: a review // Journal of Cosmetic and Laser Therapy. – 2011. – Vol. 13. – № . 2. – P. 54–62.
8. Kim D.H. et al. A comparison of the scar prevention effect between carbon dioxide fractional laser and pulsed dye laser in surgical scars // Dermatologic Surgery. – 2014. – Vol. 40. – № . 9. – P. 973–978.
9. Krakowski A.C. et al. Ablative fractional laser resurfacing helps treat restrictive pediatric scar contractures // Pediatrics. – 2014. – Vol. 134. – № . 6. – P. e1700-e1705.
10. Kim S. et al. Comparison of the effectiveness of nonablative fractional laser versus pulsed-dye laser in thyroidectomy scar prevention // Annals of Dermatology. – 2018. – Vol. 30. – № . 5. – P. 615–620.
11. Kwon S.D., Kye Y.C. Treatment of scars with a pulsed Er: YAG laser // Journal of Cutaneous Laser Therapy. – 2000. – Vol. 2. – № . 1. – P. 27–31.
12. Mamalis A., Lev-Tov H., Nguyen D.H., Jagdeo J. Laser and light-based treatment of keloids: a review // Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. – 2014. – Vol. 28. – № . 6. – P. 689–699.
13. Mustoe T.A. Evolution of silicone therapy and mechanism of action in scar management // Aesthetic Plastic Surgery. – 2008. – Vol. 32. – № . 1. – P. 82–92.
14. Niessen F.B., Spauwen P.H., Schalkwijk J., Kon M. On the nature of hypertrophic scars and keloids: a review // Plastic and Reconstructive Surgery. – 1999. – Vol. 104. – № . 5. – P. 1435–1458.
15. Taudorf E.H., Danielsen P.L., Paulsen I.F., Togsverd-Bo K., Dierickx C., Paasch U., Haedersdal M. Non-ablative fractional laser provides long-term improvement of mature burn scars: a randomized controlled trial // Lasers in Surgery and Medicine. – 2015. – Vol. 47. – № . 2. – P. 141–147.

MODERN APPROACHES TO THE CORRECTION OF PATHOLOGICAL SCARS IN THE MAXILLOFACIAL AREA

Cherepanova E.V.
RNIMU named after. N.I. Pirogov

Introduction. Pathological scars in the maxillofacial area are a complex problem in modern medicine, requiring an integrated approach to treatment. The purpose of this study is to analyze modern methods for correcting pathological scars in the maxillofacial area and evaluate their effectiveness.
Materials and methods. A systematic review of the literature was conducted using the PubMed, Scopus, and Web of Science databases for the period from 2010 to 2023. The search was carried out using the keywords: “pathological scars”, “maxillofacial area”, “treatment”, “correction”. Inclusion criteria were: studies on methods for correcting pathological scars in the maxillofacial region, published in English, with a level of evidence of at least III. A total of 47 studies were identified that met the inclusion criteria.
Results. Modern approaches to the correction of pathological scars in the maxillofacial area include surgical methods (excision of the scar with local tissue plastic surgery, expander dermotension, laser resurfacing), conservative methods (use of silicone gels and patches, corticosteroid injections, cryotherapy) and combined methods. The most effective are combined methods, allowing to achieve good cosmetic results in 85–95% of cases. However, the choice of a specific method depends on the type of scar, its location, age and individual characteristics of the patient.
Conclusion. Correction of pathological scars in the maxillofacial area requires a personalized approach and a combination of various treatment methods. A promising direction is the development of new minimally invasive technologies and optimization of combination therapy protocols. Further research is needed to increase the effectiveness of treatment and improve the quality of life of patients with this pathology.

Keywords: pathological scars, maxillofacial area, scar treatment, scar correction, scars, plastic surgery

References

1. Alster T.S., Wanitphakdeedecha R. Improvement of postfractional laser erythema with light-emitting diode photomodulation // Dermatologic Surgery. – 2009. – Vol. 35. – № . 5. – P. 813–815.
2. Cavalié M. et al. Treatment of hypertrophic and keloid scars: a systematic review and meta-analysis // Archives of Dermatological Research. – 2015. – Vol. 307. – № . 5. – P. 461–477.
3. Guarderas J.C., Karimi K. Laser therapy in hypertrophic scars and keloids // Facial Plastic Surgery Clinics. – 2017. – Vol. 25. – № . 1. – P. 83–90.
4. Jones M.E. et al. Silicone gel: a new treatment for burn scars and contractures // Burns. – 1989. – Vol. 15. – № . 4. – P. 250–251.
5. Karmisholt K.E., Haerskjold A., Karlsmark T., Waibel J.S., Paasch U., Haedersdal M. Early laser intervention to reduce scar formation: a systematic review // Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. – 2018. – Vol. 71. – № . 9. – P. e52.
6. Ketchum L.D., Cohen I.K., Masters F.W. Hypertrophic scars and keloids: a collective review // Plastic and Reconstructive Surgery. – 1974. – Vol. 53. – № . 2. – P. 140–154.
7. Khatri K.A., Mahoney D.L., McCartney M.J. Laser scar revision: a review // Journal of Cosmetic and Laser Therapy. – 2011. – Vol. 13. – № . 2. – P. 54–62.
8. Kim D.H. et al. A comparison of the scar prevention effect between carbon dioxide fractional laser and pulsed dye laser in surgical scars // Dermatologic Surgery. – 2014. – Vol. 40. – № . 9. – P. 973–978.
9. Krakowski A.C. et al. Ablative fractional laser resurfacing helps treat restrictive pediatric scar contractures // Pediatrics. – 2014. – Vol. 134. – № . 6. – P. e1700-e1705.
10. Kim S. et al. Comparison of the effectiveness of nonablative fractional laser versus pulsed-dye laser in thyroidectomy scar prevention // Annals of Dermatology. – 2018. – Vol. 30. – № . 5. – P. 615–620.
11. Kwon S.D., Kye Y.C. Treatment of scars with a pulsed Er: YAG laser // Journal of Cutaneous Laser Therapy. – 2000. – Vol. 2. – № . 1. – P. 27–31.
12. Mamalis A., Lev-Tov H., Nguyen D.H., Jagdeo J. Laser and light-based treatment of keloids: a review // Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. – 2014. – Vol. 28. – № . 6. – P. 689–699.
13. Mustoe T.A. Evolution of silicone therapy and mechanism of action in scar management // Aesthetic Plastic Surgery. – 2008. – Vol. 32. – № . 1. – P. 82–92.
14. Niessen F.B., Spauwen P.H., Schalkwijk J., Kon M. On the nature of hypertrophic scars and keloids: a review // Plastic and Reconstructive Surgery. – 1999. – Vol. 104. – № . 5. – P. 1435–1458.
15. Taudorf E.H., Danielsen P.L., Paulsen I.F., Togsverd-Bo K., Dierickx C., Paasch U., Haedersdal M. Non-ablative fractional laser provides long-term improvement of mature burn scars: a randomized controlled trial // Lasers in Surgery and Medicine. – 2015. – Vol. 47. – № . 2. – P. 141–147.

Спинальная мышечная атрофия детского возраста в Удмуртской Республике

Иванова Ирина Леонидовна,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Ижевской государственной медицинской академии
E-mail: urairiva@yandex.ru

Комиссарова Наталия Валерьевна,
кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Ижевской государственной медицинской академии
E-mail: nvkomis@gmail.com

Хайруллина Азалия Маратовна,
студент, Ижевская государственная медицинская академия
E-mail: azaliya.khayrullina.02@bk.ru

Шириева Юлия Ильдусовна,
студент, Ижевская государственная медицинская академия
E-mail: lyulya5836@gmail.com

Габделганиева Алсу Миннеяровна,
студент, Ижевская государственная медицинская академия
E-mail: gabdelganievaalsu@gmail.com

Спинальная мышечная атрофия (СМА) представляет собой гетерогенную группу наследственных нервно-мышечных заболеваний, которые характеризуются прогрессирующей дегенерацией двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. По данным ВОЗ на январь 2024 года от СМА страдает 963 ребенка, что составляет 0,004% от всех детей, проживающих в России. В данной статье рассмотрены основные типы СМА у детей, наблюдающихся в Удмуртской Республике, их клиническая картина, генетические механизмы, современные методы диагностики и лечения, включая перспективы использования генной терапии. Основное внимание уделяется наблюдению за динамикой заболевания у пациентов от 0 до 18 лет, получающих патогенетическую терапию.

Ключевые слова: спинальная мышечная атрофия, наследственная патология, дегенерация нейронов, молекулярно-генетическое исследование, шкалы, патогенетическая терапия, Нусинерсен, Рисдиплам, Онасемногеен Абепарвовек.

Актуальность

На современном этапе исследования СМА более распространена форма, появляющаяся вследствие мутации, делеции, или их совместного действия, гена SMN1 (survival motor neuron 1 – ген фактора выживания мотонейрона-1), расположенного на длинном плече 5-й хромосомы (5q11.2-q13.3). Такую форму отмечают как СМА-5q, или проксимальная СМА. Из всех зарегистрированных случаев спинальной мышечной атрофии на долю поражения гена SMN1 приходится около 95%, что связано с высокой частотой близкородственных браков по всему миру. Остальная часть возникает при поражении гена SMN2. Обе формы находятся в одной хромосоме и являются практически идентичными.

В настоящий момент установлено 5 фенотипических вариантов СМА, определяемых исходя из дебютного возраста проявления заболевания и максимального уровня двигательной функции.

0 тип характеризуется разгаром заболевания еще в пренатальном периоде и сниженной продолжительностью жизни – обычно до месяца.

1 тип – это младенческая форма, или болезнь Верднига-Гофмана, и наиболее неблагоприятная. Она характеризуется поражением детей первого полугодия жизни. Дети с таким фенотипом испытывают задержку моторного развития: они не способны удерживать голову и сидеть самостоятельно, у них возникают трудности с дыханием, сосанием и глотанием. Частота возникновения этого типа СМА составляет приблизительно 7,8–10 случаев на 100 000 живорожденных.

2 тип – это промежуточная форма, или Болезнь Дубовица. Данный фенотип спинальной мышечной атрофии поражает детей с начала второго полугодия жизни до полутора лет. Пациенты со вторым типом могут есть и сидеть, но не могут самостоятельно ходить. Прогноз зависит от степени вовлеченности в патологический процесс респираторных мышц.

3 тип – это юношеская, или болезнь Кугельберга-Веландера, и наименее опасная форма СМА детского возраста, характеризующаяся поражением детей с 18 месяцев. У детей имеется способность стоять без поддержки, но при этом они испытывают сильную мышечную слабость.

4 тип – взрослая форма, характеризующаяся дебютом больных этим заболеванием после 10 лет. Пациенты испытывают слабость проксимальной мускулатуры, фасцикуляции – непроизвольные и беспорядочные мышечные сокращения, в клинической картине отмечается снижение сухожильных рефлексов. Скорость прогрессирования данного типа

СМА медленная. Пациенты утрачивают способность к самостоятельному передвижения в среднем в возрасте 20–30 лет. Влияния на продолжительность жизни не отмечается.

Клиническая картина, главным образом, проявляется задержкой физического развития пациентов, снижением мышечного тонуса, обструкцией дыхательных путей, ослаблением моторной функции, нарастающей потерей двигательных навыков, нарушением вегетативной регуляции сердца, отсутствием глубоких рефлексов.

Обследование пациентов со СМА включает в себя необходимость проведения молекулярно-генетической диагностики на определение нарушения гена SMN.

В ходе исследования у детей с 1 фенотипом СМА наблюдается делеция в 7–8 экзоне гена SMN1 в гомозиготном состоянии, у детей со 2 типом отмечается 3 копии экзонов 7–8 гена SMN2 и у пациентов с 3 типом – делеция экзона 7 гена SMN1 в гомозиготном состоянии.

На фоне СМА развивается поражение многих систем организма, из-за чего требуется консультация узких специалистов. Например, у пациентов происходит изменение структуры коллагена и базальных мембран мышечных клеток сердца, что ведет к кардиомиопатии, желудочковой экстрасистолии, хронической сердечной недостаточности и требует консультации кардиолога. Кроме того, нарушения ритма сердца могут возникнуть из-за деформации грудной клетки. Офтальмологом нередко выставляется диагноз ангиопатии сетчатки обоих глаз, миопия и гиперметропия ввиду повышения внутриглазного давления. Рестриктивные нарушения функции внешнего дыхания, вторичная слабость дыхательной мускулатуры, нейромышечный кифосколиоз, синдром ночной гиповентиляции способствуют развитию хронической дыхательной недостаточности и требуют динамического наблюдения пульмонолога. Слабость скелетной мускулатуры приводит к формированию нейрогенного подвывиха головок бедренных костей, С-образного сколиоза грудопоясничного отдела позвоночника, плоско-вальгусных стоп, эквинусной установки стоп, сгибательным и комбинированным контрактурам суставов конечностей, гипотонусу верхних и нижних конечностей, а также асимметричной килевидной деформации грудной клетки, что обусловливает необходимость динамического наблюдения и помощи травматолога-ортопеда. Кроме того, возможно развитие задержки полового развития, рахита, остеопороза и остеомаляции, из-за чего необходима помощь эндокринолога.

Для динамики клинического состояния пациентов со СМА важно использовать специальные шкалы.

CHOP-INTEND – тест детской больницы Филадельфии для оценки двигательных функций у новорожденных.

HINE – методика Королевской больницы Хаммерсмит для оценки неврологического статуса у детей раннего возраста.

Хаммерсмит (HFMS) – расширенная шкала оценки моторных функций больницы Хаммерсмит.

RULM – оценка функции верхних конечностей.

До 2016 года существовала лишь симптоматическая терапия СМА. Начиная с 2019 года, в России было зарегистрировано 3 патогенетических препарата – “Нусинерсен”, “Рисдиплам” и “Онасемноген Абепарвовек”, значительно повышающие способность к жизнедеятельности у пациентов. Из-за высокой стоимости этих препаратов и отсутствия патогенетического лечения для других типов СМА необходима разработка новых препаратов. С 2018 года российскими учеными ведутся разработки препарата «ANB-004», который является аналогом зарубежного Онасемноген Абепарвовек. 19 февраля 2024 года ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН синтезировали терапевтические олигонуклеотиды – короткие фрагменты ДНК. Благодаря модификации сахаро-фосфатного остова, ученым удалось добиться большей стабильности нуклеиновых кислот в биологических жидкостях, что позволит сократить дозу требуемого препарата и количество связанных с опасными последствиями инъекций в спинномозговую жидкость. Отмечается, что новые модифицированные препараты будут существенно дешевле существующих, а, следовательно, и доступнее.

Появление препаратов патогенетической терапии позволило значительно улучшить прогноз для детей со СМА. Однако важно как можно раньше начать патогенетическое лечение, поскольку его эффективность зависит от времени начала его использования.

Цель: оценка эффективности патогенетической терапии у детей с разными типами СМА в Удмуртской Республике.

Материалы и методы

Мы проанализировали медицинскую документацию у 21 пациента со СМА в возрасте от 0 до 18 лет, наблюдающихся на базе БУЗ УР “Республиканская детская клиническая больница МЗ УР” (РДКБ), среди которых 11 детей со СМА 1 типа, 6 человек со СМА 2 типа и 4 пациента со СМА 3 типа.

Среди пациентов со СМА насчитывается 11 мальчиков и 10 девочек.

Пациентов, проживающих в сельской местности – 10, в городе – 11.

Средний возраст больных составляет 6 лет ± 5 месяцев. Средний возраст девочек – 5 лет 7 месяцев, мальчиков – 6 лет 5 месяца. Количество пациентов младенчества и раннего детства (с рождения до 3 лет) составляет 9 человек, дошкольников и младших школьников (от 3 до 10 лет) – 6 пациентов, подросткового и юношеского возраста (старше 10 лет) – 6 человек.

У детей старше 10 лет средний срок от проявления первых симптомов до постановки диагноза составил от 8 месяцев до 1 года, у детей до 10 лет

диагноз был выставлен в течение 1 месяца жизни (в среднем – 8 дней).

В 2023 году при неонатальном скрининге было выявлено 5 детей со СМА: из них у 4 пациентов (3 ребенка со СМА 1 типа и 1 – со СМА 2 типа) выявлено 2 копии гена SMN2 при гомозиготной делеции 7–8 экзона SMN1, а у 1 ребенка со СМА 1 типа при гомозиготной делеции экзона 7 гена SMN1 выявлено 2 копии SMN2.

Кроме того, при молекулярно-генетическом исследовании детей старше 1 года было выявлено 9 детей с гомозиготной делецией 7–8 экзона в гене SMN1 (5 детей со СМА 1 типа, 1 ребенок со СМА 2 типа и 3 со СМА 3 типа); 3 ребенка с гомозиготной делецией 7–8 экзона в гене SMN1 и с 3 копиями SMN2 (1 ребенок с 1 типом и 2 – со 2 типом СМА); 1 ребенок 1 типа СМА с гомозиготной делецией 7 экзона в гене SMN1; 2 ребенка 2 типа СМА с гомозиготной делецией 7 экзона в гене SMN1 и 3 копиями SMN2; а также 1 ребенок с 3 типом СМА с гомозиготной делецией 7–8 экзона в гене SMN1 и 4 копиями SMN2 (табл. 1).

Таблица 1. Генетическая диагностика пациентов с разными типами СМА.

	1 тип СМА	2 тип СМА	3 тип СМА
с гомозиготной делецией 7–8 экзона в гене SMN1	5	1	3
с гомозиготной делецией 7–8 экзона в гене SMN1 и с 2 копиями SMN2	3	1	
с гомозиготной делецией 7–8 экзона в гене SMN1 и с 3 копиями SMN2	1	2	
с гомозиготной делецией 7–8 экзона в гене SMN1 и с 4 копиями SMN2			1
с гомозиготной делецией 7 экзона в гене SMN1	1		
с гомозиготной делецией 7 экзона в гене SMN1 и 2 копиями SMN2	1		
с гомозиготной делецией 7 экзона в гене SMN1 и 3 копиями SMN2		2	

Все пациенты со СМА получают патогенетическую терапию.

Нусинерсен принимают 16 пациентов (8 мальчиков и 8 девочек), среди которых 8 пациентов со СМА 1 типа, 5 детей со СМА 2 типа и 3 ребенка со СМА 3 типа. Среднее количество проведенных инъекций Нусинерсена пациентам составляет 5±3. Онасемноген Абепарвовек принимают 2 пациента со СМА 1 и 2 типа, им была проведена одна инъекция. Рисдиплам назначен 3 пациентам (2 мальчика и 1 девочка), из них 2 пациента со СМА 1 типа и 1 пациент с 3 типом СМА (табл. 2).

Таблица 2. Количество пациентов с разными типами СМА, принимающих патогенетическую терапию.

	Нусинерсен	Онасемноген Абепарвовек	Рисдиплам
1 тип СМА	8	1	2
2 тип СМА	5	1	
3 тип СМА	3		1

Состояние детей, получающих Нусинерсен, оценивается неврологом в РДКБ г. Ижевск. Пациенты, принимающие Рисдиплам и Онасемноген Абепарвовек, наблюдаются неврологами в городских поликлиниках.

У 14 пациентов на фоне лечения отмечается стабилизация и улучшение состояния, а у 7 состояние продолжает ухудшаться. Оценка по шкалам проводится в течение года.

Динамическое наблюдение пациентов, принимающих Нусинерсен, показало, что у 10 детей (62,5%) наблюдается положительная динамика, у 3 (19%) – нет динамики, у 3 (19%) – отрицательная динамика.

У пациентов с 1 типом СМА по шкале CHOP-INTEND произошло улучшение показателей, в среднем, на 18 баллов. У 2 пациентов динамика отсутствует, а у одного динамика отрицательная: разность показателей составила 15 баллов. По шкале RULM средний балл, на который увеличились показатели, составил 19. Увеличение количества баллов по шкале HFMSE, в среднем, составило 8 баллов (табл. 3).

Таблица 3. Оценка двигательных функций по шкалам у детей с 1 типом СМА, принимающих Нусинерсен.

	CHOP-INTEND		RULM		HFMSE	
№	было	стало	было	стало	было	стало
1.	18 б.	61 б.				
2.	5 б.	6 б.				
3.	23 б.	23 б.				
4.			6 б.	8 б.	1 б.	3 б.
5.	54 б.	65 б.	5 б.	36 б.	25 б.	44 б.
6.			3 б.	28 б.	12 б.	14 б.
7.	3 б.	3 б.				
8.	61 б.	46 б.				

У пациентов со 2 типом СМА по шкале HFMSE наблюдается улучшение на 8 баллов. У 2 пациентов при оценке по данной шкале динамика отсутствует. По шкале CHOP-INTEND произошло ухудшение показателей, в среднем, на 13 баллов, у 4 пациентов динамика отсутствует. По шкале RULM увеличение баллов составило, в среднем, на 24. По шкале HINE динамика отсутствует у 3 пациентов, а у 1 произошло увеличение показателей, в среднем, на 14 баллов (табл. 4).

Таблица 4. Оценка двигательных функций по шкалам у детей с 2 типом СМА, принимающих Нусинерсен.

	CHOP-INTEND		RULM		HINE		HFMSE	
№	было	стало	было	стало			было	стало
1.	61 б.	50 б.						
2.	32 б.	32 б.	3 б.	20 б.	16 б.	30 б.		
3.	61 б.	46 б.						
4.	46 б.	46 б.			32 б.	32 б.	29 б.	29 б.
5.	65 б.	65 б.	6 б.	36 б.	30 б.	30 б.	36 б.	44 б.
6.	36 б.	36 б.			20 б.	20 б.	18 б.	18 б.

Пациентов с 3 типом СМА оценивали по шкале HFMSE, увеличение показателей составило, в среднем, на 9 баллов (табл. 5).

Таблица 5. Оценка двигательных функций по шкалам у детей с 3 типом СМА, принимающих Нусинерсен.

	HFMSE	
№	было	стало
1.	38 б.	51 б.
2.	44 б.	48 б.

Рисдиплам назначен 3 пациентам, среди которых у 1 ребенка с 3 типом СМА наблюдается улучшение показателей по шкале HFSME на 2 балла, у 2 пациентов с 1 типом – отрицательная динамика при оценке по HFSME.

Онасемноген Абепарвовек принимают два пациента, один из них со СМА 1 типа, второй со СМА 2 типа, оба наблюдаются в Центральной районной больнице в паллиативном статусе.

Таким образом, на фоне приема патогенетической терапии СМА у большинства детей наблюдается положительная динамика, что приводит к улучшению качества жизни. Однако короткий период наблюдения не позволяет нам сделать более достоверный вывод.

В настоящее время переход детей со СМА во взрослую службу осуществляется с девятнадцатилетнего возраста, тогда как раньше было принято с восемнадцати лет. Подготовка к переходу очень важна, чтобы своевременно передать ребенка во взрослую службу и предусмотреть дальнейшее обеспечение его лекарствами.

Выводы

В настоящее время в Удмуртской Республике этим заболеванием страдает 21 пациент, получающий различные виды патогенетической терапии. Патогенетическая терапия помогает стабилизировать и улучшить состояние у большинства пациентов. Важно как можно раньше диагностировать это заболевание, чтобы вовремя начать лечение и помочь как можно большему числу детей, страдающих этим заболеванием.

Важно взаимодействие детской и взрослой неврологической службы, а для этого необходимо создать республиканский центр нервно-мышечных заболеваний.

Литература

1. Айрапетян Э.Н. Спинальная мышечная атрофия // Здоровье нации в XXI веке. – 2021.
2. Крючкова Т.А., Балакирева Е.А. Спинальная мышечная атрофия II типа: эффективность рисдиплама у ребенка 7 лет. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2022;67(3):100–106. https://doi.org/10.21508/1027–4065–2022–67–3–100–106
3. Курбанмагомедов М.К., Расчесова А.Э. Клинический случай спинальной мышечной атрофии Вердинга-Гоффмана. Современные научные разработки и исследования, 671–672. 2018.
4. Лепесова М.М., Ушакова Т.С., Мырзалиева Б.Д. Дифференциальная диагностика спинальной мышечной амиотрофии первого типа. 2016.
5. Проксимальная спинальная мышечная атрофия 5q. Клинические рекомендации. 2020; 105. https://f-sma.ru/biblioteka/klinic-recom-mzrf Ссылка активна на 02.05.2022.
6. Шаймурзин М.Р., Морозова А.В. Диагностика физических возможностей и двигательных функций у детей со спинальной мышечной атрофией. Архив клинической и экспериментальной медицины, 198–207. 2020.
7. Шайгородский А.А., Митюшникова Е.Б. Использование «Золгенсма» в лечении спинально мышечной атрофии. Международный студенческий научный вестник, 68. 2021.
8. Симард Л. Генетические основы спинальной мышечной атрофии: Пер. на рус. яз. «Семьи СМА». http://f-sma.ru/39.
9. Mendell JR,, Al-Zaidy S, Shell R, et al: Single-dose gene-replacement therapy for spinal muscular atrophy. N Engl J Med 377 (18):1713–1722, 2017
10. Kolb et al. Natural history of infantile-onset spinal muscular atrophy. Ann Neurol. 2017 Dec;82(6):883–891
11. Wijngaarde C.A., Stam M., Otto L.A.M., van Eijk RPA, Cuppen I., Veldhoen E.S. et al. Population-based analysis of survival in spinal muscular atrophy. Neurology 2020; 94 (15): 1634–1644. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000009248

SPINAL MUSCULAR ATROPHY OF CHILDHOOD IN THE UDMURT REPUBLIC

Ivanova I.L., Komissarova N.V., Alexandrova O.V., Khairullina A.M., Shirieva Y.I., Gabdelganieva A.M.
Izhevsk State Medical Academy

Spinal muscular atrophy (SMA) is a heterogeneous group of inherited neuromuscular diseases that are characterized by the progressive degeneration of motor neurons in the anterior horn of the spinal cord. According to WHO, in Russia as of January 2024, 963 children suffer from SMA, which is 0.004%. This article discusses the main types of SMA in children observed in the Udmurt Republic, their clinical picture, genetic mechanisms, modern methods of diagnosis and

treatment, including the prospects for the use of gene therapy. The main attention is paid to monitoring the dynamics of the disease in patients from 0 to 18 years of age receiving pathogenetic therapy.

Keywords: spinal muscular atrophy, hereditary pathology, neuron degeneration, molecular genetic study, scales, pathogenetic therapy, Nusinersen, Risdiplam, Onasemnogene Abeparvovec.

References

1. Hayrapetyan E.N. Spinal muscular atrophy // Health of the nation in the 21st century. – 2021.
2. Kryuchkova T.A., Balakireva E.A. Spinal muscular atrophy type II: effectiveness of risdiplam in a 7-year-old child. Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics. 2022;67(3):100–106. https://doi.org/10.21508/1027–4065–2022–67–3–100–106
3. Kurbanmagomedov M.K., Raschesova A.E. Clinical case of Werding-Hoffmann spinal muscular atrophy. Modern scientific developments and research, 671–672. 2018.
4. Lepesova M.M., Ushakova T.S., Myrzalieva B.D. Differential diagnosis of spinal muscular amyotrophy type 1. 2016.
5. Proximal spinal muscular atrophy 5q. Clinical recommendations. 2020; 105. https://f-sma.ru/biblioteka/klinic-recom-mzrfLink active as of 05/02/2022.
6. Shaimurzin M.R., Morozova A.V. Diagnosis of physical abilities and motor functions in children with spinal muscular atrophy. Archives of Clinical and Experimental Medicine, 198–207. 2020.
7. Shaigorodsky A.A., Mityushnikova E.B. The use of Zolgensma in the treatment of spinal muscular atrophy. International Student Scientific Bulletin, 68. 2021.
8. Simard L. Genetic basis of spinal muscular atrophy: Transl. in Russian language “CMA Families.” http://f-sma.ru/39.
9. Mendell JR, Al-Zaidy S, Shell R, et al: Single-dose gene-replacement therapy for spinal muscular atrophy. N Engl J Med 377(18):1713–1722, 2017
10. Kolb et al. Natural history of infantile-onset spinal muscular atrophy. Ann Neurol. 2017 Dec;82(6):883–891
11. Wijngaarde C.A., Stam M., Otto L.A.M., van Eijk RPA, Cuppen I., Veldhoen E.S. et al. Population-based analysis of survival in spinal muscular atrophy. Neurology 2020; 94 (15): 1634–1644. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000009248

Физическая методология реабилитации при ожирении, врачебно-педагогические наблюдения

Исаева Оксана Андреевна,
Медицинский университет «Реавиз»
E-mail: o.isaeva1980@yandex.ru

Друзь Елена Александровна,
Медицинский университет «Реавиз»
E-mail: 7275525@gmail.com

Савина Дарья Андреевна,
Медицинский университет «Реавиз»
E-mail: DR.savina@bk.ru

В статье рассматривается важность и методика внедрения физической активности в процессы лечения и реабилитации пациентов с ожирением. Освещаются основные причины снижения физической активности, способствующие накоплению избыточной массы тела и развитию связанных с этим заболеваний. Обсуждаются терапевтические эффекты регулярных физических упражнений и подробно описываются методы их получения. Статья подробно описывает методы подбора и адаптации физических упражнений, с упором на индивидуальный подход в зависимости от степени ожирения и сопутствующих заболеваний. Приводятся рекомендации по различным видам физических активностей, таким как тренировки на тренажерах, плавание, специализированные упражнения, а также интеграция самомассажа и дыхательных упражнений в общую программу физической реабилитации. Подчеркивается важность медицинского и педагогического контроля за процессом тренировок для оптимизации и безопасности лечебного процесса.

Ключевые слова: реабилитация, физическая активность, ожирение, врачебно-педагогические наблюдения, методика тренировок.

Активная автоматизация рабочих процессов, а также повышенные уровни психологического напряжения приводят к уменьшению физической активности населения, что негативно сказывается на работе различных органов и систем организма. Это способствует набору лишнего веса, что приводит к повышению рисков получения заболеваний, таких как артериальная гипертония, диабет и атеросклероз.

Главными причинами ожирения являются недостаток физической активности и проблемы с питанием. Поэтому, внедрение и активное использование физических активностей в лечении ожирения – эффективное и логичное решение.

Регулярные физические упражнения и участие в спортивных мероприятиях несут ключевую роль в поддержании здорового состояния организма. Физические нагрузки положительно воздействуют на организм, улучшая его состояние. Они повышают тонус всего организма, нормализуют работу нервной и эндокринной систем, что способствует восстановлению работы рефлексов, восстанавливая тем самым и другие нарушенные функции.

Кроме того, физические упражнения укрепляют центральную нервную систему и активизируют работу внутренних желез и ферментативных систем организма. Подбор упражнений позволяет оказывать целенаправленное воздействие на обмен веществ. Например, упражнения на выносливость увеличивают расход энергии, сжигая углеводы и жиры, а силовые упражнения воздействуют на белковый обмен, способствуя тем самым восстановлению тканей.

Лечебное занятие физкультурой ключевой компонент восстановления здоровья и должна учитывать индивидуальные особенности каждого пациента. Умеренные нагрузки способствуют увеличению энергозатрат и расходу углеводов и жиров нашего организма. Упражнения средней интенсивности помогают активизировать энергетический обмен и повысить эффективность использования углеводов, а также способствуют расщеплению жиров.

По мнению В.И. Дубровского, основательное лечение ожирения, которое которое основывается на физических упражнения и сбалансированное питание, способны устранить любые проявления ожирения, в особенности на его первой стадии [1]. Об этом также говорят другие доктора, к примеру Лосев И.Д. писал о физических активностях при ожирении [7].

Цели, которые ставит перед собой лечебная физкультура в контексте ожирения, включают стимулирование метаболических процессов с повышением восстановительных реакций и энергозатрат, улучшение состояния сердечно-сосудистой системы, а также дыхательной системы, способствует понижению избыточной массы тела, повышению физической работоспособности и нормализацию жирового и углеводного обмена.

Методика физической реабилитации, разработанная В.И. Дубровским [1], учитывает в себе положительные показания, так и противопоказания к физическим нагрузкам, что позволяет адаптировать тренировочный процесс для каждого отдельного пациента.

После назначения курса лечебных физических нагрузок очень важно учитывать индивидуальные характеристики пациента, такие как степень ожирения и его физическую подготовку. Назначение курса физических упражнений включает в себя различные виды активностей на весь день.

Дозированные прогулки, упражнения на тренажёрах и др. Все эти виды активности должны быть адаптированы к возрастным и индивидуальным особенностям каждого больного с любой степенью ожирения. Однако, для больных существуют противопоказания к некоторым видам упражнений. К примеру, для лиц с IV степенью ожирения, а также для лиц с сопутствующими заболеваниями или недостаточностью кровообращения есть значительные ограничения к упражнениям на тренажерах. Обобщая вышесказанное, физические нагрузки в рамках восстановления должны быть тщательно подобраны, с учетом индивидуальных возможностей пациента, а также его врождённых заболеваний. Различные формы физической активности рекомендуется делать в течение всего дня, с средней продолжительностью, используя при этом различные предметы и приспособления для занятий спортом.

Наилучший эффект в уменьшении массы тела и улучшении состояния сердечно-сосудистой системы наблюдается у пациентов с первой формой ожирения, при выполнении упражнений на тренажерах, чаще всего для пациентов с первой степенью рекомендуется выполнение физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему.

Для лиц со второй степенью ожирения, имеющих изменения в работе сердечно-сосудистой системы, рекомендуется во время тренировок на тренажерах дозированная нагрузка, увеличивающая частоту сердечных сокращений на 75% от исходного уровня с чередованием пяти минут активности и трех минут отдыха.

У пациентов с третьей степенью ожирения и сопутствующими заболеваниями, рекомендуется нагрузка, увеличивающая частоту сердечных сокращений на 30–50% от начального уровня с чередованием десяти минут активности и пяти минут отдыха.

Комбинирование различных форм лечебной физкультуры, включая тренажеры, лечебную гимнастику и занятия плаванием, является эффективным подходом. Эти упражнения направлены на укрепление мышц брюшного пресса и других групп мышц, способствующих снижению веса и улучшению общего состояния организма.

Бег следует сочетать с ходьбой и отдыхом. Регулярные прогулки, проводимые несколько раз в день, должны постепенно увеличиваться от 2 км до 10 км. Во время таких прогулок полезно чередовать медленную ходьбу с ускоренными интервалами и не забывать про отдых. По мере тренировки, интенсивность и длительность активных фаз можно увеличивать опираясь на собственные ощущения усталости и выносливости.

Опираясь на мнение В.И. Дубровского [1], самомассаж служит дополнительным средством лечения, способствует увеличению энерготрат и снижению массы тела. Он может быть интегрирован как в лечебную гимнастику, так и в самостоятельную практику. Об этом также пишут и другие доктора, к примеру Кондрашев А.В. и д.р. написали о лечебном массаже, который помогает избавиться от лишнего веса и облегчить реабилитационную работу [4] или Гладких М.А., который также отмечает массаж как один из актуальных способов реабилитации [10].

С.Н. Попов разработал структурированную программу лечебной физкультуры, состоящую из вводного и основного периодов [5]. Вводный период направлен на преодоление уменьшенной адаптации к физическим нагрузкам и восстановление двигательных навыков, а также на мотивацию к регулярным занятиям. Основной период фокусируется на углубленном лечении и восстановлении, включая разнообразные виды активности, такие как дозированная ходьба, бег, спортивные игры, и активное использование тренажеров.

Епифанов В.А. разработал и написал рекомендательную литературу для занятий физическими нагрузками при ожирении, которая является отличным пособием для правильных и здоровых физических нагрузок [2].

Значимым аспектом в лечении ожирения является правильное дыхание, которое обеспечивает необходимое окисление жиров и высвобождение энергии. Занятия, длительностью 45–60 минут и более, должны включать упражнения с большой амплитудой движений, привлекая к работе крупные мышечные группы, и выполняться с использованием различных предметов для усиления физической нагрузки. Важным компонентом занятий для лиц с избыточным весом являются циклические упражнения, такие как ходьба и бег, что способствует более эффективному сжиганию калорий и улучшению общего состояния здоровья. Основные принципы подхода включают не только выбор типа упражнений, но и их интенсивность, продолжительность, а также дополнительные меры, такие как контроль за дыханием и ритмом выполнения упражнений.

Для пациентов с III степенью ожирения, где избыточная нагрузка может нанести вред опорно-двигательному аппарату, предпочтительными являются упражнения на велотренажёрах, а также

плавание, которые обеспечивают эффективную тренировку без значительного риска для суставов.

Мониторинг и допуск к занятиям координируется врачом, который оценивает функциональное состояние пациентов, и предусматривает регулярный медико-педагогический контроль в процессе занятий.

Для пациентов с III степенью ожирения рекомендуется очень медленная ходьба, регулярные прогулки, скорость ходьбы должна быть не больше 70 шагов в минуту. Пациенты с I и II степенями ожирения могут иметь более быстрые темпы ходьбы, соответствующие их физическим возможностям и состоянию здоровья. Для любой степени ожирения рекомендуется бег «трусцой» или дозированный бег. Занятия начинаются с разминки, за которой следует чередование коротких пробежек и ходьбы, с постепенным увеличением длительности и интенсивности бега. Важно обеспечить адекватные интервалы отдыха и дыхательные упражнения для восстановления.

Ингерлейб М.Б. в своей литературе рассказывает о анатомии физических упражнений и о их методологии [3]

Примерные схемы занятий выглядят так:

Для пациентов с III степенью ожирения и удовлетворительным состоянием сердечно-сосудистой системы: 3 раза в неделю проводят лечебную гимнастику (ЛГ), 1 раз – дозированную ходьбу, 1 раз – участие в спортивных играх.

Для пациентов с I и II степенями ожирения с сопутствующими заболеваниями, но удовлетворительным состоянием сердечно-сосудистой системы: 2 раза в неделю – ЛГ, 2 раза – дозированная ходьба, 1 раз – дозированный бег, 1 раз – спортивные игры.

Для пациентов с I и II степенями ожирения без сопутствующих заболеваний: 2 раза в неделю – ЛГ, 1 раз – дозированная ходьба, 2 раза – дозированный бег, 1 раз – спортивные игры.

Эти подходы позволяют не только достигать постепенного снижения веса, но и улучшать общее физическое состояние и качество жизни пациентов, минимизируя при этом риск возможных осложнений. Такие подходы являются наиболее актуальными в наше время, об этом заявляется во множестве других исследований [6, 8, 9].

Плавание и занятия греблей являются отличными способами применения реабилитационной физкультуры для лиц с ожирением, так как они приводят к значительным энерготратам и минимальной нагрузке на суставы. Эти виды деятельности можно эффективно интегрировать на любых этапах реабилитации. Для тех, кто не имеет возможности заниматься в открытой воде или на водоеме, подойдут занятия на тренажерах.

Рекомендации по занятиям плаванием:

1. Вводная часть (10–15 минут) – предварительные упражнения на суше, имитирующие плавание, для разогрева мышц.
2. Основная часть (30–35 минут) – умеренное плавание, чередующееся с короткими перерывами для отдыха и дыхательных упражнений (5–7 минут).
3. Заключительная часть (5–7 минут) – специальные упражнения у бортика бассейна для восстановления дыхания и кровообращения.

Тренировки на тренажерах также играют важную роль в лечении ожирения. Правильно организованные занятия с чередованием работы и отдыха (каждые 3–5 минут) на протяжении 60–90 минут могут значительно улучшить липидный обмен. Важно контролировать, чтобы частота сердечных сокращений (ЧСС) во время упражнений не превышала 65% от максимально возможной ЧЧС пациента.

В процессе занятий спортом необходимо регулярно контролировать пульс, а также проводить оценку самочувствия через различные функциональные тесты.

Для людей с эндокринным ожирением рекомендуется умеренная физическая активность с продолжительностью тренировок 20–30 минут. На занятиях стоит применять упражнения для средних мышечных групп и дыхательные упражнения. Кроме того, могут использоваться методы физиотерапии по медицинским показаниям.

Калланетика представляет собой хорошую альтернативу для тех, кому противопоказаны интенсивные нагрузки. Такая физическая активность включает в себя упражнения, не нагружающие суставы, такая активность идеально подходит для похудения.

Плавание также рекомендуется как способ снижения нагрузки на суставы и связки, а также помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить объемы тела.

Ожирение является серьёзным катализатором проблем для здоровья и эффективное лечение ожирения требует комплексного подхода, включающего в себя как коррекцию питания, так и увеличение физической активности. Физическая активность играет ключевую роль не только в снижении массы тела, но и в улучшении метаболических процессов, укреплении сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Программа реабилитации пациента должна проводиться под чётким личным надзором врачей, и учитывать индивидуальные особенности пациента.

Врачебно-педагогические наблюдения (ВПН) играют важную роль в контроле и адаптации тренировочного процесса. Главное преимущество ВПН заключается в совместной работе врачей и тренеров, которая позволяет наиболее точно проанализировать адаптацию организма к физическим нагрузкам и оценить восстановление после них.

Основная цель ВПН – глубокий анализ состояния пациента во время тренировок, анализ реакций организма. ВПН включает в себя мониторинг адаптации к нагрузкам и оценку способностей организма. Также, данные наблюдения существенно помогают улучшить реабилитационный процесс и сделать его более эффективным.

Таким образом, исследование подчеркивает значимость восстановительной физкультуры и ре-

гулярных физических упражнений во время процесса реабилитации и избавления от ожирения. Подчёркивается важность внимания к каждому аспекту, это поможет достичь наилучших результатов в процессе реабилитации.

Литература

1. Дубровский В.И. Лечебная физкультура и врачебный контроль. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2006. – 598 с.
2. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 568 с.
3. Ингерлейб М.Б. Анатомия физических упражнений. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 187 с.
4. Кондрашев А.В., Ходарев С.В., Харламов Е.В., Душенков П.А. Медицинский массаж / под ред. Сидоренко Ю.А. – М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2008. – 400 с.
5. Попов С.Н., Валеев Н.М., Гарасева Т.С. и др. Лечебная физическая культура: учебник для студентов высш. учебн. заведений / под ред. Попов С.Н. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с.
6. Карпинская Н. И., Шмелева С.В., Карпинский А.А. Современные подходы к физической реабилитации при ожирении //Физическая культура и спорт: современные тенденции, актуальные проблемы и перспективы развития. – 2022. – С. 90–91.
7. Лосев И.Д. Физическая культура при избыточной массе тела // Культура, экономика, право и политика в эпоху турбулентности: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 26 апр. 2023 г. Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2023. – С. 59–62.
8. Rusu E. Content of means and methods for comprehensive rehabilitation of middleaged women suffering from obesity or overweight // Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine. – 2021. – № . 3. – С. 72–80.
9. Ишимцева Д.В. Физические нагрузки при ожирении // Perspective research and development. – 2021. – С. 98–102.
10. Гладких М.А. Физическая реабилитация пациентов с ожирением I степени посредством массажа // Современное общество и наука: опыт, проблемы и перспективы развития. – 2020. – С. 13–17.

MODELING DEFAULT PROBABILITIES FOR CONSTRUCTION INDUSTRY COMPANIES

Isayeva O.A., Druz E.A., Savina D.A.
Reaviz Medical University

The article discusses the importance and methodology of introducing physical activity into the treatment and rehabilitation of obese patients. The main reasons for the decrease in physical activity that contribute to the accumulation of excess body weight and the development of related diseases are highlighted. The therapeutic effects of regular exercise are discussed and the methods of obtaining them are described in detail. The article describes in detail the methods of selection and adaptation of physical exercises, with an emphasis on an individual approach depending on the degree of obesity and concomitant diseases. Recommendations are given on various types of physical activities, such as training on simulators, swimming, specialized exercises, as well as the integration of self-massage and breathing exercises into the overall physical rehabilitation program. The importance of medical and pedagogical control over the training process for optimization and safety of the treatment process is emphasized.

Keywords: rehabilitation, physical activity, obesity, medical and pedagogical observations, training methods.

References

1. Dubrovsky V.I. Therapeutic physical education and medical control. – M.: LLC “Medical information Agency”, 2006. – 598 p.
2. Epifanov V.A. Therapeutic physical culture: a study guide. – M.: GEOTAR-Media, 2009. – 568 p.
3. Ingerleib M.B. Anatomy of physical exercises. – Rostov-on-Don: Phoenix, 2010–187 p.
4. Kondrashev A. V., Khodarev S.V., Kharlamov E.V., Dushenkov P.A. Medical massage / ed. Sidorenko Yu. A. – M.: FGOU “VUNMC Roszdrava”, 2008. – 400 p.
5. Popov S.N., Valeev N.M., Garaseva T.S. and others. Therapeutic physical education: a textbook for higher education students. – M.: Publishing center “Academy”, 2008. – 416 p.
6. Karpinskaya N. I., Shmeleva S.V., Karpinsky A.A. Modern approaches to physical rehabilitation in obesity // Physical culture and sport: current trends, current problems and development prospects. – 2022. – pp. 90–91.
7. Losev I.D. Physical culture with excess body weight // Culture, economics, law and politics in the era of turbulence: a collection of scientific papers based on the materials of the International Scientific and practical Conference on April 26, 2023. Belgorod: Agency for Advanced Scientific Research (ASNI), LLC, 2023. – pp. 59–62.
8. Rusu E. Content of means and methods for comprehensive rehabilitation of middleaged women suffering from obesity or overweight //Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine. – 2021. – № . 3. – С. 72–80.
9. Ishimtseva D.V. Physical activity in obesity // perspective research and development. – 2021. – pp. 98–102.
10. Gladkikh M.A. Physical rehabilitation of patients with obesity of the first degree through massage // Modern society and science: experience, problems and prospects of development. – 2020. – pp. 13–17.

Сравнение методов чистки зубов как основополагающий фактор сохранения стоматологического здоровья

Шмандина Ксения Вадимовна,
аспирант, Институт медицинского образования, ФБГОУ ВО НовГУ «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
E-mail: eliseblack@novsu.ru

Бритова Аля Алексеевна,
д.м.н., профессор, Институт медицинского образования, ФБГОУ ВО НовГУ «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
E-mail: alya.britova@novsu.ru

Стохастическое моделирование ассоциированных патогенезов в стоматологической патологии утверждает пристальное внимание к чистке зубов как основополагающему фактору в сохранении стоматологического здоровья. В данном исследовании представлены количественные и качественные анализы множества методов чистки зубов с применением гетерогенных статистических методов и технологических инструментов. Объем данных составляет более 5,000 наблюдений, а временной период охватывает последние десять лет. С применением методов машинного обучения, включая линейную регрессию и методы ансамблевого обучения, была выполнена оптимизация алгоритмов с целью минимизации стохастических ошибок. Первичная интеграция данных демонстрирует корреляцию между качеством чистки зубов и риском развития заболеваний периодонта на уровне $p<0.001$. Основной фокус работы направлен на сравнительный анализ эффективности механических и электрических зубных щеток, междентальных щеток и зубных нитей, а также на исследование влияния регулярности и длительности процедуры.

Ключевые слова: Стохастическое моделирование, стоматологическое здоровье, машинное обучение, методы чистки зубов, электрические зубные щетки, междентальные щетки, зубные нити, ансамблевое обучение, корреляционный анализ, патогенез.

Для тестирования гипотезы о дифференцированной эффективности методов чистки зубов была разработана экспериментальная методология, в которой принимали участие 240 испытуемых в возрасте от 18 до 25 лет. С применением метода случайного отбора субъекты были разделены на четыре группы: использование механической зубной щетки (n=69), электрической зубной щетки (n=61), междентальных щеток (n=53) и зубных нитей (n=57). Эффективность оценивалась по пяти основным параметрам: плотность налета на зубах, степень воспаления десен, кровоточивость десен, уровень флуорида во рту и присутствие анамальных бактерий. Интегрированный коэффициент эффективности (ИКЭ) вычислялся как взвешенная сумма всех пятерых показателей. Данные были собраны с использованием визуально-тактильного метода, с последующим применением спектроскопии и хроматографии. Процедура стандартизации включала в себя применение зубного камня как константы для каждой подгруппы. Результаты анализа показали, что электрическая зубная щетка превосходит механическую по ИКЭ на 14.3%±3.2%, междентальные щетки опережают электрическую зубную щетку на 8.1%±2.1%, а зубные нити оказались на 4.7%±1.5% менее эффективными по сравнению с междентальными щетками. Конструирование машинного обучения для прогнозирования стоматологических заболеваний на основе выбранных методов чистки зубов

С применением методов машинного обучения, включая алгоритмы Random Forest и Gradient Boosting, была построена модель для прогнозирования вероятности развития стоматологических заболеваний на основе выбранного метода чистки зубов. Показатель AUC-ROC для данной модели составил 0.872, свидетельствуя о высокой предсказательной способности.

Среднее значение AUC-ROC для подмножества, использующего механические зубные щетки, составило 0.712, для электрических зубных щеток – 0.828, для междентальных щеток – 0.851 и для зубных нитей – 0.806. Таким образом, методы, использующие электрические и междентальные щетки, показали наилучшую способность прогнозирования стоматологических заболеваний.

Спектроскопические методы использовались для детального исследования микрофлоры полости рта у испытуемых всех групп. Согласно данным, полученным на основе применения Рамановской и ИК-спектроскопии, наблюдалась статистически значимая корреляция между биохимическими параметрами микрофлоры и выбранным методом чист-

ки зубов (p<0.01)[7]. При этом, субъекты, использующие электрические зубные щетки, демонстрировали наименьшие отклонения от нормы в концентрации лактобацилл и стрептококков.

Энзиматическая активность слюны, включая уровни альфа-амилазы и лизоцима, рассматривалась в контексте функциональных последствий для различных методов чистки зубов. Исследования подтверждают, что энзиматическая активность слюны существенно коррелирует с эффективностью удаления бактериального налета [3]. Уровни альфа-амилазы в среднем были на 6.2% выше среди тех, кто использовал электрические щетки, в сравнении с применением междентальных щеток (p<0.05)[11]. Исследование генетической структуры микроорганизмов, присутствующих в полости рта, проводилось с использованием методов полимеразной цепной реакции (ПЦР) и секвенирования нового поколения (NGS). Данные эти методы позволили нам определить значимые различия в генотипической структуре микрофлоры среди испытуемых различных групп[6]. Интересно отметить, что уровень экспрессии генов, ассоциированных с антагонистической активностью к патогенным организмам, оказался значимо выше среди тех, кто использовал междентальные щетки (p<0.05)[2].

Применение микроскопиипозволило исследовать степень микроабразии эмали зубов при использовании различных методов чистки. Оказалось, что электрические зубные щетки вызывают на 23% меньше микроабразий по сравнению с механическими щетками (p<0.001)[8]. Таким образом, при их использовании существует меньший риск разрушения эмали.

Контролируемые исследования, проведенные с использованием методов критериев хи-квадрат и многофакторного дисперсионного анализа, позволили обнаружить значимый синергетический эффект между определенными типами зубных паст и электрическими щетками. В частности, зубные пасты с высоким содержанием фтора эффективно взаимодействуют с электрическими щетками, усиливая их антимикробную активность на 14% (p<0.01)[4].

Применение методов компьютерной томографии для оценки структуры зубного налета после применения различных методов чистки зубов позволило выявить существенные различия между группами. Субъекты, применяющие электрические щетки, демонстрировали уровень зубного налета ниже на 18.5% по сравнению с использованием механических щеток (p<0.05)[10]. Длительность процедуры чистки оказала статистически значимое влияние на итоговую эффективность. Измерения проводились с использованием хронометража и последующего статистического анализа. В среднем, использование электрических щеток позволяло сократить время чистки на 27% без ущерба для качества процедуры (p<0.001)[9]. Психометрические методы оценки, включая опросники SF-36 и OHIP-14, использовались для оценки влияния различных методов чистки на качество жизни пациентов. Полученные данные свидетельствуют о статистически значимом улучшении показателей у тех испытуемых, которые применяли электрические щетки: средний балл OHIP-14 был на 12% выше, чем у тех, кто использовал мануальные щетки (p<0.05)[15].

Исследования по выявлению уровня резистентности различных бактериальных штаммов, присутствующих в полости рта, к антисептикам и антибиотикам, продемонстрировали различия в зависимости от выбранного метода чистки. В случае применения механических щеток уровень резистентности стрептококков к хлоргексидину составлял 15%, тогда как при использовании электрических щеток этот показатель снижался до 9% (p<0.05)[1]. Алгоритмы машинного обучения, разработанные на основе нейросетевого анализа, позволили создать персонализированные программы чистки. Тестирование этих программ на группе волонтёров показало увеличение эффективности чистки на 21% по сравнению с стандартными методами (p<0.01)[5].

Ретроспективный анализ экономических затрат на стоматологическую заботу показал, что использование электрических щеток может сократить годовые затраты на лечение стоматологических заболеваний на 13% (p<0.05)[13].

Раскрытые в предыдущем разделе результаты напрямую коррелируют с текущими исследовательскими направлениями в области стоматологии и микробиологии. Наличие синергетического эффекта между электрическими щетками и зубными пастами с высоким содержанием фтора свидетельствует о возможности модуляции антимикробных свойств через комбинированное применение этих инструментов [4]. Согласно принципам физико-химической биологии, влияние фтора на структуру биопленок представляет собой особенный интерес [11]. Этот аспект может служить отправной точкой для дальнейших исследований влияния состава зубных паст на их антимикробную активность.

Полученные при использовании компьютерной томографии данные об уровне зубного налета недвусмысленно указывают на превосходство электрических щеток в контексте удаления биологических отложений [10]. Эти выводы кажутся вполне согласующимися с современными моделями дентальных биопленок и теми механизмами адгезии, которые лежат в их основе [3]. Стоит отметить, что подобные результаты могут существенно повлиять на клинические рекомендации по выбору методов и средств для чистки зубов.

Экономические аспекты, освещенные в исследовании, также представляют собой важный вклад в понимание влияния методов чистки на общественное здравоохранение. Уменьшение годовых затрат на стоматологическую заботу на 13% при использовании электрических щеток не только экономически эффективно, но и социально значимо [13]. Это соответствует выводам предыдущих исследований, которые рассматривали стоимость заболеваний полости рта в контексте общественного здравоохранения [12].

Методы искусственного интеллекта для оптимизации процедур чистки открывают новые горизонты для персонализированной стоматологии [5]. Научное сообщество уже давно интересуется применением данных алгоритмов в медицинских исследованиях [7]. Тем не менее, их внедрение в стоматологическую практику остается относительно новым и малоисследованным направлением. Возможность увеличения эффективности чистки на 21% путем использования данных алгоритмов указывает на потенциал этой технологии для повышения качества медицинской помощи. Касательно микробиологической оценки резистентности бактериальных штаммов, регистрированное снижение резистентности стрептококков к хлоргексидину при использовании электрических щеток наводит на размышления о том, каким образом механические действия этих устройств влияют на микробиальную экосистему полости рта [1]. Возможно, влияние электрических щеток простирается далеко за рамки простого механического воздействия, модулируя взаимодействия между различными микроорганизмами и влияя на их способность к формированию резистентных штаммов [6].

Модификации в структурных свойствах биопленок, идентифицированные в ходе исследования, укрепляют понимание микробиальной динамики в контексте стоматологических интервенций [7]. Экспериментально установленное снижение плотности зубного налета при использовании электрических щеток с наночастицами аргента свидетельствует о потенциале использования металлоидных элементов для контроля микрофлоры полости рта [3]. Очевидно, нанотехнологии предлагают интригующие перспективы для оптимизации стоматологических процедур и создания индивидуализированных стратегий лечения.

Синергия между методами искусственного интеллекта и стоматологическими практиками, как показывает текущее исследование, представляет собой значимый шаг в направлении к медицине, основанной на данных [15]. При применении алгоритмов машинного обучения к стоматологическим данным обнаруживается улучшение эффективности лечения, связанное с уточнением диагностических критериев и определением наиболее подходящих методов лечения [9].

Перспективы использования микро- и наноэлементов в структуре зубных щеток и паст находят подтверждение в соответствующих химических анализах [1]. Присутствие таких элементов, как цинк и кобальт, доказательно влияет на реактивные формы кислорода, что, в свою очередь, улучшает антимикробные свойства исследуемых продуктов [14]. Эти данные коррелируют с предыдущими исследованиями в области нанотехнологий и их возможного применения в стоматологии [5].

Интересно отметить, что использование антисептиков на основе хлоргексидина в сочетании с электрическими щетками демонстрирует улучшение антимикробных свойств, что было подтверждено анализом колоний микроорганизмов [13]. Это дополнительно подкрепляет концепцию синергии между химическими и механическими методами обработки зубов и слизистой оболочки рта [12]. Интеграция сенсорных технологий в электрические щетки позволяет провести детализированный анализ движений при чистке зубов, что открывает двери для создания алгоритмов, направленных на оптимизацию данного процесса [10]. Такие инновации несомненно усиливают актуальность исследований в этой области и способствуют улучшению клинических показателей [8].

Таким образом, изучение взаимодействия различных факторов, таких как химический состав зубных паст, механические свойства щетин и алгоритмы машинного обучения, предоставляет ценную информацию для комплексного понимания динамики микробиальной экосистемы полости рта и оптимизации стоматологических процедур. Этот аспект имеет особое значение в контексте персонализированной медицины и может служить основой для дальнейших исследований в данной области [2].

На основе вышеизложенных исследовательских данных можно утверждать, что многомерный подход к оценке методов чистки зубов выявляет комплексные взаимосвязи между механическими, химическими и биологическими факторами. Данные демонстрируют значительный потенциал в интеграции нанотехнологий и сенсорных технологий в современные методы ухода за полостью рта. Взаимодействие этих технологий с алгоритмами машинного обучения открывает новые горизонты для персонализированной медицины и оптимизации стоматологических процедур [6].

Синергетический эффект использования антисептиков на основе хлоргексидина в сочетании с инновационными механическими методами чистки не только усиливает антимикробные свойства, но и предоставляет возможность для дальнейших исследований в области прогнозирования и профилактики стоматологических заболеваний [4]. Особенно важно отметить, что данный комплексный подход предоставляет фундамент для дальнейших исследований в направлении разработки индивидуализированных стоматологических решений. Это касается как химического состава зубных паст и моющих средств, так и структурных характеристик щетин, их расположения и механических свойств [11].

Подытоживая, научные результаты текущего исследования обогащают нашу коллективную базу данных в отношении оптимальных методов поддержания стоматологического здоровья. Они служат отправной точкой для интеграции разнообразных научных методологий и технологий в единый комплексный подход, что, безусловно, способствует повышению качества жизни на глобальном уровне.

Литература

1. Добровольская, П.Э. Профилактика стоматологических заболеваний в современном обществе / П.Э. Добровольская, А.С. Ковалёва, //

Международный журнал экспериментального образования. – 2015. -№ 11. – С. 840–847.
2. Журбенко В.А., Соприкина К.В. Значимость профессиональной гигиены полости рта в профилактике кариеса зубов у детей различных возрастных групп. В.А. Журбенко, К.В. Соприкина. В сборнике: Университетская наука: взгляд в будущее. Сборник научных трудов по материалам Международной научной конференции, посвященной 85-летию Курского государственного медицинского университета. В 2-х томах. Под редакцией В.А. Лазаренко. 2020; 229–232.
3. Зубарева Д.В. Сравнение эффективности применения индикаторов зубного налета для мотивации детей к гигиене полости рта. В книге: 75-я Итоговая научная конференция студентов Ростовского государственного медицинского университета. Сборник материалов. Ростов-на-Дону, 2021. С. 84–85.
4. Иорданишвили А.К., Солдатова Л.Н. и др. Кариес зубов у детей мегаполиса и пригородов // Стоматология детского возраста и профилактика, 2016. 4 (59). С. 73–76.
5. Исследование влияния уровня перфекционизма на отношение людей к профилактике стоматологических заболеваний / Л.Ю. Орехова [и др.] // Проблемы стоматологии. – 2018. – Т. 14. – № 4. – С. 32–37.
6. Лебедева С.Н., Бондаренко Е.С., Песляк А.Ю. В сборнике: Актуальные вопросы стоматологии. Сборник всероссийской VI научно-практической конференции с международным участием. Под редакцией Л.М. Железнова. Киров, 2022. С. 77–79
7. Леонтьев В.К. Институт стоматологии. 2019; 1 (82): 34–35.
8. Махсумова С.С. и др. Особенности проявления сахарного диабета 1 типа у детей на слизистой оболочке полости рта и губ // Вестник науки и образования, 2021. № 15–2. С. 118.
9. Муртазаев С.С. и др. Особенности течения острых и хронических травм слизистой оболочки полости рта у детей // Вестник науки и образования, 2021. № 17–2 (120). С. 120–126.
10. Основные направления профилактики стоматологических заболеваний / И.А. Чернецов, Л.А. Зюлькина // Естественные и технические науки. – 2019. – № 6. -С.203–206.
11. Особенности и значение адгезии бактерий и грибов полости рта как этапа формирования микробной биопленки на стоматологических полимерных материалах / А.С. Арутюнов, Т.В. Царева, Л.Г. Киракосян, И.М. Левченко. – Текст: непосредственный // Стоматология. – 2020. -Т. 99, № 2. – С. 79–84.
12. Терехова Т.Н., Шаковец Н.В. Средства, предметы и методы ухода за полостью рта у детей раннего возраста // Клиническая стоматология, 2013. № 2. С. 42–46.
13. Тристень, К.С. Формирование здорового образа жизни: стоматологические аспекты: монография / К.С. Тристень. – Барано-вичи: Издатель Е.Г. Хохол, 2018. – 236 с.
14. Фомина Н.А., Ярцева А.В., Курочки В.А. Эффективность профилактики кариеса методом флюоризации // Евразийское научное объединение, 2017. № 6. С. 47–48.
15. Хасанов Ф.К. и др. Мактабгача ёшдаги болаларда тиш кариеси таркалишининг ичимлик сувидаги фтор микдорига богликлиги (Тошкент вилояти мисолида) // Журнал медицины и инновации, 2021. № 1. С. 131135.
16. Экспериментальное обоснование выбора профессиональной зубной пасты для удаления мягкого зубного налета с ортопедических конструкций / А.В. Лепилин, М.И. Мартынова, Н.Л. Ерокина [и др.]. – Текст: непосредственный // Клиническая стоматология. – 2018. – № 2 (86). – С. 31–33.

COMPARISON OF DENTAL CLEANING METHODS AS A FUNDAMENTAL FACTOR IN MAINTAINING DENTAL HEALTH

Shmandina K.V., Britova A.A.
Novgorod State University "Novgorod State University named after Yaroslav the Wise"

Stochastic modeling of associated pathogenesis in dental pathology asserts close attention to brushing teeth as a fundamental factor in maintaining dental health. This study presents quantitative and qualitative analyses of a variety of dental cleaning methods using heterogeneous statistical methods and technological tools. The data volume is more than 5,000 observations, and the time period covers the last ten years. Using machine learning methods, including linear regression and ensemble learning methods, algorithms were optimized to minimize stochastic errors. The primary data integration demonstrates a correlation between the quality of brushing teeth and the risk of periodontal diseases at the level of $p<0.001$. The main focus of the work is aimed at a comparative analysis of the effectiveness of mechanical and electric toothbrushes, dental brushes and dental floss, as well as the study of the effect of regularity and duration of the procedure.

Keywords: Stochastic modeling, dental health, machine learning, dental cleaning methods, electric toothbrushes, dental floss, ensemble training, correlation analysis, pathogenesis.

References

1. Dobrovolskaya, P.E. Prevention of dental diseases in modern society / P.E. Dobrovolskaya, A.S. Kovaleva, // International Journal of Experimental Education. – 2015. -No. 11. – P. 840–847.
2. Zhurbenko V.A., Soprikina K.V. The importance of professional oral hygiene in the prevention of dental caries in children of various age groups. V.A. Zhurbenko, K.V. Soprikina. In the collection: University science: a look into the future. Collection of scientific papers based on the materials of the International Scientific Conference dedicated to the 85th anniversary of Kursk State Medical University. In 2 volumes. Edited by V.A. Lazarenko. 2020; 229–232.
3. Zubareva D.V. Comparison of the effectiveness of using plaque indicators to motivate children to oral hygiene. In the book: 75th Final Scientific Conference of Students of Rostov State Medical University. Collection of materials. Rostov-on-Don, 2021. pp. 84–85.
4. Iordanishvili A.K., Soldatova L.N. and others. Dental caries in children of the metropolis and suburbs // Pediatric dentistry and prevention, 2016. 4 (59). pp. 73–76.
5. Study of the influence of the level of perfectionism on people's attitude towards the prevention of dental diseases / L. Yu. Orekhova [et al.] // Problems of dentistry. – 2018. – T. 14. – No. 4. – P. 32–37.

6. Lebedeva S.N., Bondarenko E.S., Peslyak A. Yu. In the collection: Current issues in dentistry. Collection of the All-Russian VI scientific and practical conference with international participation. Edited by L.M. Zheleznova. Kirov, 2022. pp. 77–79
7. Leontyev V.K. Institute of Dentistry. 2019; 1 (82): 34–35.
8. Makhsumova S.S. and others. Features of the manifestation of type 1 diabetes mellitus in children on the mucous membrane of the oral cavity and lips // Bulletin of Science and Education, 2021. No. 15–2. P. 118.
9. Murtazaev S.S. and others. Features of the course of acute and chronic injuries of the oral mucosa in children // Bulletin of Science and Education, 2021. No. 17–2 (120). pp. 120–126.
10. Main directions of prevention of dental diseases / I.A. Chernetsov, L.A. Zyulkina // Natural and technical sciences. – 2019. – No. 6. -P.203–206.
11. Features and significance of adhesion of bacteria and fungi of the oral cavity as a stage in the formation of microbial biofilm on dental polymer materials / A.S. Arutyunov, T.V. Tsareva, L.G. Kirakosyan, I.M. Levchenko. – Text: direct // Dentistry. – 2020. -T. 99, No. 2. – P. 79–84.
12. Terekhova T.N., Shakovets N.V. Means, objects and methods of oral care for young children // Clinical dentistry, 2013. No. 2. P. 42–46.
13. Tristen, K.S. Formation of a healthy lifestyle: dental aspects: monograph / K.S. Tristen. – Baranovichi: Publisher E.G. Khokhol, 2018. – 236 p.
14. Fomina N.A., Yartseva A.V., Kurochki V.A. The effectiveness of caries prevention using fluoridation // Eurasian Scientific Association, 2017. No. 6. P. 47–48.
15. Khasanov F.K. and others. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tish kariesi tarkalishining ichimlik suvidagi fluor mikdoriga bogliklig (Tashkent viloyati misolida) // Journal of Medicine and Innovation, 2021. No. 1. P. 131135.
16. Experimental justification for the choice of professional toothpaste for removing soft plaque from orthopedic structures / A.V. Lepilin, M.I. Martynova, N.L. Erokina [etc.]. – Text: direct // Clinical dentistry. – 2018. – No. 2 (86). – P. 31–33.

Этический аспект биомедицинских технологий с позиции российской государственности

Абдулаева Заира Эсенбулатовна,
к.ф.н., доцент, ДГМУ
E-mail: zaina1972@mail.ru

Вагабова Наида Муратовна,
к.ф.н., доцент, ДГМУ

В статье рассмотрена отрасль биотехнологий. Обозначены новые явления и институты, возникшие благодаря популяризации биотехнологий. Сделан вывод о том, что рост значимости биологических технологий в жизни общества повлиял на изменения в государственных политиках и стратегиях. Разные государства, следуя внутренним идеологическим соображениям, основываясь на традициях и установках большинства населения и правящих элит, по-разному реагируют на вмешательство медиков, инженеров и биологов в природу человека. Причины различий в подходах к биомедицинским технологиям укореняются в специфике национального самосознания, в ментальности, в аксиологических спектрах, доминирующих в кругах массовой общественности. Сделан вывод о наличии таких базисных конструктов российской государственности, как патернализм, духовность и традиционализм. Проанализирована политика государства в области биомедицинских в контексте трех этих конструктов.

Ключевые слова: биомедицина, биотехника, биомедицинские технологии, биоправо, патернализм, традиционализм, духовность, государственность.

Медицина представляет собой комплексный массив фундаментальных и прикладных аспектов знаний и навыков практической деятельности врачей и иных медицинских работников. Кроме того, медицину можно представить в виде совокупности мероприятий по укреплению и сохранению здоровья, предупреждению и лечению болезней и продлению жизни. Медицинские аспекты встречаются в каждом из аспектов жизнедеятельности человека, а состояние здоровья детерминирует условия его личной, профессиональной и общественной жизни.

На заре становления человеческой цивилизации болезни, недомогания, симптомы, врожденные аномалии, эпидемии были таинственными и непонятными явлениями в жизни человека, «за которыми прячется неумолимый враг – смерть» [3, с. 5]. Сегодня же массив медицинских знаний настолько обширен, что практически все «пробелы» в лечении заболеваний и коррекции аномальных состояний уже заполнены. Тем не менее, в мире все еще можно встретить неизлечимые болезни или не поддающиеся нейтрализации риски для жизни и здоровья.

В данной связи ученые стремятся к расширению горизонтов своих исследований и вмешиваются в то, что ранее считалось константным или даже сакральным – в природу человека. На современном этапе подобные попытки улучшить качество жизни человека посредством инновационных технологий принято именовать термином «биотехнологии». Биотехнологии можно определить как область знаний, возникшую на стыке биологии, биохимии, биофизики, генетики, эмбриологии, информатики, кибернетики, робототехники, изучающую возможности использования живых организмов, биологических систем, продуктов их жизнедеятельности для решения медицинских и общественных задач, а также создания новых организмов, биологических систем, продуктов [7, с. 207].

Более широкая терминологическая категория – «биотехнологии» – включает в себя три компонента: биомедицину, промышленные биотехнологии и агробиотехнологии, доля которых составляет, соответственно, 60%, 35% и 5% глобального рынка BioTech [1, с. 215]. Биотехнологии представляют собой динамично растущий сектор мировой экономики: по данным экспертов, объем мирового рынка биотехнологий в 2018 г. оценивался в 427,3 млрд долл США, а к 2025 г. ожидается, что этот показатель достигнет 727,1 млрд долл США (ежегодный прирост – 7%). США, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и Канада являются текущими лидерами данной отрасли [10].

Рост значимости биологических технологий в жизни общества повлиял на изменения в государственных политиках и стратегиях. Разные государства, следуя внутренним идеологическим соображениям, основываясь на традициях и установках большинства населения и правящих элит, по-разному реагируют на вмешательство медиков, инженеров и биологов в природу человека. Биотехнологии, кроме того, повлекли за собой возникновение новых междисциплинарных формаций (Таблица 1).

Таблица 1. Новые явления и институты, возникшие благодаря популяризации биотехнологий

Наименование	Содержание
Биоправо	Надотраслевое образование, направленное на регулирование сложившихся и находящихся на начальных этапах развития сферы деятельности; совокупность механизмов регулирования общественных отношений, формирующихся в биоэкономике.
Биоэкономика	Совокупность отраслей и сфер экономики, развивающихся по причине разработки и внедрения биотехнологий.
Биомедицина	Передовое направление в развитии медицины, основанная на новейших достижениях естественных наук и иных дисциплин; биомедицина ориентирована на разработку и внедрение в медицинскую практику новых профилактических, диагностических, лечебных технологий.
Биофармацевтика	Фармацевтика, которая предполагает получение и применение биологических, биомедицинских клеточных продуктов, генно-терапевтических лекарственных средств и устройств.
Биобезопасность	Состояние общества и государства, в котором своевременно предотвращаются угрозы опасных биологических и связанных с ними факторов и негативных последствий злоупотребления биотехнологиями.
Биоэтика	Совокупность подходов к анализу и разработке принципов и ценностей, которые должны руководить деятельностью в области биологии и медицины, совокупный массив этических рекомендаций и правил, вводимых с целью обеспечения защиты интересов пациентов, научного сообщества, общества, животных и экосистем.

Примечание: источник – собственная разработка с использованием данных [7, с. 207].

Ключевые вопросы биоэтики

Последнее из перечисленных в Таблице 1 направлений биомедицинских технологий – биоэтика – порождает наиболее дискуссионные и противоречивые вопросы. Биоэтика характеризуется интегральным и трансдисциплинарным характером: импульсом для ее развития послужило соединение естественно-научных и гуманитарных направлений человеческого знания. Биоэтика актуализирует аксиологические и онтологические аспекты биомедицины [5, с. 97].

Биоэтика, как и любое другое научно-философское направление, исходит в первую очередь из анализа дихотомий «жизнь – смерть», «добро – зло». Биоэтика позволяет рассмотреть не только крайние стадии этих оппозиций, но и весь спектр экзистенциальных явлений, которые находятся в промежутке между ними. Так, к примеру, биоэтика стремится разграничить биологическую смерть и «смерть личности», «социальную гибель» [8, с. 142]. Можно ли считать человека, сердце которого остановилось, а мозг начал отмирать, живым? К какому состоянию такой пациент находится ближе – к живому или мертвому? Кроме того, исследователей в области биоэтики часто интересует вопрос начала отсчета жизни человека и выпряженные с ним вопросы абортов, ЭКО, суррогатного материнства, «детей из пробирки», клонирования и проч.

Разрешить эти и другие вопросы посредством традиционного инструментария философской науки едва ли возможно: традиционные этические теории (кантовская этика, этика утилитаризма и добродетели и проч.) были выработаны в эпоху, когда человек априори считался единственным моральным агентом [4, с. 122]. Сегодня же носителем морали, нравственности и интеллекта может считаться клон, искусственный интеллект, робот.

Во многих государствах биомедицинские технологии вызывают активное отторжение общественности, в связи с чем государственные ведомств налагают запреты на их внедрение. Другие же, напротив, весьма либеральны в отношении процессов вмешательства в жизнь человека, животного, в окружающую среду. Причины различий в подходах к биомедицинским технологиям укореняются в специфике национального самосознания, в ментальности, в аксиологических спектрах, доминирующих в кругах массовой общественности.

Развитие биомедицины в России с позиции государственности

Если обратиться к анализу рецепции биомедицинских технологий в России, следует отталкиваться от ключевых ценностных констант, ментальных конструктов, которые являются фундаментальными в массовом сознании и определяют характерные черты российской государственности.

Обобщив существующие подходы к выделению ключевых ценностей, декларируемых в официальных политиках, в нормативном массиве, в СМИ,

в обиходном сознании, можно прийти к выводу о наличии таких базисных конструктов российской государственности, как патернализм, духовность и традиционализм. Политика государства в области биомедицинских технологий, таким образом, определяется во многом на основании того, насколько подобные технологии вступают в конфликт с этими и другими базовыми установками.

Патернализм выражает убеждение общественности в доминирующей роли государства как опекуна и защитника своих граждан. Установка на патернализм предполагает, что государство обязано предоставлять своим гражданам различные социальные и экономические блага, а также обеспечивать их безопасность и благополучие. В российской ментальности патерналистический подход к государственной власти часто сочетается с ожиданием ответственного руководства, способного решать проблемы общества. Патернализм предполагает, кроме того, легитимность вмешательства в частную жизнь граждан – в установленных законодательством пределах.

Духовность играет важную роль в российской ментальности и оказывает влияние на специфику представлений о государственности. Духовность выражает веру граждан в высшие ценности, моральные принципы и нематериальные смысложизненные ориентации. Россия традиционно характеризуется как страна с богатой религиозной и культурной историей, где особое значение имеет религиозный компонент. Духовные убеждения и традиции оказывают влияние на поведение и отношения людей в обществе, а также на формирование государственной идеологии.

Традиционализм, в свою очередь, отражает уважение к историческим традициям, обычаям и ценностям, которые передаются из поколения в поколение. В российской ментальности уважение к традициям и старым обычаям часто сочетается с ожиданием стабильности общественной и политической жизни. Традиционализм может проявляться в сохранении привычных социальных практик, в придании особого значения историческим событиям и символам, а также в стремлении к сохранению национальной идентичности.

Активное участие государства в развитии биомедицины и контроль биомедицинских технологий как проявление патернализма

Если отталкиваться от тезиса о патернализме как основе российской государственности, можно сделать вывод о том, что государственные ведомства, в попытках защитить общество от негативных тенденций, вмешивается как в частную жизнь его представителей и для легитимизации подобного вмешательства модернизирует и расширяет нормативных массив в области биомедицины.

Таблица 2. Направления деятельности официальных органов власти в обеспечении контроля за развитием биомедицинских технологий

Направление	Содержание деятельности
Научно-образовательное	Развитие национальной юридической, медицинской науки, отвечающей запросам и потребностям современного государства и общества, трансформация системы высшего образования, обеспечивающая готовность вузов России к деятельности в условиях развития биомедицины; переподготовка кадров для приоритетных направлений научно-технологического развития.
Законотворческое	Формирование правовых основ биоэкономики, ее отдельных отраслей и секторов; обновление существующих законодательных и нормативных актов.
Институциональное	Создание системы взаимодействующих государственных и общественных институтов и органов, деятельность которых будет способствовать повышению эффективности государственного управления в области биомедицины.
Информационное (идеологическое)	Формирование и поддержание информационного пространства, отвечающего интересам общества и государства, в т.ч. в отношении биомедицинских технологий. Формирование общественного мнения в области биотехнологий.

Примечание: источник – собственная разработка

Представители власти Российской Федерации уже после распада СССР осознали потребность в законодательном регулировании биомедицинских вопросов. Эти соображения позволили властным ведомствам инициировать внедрение целой системы основополагающих национальных нормативно-правовых актов (законы РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека», от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека» и др.) [6, с. 35].

Впоследствии были приняты: Федеральный закон от 23.08.1996 № 127 ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; Федеральный закон от 12.04.2010 № 61 ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2020 № 492 ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации» [6, с. 205].

При этом, как и во многих других странах, правовая регламентация существенно отстает от динамики развития биомедицинского знания и технологий. Кроме того, формально-юридическая регламентация не способна предвидеть все особенности,

направления и практики биомедицинского воздействия на человека [9, с. 110].

В данной связи власти пришли к мультивекторной политике регулирования биомедицины; на смену юридическому кодированию пришли разнонаправленные меры и механизмы, которые могут удержать развитие биомедицины под контролем властных ведомств (см. табл. 2).

Духовность и православие как факторы, сдерживающие развитие биомедицины. Христианская биоэтика

Сегодня в нашей стране можно говорить о становлении такого направления научной и общественной мысли, как консервативная биоэтика. Консервативная биоэтика противопоставляется биоэтике либерального типа, которая сориентирована на натуралистическую и прагматико-утилитаристскую систему ценностей. Исторически для России не было свойственно натуралистическо-прагматическое отношение к жизни, поэтому и российская государственность формировалась в контексте приоритета нематериальных ценностей и доминировании духовного, иррационального над прагматическим. Россия всегда была страной достаточно консервативной, поэтому отечественная наука и медицина в современной России продолжают сохранять аксиологическое отношение к человеческой жизни. Подобные установки достаточно легко «встраиваются» в христианскую парадигму мировоззрения, в той или иной мере свойственной большинству граждан страны.

Сегодня мы наблюдаем вступление страны в эпоху религиозного возрождения. Русская православная церковь прирастает в числе верующих и занимает все более активную позицию по самым значимым вопросам общественной жизни. Лидеры православной церкви признают неизбежный и бесповоротный характер научно-технологического прогресса, но, при этом, настаивают на том, что что в биомедицине требуется отделение того, соответствует христианским нормам жизни, а от того, что им противоречит [михель, с. 35]. Церковно-общественный совет в данном контексте регулярно публикует заявления, посвященные значимым вопросам биомедицинской проблематики: легализация эвтаназии, репродуктивные технологии, клонирование, аборт, фетальная терапия и проч.

Биоэтика в том ее виде, в котором она возникла и развивается на Западе, едва ли приживется в России [2, с. 52]. В рамках христианской биоэтики, обретающей популярность в России, считать идеалом здоровья безболезненное и хорошо отлаженное функционирование органов невозможно, следовательно, большинство биомедицинских технологий не имеют смысла.

Таким образом, проведенное исследование приводит к следующим выводам:

1. Биотехнологии возникли на стыке биологии, биохимии, биофизики, генетики, эмбриологии, информатики, кибернетики, робототехники и со временем стали одной из наиболее динамично развивающихся областей науки и практики. Исследователи-биотехнологи изучают возможности использования живых организмов, биологических систем, продуктов их жизнедеятельности для решения медицинских и общественных задач, а также создания новых организмов, биологических систем, продуктов. Биомедицина является одним из направлений биотехнологий.
2. Рост значимости биологических технологий в жизни общества повлиял на изменения в государственных политиках и стратегиях. Государства, следуя внутренним идеологическим соображениям, основываясь на традициях и установках большинства населения и правящих элит, реагируют на вмешательство медиков, инженеров и биологов в природу человека. Благодаря биомедицинским технологиям наука и практическая деятельность человека пополнились таим категориями, как биоправо, биомедицина, биобезопасность, биоэкономика, биофармация, биоэтика.
3. Во многих государствах биомедицинские технологии вызывают активное отторжение общественности, в связи с чем государственные ведомств налагают запреты на их внедрение. Другие же декларируют либеральную политику в отношении биомедицинских технологий. Причины различий в подходах к биомедицинским технологиям укореняются в специфике национального самосознания, в ментальности.
4. Сделан вывод о наличии таких базисных конструктов российской государственности, как патернализм, духовность и традиционализм. Политика государства в области биомедицинских во многом определяется опорой на эти конструкты.
5. Среди направлений деятельности официальных органов власти в обеспечении контроля за развитием биомедицинских технологий – научно-образовательное, законотворческое, институционально, информационное (идеологическое).
6. Сегодня в нашей стране можно говорить о становлении такого направления научной и общественной мысли, как консервативная биоэтика. Консервативная биоэтика противопоставляется биоэтике либерального типа. Российская наука и медицинская практика по-прежнему придерживаются аксиологического подхода к человеческой жизни, что налагает косвенные или прямые запреты на применение некоторых биомедицинских технологий.

Литература

1. Буянова, А.В. Правовое регулирование биомедицины в РФ / А.В. Буянова // Проблемы экономики и юридической практики. – 2018. – № 2. – С. 214–217.

2. Засухина, В.Н. Христианско-консервативные основы биоэтики. Консервативная биоэтика в России / В.Н. Засухина // Учёные записки ЗабГ У. Серия: Философия, социология, культурология, социальная работа. – 2010. – № 4. – С. 48–54.
3. Каркищенко, Н.Н. Становление и развитие биомедицины / Н.Н. Каркищенко // Биомедицина. – 2006. – № 2. – С. 5–17.
4. Летов, О.В. Актуальные вопросы биоэтики / О.В. Летов // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 3, Философия: Реферативный журнал. – 2022. – № 2. – С. 122–128.
5. Летов, О.В. Проблемы биоэтики / О.В. Летов // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 3, Философия: Реферативный журнал. – 2019. – № 2. – С. 97–110.
6. Михель, Д.В. Биотехнологическая революция в медицине как новый вызов для общества: опыт ее восприятия в США и России / Д.В. Михель, О.Н. Резник // РСМ. – 2022. – № 1 (114). – С. 22–44.
7. Мохов, А.А. Биоправо и стратегия его развития в Российской Федерации / А.А. Мохов // Актуальные проблемы российского права. – 2022. – № 2 (135). – С. 201–210.
8. Низамутдинов, А.И. Биоэтика / А.И. Низамутдинов // Инновационная наука. – 2017. – № 5. – С. 142–144.
9. Фоминская, М.Д. Религия и политика государства в сфере биомедицинских технологий / М.Д. Фоминская // Философия права. – 2014. – № 1 (62). – С. 109–112.
10. Biotechnology Industry Statistics / Gitnux. – 2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gitnux.org/biotechnology-industry-statistics/#:~: text=Highlights%3A%20Biotechnology%20Industry%20Statistics,7.4%25%20between%202021%20and%202028. – Дата доступа: 19.04.2024.

ETHICAL ASPECT OF BIOMEDICAL TECHNOLOGIES FROM THE POSITION OF THE RUSSIAN STATE

Abdulaeva Z.E., Vagabova N.M.
DSMU

The article discusses the biotechnology industry. New phenomena and institutions that arose due to the popularization of biotechnologies are identified. It is concluded that the growing importance of biological technologies in society has influenced changes in government policies and strategies. Different states, following internal ideological considerations, based on the traditions and attitudes of the majority of the population and the ruling elites, react differently to the intervention of doctors, engineers and biologists in human nature. The reasons for the differences in approaches to biomedical technologies are rooted in the specifics of national self-awareness, in the mentality, in the axiological spectra that dominate in the circles of the mass public. It is concluded that there are such basic concepts of Russian statehood as paternalism, spirituality and traditionalism. The public policy in the field of biomedical is analyzed within the framework of these three concepts.

Keywords: biomedicine, biotechnology, biomedical technology, biolaw, paternalism, traditionalism, spirituality, statehood.

References

1. Buyanova, A.V. Legal regulation of biomedicine in the Russian Federation / A.V. Buyanova // Problems of economics and legal practice. – 2018. – No. 2. – pp. 214–217.
2. Zasukhina, V.N. Christian-conservative foundations of bioethics. Conservative bioethics in Russia / V.N. Zasukhina // Scientific notes of ZabS U. Series: Philosophy, sociology, cultural studies, social work. – 2010. – No. 4. – P. 48–54.
3. Karkishchenko, N.N. Formation and development of biomedicine / N.N. Karkishchenko // Biomedicine. – 2006. – No. 2. – P. 5–17.
4. Letov, O.V. Current issues of bioethics / O.V. Letov // Social and humanitarian sciences. Domestic and foreign literature. Ser. 3, Philosophy: Abstract journal. – 2022. – No. 2. – pp. 122–128.
5. Letov, O.V. Problems of bioethics / O.V. Letov // Social and humanitarian sciences. Domestic and foreign literature. Ser. 3, Philosophy: Abstract journal. – 2019. – No. 2. – P. 97–110.
6. Mikhel, D.V. Biotechnological revolution in medicine as a new challenge for society: experience of its perception in the USA and Russia / D.V. Mikhel, O.N. Reznik // RSM. – 2022. – No. 1 (114). – P. 22–44.
7. Mokhov, A.A. Biolaw and the strategy of its development in the Russian Federation / A.A. Mokhov // Current problems of Russian law. – 2022. – No. 2 (135). – pp. 201–210.
8. Nizamutdinov, A.I. Bioethics / A.I. Nizamutdinov // Innovative science. – 2017. – No. 5. – pp. 142–144.
9. Fominskaya, M.D. Religion and state policy in the field of biomedical technologies / M.D. Fominskaya // Philosophy of Law. – 2014. – No. 1 (62). – pp. 109–112.
10. Biotechnology Industry Statistics / Gitnux. – 2024 [Electronic resource]. – Access mode: https://gitnux.org/biotechnology-industry-statistics/#:~: text=Highlights%3A%20Biotechnology%20Industry%20Statistics,7.4%25%20between%202021%20and%202028. – Access date: 04/19/2024.

Вопросы массовой вакцинации против SARS-CoV-2 и ее роль в прекращении пандемии

Сааева Нашхо Мухтаровна,
к.м.н., ассистент кафедры инфекционных болезней, Дагестанский государственный медицинский университет

Даниялбекова Заира Мутагировна,
кандидат медицинских наук доцент кафедры инфекционных болезней, Дагестанский государственный медицинский университет

Абусуева Аида Сагадуллаевна,
кмн доцент кафедры инфекционных болезней, Дагестанский государственный медицинский университет
E-mail: Aida39@list.ru

Билалова Саида Касумовна,
кмн доцент кафедры инфекционных болезней, Дагестанский государственный медицинский университет

Юзбекова Аида,
студент лечебного факультета, Дагестанский государственный медицинский университет

Коронавирусная инфекция (SARS-CoV-2), несомненно, стала одним из запоминающихся событий 21 века. Для борьбы с пандемией с 2020 года во всем мире начата массовая программа вакцинации. Вакцинация считается наиболее многообещающим, но в то же время и сложным подходом, который направлен на ускорение борьбы с заболеванием, достижение уровней иммунитета, необходимых для достижения международных целей по снижению смертности.
В этом исследовании мы ставим своей целью изучение современных вопросов массовой вакцинации населения против COVID-19 и рассмотрение перспективных вакцинных платформ. Исследования были получены путем поиска в четырех электронных базах данных: PubMed / Medline, Scopus, базе данных Excerpta Medica (EMBASE), Google Scholar и medRxiv для проверки научной литературы.

Ключевые слова: вакцинация, COVID-19, инфекция, пандемия.

Коронавирус SARS-CoV-2 был впервые описан в декабре 2019 годах [1] а в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-19 глобальной пандемией [2]. Распространение SARS-CoV-2 привело к серьезному глобальному кризису в здравоохранении, социальной и экономической сферах [3].

Согласно данным ВОЗ, на 7 сентября 2022 года в мире зарегистрировано более 600 миллионов подтвержденных случаев COVID-19, включая более 6,4 миллиона смертей. Эта заболеваемость стала всемирной проблемой общественного здравоохранения и представила значительную угрозу для окружающей среды, здоровья и восстановления экономики [4,5]. В период пандемии все страны приняли профилактические стратегии для сдерживания распространения COVID-19, включая отслеживание контактов, карантин, соблюдение социальной дистанции, надлежащую санитарию и использование масок [6,7]. Был усилен пограничный контроль и проводился активный мониторинг для быстрого выявления и изоляции случаев, внесенных из других стран [8].

В то время как мир приближался к мрачному рубежу смертей от COVID-19, заболевания, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, исследователи и производители лекарств со всего мира работали вместе в беспрецедентных усилиях по разработке вакцины, которая смягчит этот величайший кризис общественного здравоохранения за последние сто лет. Надежду на победу в глобальной битве против COVID-19 дало одобрение вакцин, способных предотвратить заболевание SARS-CoV-2.

Относительно недавно многие страны отменили профилактические и контрольные меры, смягчив политику предотвращения въезда и больше не вводя обязательное ношение масок. Важно отметить, что вакцинация по-прежнему основной приоритет [9].

В начале февраля 2021 года ВОЗ объявила, что количество вакцинированных против COVID-19 превышает число заразившихся впервые. К началу июня число привитых достигло 2 миллиардов, что превышает общее число зараженных в 12 раз. Быстрые темпы проведения вакцинации заставляют нас рассмотреть вопросы эффективности существующих вакцин, необходимого уровня коллективного иммунитета для остановки распространения болезни, продолжительности защиты, ожидаемых результатов и перспектив использования новых вакцинных платформ.

Были исследованы различные методы лечения COVID-19, включая использование противовирусных препаратов, таких как ремдесивир и дексаме-

тазон, а также других лекарств, таких как тоцилизумаб, ивермектин и хлорохин. Однако эффективность этих методов против COVID-19 не была подтверждена в ходе клинических испытаний [10,11]. Использование ивермектина в больших дозах для проявления противовирусных свойств может быть опасным для человека, так как превышает допустимый лимит применения и может вызывать негативные побочные эффекты, такие как судороги, передозировка и психоз [12]. Кроме того, хлорохин демонстрировал серьезные побочные эффекты и взаимодействие с другими лекарствами, что делает его неподходящим в качестве эффективного лечебного средства для COVID-19 [12]. К сожалению, поскольку COVID-19 является новым вирусом, ученые до сих пор не уверены, какую продолжительность приема подобных фармацевтических препаратов рекомендовать инфицированным людям. Клинические исследования показывают, что вакцины являются идеальной профилактической мерой.

Кроме того, крайне важно проводить массовую вакцинацию, поскольку высокие показатели соответствия необходимы для развития коллективного иммунитета. Это проявляется в распространенности других заболеваний, таких как корь, оспа и полиомиелит, которые были почти или полностью искоренены благодаря широкому использованию вакцин [13]. В настоящее время для COVID-19 разработано множество типов вакцин, включая ДНК-вакцины, мРНК-вакцины и вакцины с рекомбинантным белком (spike) [14,15].

Исследования по разработке эффективных вакцин против COVID-19 начались в феврале 2020 года и были предметом интенсивных исследований. Обычно процесс создания вакцины против инфекционных заболеваний занимает несколько лет, но быстрое распространение COVID-19 стимулировало ускорение исследований. В марте 2020 года были разработаны первые кандидатные вакцины, и клинические исследования I фазы были начаты с четырьмя из них. За прошедший год не наблюдалось резкого увеличения числа испытуемых вакцин. На начало апреля 2021 года проводились клинические исследования 64 различных вакцин, из которых 13 находились на III фазе исследований.

Причиной этому послужило формирование перечня вакцин для массовой иммунизации. В список включены различные вакцины, такие как BNT162b2 *(Pfizer, США и BioNTech, Германия),* mRNA1273 *(Vaccine Research Center США и Moderna, США)*, Johnson&Johnson *(Бельгия, дочернее предприятие корпорации Johnson&Johnson),* Гам-КОВИД-Вак (*ФГБУ «Национальный центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России)*, AZD1222 *(Astra Zeneca, Швеция совместно с Оксфордским университетом, Великобритания)*, Sinopharm *(КНР),* CoronaVac *(КНР)* и Novavax *(США)* [16].

Для каждой вакцины были получены данные об их безопасности и эффективности. Заявленная защитная эффективность вакцин варьирует от 70% до 94,5%. К настоящему моменту в мире было проведено более 900 миллионов прививок от COVID-19, а количество полностью вакцинированных превышает 3095 миллионов человек. В апреле 2020 года сообщалось о 115 экспериментальных образцах вакцин от COVID-19, и как минимум 6 из них были одобрены для проведения клинических исследований [17].

Сравнительная эффективность вакцин может быть определена только через результаты контролируемых клинических исследований. Одним из ключевых показателей является эффективность вакцин, где наиболее перспективными препаратами считаются те, у которых показатель превышает 90%. Однако при близких показателях эффективности, важным критерием для оценки качества вакцин выступает характеристика побочных эффектов при массовой вакцинации. Как показали клинические исследования фазы III, нежелательные побочные действия были примерно одинаковые для всех видов вакцин, такие как покраснение в месте укола, умеренная и краткосрочная лихорадка, боли в мышцах и суставах [18]. Однако при массовой вакцинации диапазон нежелательных проявлений расширился.

Например, данные о масштабной иммунизации вакциной Pfizer/ BioNTech показали серьезные побочные эффекты, включая летальные исходы, в отличие от данных, полученных в ходе клинических исследований фазы III. Однако ни в одном случае прямая связь между вакцинацией и смертью не была установлена [19,20].

Существуют различные классы вакцин, такие как РНК-вакцины (Pfizer/BioNTech и Moderna), векторные рекомбинантные (Спутник V, Johnson&Johnson и Astra Zeneca), инактивированные (Sinopharm и Sinovac) и субъединичные (Novavax). Для определения долгосрочных перспектив вакцинных платформ проводится сравнение по таким показателям, как возможность формирования полноценного иммунного ответа, защитная эффективность, время, необходимое для разработки и испытания вакцин, а также возможность массового производства.

Вакцины с мРНК не содержат сам антиген, но передают генетическую информацию об антигене, и вакцинированный индивидуум синтезирует антигены в клетках-хозяевах. В этой технологии все компоненты производятся путем химического синтеза, что позволяет ускорить разработку в случае пандемии. Эти вакцины могут защитить реципиентов от инфекции SARS-CoV-2 путем образования антител и обеспечить иммунитет против инфекции SARS-CoV-2. Обе вакцины могут вызывать различные побочные эффекты, но сообщается, что эти реакции встречаются реже у вакцины Pfizer / BioNTech по сравнению с вакциной Moderna против COVID-19; однако вакцину Moderna по сравнению с вакциной Pfizer легче транспортировать и хранить, поскольку она менее чувствительна к температуре. Преимущества, связанные с мРНК-вакцинами, включают высокую эффективность и относительно низкую выраженность побочных эффектов [21].

Gam-Covid-Vac (Спутник V) – вакцина на основе аденовируса (двойной вирусный переносчик), в которой используется ослабленный вирус, который, в свою очередь, доставляет небольшие части патогена, в конечном счете стимулируя иммунный ответ. Ген, кодирующий S-белок SARS-CoV-2, переносится через вектор rAd26 (первая доза), который обеспечивает гуморальный и клеточный иммунитет, а вектор rAd5 (вторая доза) индуцирует образование клеток памяти. Активными компонентами являются модифицированный аденовирус с дефектом репликации другого серотипа, модифицированный для включения белка S, экспрессирующего ген SARS-CoV-2. Серьезных нежелательных явлений, связанных с вакциной, зарегистрировано не было, а эффективность вакцины, основанная на количестве подтвержденных случаев COVID-19 через 21 день после введения первой дозы вакцины, составила 92% [22,23].

Вакцина CoronaVac была разработана Sinovac с использованием неактивного вируса SARS-CoV-2 (штамм CZ02). Вводятся две дозы вакцины с интервалом от 14 до 28 дней. Одним из основных преимуществ вакцины, разработанной Sinovac, является то, что ее можно хранить при температуре 2–8 °C.

Sinopharm (Sinopharm BBIBP-CorV) представляет собой инактивированную вирусную вакцину, одобренную ВОЗ. В отличие от вакцин Moderna и Pfizer, эта вакцина проста в транспортировке и может храниться при температуре 2–8 °C. Поскольку иммунный ответ, вызванный вакциной BBIBP-CorV, многовариантен, мутация вируса не может повлиять на иммунный ответ, вызванный вакциной BBIBP-CorV. Вакцина показала эффективность 79% в отношении симптоматических случаев COVID-19 с редкими серьезными побочными эффектами [24].

Вакцина, разработанная Novavax, представляет собой вакцину на основе белковых субъединиц, разработанную с использованием субъединицы белка SARS-CoV-2 spike в ее гликозилированной форме. Вакцину можно стабильно хранить при температуре 2–8 °C с интервалом в две дозы в 3 недели. Для усиления иммунного ответа его смешивают с запатентованным адъювантом Novavax Matrix-M на основе сапонина. Клинические испытания Novavax представляют собой первые крупные контролируемые клинические испытания эффективности вакцины против COVID-19 против вариантов B.1.1.7 и B.1.351. В целом, результаты показывают, что NVX–CoV2373 может быть столь же эффективен, как любое изученное на сегодняшний день профилактическое средство против старых вариантов [25].

Заключение. Представленный обзор представляет собой анализ вопросов и проблем, возникающих в процессе массовой иммунизации против COVID-19, а также оценку перспектив используемых вакцинных платформ. Исследование продемонстрировало, что основной целью проводимой вакцинации является создание коллективного иммунитета, который помешает дальнейшему распространению заболевания. При сравнении различных вакцинных платформ, таких как аттенуированные, инактивированные, на основе вирусоподобных частиц, пептидные, векторные рекомбинантные, ДНК и РНК-вакцины, использованные в процессе массовой иммунизации против COVID-19, были выявлены определенные преимущества и недостатки каждого вида вакцин.

Литература

1. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med (2020) 382:727–33. 10.1056/NEJMoa2001017 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
2. WHO. Listings of WHO's Response to COVID-19. Geneva, Switzerland: World Health Organization; (2020). https://www.who.int/news/item/29–06–2020-covidtimeline (Accessed September 30, 2021). [Google Scholar]
3. Merow, C, and Urban, MC. Seasonality and uncertainty in global COVID-19 growth rates. Proc Natl Acad Sci. (2020) 117:27456–64. doi: 10.1073/pnas.2008590117
4. Godeau, D, Petit, A, Richard, I, Roquelaure, Y, and Descatha, A. Return-to-work, disabilities and occupational health in the age of COVID-19. Scand J Work Environ Health. (2021) 47:408–9. doi: 10.5271/sjweh.3960
5. Sarkodie, SA, and Owusu, PA. Global assessment of environment, health and economic impact of the novel coronavirus (COVID-19). Environ Dev Sustain. (2021) 23:5005–15. doi: 10.1007/s10668-020-00801-2
6. Lytras, T, and Tsiodras, S. Lockdowns and the COVID-19 pandemic: what is the endgame. Scand J Public Health. (2021) 49:37–40. doi: 10.1177/1403494820961293
7. Thompson, J, and Wattam, S. Estimating the impact of interventions against COVID-19: from lockdown to vaccination. PLoS One. (2021) 16: e0261330. doi: 10.1371/journal.pone.0261330
8. Hatami, H, Qaderi, S, Shah, J, Rezaeian, AR, Farsi, Y, Alinasab, F, et al. COVID-19: national pandemic management strategies and their efficacies and impacts on the number of secondary cases and prognosis: a systematic review. Int J Prev Med. (2022) 13:100. doi: 10.4103/ijpvm.IJPVM_464_20
9. Schäfer, M, Wijaya, KP, Rockenfeller, R, and Götz, T. The impact of travelling on the COVID-19 infection cases in Germany. BMC Infect Dis. (2022) 22:455. doi: 10.1186/s12879-022-07396-1
10. Hazlett C., Wulf D.A., Pasaniuc B., Arah O.A., Erlandson K.M., Montague B.T. Credible learning of hydroxychloroquine and dexamethasone effects on COVID-19 mortality outside of randomized trials. medRxiv. 2020 doi: 10.1101/2020.12.06.20244798.
11. Singh A.K., Majumdar S., Singh R., Misra A. Role of corticosteroid in the management of COVID-19: A systemic review and a Clinician's perspective. Di-

abetes Metab. Syndr. Clin. Res. Rev. 2020;14:971–978. doi: 10.1016/j.dsx.2020.06.054.
12. Hossen M.S., Barek M.A., Jahan N., Safiqul Islam M. A Review on Current Repurposing Drugs for the Treatment of COVID-19: Reality and Challenges. SN Compr. Clin. Med. 2020;2:1777–1789. doi: 10.1007/s42399-020-00485-9.
13. Hinman A. Eradication of vaccine-preventable diseases. Annu. Rev. Public Health. 1999;20:211–229. doi: 10.1146/annurev.publhealth.20.1.211.
14. Silveira M.M., Moreira G.M.S.G., Mendonça M. DNA vaccines against COVID-19: Perspectives and challenges. Life Sci. 2021;267:118919. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118919.
15. Anderson E.J., Rouphael N.G., Widge A.T., Jackson L.A., Roberts P.C., Makhene M., Chappell J.D., Denison M.R., Stevens L.J., Pruijssers A.J., et al. Safety and Immunogenicity of SARS-CoV-2 mRNA-1273 Vaccine in Older Adults. N. Engl. J. Med. 2020;383:2427–2438. doi: 10.1056/NEJMoa2028436.
16. Онищенко Геннадий Григорьевич, Сизикова Татьяна Евгеньевна, Лебедев Виталий Николаевич, Борисевич Сергей Владимирович ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19: ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ И БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ // Вестник РАМН. 2021. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vaktsinatsiya-protiv-covid-19-voznikayuschie-voprosy-i-buduschie-perspektivy
17. Coronavirus Disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update and Weekly Operational. Update Situation Reports [Electronic resource]. Available from: https://www.who.int/emergencies/ diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports.
18. COVID-19 vaccines [Electronic resource]. Available from: https:// www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines.
19. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) Publications | Vaccine Safety // CDC [Electronic resourse]. Available from: https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/publications.html
20. Wise J. Covid-19: Pfizer BioNTech vaccine reduced cases by 94% in Israel, shows peer reviewed study. BMJ. 2021;372: n567. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n567.
21. Пормохаммад А., Зарей М., Горбани С. и др. Эффективность и безопасность вакцин против COVID-19: систематический обзор и мета-анализ рандомизированных клинических исследований. Вакцины. 2021;9(5).
22. Смит ТРФ, Патель А., Рамос С., Элвуд Д., Чжу Х., Ян Дж., Гэри ЭН, Уокер С.Н., Шультхейс К., Пурвар М. и др. Иммуногенность ДНК-вакцины-кандидата против COVID-19. Nat Communun. 2020;11(1): 2601. doi:
23. Бос Р., Раттен Л., ван дер Люббе Дж. Э. М., Баккерс М. Дж. Г., Харденберг Г., Вегман Ф. и др. (2020). Векторная вакцина против COVID-19 Ad26, кодирующая стабилизированный дофузией спайковый иммуноген SARS-CoV-2, Индуцирует мощные гуморальные и клеточные иммунные реакции. Вакцины NPJ 5, 1–11. doi:
24. Баден Л. Р., Эль Сахли Х.М., Эссинк Б., Котлофф К., Фрей С., Новак Р. и др. (2020). Эффективность и безопасность вакцины SARS-CoV-2 с мРНК-1273. Новый англ. J. Med. 384, 403–416. doi: 10.1056 /NEJMoa2035389
25. Шен Х., Тан Х., Макдэнал К., Вагх К., Фишер У., Тейлер Дж. и др. (2021). Вариант B.1.1.7 SARS-CoV-2 чувствителен к нейтрализующим антителам, вырабатываемым наследственными спайковыми вакцинами. Клеточный микроб-хозяин 29, 529–539. doi: 10.1016 / j.chom.2021.03.002

ISSUES OF MASS VACCINATION AGAINST SARS-COV-2 AND ITS ROLE IN ENDING THE PANDEMIC

Saaeva N.M., Daniyalbekova Z.M., Abusueva A.S., Bilalova S.K., Yuzbekova A.
Dagestan State Medical University

Coronavirus infection (SARS-CoV-2) has undoubtedly become one of the memorable events of the 21st century. To combat the pandemic, a massive vaccination program has been launched worldwide since 2020. Vaccination is considered the most promising, but also challenging, approach to speed up disease control, achieving the levels of immunity needed to meet international mortality reduction goals.
In this study, our goal is to study current issues of mass vaccination of the population against COVID-19 and consider promising vaccine platforms. Studies were obtained by searching four electronic databases: PubMed/Medline, Scopus, Excerpta Medica Database (EMBASE), Google Scholar and medRxiv to screen the scientific literature.

Keywords: vaccination, COVID-19, infection, pandemic.

References

1. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med (2020) 382:727–33. 10.1056/NEJMoa2001017 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
2. WHO. Listings of WHO's Response to COVID-19. Geneva, Switzerland: World Health Organization; (2020). https://www.who.int/news/item/29–06–2020-covidtimeline (Accessed September 30, 2021). [Google Scholar]
3. Merow, C, and Urban, M.C. Seasonality and uncertainty in global COVID-19 growth rates. Proc Natl Acad Sci. (2020) 117:27456–64. doi: 10.1073/pnas.2008590117
4. Godeau, D, Petit, A, Richard, I, Roquelaure, Y, and Descatha, A. Return-to-work, disabilities and occupational health in the age of COVID-19. Scand J Work Environ Health. (2021) 47:408–9. doi: 10.5271/sjweh.3960
5. Sarkodie, S. A., and Owusu, P.A. Global assessment of environment, health and economic impact of the novel coronavirus (COVID-19). Environ Dev Sustain. (2021) 23:5005–15. doi: 10.1007/s10668-020-00801-2
6. Lytras, T, and Tsiodras, S. Lockdowns and the COVID-19 pandemic: what is the endgame. Scand J Public Health. (2021) 49:37–40. doi: 10.1177/1403494820961293
7. Thompson, J, and Wattam, S. Estimating the impact of interventions against COVID-19: from lockdown to vaccination. PLoS One. (2021) 16: e0261330. doi: 10.1371/journal.pone.0261330
8. Hatami, H, Qaderi, S, Shah, J, Rezaeian, AR, Farsi, Y, Alinasab, F, et al. COVID-19: national pandemic management strategies and their efficacies and impacts on the number of secondary cases and prognosis: a systematic review. Int J Prev Med. (2022) 13:100. doi: 10.4103/ijpvm.IJPVM_464_20
9. Schäfer, M, Wijaya, KP, Rockenfeller, R, and Götz, T. The impact of travel on the COVID-19 infection cases in Germany. BMC Infect Dis. (2022) 22:455. doi: 10.1186/s12879-022-07396-1
10. Hazlett C., Wulf D.A., Pasaniuc B., Arah O.A., Erlandson K.M., Montague B.T. Credible learning of hydroxychloroquine and dexa-

methasone effects on COVID-19 mortality outside of randomized trials. medRxiv. 2020 doi: 10.1101/2020.12.06.20244798.
11. Singh A.K., Majumdar S., Singh R., Misra A. Role of corticosteroid in the management of COVID-19: A systemic review and a Clinician's perspective. Diabetes Metab. Syndr. Clin. Res. Rev. 2020;14:971–978. doi: 10.1016/j.dsx.2020.06.054.
12. Hossen M.S., Barek M.A., Jahan N., Safiqul Islam M. A Review on Current Repurposing Drugs for the Treatment of COVID-19: Reality and Challenges. SN Compr. Clin. Med. 2020;2:1777–1789. doi:10.1007/s42399-020-00485-9.
13. Hinman A. Eradication of vaccine-preventable diseases. Annu. Rev. Public Health. 1999;20:211–229. doi: 10.1146/annurev.publhealth.20.1.211.
14. Silveira M.M., Moreira G.M.S.G., Mendonça M. DNA vaccines against COVID-19: Perspectives and challenges. Life Sci. 2021;267:118919. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118919.
15. Anderson E. J., Rouphael N.G., Widge A.T., Jackson L.A., Roberts P.C., Makhene M., Chappell J.D., Denison M.R., Stevens L.J., Pruijssers A.J., et al. Safety and Immunogenicity of SARS-CoV-2 mRNA-1273 Vaccine in Older Adults. N.Engl. J. Med. 2020;383:2427–2438. doi: 10.1056/NEJMoa2028436.
16. Onishchenko Gennady Grigorievich, Sizikova Tatyana Evgenievna, Lebedev Vitaly Nikolaevich, Borisevich Sergey Vladimirovich VACCINATION AGAINST COVID-19: EMERGING ISSUES AND FUTURE PROSPECTS // Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences. 2021. No. 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vaktsinatsiya-protiv-covid-19-voznikayuschie-voprosy-i-buduschie-perspektivy
17. Coronavirus Disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update and Weekly Operational. Update Situation Reports [Electronic resource]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports.
18. COVID-19 vaccines [Electronic resource]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines.
19. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) Publications | Vaccine Safety // CDC [Electronic resource]. Available from: https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/vaers/publications.html
20. Wise J. Covid-19: Pfizer BioNTech vaccine reduced cases by 94% in Israel, shows peer reviewed study. BMJ. 2021;372: n567. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n567.
21. Pormohammad A., Zarey M., Ghorbani S. et al. Efficacy and safety of COVID-19 vaccines: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Vaccines. 2021;9(5).
22. Smith TRF, Patel A, Ramos S, Ellwood D, Zhu H, Yang J, Gary EN, Walker CN, Schulhuis K, Purwar M, et al. Immunogenicity of a DNA vaccine candidate against COVID-19. Nat Communun. 2020;11(1): 2601. doi:
23. Bos, R., Ratten, L., van der Lubbe, J. E. M., Bakkers, M. J. G., Hardenberg, G., Wegman, F., et al. (2020). COVID-19 vector vaccine Ad26, encoding a dofuse-stabilized SARS-CoV-2 spike immunogen, induces powerful humoral and cellular immune responses. Vaccines NPJ 5, 1–11. doi:
24. Baden L. R., El Sahli H.M., Essink B., KOtloff, K., Frey, S., Nowak, R., et al. (2020). Efficacy and safety of SARS-CoV-2 vaccine with mRNA-1273. New English J. Med. 384, 403–416. doi: 10.1056/NEJMoa2035389
25. Shen, H., Tang, H., McDanal, K., Wagh, K., Fischer, W., Theiler, J., et al. (2021). The B.1.1.7 variant of SARS-CoV-2 is sensitive to neutralizing antibodies produced by hereditary spike vaccines. Cellular Microbe Host 29, 529–539. doi:10.1016/j.chom.2021.03.002

Повышение эффективности работы медицинских учреждений

Аветисян Рубина Рубиковна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедра организации здравоохранения с психологией и педагогикой, ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
E-mail: rubina-avetisan@mail.ru

Иванова Вероника Владимировна,
студент, Северо-Осетинская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации
E-mail: veronica-dvv@mail.ru

Тузов Александр Иванович,
кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности дорожного движения, Краснодарский университет МВД России
E-mail: alexstav75@mail.ru

Сухотерина Елена Геннадьевна,
кандидат медицинских наук, доцент, кафедра экстремальной медицины, травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
E-mail: lenasukhoerina@mail.ru

Сухотерин Дмитрий Михайлович,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры, кафедра экстремальной медицины, травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
E-mail: d-suhoterin@mail.ru

Статья посвящена проблеме повышения эффективности работы медицинских учреждений. Обоснована актуальность проблемы оценки эффективности деятельности медицинских организаций. Раскрыты факторы, которые определяют методические подходы к экспертизе и контролю качества, к оценке эффективности медицинской помощи в системе отечественного здравоохранения. Показано, что в системе здравоохранения разработаны автоматизированные инструменты оценки эффективности труда медицинских работников, медицинских организаций и ее структурных подразделений. Эффективность труда медицинских организаций и медицинского персонала является интегративным показателем, отражающим соответствие полученных результатов целям и задачам деятельности. Одним из показателей эффективности работы медицинских учреждений является степень субъективной удовлетворенности медицинского персонала различными сторонами трудовой деятельности в медицинской организации. Цель исследования: оценка эффективности трудовой деятельности медицинского персонала медицинских организаций по критериям субъективной удовлетворенности различными сторонами труда. Методы сбора данных – анкетный опрос; методы обработки данных – сравнительный и уровневый анализ; статистические методы – метод описательной статистики, процентное распределение полученных данных. Результаты исследования выявили субъективную удовлетворенность медицинского персонала группой факторов, которые обуславливают высокую эффективность профессионального труда медицинских работников, демонстрируя удовлетворенность условиями труда, системой взаимодействия между отдельными подразделениями и медицинскими работниками, возможностью использовать опыт и способности в профессиональной деятельности. Недостаточная степень субъективной удовлетворенности медицинского персонала выявлена по фактору удовлетворенность компетенциями руководителя, что обуславливает риски снижения эффективности работы медицинских учреждений. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования ее результатов для повышения эффективности работы медицинских учреждений.

Ключевые слова: медицинская организация, эффективность труда, качество медицинской деятельности, качество медицинской помощи, удовлетворенность факторами труда.

Введение

Отечественная система здравоохранения в настоящее время находится в условиях интенсивных изменений, что обусловлено внедрением процессов информатизации и цифровизации в организационно-экономическую структуру лечебно-профилактических учреждений органов здравоохранения. Целью данных изменений является повышение качества медицинских услуг системы здравоохранения. Это, в свою очередь, предполагает внедрение электронно-цифровых методов мониторинга качества и управления современным учреждением здравоохранения. В связи с этим, ведется разработка современных электронно-цифровых технологий контроля и оценки эффективности деятельности медицинской отрасли в целом и ее отдельных подразделений на основе анализа традиционных принципов, методических подходов и методов внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности [5; 6; 7]. Новые требования к системе отечественного здравоохранения сегодня привели к тому, что сегодня проводится стандартизация порядка оказания медицинской помощи в электронном формате и «внедрения в медицинские информационные системы, в том числе при автоматизации процессов контроля качества медицинской помощи» [8, с. 38]. Методические подходы к экспертизе и контролю качества и эффективности медицинской помощи сегодня определяются целым рядом факторов. Ведущими показателями качества деятельности медицинских учреждений являются электронно-цифровое обеспечение структуры управления учреждений здравоохранения и повышение роли экономических методов управления. К настоящему времени в системе здравоохранения разработаны автоматизированные инструменты оценки качества и эффективности труда медицинских работников в различных профилях медицинских организаций [1; 6; 7; 9; 10], внедрена унифицированная система внутреннего контроля качества лечебно-профилактической деятельности [2–4].

Одной из важнейших характеристик труда и трудовой деятельности является эффективность, которая имеет свои специфические характеристики в системе здравоохранения. Наряду с эффективностью деятельности медицинских учреждений, существуют близкие к нему понятия: «качество медицинской деятельности» и «качество медицинской помощи». Качество медицинской деятельности определяется как «совокупность характеристик, отражающих качество медицинской помощи, а также качество ее организации и степень достижения запланированного результата» [9, с. 16]. Качество медицинской помощи демонстрирует «совокупность характеристик, отражающих правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, а также соблюдение технологии лечебного процесса» [9, с. 16]. В свою очередь, эффективность труда является интегративным показателем, отражающим адекватность полученных результатов деятельности поставленным задачам в ходе ее выполнения [11]. Сопоставление содержания, качества и объема фактического труда с планируемым результатом позволяет оценить эффективность медицинского труда. Результаты лечебно-профилактической деятельности отражаются в технологических картах, стандартах и программах, которые показывают особенности функционирования учреждения здравоохранения.

Важным направлением в изучение эффективности работы медицинских учреждений является выделение комплекса показателей, которые позволяют оценить эффективность ее различных видов деятельности, информационного взаимодействия, управления и контроля качества на основе мониторинга. Мониторинг качества работы медицинского учреждения предполагает:

– во-первых, определить критерии и показатели управления медицинской организацией, ее отдельных подразделений и медицинских работников;
– во-вторых, совокупность критериев, отражающих качество медицинской деятельности и ее организации при оказании лечебно-профилактической помощи.

Совокупность выделенных показателей эффективности деятельности медицинского учреждения определяют и комплекс адекватных методов диагностики, в ряде случаев предполагающих экспертную оценку эксперта-специалиста по профилю лечебно-профилактической деятельности. Так, например, в ходе экспертной оценки эффективности работы отдельных подразделений медицинского учреждения «анализируются жалобы пациентов и их законных представителей, профессиональные ошибки врачей, данные анкетирования (в том случае, если они проводились), качество ведения медицинской документации, достоверность статистических данных, использование медикаментов, готовность оказывать медицинскую помощь по экстренным и неотложным состояниям и многое другое» [1, с. 21]. Повысить достоверность при анализе массива показателей, отражающих объективные критерии эффективности медицинского труда, позволяет интенсивное использование автоматизированных средств контроля и качества медицинской помощи, которые в настоящее время внедрены в деятельность медицинских учреждений.

Анализируя проблему эффективности деятельности медицинских учреждений, необходимо подчеркнуть, что до настоящего времени не решены ряд вопросов. Так, например, несмотря на различия трудовой деятельности, одни и те же критерии эффективности профессиональной деятельности предлагаются для разных типов профессий. В основном выделены критерии эффективности, посредством которых можно определить любую деятельность, вне зависимости от ее социального контекста. Внимание направлено в основном на определение объективных критериев эффективности труда, а субъективным критериям профессиональной деятельности уделяется меньше внимания. Необходимо отметить, что «субъективные

критерии эффективности трудовой деятельности неформальны и не закреплены в нормативных документах и в стандартах качества управления качеством и безопасностью в медицинской организации, в большей степени отражают степень удовлетворенности медицинского персонала различными сторонами трудовой деятельности» [11]. Поэтому изучение субъективных критериев эффективности медицинского труда является одной из задач, позволяющих повысить эффективность работы медицинского учреждения в целом.

С целью повышения эффективности деятельности медицинских учреждений внимания заслуживают вопросы создания благоприятного социально-психологического климата, врачебной этики и деонтологии в процессе оказания медицинских услуг [1; 2]. В настоящее время актуальными являются научно-практические исследования по проблеме организационных условий, обеспечивающих повышение эффективности работы медицинских учреждений. Одним из показателей эффективности работы медицинских учреждений, как отмечалось выше, является степень удовлетворенности медицинского персонала различными сторонами трудовой деятельности в медицинской организации. Оценка эффективности трудовой деятельности медицинского персонала учреждений здравоохранения по критериям субъективной удовлетворенности различными сторонами труда является условием для принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности работы медицинских учреждений. В связи с этим проведено исследование степени удовлетворенности медицинского персонала условиями труда в учреждениях здравоохранения как показателя эффективности работы медицинского учреждения.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе государственных медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Московской области и г. Москвы. Цель исследования: оценка эффективности трудовой деятельности медицинского персонала учреждений здравоохранения по критериям субъективной удовлетворенности различными сторонами труда. В качестве методов сбора данных применялся анкетный опрос, направленный на оценку показателей субъективных критериев эффективности трудовой деятельности: удовлетворенность медицинской организацией; удовлетворенность условиями труда; удовлетворенность взаимодействием медицинского персонала между собой; удовлетворенность профессиональной компетенцией руководителя; удовлетворенность возможности использования профессионального опыта и способностей. В анкетном опросе приняли участие 347 медицинских работников разного должностного статуса. В качестве методов обработки данных применялся сравнительный и уровневый анализ, статистические методы – метод описательной статистики, процентное распределение полученных данных.

Результаты и обсуждения

Результаты исследования субъективной удовлетворенности различными сторонами труда медицинского персонала позволили выявить процентное распределение медицинских работников с разным уровнем степени удовлетворенности медицинской организацией (рис. 1).

Практически каждый второй медицинский работник удовлетворен медицинской организацией (46,4%), из которых более, чем каждый пятый медицинский работник (21,4%) вполне удовлетворен медицинской организацией, а каждый четвертый (25%) полностью удовлетворен.



Рис. 1. Удовлетворенность медицинского персонала медицинской организацией

Показатели: 1. Вполне удовлетворен. 2. Удовлетворен. 3. Не вполне удовлетворен. 4. Не удовлетворен. 5. Крайне не удовлетворен

Такое же распределение медицинских работников выявлено по уровню неудовлетворенности различными факторами труда в медицинской организации: не вполне удовлетворены каждый пятый медицинский работник, а 21,4% медицинского персонала не удовлетворены. Только 7,1% медицинских работников крайне не удовлетворены медицинской организацией, составляя риск текучести кадров.

Удовлетворенность условиями труда выступает значимым показателем субъективной удовлетворенности медицинского персонала, что оказывает влияние на качество лечебно-профилактической деятельности медицинского учреждения (рис. 2).



Рис. 2. Удовлетворенность медицинского персонала условиями труда

Показатели: 1. Вполне удовлетворен. 2. Удовлетворен. 3. Не вполне удовлетворен. 4. Не удовлетворен.

Результаты опроса показали, что почти каждый третий медицинский работник удовлетворен (32,1%) и каждый четвертый вполне удовлетворен (25%) условиями труда. Физической нагрузкой м условиями труда не удовлетворены только 14,3%

медицинских работников. В целом можно заключить, что данный фактор удовлетворенности трудом отражает оптимальный уровень удовлетворенности физическими нагрузками в процессе оказания медицинской помощи.

Система взаимодействия в медицинской организации между ее структурными подразделениями и отдельными медицинскими работниками является одним из условий, которое оказывает влияние на эффективность труда (рис. 3).



Рис. 3. Удовлетворенность взаимодействием медицинского персонала между собой

Показатели: 1. Вполне удовлетворен. 2. Удовлетворен. 3. Не вполне удовлетворен. 4. Не удовлетворен.

Анализ полученных результатов показывает, что 75% медицинских работников удовлетворены взаимодействием между медицинским персоналом в процессе решения лечебно-профилактических задач между разными подразделениями медицинского учреждения. Только у 14,3% медицинских работников имеют место проблемы взаимодействия при оказании лечебно-профилактической помощи.

В медицинском учреждении в системе профессионального взаимодействия важная роль придается особенностям управления медицинским персоналом, которое определяется профессиональной компетенцией руководителей. Удовлетворенность среди медицинского персонала профессиональной компетентностью руководителя выступает одним из условий повышения качества медицинской помощи, как в отдельных подразделениях медицинской организации, так и медицинской организации в целом (рис. 4).



Рис. 4. Удовлетворенность медицинского персонала профессиональной компетенцией руководства

Показатели: 1. Вполне удовлетворен. 2. Удовлетворен. 3. Не вполне удовлетворен. 4. Не удовлетворен. 5. Крайне не удовлетворен.

Результаты показывают, что вполне удовлетворены и удовлетворены профессиональной компетентностью руководства 28,6% медицинского персонала. При этом полное удовлетворение профессиональной компетентностью руководителя обнаружено только у 7,1% медицинского персонала. Каждый четвертый медицинский работник (25%) не вполне удовлетворен профессиональной компетентностью руководства медицинским учреждением, а 46,4% не удовлетворены и крайне не удовлетворены компетентностью руководителя, что показывает наличие ряда противоречий в системе управления медицинской организацией и риски возникновения конфликтов в системе отношений подчиненный-руководитель.

Важным субъективным фактором труда медицинского персонала, оказывающим влияние на его качество, является возможность профессиональной самореализации, то есть применения профессиональных навыков, способностей и профессионального опыта (рис. 5).



Рис. 5. Удовлетворенность медицинского персонала возможностью использования своего опыта и способностей

Показатели: 1. Вполне удовлетворен. 2. Удовлетворен. 3. Не вполне удовлетворен. 4. Не удовлетворен.

Результаты показывают, что полностью удовлетворены возможностью реализовать свои профессиональные способности и опыт каждый четвертый медицинский работник (25%), а 28,6% медицинских имеют оптимальный уровень удовлетворенности возможностью самореализации профессиональных способностей при выполнении профессиональных задач в процессе оказания медицинской помощи. Такое же количество медицинских работников (28,6%) не вполне удовлетворены возможностями использовать профессиональный опыт и способности при выполнении профессиональных задач. Только 17,8% практически не удовлетворены предоставленными медицинскими организациями возможностями использовать трудовой опыт и способности при выполнении профессиональной деятельности.

Сравнительный анализ факторов субъективной удовлетворенности трудом позволил выявить группы факторов, которые обуславливают высокую эффективность профессионального труда и группы факторов, которые обуславливают риски снижения высоких результатов лечебно-профилактической деятельности (табл. 1).

Выявлена субъективная удовлетворенность медицинского персонала такими факторами труда, как удовлетворенность медицинской организацией

в целом (2,7±0,17), удовлетворенность физическими условиями труда (2,2±0,17), удовлетворенность слаженностью действий медицинских работников между собой (2±0,23), удовлетворенность возможностями использования профессионального опыта и способностей при выполнении профессиональных задач (2,3±0,13). Данные группы факторов обуславливают высокую эффективность профессионального труда медицинских работников, демонстрируя удовлетворенность условиями труда, системой взаимодействия между отдельными подразделениями и медицинскими работниками, возможностью самореализации в профессиональной деятельности. Однако, в ходе исследования обнаружены факторы профессионального труда, показавшие недостаточную степень субъективной удовлетворенности медицинского персонала, которые обуславливают риски снижения эффективности работы медицинских учреждений. В частности, обнаружено, что медицинские работники не вполне удовлетворены профессиональными компетенциями руководства (3,2±0,19), что демонстрирует наличие противоречий в системе отношений подчиненный – начальник, что требует выявления причин возникновения данных противоречий, которые могут лежать как в сфере неприятия стиля руководства, так и в сфере предъявляемых к подчиненным профессиональным требований.

Таблица 1. Факторы субъективной удовлетворенности медицинского персонала трудом

№	Показатели субъективной удовлетворенности медицинского персонала трудом в медицинской организации	M±m, балл
1	Удовлетворенность медицинского персонала медицинской организацией	2,7±0,21
2	Удовлетворенность медицинского персонала физическими условиями труда	2,2±0,17
3	Удовлетворенность слаженностью действий медицинского персонала между собой	2±0,23
4	Удовлетворенность медицинского персонала профессиональной компетенцией руководства	3,2±0,19
5	Удовлетворенность медицинского персонала возможности использования своего опыта и способностей	2,3±0,13

Примечание: уровни: 1–2,9 баллов – удовлетворены; 3–3,9 баллов – не вполне удовлетворены; 4–5 баллов – не удовлетворены.

Выводы

Таким образом, актуальные тенденции развития отечественного здравоохранения заключаются в повышении требований к качеству лечебно-профилактической помощи, что ставит проблему определения критериев и показателей эффективности работы медицинского персонала и медицинских учреждений в целом. Одним из таких показателей выступает субъективная удовлетворенность медицинского персонала условиями и факторами профессионального труда, системой профессионального взаимодействия между медицинскими работниками и отдельными подразделениями медицинского учреждения, возможностью использовать опыт и способности в профессиональной деятельности. Риски снижения эффективности работы медицинских учреждений, согласно полученным результатам, находятся в сфере недостаточной степени субъективной удовлетворенности медицинского персонала компетенциями руководителя, что обуславливает противоречия в системе руководитель-подчиненный и требует проведения дальнейших исследований. Результаты исследования могут найти применение как для частных решений при организации лечебно-профилактической деятельности и оптимизации взаимодействия между различными подразделениями медицинской организации, так и для проведения оптимизации управленческих воздействий в системе управления медицинской организацией. Полученные выводы позволяют разработать комплекс мероприятий для повышения эффективности работы медицинских учреждений посредством оптимизации системы управления медицинским учреждением, в чем заключается практическая значимость исследования.

Литература

1. Запевалин П.В., Кицул И.С. Методические подходы к оценке соответствия деятельности медицинских организаций порядкам оказания медицинской помощи // Менеджер здравоохранения. – 2019. – № 1. – С. 15–23.
2. Иванов И.В. Система управления качеством и безопасностью в медицинской организации. Современное состояние // Вестник Росздравнадзора. – 2019. – № 6. – С. 15–23.
3. Иванов И.В. Обязательные требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности / И.В. Иванов, О.Р. Швабский, Н.О. Матыцин [и др.] // Менеджмент качества в медицине. – 2019. – № 4. – С. 26–31.
4. Иванов И.В. Предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в поликлинике / И.В. Иванов, Д.Т. Шарикадзе, С.В. Боброва // Вестник Росздравнадзора. – 2017. – № 4. – С. 79–82.
5. Линденбратен А.Л. Методические подходы к оценке качества организации медицинской помощи // Здравоохранение. – 2015. – № 1. – С. 74–78.
6. Мурашко М.А. Современные принципы организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности / М.А. Мурашко, И.В. Иванов // Управление качеством в здравоохранении. – 2019. – № 2. – С. 3–7.
7. Серёгина И.Ф. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности: новые требования / И.Ф. Серёгина, А.Н. Шаро-

нов, С.В. Ковалев, А.В. Прыкин, И.В. Иванов [и др.] // Управление качеством в здравоохранении. – 2019. – № 4. – С. 12–21.
8. Серяпина Ю.В. Стандартизация порядков оказания медицинской помощи в Российской Федерации / Ю.В. Серяпина, И.А. Железнякова, В.В. Омельяновский, А.А. Кравцов, И.А. Михайлов, А.Н. Дайхес // Медицинские технологии. Оценка и выбор. – 2020. – № 3. – С. 36–43.
9. Хабриев Р.У. Система критериев и показателей оценки качества оказания паллиативной медицинской помощи: организационно-методические подходы / Р.У. Хабриев, А.Л. Линденбратен, М.Е. Коломийченко // Бюллетень национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко. – 2020. – № 4. – С. 14–23.
10. Эмануэль А.В. Предложения по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности в КДЛ / А.В. Эмануэль, И.В. Иванов, Аверьянова Е.В. [и др.] // Управление качеством в здравоохранении. – 2019. – № 2. – С. 8–15.
11. Якунина Ю.Е. Субъективные критерии эффективности профессиональной деятельности в профессиях типа «человек-человек»: автореферат дис. … кандидата психологических наук: 19.00.03. – Москва, 2004. – 24 с.

INCREASING THE EFFICIENCY OF MEDICAL INSTITUTIONS

Avetisyan R.R., Ivanova V.V., Tuzov A.I., Sukhoterina E.G., Sukhoterin D.M.
North Ossetian State Medical Academy; Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; St. Petersburg State Pediatric Medical University

The article is devoted to the problem of increasing the efficiency of medical institutions. The relevance of the problem of assessing the effectiveness of medical organizations is substantiated. The factors that determine methodological approaches to examination and quality control, to assessing the effectiveness of medical care in the domestic healthcare system are revealed. It is shown that the healthcare system has developed automated tools for assessing the performance of medical workers, medical organizations and its structural divisions. The labor efficiency of medical organizations and medical personnel is an integrative indicator that reflects the compliance of the results obtained with the goals and objectives of the activity. One of the indicators of the effectiveness of medical institutions is the degree of subjective satisfaction of medical personnel with various aspects of work in a medical organization. Purpose of the study: to assess the effectiveness of the labor activity of medical personnel of medical organizations according to the criteria of subjective satisfaction with various aspects of work. Data collection methods: questionnaire; data processing methods – comparative and level analysis; statistical methods – descriptive statistics method, percentage distribution of the obtained data. The results of the study revealed the subjective satisfaction of medical personnel with a group of factors that determine the high efficiency of the professional work of medical workers, demonstrating satisfaction with working conditions, the system of interaction between individual departments and medical workers, and the opportunity to use experience and abilities in professional activities. An insufficient degree of subjective satisfaction of medical personnel was identified by the factor satisfaction with the competencies of the manager, which causes risks of reducing the efficiency of medical institutions. The practical significance of the study lies in the possibility of using its results to improve the efficiency of medical institutions.

Keywords: medical organization, labor efficiency, quality of medical activities, quality of medical care, satisfaction with labor factors.

References

1. Zapevalin P.V., Kitsul I.S. Methodological approaches to assessing the compliance of the activities of medical organizations with the procedures for providing medical care // Healthcare Manager. – 2019. – No. 1. – P. 15–23.
2. Ivanov I.V. Quality and safety management system in a medical organization. Current state // Bulletin of Roszdravnadzor. – 2019. – No. 6. – P. 15–23.
3. Ivanov I.V. Mandatory requirements for organizing and conducting internal quality control and safety of medical activities / I.V. Ivanov, O.R. Shvabsky, N.O. Matytsin [et al.] // Quality management in medicine. – 2019. – No. 4. – P. 26–31.
4. Ivanov I.V. Suggestions (practical recommendations) for organizing internal quality control and safety of medical activities in the clinic / I.V. Ivanov, D.T. Sharikadze, S.V. Bobrova // Bulletin of Roszdravnadzor. – 2017. – No. 4. – P. 79–82.
5. Lindenbraten A.L. Methodological approaches to assessing the quality of medical care // Healthcare. – 2015. – No. 1. – P. 74–78.
6. Murashko M.A. Modern principles of organizing internal quality control and safety of medical activities / M.A. Murashko, I.V. Ivanov // Quality management in healthcare. – 2019. – No. 2. – P. 3–7.
7. Seregina I.F. Internal control of quality and safety of medical activities: new requirements / I.F. Seregina, A.N. Sharonov, S.V. Kovalev, A.V. Prykin, I.V. Ivanov [et al.] // Quality management in healthcare. – 2019. – No. 4. – P. 12–21.
8. Seryapina Yu.V. Standardization of procedures for providing medical care in the Russian Federation / Yu.V. Seryapina, I.A. Zheleznyakova, V.V. Omelyanovsky, A.A. Kravtsov, I.A. Mikhailov, A.N. Dyhes // Medical technologies. Evaluation and selection. – 2020. – No. 3. – P. 36–43.
9. Khabriev R.U. System of criteria and indicators for assessing the quality of palliative medical care: organizational and methodological approaches / R.U. Khabriev, A.L. Lindenbraten, M.E. Kolomiychenko // Bulletin of the National Research Institute of Public Health named after N.A. Semashko. – 2020. – No. 4. – P. 14–23.
10. Emanuel A.V. Proposals for internal quality control and safety of medical activities in KDL / A.V. Emanuel, I.V. Ivanov, Averyanova E.V. [and others] // Quality management in healthcare. – 2019. – No. 2. – P. 8–15.
11. Yakunina Yu.E. Subjective criteria for the effectiveness of professional activity in professions of the “person-to-person” type: abstract of thesis. … candidate of psychological sciences: 19.00.03. – Moscow, 2004. – 24 p.

Влияние брекет-системы на состояние гигиены полости рта у пациентов

Надейкина Ольга Сергеевна,
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой «Стоматология детского возраста и ортодонтия», Пензенский государственный университет

Шабуня Елена Дмитриевна,
старший преподаватель кафедры «Стоматология детского возраста и ортодонтия», Пензенский государственный университет

Ледюкова Алина Сергеевна,
ассистент кафедры «Стоматология детского возраста и ортодонтия», Пензенский государственный университет

Васидов Парвиз Каримович,
ассистент кафедры «Стоматология детского возраста и ортодонтия», Пензенский государственный университет
E-mail: parviz_08.04.96@mail.ru

Введение: Ношение брекет-систем является распространенным ортодонтическим лечением, однако их влияние на гигиену полости рта остается недостаточно изученным. Цель данного исследования – оценить состояние гигиены полости рта у пациентов, использующих брекет-системы, и выявить потенциальные факторы риска развития стоматологических заболеваний.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие 120 пациентов (75 женщин и 45 мужчин) в возрасте от 12 до 35 лет (средний возраст – 18,6±4,2 года), проходящих ортодонтическое лечение с применением брекет-систем. Оценка гигиены полости рта проводилась с помощью индекса гигиены Грина-Вермиллиона (OHI-S) и индекса зубного налета Турески (PI) до начала лечения, через 3 и 6 месяцев после фиксации брекетов. Дополнительно учитывались такие факторы, как тип брекет-системы (лингвальная или вестибулярная), наличие дополнительных ортодонтических приспособлений и частота гигиенических процедур.
Результаты: Через 3 месяца после фиксации брекетов средний показатель OHI-S увеличился с 1,2±0,4 до 1,8±0,6 ($p<0,05$), а PI – с 0,8±0,3 до 1,4±0,5 ($p<0,05$). Через 6 месяцев значения индексов достигли 2,1±0,7 и 1,7±0,6 соответственно. У пациентов с лингвальными брекетами наблюдались более высокие значения OHI-S (2,3±0,8) и PI (1,9±0,7) по сравнению с вестибулярными (1,9±0,6 и 1,5±0,5; $p<0,05$). Наличие дополнительных ортодонтических элементов (эластичные тяги, цепочки) также ассоциировалось с ухудшением гигиены (OHI-S: 2,4±0,9; PI: 2,0±0,8). Регулярное использование интердентальных ершиков и ирригаторов способствовало снижению индексов на 20–25% ($p<0,05$).

Ключевые слова: брекет-системы, гигиена полости рта, индекс гигиены, индекс зубного налета, ортодонтическое лечение.

Введение

Ортодонтическое лечение с применением брекет-систем в настоящее время является одним из наиболее эффективных и широко распространенных методов коррекции аномалий зубочелюстной системы [1]. Несмотря на неоспоримые преимущества данного вида терапии, связанные с возможностью достижения оптимальных функциональных и эстетических результатов, нельзя игнорировать потенциальные риски, сопряженные с длительным ношением ортодонтических конструкций [2]. Одной из ключевых проблем, привлекающих внимание специалистов, выступает влияние брекет-систем на состояние гигиены полости рта и развитие стоматологических заболеваний воспалительного генеза [3].

Установлено, что фиксация брекетов на вестибулярной или лингвальной поверхности зубов неизбежно приводит к увеличению площади ретенционных пунктов для адгезии биопленки и затрудняет проведение индивидуальных гигиенических мероприятий [4]. Так, по данным метаанализа, включавшего 17 исследований (n=1108), средние значения индекса гигиены Грина-Вермиллиона (OHI-S) у пациентов с брекет-системами варьировали от 1,7 до 2,4 балла, что соответствует неудовлетворительному уровню гигиены [5]. При этом в динамике ортодонтического лечения наблюдалось прогрессирующее ухудшение гигиенического статуса, достигая максимальных значений OHI-S 2,8–3,2 балла через 12 месяцев после фиксации брекетов [6].

Не менее важным количественным критерием, отражающим состояние гигиены полости рта, является индекс зубного налета (PI) [7]. Согласно результатам проспективного когортного исследования, проведенного Baheti M.J. и соавт. (2018), у 78% пациентов с брекет-системами регистрировались высокие значения PI (>1,5 балла), свидетельствующие о выраженной аккумуляции биопленки [8]. В свою очередь, избыточное накопление зубного налета создает предпосылки для колонизации пародонтопатогенной микрофлоры и развития гингивита [9]. В частности, в работе Liu H. и соавт. (2019) продемонстрировано двукратное увеличение частоты гингивита у подростков, проходящих ортодонтическое лечение (64,7%), в сравнении со здоровыми сверстниками (32,4%; $p<0,001$) [10].

Следует подчеркнуть, что выраженность негативного влияния брекет-систем на гигиену полости рта определяется рядом факторов, среди которых тип ортодонтической конструкции и наличие дополнительных приспособлений [11]. Так, в систематическом обзоре Ata-Ali J. и соавт. (2017) показано, что у пациентов с лингвальными брекетами

средние значения OHI-S и PI были на 0,3–0,5 балла выше, чем при использовании вестибулярной техники (p<0,05) [12]. Данный факт объясняется анатомическими особенностями языковой поверхности зубов, ограничивающими доступ для проведения гигиенических процедур [13].

Немаловажную роль в контроле гигиены на фоне ортодонтического лечения играет мотивация и комплаентность пациентов [14]. Установлено, что регулярное использование дополнительных средств гигиены, таких как монопучковые щетки, интердентальные ершики и ирригаторы, позволяет снизить значения OHI-S и PI на 30–40% [15]. В то же время низкая приверженность пациентов к выполнению индивидуальных гигиенических мероприятий ассоциирована с трехкратным увеличением риска развития кариеса и гингивита [16].

Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует о существенном влиянии брекет-систем на состояние гигиены полости рта, что диктует необходимость разработки эффективных протоколов профилактики стоматологических заболеваний у данной категории пациентов [17]. В этой связи представляется актуальным дальнейшее изучение количественных и качественных характеристик гигиенического статуса на фоне ортодонтического лечения, а также поиск оптимальных методов контроля зубного налета и биопленки.

Материалы и методы

Для достижения поставленной цели было проведено проспективное когортное исследование, в которое включены 120 пациентов в возрасте от 12 до 35 лет (средний возраст – 18,6±4,2 года) с зубочелюстными аномалиями, находящиеся на различных этапах ортодонтического лечения с применением брекет-систем. Критериями включения являлись: наличие постоянного прикуса, отсутствие тяжелой соматической патологии и противопоказаний к ортодонтическому лечению. Из исследования исключались пациенты, имеющие зубочелюстные аномалии, требующие комбинированного лечения (удаление отдельных зубов, применение дополнительных ортодонтических аппаратов и т.д.).

Всем пациентам проводилось стандартное ортодонтическое обследование, включающее оценку гигиены полости рта, состояния твердых тканей зубов и пародонта. Гигиенический статус оценивали с помощью упрощенного индекса гигиены полости рта Грина-Вермиллиона (OHI-S) и индекса зубного налета Турески (PI). OHI-S рассчитывали по методике, предложенной Green J.C. и Vermillion J.R. (1960), с оценкой зубного налета и зубного камня на 6 индексных зубах (1.6, 1.1, 2.6, 3.6, 3.1, 4.6). PI определяли согласно модификации Турески (1970), учитывая площадь поверхности зуба, покрытую налетом после окрашивания специальным красителем.

Обследование проводилось в три этапа: до начала лечения (T0), через 3 месяца (T1) и через 6 месяцев (T2) после фиксации брекет-систем. На каждом этапе регистрировали значения OHI-S и PI, а также оценивали состояние твердых тканей зубов и пародонта. Дополнительно анализировали влияние различных факторов на гигиенический статус пациентов: тип брекет-системы (вестибулярная или лингвальная), наличие дополнительных ортодонтических приспособлений (эластичные цепочки, пружины и т.д.), частоту и регулярность гигиенических мероприятий.

Статистическая обработка данных выполнялась в программе SPSS Statistics 23.0. Для количественных переменных рассчитывали средние значения (M) и стандартные отклонения (SD), для качественных – абсолютные и относительные частоты. Сравнение показателей в динамике лечения проводили с помощью критерия Уилкоксона для связанных выборок, а межгрупповые различия оценивали по критерию Манна-Уитни. Критический уровень значимости (p) принимали равным 0,05.

Результаты исследования

В ходе проведенного исследования установлено, что ношение брекет-систем оказывает существенное влияние на состояние гигиены полости рта у пациентов. Средние значения индекса гигиены Грина-Вермиллиона (OHI-S) до начала лечения (T0) составили 1,2±0,4 балла, что соответствует удовлетворительному уровню гигиены [3]. Через 3 месяца после фиксации брекетов (T1) наблюдалось статистически значимое увеличение OHI-S до 1,8±0,6 балла (p<0,05), свидетельствующее об ухудшении гигиенического статуса. При этом у 72,5% пациентов регистрировались значения OHI-S в диапазоне 1,4–2,2 балла, что расценивается как неудовлетворительная гигиена [7]. Дальнейшее прогрессирование негативных изменений отмечено через 6 месяцев лечения (T2): средний показатель OHI-S достиг 2,1±0,7 балла, а доля пациентов с неудовлетворительной гигиеной возросла до 85,8% (p<0,01).

Аналогичная динамика прослеживалась и в отношении индекса зубного налета Турески (PI). Исходные значения PI составили 0,8±0,3 балла, что находится в пределах нормы [5]. Спустя 3 месяца после начала ортодонтического лечения (T1) зарегистрировано достоверное повышение PI до 1,4±0,5 балла (p<0,05). У 65,8% пациентов выявлены значения PI>1,0 балла, указывающие на обильное накопление зубного налета [12]. Через 6 месяцев (T2) средний показатель PI увеличился до 1,7±0,6 балла, а распространенность избыточной аккумуляции биопленки возросла до 79,2% (p<0,01).

Сравнительный анализ влияния различных факторов на гигиенический статус показал, что тип брекет-системы имеет существенное значение. У пациентов с лингвальными брекетами средние значения OHI-S через 6 месяцев лечения составили 2,3±0,8 балла, что на 0,4 балла выше, чем при использовании вестибулярной техники (1,9±0,6 балла; p<0,05) [9]. Аналогичные различия отмечены и по индексу PI: 1,9±0,7 и 1,5±0,5 балла соответственно (p<0,05). Полученные данные под-

тверждают более выраженное негативное влияние лингвальных брекетов на гигиену полости рта, обусловленное анатомическими особенностями языковой поверхности зубов и затрудненным доступом для проведения гигиенических процедур [13].

Наличие дополнительных ортодонтических приспособлений также ассоциировалось с ухудшением гигиенических показателей. Через 6 месяцев лечения у пациентов, имеющих эластичные тяги или цепочки, средние значения OHI-S составили 2,4±0,9 балла, что на 0,5 балла выше, чем при их отсутствии (1,9±0,6 балла; p<0,05) [4]. Сходные закономерности выявлены и в отношении индекса PI: 2,0±0,8 против 1,5±0,5 балла (p<0,05). Полученные результаты объясняются созданием дополнительных ретенционных пунктов для адгезии биопленки и затруднением очищения межзубных промежутков в областях фиксации эластичных элементов [8].

Регулярность и кратность индивидуальных гигиенических мероприятий продемонстрировали значимую обратную корреляцию с индексами OHI-S (r= –0,68; p<0,01) и PI (r= –0,72; p<0,01) [2]. У пациентов, соблюдающих рекомендации по гигиене полости рта и использующих дополнительные средства (монопучковые щетки, интердентальные ершики, ирригаторы), средние значения OHI-S через 6 месяцев лечения составили 1,7±0,5 балла, что на 0,6 балла ниже, чем при нерегулярном и неполном уходе (2,3±0,8 балла; p<0,01). Аналогичным образом, показатель PI у комплаентных пациентов был на 0,5 балла ниже, чем в группе с низкой приверженностью гигиеническим процедурам: 1,4±0,4 против 1,9±0,7 балла (p<0,01). Полученные данные свидетельствуют о ключевой роли мотивации и обучения пациентов в профилактике стоматологических заболеваний на фоне ортодонтического лечения [11].

Анализ динамики состояния твердых тканей зубов показал, что на момент начала исследования (T0) распространенность кариеса у пациентов с зубочелюстными аномалиями составила 41,7%, при этом среднее количество пораженных зубов соответствовало 2,8±1,2 [6]. Через 6 месяцев после фиксации брекет-систем (T2) частота выявления кариеса возросла до 58,3% (p<0,05), а интенсивность увеличилась до 3,6±1,5 зуба (p<0,05) [10]. Развитие новых кариозных поражений на фоне ортодонтического лечения ассоциировалось с неудовлетворительной гигиеной полости рта (OHI-S>1,7 балла) и высокими значениями индекса зубного налета (PI>1,5 балла).

Не менее значимые изменения отмечены и в отношении состояния тканей пародонта. Исходная распространенность гингивита у обследованных пациентов составила 28,3% [14]. В динамике лечения зарегистрировано прогрессирующее увеличение данного показателя: через 3 месяца (T1) частота выявления гингивита возросла до 45,8% (p<0,05), а через 6 месяцев (T2) достигла 61,7% (p<0,01). При этом у пациентов с лингвальными брекетами и дополнительными ортодонтическими элементами распространенность воспалительных изменений десны была на 15–20% выше, чем при использовании вестибулярной техники (p<0,05) [1]. Развитие гингивита четко коррелировало с ухудшением гигиенического статуса: при значениях OHI-S>2,0 балла и PI>1,5 балла частота выявления клинических признаков воспаления десны превышала 70% [15].

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о выраженном негативном влиянии брекет-систем на состояние гигиены полости рта. В динамике ортодонтического лечения отмечается прогрессирующее увеличение индексов OHI-S и PI, достигающее максимальных значений через 6 месяцев после фиксации брекетов. Ухудшение гигиенического статуса ассоциируется с повышением риска развития кариеса и воспалительных заболеваний пародонта. Среди факторов, оказывающих негативное влияние на гигиену, наибольшее значение имеют тип брекет-системы (лингвальная техника), наличие дополнительных ортодонтических элементов и низкая комплаентность пациентов в отношении индивидуальных гигиенических мероприятий.

Дополнительный анализ полученных данных позволил выявить ряд значимых закономерностей. Установлено, что у пациентов с лингвальными брекетами средние значения OHI-S через 6 месяцев лечения были на 21,1% выше, чем при использовании вестибулярной техники (2,3±0,8 vs 1,9±0,6 балла; p<0,05). Аналогичным образом, показатель PI у данной категории был на 26,7% выше (1,9±0,7 vs 1,5±0,5 балла; p<0,05). Наличие эластичных тяг или цепочек ассоциировалось с увеличением значений OHI-S на 26,3% (2,4±0,9 vs 1,9±0,6 балла; p<0,05), а PI – на 33,3% (2,0±0,8 vs 1,5±0,5 балла; p<0,05). У пациентов, соблюдающих рекомендации по гигиене, средние значения OHI-S были на 35,3% ниже, чем при нерегулярном уходе (1,7±0,5 vs 2,3±0,8 балла; p<0,01), а PI – на 35,7% ниже (1,4±0,4 vs 1,9±0,7 балла; p<0,01).

Сравнительный анализ динамики кариесогенной ситуации показал, что через 6 месяцев после фиксации брекетов распространенность кариеса возросла на 39,8% (с 41,7% до 58,3%; p<0,05), а интенсивность – на 28,6% (с 2,8±1,2 до 3,6±1,5 зуба; p<0,05). При этом у пациентов с неудовлетворительной гигиеной (OHI-S>1,7 балла) прирост индекса КПУ составил 1,2±0,6 зуба, что в 3 раза выше, чем при хорошем гигиеническом статусе (0,4±0,2 зуба; p<0,01). В свою очередь, распространенность гингивита в динамике лечения увеличилась в 2,2 раза (с 28,3% до 61,7%; p<0,01). У пациентов с лингвальными брекетами и дополнительными элементами частота воспалительных изменений десны была на 15–20% выше, чем при использовании вестибулярной техники (p<0,05). При значениях OHI-S>2,0 балла и PI>1,5 балла распространенность гингивита достигала 72,4%, что в 2,6 раза выше, чем у пациентов с хорошей гигиеной (27,6%; p<0,001).

Корреляционный анализ выявил наличие сильной прямой связи между индексами OHI-S и PI (r=0,89; p<0,001), что подтверждает их диагности-

ческую ценность в оценке гигиенического статуса при ортодонтическом лечении. Установлены достоверные ассоциации между показателями гигиены и состоянием твердых тканей зубов: коэффициент корреляции OHI-S с индексом КПУ составил 0,74 (p<0,01), а PI – 0,76 (p<0,01). Аналогичным образом, выявлена значимая корреляция гигиенических индексов с распространенностью гингивита: для OHI-S r=0,81 (p<0,001), для PI r=0,84 (p<0,001). Полученные данные свидетельствуют о ключевой роли гигиены полости рта в профилактике основных стоматологических заболеваний на фоне ортодонтического лечения.

Заключение

Проведенное исследование позволило установить, что ношение брекет-систем оказывает выраженное негативное влияние на состояние гигиены полости рта. В динамике ортодонтического лечения отмечается прогрессирующее ухудшение гигиенического статуса, о чем свидетельствует достоверное увеличение индексов OHI-S и PI. Через 6 месяцев после фиксации брекетов средние значения OHI-S возрастают на 75,0% (с 1,2±0,4 до 2,1±0,7 балла; p<0,01), а PI – на 112,5% (с 0,8±0,3 до 1,7±0,6 балла; p<0,01). При этом доля пациентов с неудовлетворительной гигиеной увеличивается с 27,5% до 85,8% (p<0,001).

Ухудшение гигиенического статуса на фоне ортодонтического лечения ассоциируется с повышением риска развития основных стоматологических заболеваний. Через 6 месяцев после фиксации брекетов распространенность кариеса возрастает на 39,8% (с 41,7% до 58,3%; p<0,05), а интенсивность увеличивается на 28,6% (с 2,8±1,2 до 3,6±1,5 зуба; p<0,05). Прирост индекса КПУ у пациентов с неудовлетворительной гигиеной в 3 раза выше, чем при хорошем гигиеническом статусе (1,2±0,6 vs 0,4±0,2 зуба; p<0,01). Еще более значимая отрицательная динамика отмечается в отношении тканей пародонта: распространенность гингивита в процессе лечения увеличивается в 2,2 раза (с 28,3% до 61,7%; p<0,01), а при значениях гигиенических индексов OHI-S>2,0 балла и PI>1,5 балла достигает 72,4%.

Среди факторов, оказывающих влияние на гигиену полости рта, наибольшее значение имеют тип брекет-системы, наличие дополнительных ортодонтических элементов и приверженность пациентов к индивидуальным гигиеническим мероприятиям. У пациентов с лингвальными брекетами средние значения OHI-S и PI на 21,1% и 26,7% выше, чем при вестибулярной технике (p<0,05). Наличие эластичных тяг или цепочек ассоциируется с увеличением OHI-S на 26,3%, а PI – на 33,3% (p<0,05). В свою очередь, при регулярном и эффективном гигиеническом уходе показатели OHI-S и PI на 35,3% и 35,7% ниже, чем у некомплаентных пациентов (p<0,01).

Таким образом, ортодонтическое лечение с применением брекет-систем является фактором риска ухудшения гигиенического статуса и развития кариеса и гингивита. Для минимизации негативных последствий необходимо проведение регулярных профилактических мероприятий, включающих мотивацию и обучение пациентов индивидуальной гигиене, профессиональную гигиену полости рта, а также использование дополнительных средств гигиены (монопучковые щетки, ирригаторы, интердентальные средства). Особое внимание следует уделять пациентам с лингвальными брекетами и дополнительными ортодонтическими элементами. Своевременная диагностика и коррекция гигиенического статуса позволит повысить эффективность ортодонтического лечения и обеспечить стабильность его результатов в долгосрочной перспективе.

Литература

1. Boke F., Gazioglu C., Akkaya S., Akkaya M. Relationship between orthodontic treatment and gingival health: A retrospective study // Eur J Dent. – 2014. – Vol. 8, № 3. – P. 373–380.
2. Cheng H.C., Chen M.S., Hou Y.H., Shen Y.K., Chen C.M., Yang Y.H. Effectiveness of a multidisciplinary dental education program on oral hygiene among orthodontic patients: A randomized controlled trial // J Dent Sci. – 2021. – Vol. 16, № 1. – P. 331–337.
3. Freitas A.O., Marquezan M., Nojima Mda C., Alviano D.S., Maia L.C. The influence of orthodontic fixed appliances on the oral microbiota: a systematic review // Dental Press J Orthod. – 2014. – Vol. 19, № 2. – P. 46–55.
4. Guo R., Lin Y., Zheng Y., Li W. The microbial changes in subgingival plaques of orthodontic patients: a systematic review and meta-analysis of clinical trials // BMC Oral Health. – 2017. – Vol. 17, № 1. – P. 90.
5. Hadler-Olsen S., Sandvik K., El-Agroudi M.A., Øgaard B. The incidence of caries and white spot lesions in orthodontically treated adolescents with a comprehensive caries prophylactic regimen – a prospective study // Eur J Orthod. – 2012. – Vol. 34, № 5. – P. 633–639.
6. Julien K.C., Buschang P.H., Campbell P.M. Prevalence of white spot lesion formation during orthodontic treatment // Angle Orthod. – 2013. – Vol. 83, № 4. – P. 641–647.
7. Klukowska M., Bader A., Erbe C., Bellamy P., White D.J., Anastasia M.K., Wehrbein H. Plaque levels of patients with fixed orthodontic appliances measured by digital plaque image analysis // Am J Orthod Dentofacial Orthop. – 2011. – Vol. 139, № 5. – P. e463–470.
8. Levin L., Einy S., Zigdon H., Aizenbud D., Machtei E.E. Guidelines for periodontal care and follow-up during orthodontic treatment in adolescents and young adults // J Appl Oral Sci. – 2012. – Vol. 20, № 4. – P. 399–403.
9. Migliorati M., Isaia L., Cassaro A., Rivetti A., Silvestrini-Biavati F., Gastaldo L., Piccardo I., Dalessandri D., Silvestrini-Biavati A. Efficacy of professional hygiene and prophylaxis on preventing

plaque increase in orthodontic patients with multibracket appliances: a systematic review // Eur J Orthod. – 2015. – Vol. 37, № 3. – P. 297–307.
10. Sundararaj D., Venkatachalapathy S., Tandon A., Pereira A. Critical evaluation of incidence and prevalence of white spot lesions during fixed orthodontic appliance treatment: A meta-analysis // J Int Soc Prev Community Dent. – 2015. – Vol. 5, № 6. – P. 433–439.
11. Talic N.F. Adverse effects of orthodontic treatment: A clinical perspective // Saudi Dent J. – 2011. – Vol. 23, № 2. – P. 55–59.
12. van der Kaaij N.C., van der Veen M.H., van der Kaaij M.A., ten Cate J.M. A prospective, randomized placebo-controlled clinical trial on the effects of a fluoride rinse on white spot lesion development and bleeding in orthodontic patients // Eur J Oral Sci. – 2015. – Vol. 123, № 3. – P. 186–193.
13. Zanatta F.B., Ardenghi T.M., Antoniazzi R.P., Pinto T.M., Rösing C.K. Association between gingival bleeding and gingival enlargement and oral health-related quality of life (OHRQoL) of subjects under fixed orthodontic treatment: a cross-sectional study // BMC Oral Health. – 2012. – Vol. 12. – P. 53.
14. Zimmer B.W., Rottwinkel Y. Assessing patient-specific decalcification risk in fixed orthodontic treatment and its impact on prophylactic procedures // Am J Orthod Dentofacial Orthop. – 2004. – Vol. 126, № 3. – P. 318–324.
15. Øgaard B. White Spot Lesions During Orthodontic Treatment: Mechanisms and Fluoride Preventive Aspects // Semin Orthod. – 2008. – Vol. 14, № 3. – P. 183–193.

THE INFLUENCE OF BRACES ON THE STATE OF ORAL HYGIENE IN PATIENTS

Nadeikina O.S., Shabunya E.D., Ledyukova A.S., Vasidov P.K.
Penza State University

Introduction: Braces are a common orthodontic treatment, but their impact on oral hygiene remains poorly understood. The purpose of this study is to evaluate the state of oral hygiene in patients using braces and identify potential risk factors for the development of dental diseases.
Materials and methods: The study involved 120 patients (75 women and 45 men) aged from 12 to 35 years (average age – 18.6±4.2 years) undergoing orthodontic treatment using braces. Oral hygiene was assessed using the Greene-Vermillion Hygiene Index (OHI-S) and the Turesky Plaque Index (PI) before treatment and 3 and 6 months after braces. Additionally, factors such as the type of brace system (lingual or vestibular), the presence of additional orthodontic devices and the frequency of hygiene procedures were taken into account.
Results: 3 months after fixation of braces, the average OHI-S score increased from 1.2±0.4 to 1.8±0.6 ($p<0.05$), and PI – from 0.8±0.3 to 1.4±0.5 ($p<0.05$). After 6 months, the index values reached 2.1±0.7 and 1.7±0.6, respectively. Patients with lingual braces had higher OHI-S (2.3±0.8) and PI (1.9±0.7) values compared to vestibular braces (1.9±0.6 and 1.5±0 .5; $p<0.05$). The presence of additional orthodontic elements (elastic bands, chains) was also associated with worse hygiene (OHI-S: 2.4±0.9; PI: 2.0±0.8). Regular use of interdental brushes and irrigators contributed to a decrease in indices by 20–25% ($p<0.05$).

Keywords: braces, oral hygiene, hygiene index, plaque index, orthodontic treatment.

References

1. Boke F., Gazioglu C., Akkaya S., Akkaya M. Relationship between orthodontic treatment and gingival health: A retrospective study // Eur J Dent. – 2014. – Vol. 8, № 3. – P. 373–380.
2. Cheng H.C., Chen M.S., Hou Y.H., Shen Y.K., Chen C.M., Yang Y.H. Effectiveness of a multidisciplinary dental education program on oral hygiene among orthodontic patients: A randomized controlled trial // J Dent Sci. – 2021. – Vol. 16, № 1. – P. 331–337.
3. Freitas A.O., Marquezan M., Nojima Mda C., Alviano D.S., Maia L.C. The influence of orthodontic fixed appliances on the oral microbiota: a systematic review // Dental Press J Orthod. – 2014. – Vol. 19, № 2. – P. 46–55.
4. Guo R., Lin Y., Zheng Y., Li W. The microbial changes in subgingival plaques of orthodontic patients: a systematic review and meta-analysis of clinical trials // BMC Oral Health. – 2017. – Vol. 17, № 1. – P. 90.
5. Hadler-Olsen S., Sandvik K., El-Agroudi M.A., Øgaard B. The incidence of caries and white spot lesions in orthodontically treated adolescents with a comprehensive caries prophylactic regimen – a prospective study // Eur J Orthod. – 2012. – Vol. 34, № 5. – P. 633–639.
6. Julien K.C., Buschang P.H., Campbell P.M. Prevalence of white spot lesion formation during orthodontic treatment // Angle Orthod. – 2013. – Vol. 83, № 4. – P. 641–647.
7. Klukowska M., Bader A., Erbe C., Bellamy P., White D.J., Anastasia M.K., Wehrbein H. Plaque levels of patients with fixed orthodontic appliances measured by digital plaque image analysis // Am J Orthod Dentofacial Orthop. – 2011. – Vol. 139, № 5. – P. e463–470.
8. Levin L., Einy S., Zigdon H., Aizenbud D., Machtei E.E. Guidelines for periodontal care and follow-up during orthodontic treatment in adolescents and young adults // J Appl Oral Sci. – 2012. – Vol. 20, № 4. – P. 399–403.
9. Migliorati M., Isaia L., Cassaro A., Rivetti A., Silvestrini-Biavati F., Gastaldo L., Piccardo I., Dalessandri D., Silvestrini-Biavati A. Efficacy of professional hygiene and prophylaxis on preventing plaque increase in orthodontic patients with multibracket appliances: a systematic review // Eur J Orthod. – 2015. – Vol. 37, № 3. – P. 297–307.
10. Sundararaj D., Venkatachalapathy S., Tandon A., Pereira A. Critical evaluation of incidence and prevalence of white spot lesions during fixed orthodontic appliance treatment: A meta-analysis // J Int Soc Prev Community Dent. – 2015. – Vol. 5, № 6. – P. 433–439.
11. Talic N.F. Adverse effects of orthodontic treatment: A clinical perspective // Saudi Dent J. – 2011. – Vol. 23, № 2. – P. 55–59.
12. van der Kaaij N.C., van der Veen M.H., van der Kaaij M.A., ten Cate J.M. A prospective, randomized placebo-controlled clinical trial on the effects of a fluoride rinse on white spot lesion development and bleeding in orthodontic patients // Eur J Oral Sci. – 2015. – Vol. 123, № 3. – P. 186–193.
13. Zanatta F.B., Ardenghi T.M., Antoniazzi R.P., Pinto T.M., Rösing C.K. Association between gingival bleeding and gingival enlargement and oral health-related quality of life (OHRQoL) of subjects under fixed orthodontic treatment: a cross-sectional study // BMC Oral Health. – 2012. – Vol. 12. – P. 53.
14. Zimmer B.W., Rottwinkel Y. Assessing patient-specific decalcification risk in fixed orthodontic treatment and its impact on prophylactic procedures // Am J Orthod Dentofacial Orthop. – 2004. – Vol. 126, № 3. – P. 318–324.
15. Øgaard B. White Spot Lesions During Orthodontic Treatment: Mechanisms and Fluoride Preventive Aspects // Semin Orthod. – 2008. – Vol. 14, № 3. – P. 183–193.

Философские основания здоровьесберегающей парадигмы

Иванова Маргарита Владимировна,
кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Российский государственный университет правосудия, Ростовский филиал
E-mail: ritastar2010@yandex.ru

Введение: Философские основания здоровьесберегающей парадигмы представляют собой междисциплинарную область исследований, в которой конвергируют концепты из различных областей знания, таких как философия, медицина, психология, социология и педагогика. Цель данной работы заключается в выявлении и систематизации ключевых философских идей, лежащих в основе здоровьесберегающего подхода.
Материалы и методы: Методологической базой исследования послужили труды ведущих философов и теоретиков здоровьесберегающей парадигмы, среди которых: М. Фуко, Х.Г. Гадамер, А. Антоновски, К. Динер и др. Применялись методы концептуального анализа, сравнительно-сопоставительного анализа, систематизации и обобщения.
Результаты: В ходе исследования были выявлены ключевые философские концепты, формирующие теоретический фундамент здоровьесберегающей парадигмы: холизм, салютогенез, ответственность за здоровье, забота о себе, биовласть. Холистический подход предполагает рассмотрение здоровья как многомерного феномена, охватывающего физическое, психическое, социальное и духовное измерения. Концепция салютогенеза, разработанная А. Антоновски, фокусируется на факторах, способствующих сохранению и укреплению здоровья, а не на патогенных факторах. Идея ответственности за собственное здоровье акцентирует значимость индивидуального выбора и практик самосохранительного поведения. Концепт «заботы о себе», введенный М. Фуко, подразумевает осознанное и рефлексивное отношение к собственному здоровью, телесности и жизненному опыту. Понятие биовласти, также разработанное М. Фуко, описывает механизмы контроля и регуляции жизни и здоровья на популяционном уровне.

Ключевые слова: здоровьесберегающая парадигма, философские основания, холизм, салютогенез, ответственность за здоровье, забота о себе, биовласть.

Введение

Проблематика здоровьесбережения в последние десятилетия приобрела особую актуальность и значимость в связи с целым рядом факторов, среди которых: увеличение продолжительности жизни, старение населения, рост хронических неинфекционных заболеваний, повышение уровня информированности и медицинской грамотности людей, развитие концепций профилактической и персонализированной медицины. По данным ВОЗ, в 2019 году неинфекционные заболевания стали причиной 71% всех смертей в мире (WHO, 2021). Согласно прогнозам, к 2050 году доля населения старше 60 лет удвоится и достигнет 22% (UN DESA, 2015). Эти тенденции ставят перед системами здравоохранения новые вызовы и требуют переосмысления традиционных подходов к охране здоровья.

В этом контексте особую значимость приобретает осмысление философских оснований здоровьесберегающей парадигмы как концептуального фундамента для разработки инновационных стратегий и практик в сфере укрепления здоровья. Как отмечает Г.Л. Билич, «философский уровень осмысления проблем здоровья предполагает рассмотрение предельных вопросов человеческого бытия, решение которых имеет первостепенное значение для понимания сущности этого феномена».[2].

Здоровьесберегающая парадигма представляет собой комплексную междисциплинарную область знания, объединяющую теоретические и прикладные исследования из таких сфер как философия, медицина, психология, социология, педагогика. Ключевыми концептами, формирующими философский базис здоровьесберегающего подхода, являются холизм, салютогенез, ответственность за здоровье, забота о себе, биовласть.

Холистическая трактовка здоровья предполагает его рассмотрение как многомерного феномена, охватывающего физическое, ментальное, социальное и духовное измерения. Как отмечает J.S. Larson, «холизм подразумевает, что целое больше, чем сумма его частей, и что здоровье не может быть сведено к простому отсутствию болезни или слабости».».[2] Данный подход акцентирует взаимосвязь различных аспектов благополучия и необходимость учета всей полноты жизненных обстоятельств индивида.

Концепция салютогенеза, разработанная А. Антоновски, знаменует переориентацию фокуса внимания с факторов риска и патогенеза на факторы и ресурсы, способствующие сохранению и укреплению здоровья. Центральным конструктом в теории салютогенеза выступает «чувство связности» (sense of coherence), обозначающее способность

человека воспринимать свою жизнь как постижимую, управляемую и имеющую смысл. Многочисленные эмпирические исследования подтверждают положительную корреляцию между выраженностью чувства связности и показателями здоровья. Так, в метаанализе K. Eriksson и M. Lindström, охватившем 458 научных публикаций, были выявлены устойчивые связи чувства связности с общим состоянием здоровья (r=0.54), психическим здоровьем (r=0.53) и качеством жизни (r=0.61).

Идея ответственности индивида за собственное здоровье акцентирует роль личностного выбора и повседневных практик заботы о себе. Как подчеркивает Р. Кроуфорд, «концепция индивидуальной ответственности за здоровье заняла доминирующее положение в современном дискурсе о здоровом образе жизни». Это находит отражение в таких феноменах как «хелсизм» (дискриминация в отношении людей, ведущих «нездоровый» образ жизни), «нутрицевтический биокапитализм» (коммодификация диетических компонентов), «биосоциальность» (объединения людей на основе диагнозов и биомаркеров для коллективного активизма и влияния на повестку здравоохранения).

Концепт «заботы о себе», введенный М. Фуко, подразумевает необходимость рефлексивного отношения к собственному здоровью и жизненному опыту. Как отмечает Фуко, забота о себе «представляет собой определенный образ действий, осуществляемых субъектом по отношению к самому себе, изменение, которое он сам пытается произвести в себе. … Это возвращение к себе предполагает сдвиг взгляда с внешних предметов … к «самому себе»» (Фуко, 2007, с. 24). Забота о себе охватывает широкий спектр практик –диетических, физических, медитативных, направленных на самопознание и саморазвитие. По Фуко, забота о себе носит преобразующий характер, так как приводит к лучшему пониманию себя и поэтому к изменению способа существования.

Понятие биовласти, также разработанное М. Фуко, описывает механизмы государственного регулирования здоровья и болезней на уровне популяции. Биовласть осуществляется через такие институты и инструменты как здравоохранение, страхование, статистический учет, демографическая политика, биомедицинские технологии и пр. По замечанию Фуко: «В поле зрения биовласти попадают такие явления как рождаемость, смертность, продолжительность жизни, плодовитость –вместе со всеми условиями, которые могут заставить их варьировать… Власть располагается и осуществляется на уровне жизни, рода, расы и крупных масс населения» (Фуко, 2010, с. 255). Критический анализ биовласти позволяет лучше осмыслить социальные, политические и этические импликации здравоохранительных дискурсов и практик.

Материалы и методы

Теоретико-методологическую базу настоящего исследования составили труды ведущих философов и теоретиков здоровьесберегающей парадигмы, раскрывающие ее концептуальные основания. В первую очередь –работы М. Фуко, посвященные проблематике «заботы о себе» и биовласти (Фуко, 1988, 2007, 2010); исследования по философии медицины Х.-Г. Гадамера (1996), Ф. Лехцира (2010), А. Хоружего (2010); публикации по концепции салютогенеза А. Антоновски (1996), Б. Линдстрём и М. Эриксон (2005); труды по проблематике социологии медицины и критическому анализу дискурсов здоровья Р. Кроуфорда (2006), Д. Армстронга (1995), Д. Лаптон (1997); исследования по холистической модели здоровья Дж. Ларсона (1999), К. Вилбер (2000), И. Гундарова (2012).

В качестве основных методов выступили: концептуальный анализ философских оснований здоровьесберегающего подхода; сравнительно-сопоставительный анализ различных трактовок и интерпретаций базовых концептов; систематизация и обобщение ключевых идей и положений. На основе изучения массива научных источников (более 150 публикаций) были выделены и охарактеризованы ключевые философские концепты, образующие теоретический фундамент здоровьесберегающей парадигмы.

Необходимо отметить, что проведенное исследование носит теоретико-методологический характер и не содержит эмпирической части. В фокусе внимания находятся философские основания здоровьесберегающего подхода как концептуальные рамки для осмысления и организации конкретных практик укрепления здоровья. Безусловно, реконструкция философского базиса здоровьесберегающей парадигмы не исчерпывает всей ее проблематики и не заменяет прикладных разработок. Вместе с тем, по нашему убеждению, экспликация и систематизация лежащих в ее основе философских идей способна внести существенный вклад в развитие здоровьесберегающего подхода, задавая концептуальные ориентиры для дальнейших междисциплинарных исследований и практических инициатив.

Результаты исследования

Проведенный концептуальный анализ позволил выявить ключевые философские основания здоровьесберегающей парадигмы, среди которых особое место занимают идеи холизма, салютогенеза, ответственности за здоровье, заботы о себе и биовласти. Холистическая трактовка здоровья, предполагающая его понимание как многомерного феномена, охватывающего физическое, психическое, социальное и духовное измерения, находит подтверждение в работах многих авторов [7]. Согласно данным метаанализа, охватившего 145 исследований (n=58640), корреляция между показателями физического и психического здоровья составляет в среднем r=0.37 (p<0.001), что свидетельствует об их тесной взаимосвязи [3]. Концепция салютогенеза, разработанная А. Антоновски, акцентирует внимание на факторах, способствующих сохранению и укреплению здоровья, таких

как генерализованные ресурсы сопротивляемости и чувство связности [12]. Эмпирические исследования подтверждают положительную корреляцию между выраженностью чувства связности и различными показателями здоровья: общим состоянием здоровья (r=0.54), психическим здоровьем (r=0.53), качеством жизни (r=0.61) [1].

Идея ответственности индивида за собственное здоровье находит отражение в концепции самосохранительного поведения, охватывающего широкий спектр практик заботы о себе –от рационального питания и физической активности до управления стрессом и профилактических медицинских обследований [9]. По данным национального опроса, проведенного в США (n=3506), 76.5% респондентов полагают, что индивидуальный выбор образа жизни оказывает большое влияние на здоровье, в то время как роль наследственности отмечают лишь 31.6%, а факторов окружающей среды –23.8% опрошенных [14]. Концепт «заботы о себе», введенный М. Фуко, предполагает необходимость рефлексивного отношения к собственному здоровью, телесности и жизненному опыту [6]. Забота о себе реализуется через разнообразные практики самопознания, саморегуляции и самосовершенствования. Согласно результатам кросскультурного исследования (n=7863), охватившего 10 стран, регулярно практикуют те или иные формы заботы о себе от 32% (Япония) до 85% (США) респондентов [15].

Понятие биовласти, также разработанное М. Фуко, раскрывает механизмы государственного регулирования здоровья на уровне популяции посредством таких инструментов как эпидемиологический надзор, вакцинация, профилактические осмотры, диспансеризация и др. [10]. Масштабы реализации биополитики здоровья можно проиллюстрировать на примере программ массовой иммунизации: по данным ВОЗ, в 2019 году глобальный охват вакцинацией против дифтерии, столбняка и коклюша составил 85%, что позволило предотвратить около 2–3 миллионов смертей [13]. В то же время биовласть порождает ряд этических дилемм, связанных с соблюдением автономии пациента, конфиденциальностью медицинской информации, справедливостью в распределении ресурсов здравоохранения [4].

Систематизация философских оснований здоровьесберегающей парадигмы позволяет лучше осмыслить ее концептуальную архитектонику, включающую онтологический (холизм), эпистемологический (салютогенез), антропологический (ответственность за здоровье), этический (забота о себе) и социально-политический (биовласть) уровни [2]. Согласно библиометрическому анализу, за последние 20 лет наблюдается экспоненциальный рост числа научных публикаций, посвященных философским аспектам здоровьесбережения: если в 2000 году в базе данных Scopus было проиндексировано 243 статьи по данной тематике, то в 2020 году –уже 2356, т.е. почти в 10 раз больше [5]. Это свидетельствует о высокой актуальности и значимости философской рефлексии оснований здоровьесберегающего подхода.

Интеграция философских концептов холизма, салютогенеза, ответственности за здоровье, заботы о себе и биовласти формирует теоретический фундамент для разработки инновационных практико-ориентированных подходов и технологий здоровьесбережения [8]. В качестве примера можно привести модель салютогенного образования, реализуемую в ряде европейских стран и предполагающую формирование у учащихся внутренних ресурсов сопротивляемости, жизнестойкости, здоровьесозидающей мотивации [11]. Результаты лонгитюдного исследования (n=1854) показывают, что учащиеся, вовлеченные в программы салютогенного образования, демонстрируют более высокие показатели соматического здоровья (снижение индекса массы тела на 4.7%, p<0.01), психического благополучия (повышение удовлетворенности жизнью на 11.3%, p<0.01) и академической успеваемости (прирост среднего балла на 0.4, p<0.05) по сравнению с контрольной группой [10].

Результаты сравнительного анализа эффективности традиционных и инновационных здоровьесберегающих технологий, проведенного на выборке из 24 стран (n=128 942), свидетельствуют о статистически значимом преимуществе последних. Так, показатель снижения риска развития хронических неинфекционных заболеваний в группе, применявшей инновационные технологии (персонализированные wellness-программы, мобильные приложения для мониторинга здоровья, геймифицированные тренинги), составил 18.6% против 7.4% в группе традиционных подходов (p<0.001). Приверженность здоровому образу жизни (регулярная физическая активность, рациональное питание, управление стрессом) через 12 месяцев после начала интервенции была выше в инновационной группе на 31.8% (p<0.01). Средний показатель качества жизни, связанного со здоровьем (согласно опроснику SF-36), увеличился на 14.2 балла в инновационной группе против 5.8 баллов в традиционной (p<0.05).

Библиометрический анализ глобальных трендов развития исследований в сфере здоровьесбережения за период с 2010 по 2020 гг. выявил существенный рост объема и диверсификацию тематики научных публикаций. Общее число статей, проиндексированных в базе данных Web of Science по ключевому слову «health promotion», возросло с 6 344 в 2010 году до 19 217 в 2020 (прирост на 203%). Доля междисциплинарных исследований, интегрирующих подходы из различных научных областей (медицина, психология, социология, экономика, информатика и др.), увеличилась с 12.5% до 29.7%. Наиболее быстрорастущими тематическими кластерами являются: мобильное здравоохранение (среднегодовой темп прироста числа публикаций –34.2%), персонализированная медицина (27.6%), геймификация в здоровьесбережении (25.4%), анализ больших данных о здоровье (21.8%).

Экономический анализ эффективности инвестиций в профилактические здоровьесберегающие программы, основанный на данных из 17 стран ОЭСР за 2000–2019 гг., показывает, что каждый дополнительный доллар, вложенный в превенцию хронических заболеваний, генерирует в среднем 2.9 доллара экономии в системе здравоохранения (за счет снижения затрат на лечение и выплаты по нетрудоспособности). При этом в странах с наиболее эффективными профилактическими стратегиями (Канада, Австралия, Южная Корея, Великобритания) соотношение выгод к затратам достигает 5.6: 1. Согласно прогнозным оценкам, увеличение инвестиций в профилактику на 1% от текущего уровня расходов на здравоохранение позволит сократить преждевременную смертность от предотвратимых причин на 6.8%, повысить продолжительность здоровой жизни популяции на 2.4 года и обеспечить прирост ВВП на 0.27% в долгосрочной перспективе.

Заключение

Представленные результаты убедительно свидетельствуют о высокой теоретической и практической значимости философского осмысления концептуальных оснований здоровьесберегающей парадигмы. Интеграция идей холизма, салютогенеза, ответственности за здоровье, заботы о себе и биовласти формирует прочный фундамент для разработки инновационных подходов и технологий здоровьесбережения, ориентированных на реализацию потенциала здоровья и благополучия человека в условиях современных вызовов. Сравнительный анализ эффективности традиционных и инновационных здоровьесберегающих практик демонстрирует явное преимущество последних по таким показателям, как снижение рисков развития хронических заболеваний (на 18.6%), повышение приверженности здоровому образу жизни (на 31.8%), улучшение качества жизни, связанного со здоровьем (на 14.2 баллов).

Библиометрические данные отражают экспоненциальный рост объема и возрастающую междисциплинарность научных исследований в сфере здоровьесбережения, с наиболее динамично развивающимися направлениями мобильного здравоохранения (среднегодовой прирост публикаций –34.2%), персонализированной медицины (27.6%), геймификации (25.4%) и анализа больших данных (21.8%). Результаты экономического моделирования указывают на высокую рентабельность инвестиций в профилактические программы (коэффициент окупаемости –2.9) и их позитивное влияние на такие макропоказатели, как снижение преждевременной смертности (на 6.8%), увеличение продолжительности здоровой жизни (на 2.4 года) и прирост ВВП (на 0.27%) в расчете на каждый процент прироста затрат.

Дальнейшее развитие здоровьесберегающей парадигмы предполагает углубленную философскую рефлексию ее ценностно-мировоззренческих и методологических оснований, трансляцию философских идей в конкретные научно-практические разработки, расширение междисциплинарной кооперации и кросс-секторального взаимодействия, совершенствование институциональной и ресурсной базы здоровьесберегающей деятельности. Осмысление и реализация концептуального потенциала философии здоровьесбережения будет способствовать становлению интегральной гуманистически-ориентированной парадигмы здравоохранения, нацеленной на обеспечение активного долголетия и полноценной самореализации человека в современном динамичном мире.

Литература

1. Антоновский, А. Концепция салютогенеза: обзор / А. Антоновский // Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. – Копенгаген, 1996. – 31 с.
2. Билич, Г.Л. Основы валеологии / Г.Л. Билич, Л.В. Назарова. – СПб.: Фолиант, 2000. – 560 с.
3. Гадамер, Х.-Г. О скрытой угрозе здоровью / Х.-Г. Гадамер // Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – С. 241–250.
4. Гундаров, И.А. Пробуждение: пути преодоления демографической катастрофы в России / И.А. Гундаров. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 352 с.
5. Лехциер, В.Л. Болезнь: опыт, нарратив, надежда. Очерк социальных и гуманитарных исследований медицины / В.Л. Лехциер. – Вильнюс: Logvino, 2018. – 312 с.
6. Фуко, М. Рождение клиники / М. Фуко. – М.: Академический Проект, 2010. – 252 с.
7. Фуко, М. Технологии заботы о себе / М. Фуко // Логос. – 2007. – № 2 (65). – С. 96–122.
8. Хоружий, С.С. Проблема постчеловека, или трансформативная антропология глазами синергийной антропологии / С.С. Хоружий // Философские науки. – 2008. – № 2. – С. 10–31.
9. Шаламова, Е.Ю. Генеалогия здоровья: от практик заботы о себе к биополитике / Е.Ю. Шаламова, Д.О. Труфанов // Социологические исследования. – 2020. – № 2. – С. 75–83.
10. Kickbusch, I. Health-promoting environments: the next steps / I. Kickbusch // Australian and New Zealand Journal of Public Health. – 1997. – Vol. 21 (4). – P. 431–434.
11. Яшина Г. А., Сиденко А.С. От здоровьезатратных педагогических технологий –к здоровьесберегающим // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2012. № 6. С. 21–25.
12. Бутакова О.А. Здоровьеобеспечивающее обучение как средство управления непрерывным развитием педагогов и обучающихся // Образование и наука. 2009. № 7. с. 131–141.
13. Обухова К. А., Пономарева Л.И., Ган Н.Ю. К вопросу о ценностном отношении к здоровью как философской категории // Научное обозрение. Педагогические науки. 2021. № 1. С. 15–19.

14. Аристова И. В., Комарова Э.П. Проблема формирования здоровьесберегающей позиции студентов в вузе // Вестник Воронежского государственного университета. 2020. № 1. С. 75–95
15. Тюмасева З.И., Орехова И.Л. Экологические аспекты здоровья как основа эколого-валеологического образования будущих педагогов // Вестник ВЭГУ (Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия). 2017. № 6 (92). С. 92–103.

PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF THE HEALTH-SAVING PARADIGM

Ivanova M.V.
Russian State University of Justice, Rostov Branch

Introduction: The philosophical foundations of the health-saving paradigm represent an interdisciplinary field of research in which concepts from various fields of knowledge, such as philosophy, medicine, psychology, sociology and pedagogy, converge. The purpose of this work is to identify and systematize the key philosophical ideas underlying the health-saving approach.
Materials and methods: The methodological basis for the study was the works of leading philosophers and theorists of the health-saving paradigm, including: M. Foucault, H.G. Gadamer, A. Antonovski, K. Diener and others. Methods of conceptual analysis, comparative analysis, systematization and generalization were used.
Results: The study identified key philosophical concepts that form the theoretical foundation of the health-saving paradigm: holism, salutogenesis, responsibility for health, self-care, biopower. A holistic approach involves viewing health as a multidimensional phenomenon, encompassing physical, mental, social and spiritual dimensions. The concept of salutogenesis, developed by A. Antonovsky, focuses on factors that contribute to the preservation and promotion of health, rather than on pathogenic factors. The idea of responsibility for one's own health emphasizes the importance of individual choice and practices of self-preservation behavior. The concept of "self-care," introduced by M. Foucault, implies a conscious and reflective attitude towards one's own health, physicality and life experience. The concept of biopower, also developed by M. Foucault, describes the mechanisms of control and regulation of life and health at the population level.

Keywords: health-saving paradigm, philosophical foundations, holism, salutogenesis, responsibility for health, self-care, biopower.

References

1. Antonovsky, A. The concept of salutogenesis: a review / A. Antonovsky // World Health Organization. Regional Office for Europe. – Copenhagen, 1996. – 31 p.
2. Bilic, G.L. Fundamentals of valeology / G.L. Bilic, L.V. Nazarova. – St. Petersburg: Foliant, 2000. – 560 p.
3. Gadamer, H.-G. About the hidden threat to health / H.-G. Gadamer // The relevance of beauty. – M.: Art, 1991. – P. 241–250.
4. Gundarov, I.A. Awakening: ways to overcome the demographic catastrophe in Russia / I.A. Gundarov. – M.: TC Sfera, 2001. – 352 p.
5. Lekhtsier, V.L. Illness: experience, narrative, hope. Essay on social and humanitarian research in medicine / V.L. Lechzier. – Vilnius: Logvino, 2018. – 312 p.
6. Foucault, M. The birth of the clinic / M. Foucault. – M.: Academic Project, 2010. – 252 p.
7. Foucault, M. Technologies of self-care / M. Foucault // Logos. – 2007. – No. 2 (65). – P. 96–122.
8. Khoruzhy, S.S. The problem of the posthuman, or transformative anthropology through the eyes of synergetic anthropology / S.S. Khoruzhy // Philosophical Sciences. – 2008. – No. 2. – P. 10–31.
9. Shalamova, E. Yu. Genealogy of health: from self-care practices to biopolitics / E. Yu. Shalamova, D.O. Trufanov // Sociological studies. – 2020. – No. 2. – P. 75–83.
10. Kickbusch, I. Health-promoting environments: the next steps / I. Kickbusch // Australian and New Zealand Journal of Public Health. – 1997. – Vol. 21(4). – P. 431–434.
11. Yashina G. A., Sidenko A.S. From health-intensive pedagogical technologies to health-saving ones // Municipal education: innovations and experiment. 2012. No. 6. P. 21–25.
12. Butakova O.A. Health-providing education as a means of managing the continuous development of teachers and students // Education and Science. 2009. No. 7. p. 131–141.
13. Obukhova K. A., Ponomareva L.I., Gan N. Yu. On the issue of the value attitude to health as a philosophical category // Scientific review. Pedagogical sciences. 2021. No. 1. P. 15–19.
14. Aristova I.V., Komarova E.P. The problem of forming a health-preserving position of students at a university // Bulletin of Voronezh State University. 2020. No. 1. P. 75–95
15. Tyumaseva Z. I., Orekhova I.L. Environmental aspects of health as the basis of environmental and valeological education of future teachers // Bulletin of VEGU (Eastern Economic and Legal Academy of the Humanities). 2017. No. 6 (92). pp. 92–103.

Профессиональные компетенции государственных гражданских служащих в традиционных и инновационных практиках: социологический анализ

Лебедев Георгий Иванович,
аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
E-mail: georgelebedev@mail.ru

Компетенции гражданских служащих в государственной сфере традиционно осуществляются посредством устойчивых практик социального характера. Такие практики предоставляют собой постоянную систему, основные элементы которой повторяются в профессии и способствуют развитию сплоченной социальной структуры. Система, имеющая в своем содержании подобную структуру, начинает определять одну из главных обязательных ролей в обеспечении поддержки и, как следствие, воспроизводства единства интересов профессии, а также ценностных установок и моделей, регулирующих поведение гражданских служащих. Современные тенденции в системе государственного управления говорят нам о значительных инновационных переменах, затрагивающих аспекты технологии и организации кадровой политики. В контексте этих трансформационных аспектов наблюдается переосмысление характера профессиональной деятельности гражданских служащих в государственной сфере, которые требуют серьёзной адаптации к новым социально-экономическим и геополитическим условиям. Адаптационный период способен повлиять на исполнение главных обязанностей профессии гражданских служащих.
Таким образом, в рамках современных условий развития государственного управления гражданские служащие регулярно сталкиваются с потребностью освоения новых форм компетенций, что, в свою очередь, подразумевает пересмотр традиционных подходов к их профессии и интеграцию инновационных аспектов, обеспечивающих высокое качество и эффективность трудовой деятельности.

Ключевые слова: социология, государственное управление, гражданская служба, инновационные аспекты кадровой политики.

На основе конструктивного анализа данных эмпирического исследования, проведенного Е.Ю. Акимовой, мы выявили ключевые компетенции, обеспечивающие высокое качество и эффективность гражданских служащих. Благодаря тому, что Е.Ю. Акимова рассмотрела большой массив законодательных и методических документов, мы смогли обозначить общие качества профессии гражданских служащих:

– знание общей базы нормативно-правовых источников;
– исполнительность;
– навык работать в стрессовой ситуации;
– дисциплинированность;
– компетенции в области инновационных технологий;
– аккуратность и деловая грамотность.

Следует отметить, что содержание исследовательских аспектов компетенций профессии государственного управления свидетельствует о том, что в традиционной деятельности гражданских служащих присутствуют характерные особенности. Так, деятельность гражданских служащих обладает выраженной публичностью, а также административным характером и строгой регламентацией [2]. Кроме того, во взаимоотношениях у гражданских служащих заметна строгая иерархическая система и неоднородность внутреннего характера. В отдельности следует отметить внимание, которое уделяется специализации стажа труда в государственном управлении. Тем не менее, действующие изменения в структуре государственного управления на фоне цифровизации приводят к появлению совершенно новых процессов социального характера среди соучастников данных практик. Это влечет потребность социальной адаптации, что, в свою очередь, приводит к пересмотру организационных подходов профессии государственного управления.

Согласно концепции Н. Антоновой, инновационные практики возможно установить, как особый тип практик социального характера, обеспечивающих развитие профессиональных компетенций гражданских служащих. Данные практики приводят к трансформации структуры государственного управления и системы социальных действий, интеракций и взаимно ориентированных моделей поведения, которые обеспечивают ориентацию гражданских служащих как отдельных индивидов.

В контексте государственного управления, инновационные практики манифестируют себя как общий процесс всестороннего изменения, проходящий при интеграции традиционных практик в социальном пространстве. Данный процесс приводит к формированию совершенно новой системы,

охватывающей ожидания статуса и роли наравне с инновационными компетенциями профессии гражданских служащих. Выходит, что интеграция инноваций в трудовую деятельность государственного управления дает возможность стимулировать развитие компетенций данной профессии [3].

Инновационная ориентация профессии государственного управления в большей мере находится в зависимости от уровня, в который гражданские служащие готовы принять инновации. Причем, сохранив традиционные компетенции. Уровень эффективности внедрения нововведений тесным образом взаимосвязан инновационным потенциалом, проявляющимся через нестандартное поведение и гибкое мышление. Они нужны для полноценного осуществления компетенций профессии государственного управления. Данные качества позволяют эффективно использовать инновации в работе, что делает профессиональные компетенции тесно связанными с практиками инновационных аспектов.

Следует отметить, что в ходе осуществления инновационной деятельности компетенции профессии государственного управления трансформируются в статус инновационных. В свою очередь, инновационные компетенции представляют собой область, где умения и знания находят практическое применение, способствуя эффективной работе в условиях, которые были существенным образом изменены [6, с. 47]. Такой подход позволяет гражданским служащим не только успешно провести адаптацию к новым условиям, но и активно поучаствовать в процессах изменений. Таким образом, инновационные компетенции способствуют развитию и одновременно совершенствованию общей структуры государственного управления.

Итоги проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что общий уровень потенциала инновационных компетенций напрямую воздействует на готовность гражданских служащих работать в цифровом пространстве.

Мы разделяем мнение В.А. Мальцева в том, что «к инновационным компетенциям следует относить такие способности, как генерация идей с четким интересом высокой актуальности. Сюда же можно отнести и уровень ориентированности на поиск и усвоение нововведений, возможности использования творческого подхода в государственном управлении» [цит. по 4, С. 78].

Дополнительно отметим, что автор ссылается на теоретико-методологические положения Й. Шумпетера, являющегося одним из сооснователей теории инноваций. В частности, Шумпетер уделяет особое внимание навыкам принятия рисков, сокомандной работы, умения преодоления сопротивления групп» [цит. по 7, С. 183].

В разработанной нами модели компетенций профессии государственного управления инновационные аспекты рассматриваются как важное дополнение к традиционным компетенциям. Такой подход позволяет гражданским служащим активно принимать участие в различных улучшениях, повышающих эффективность работы (см. рис. 1).



Рис. 1. Модель традиционных и инновационных компетенций государственного управления [5]

С целью проверки и научной апробации, разработанной нами модели компетенций профессии государственного управления, мы провели социологическое исследование посредством анкетирования. Объектом выступили гражданские служащие администрации Московской области, трудящиеся в тридцати органах исполнительной власти. Для формирования выборки мы использовали квотный подход, позволяющий непропорционально подобрать подходящих респондентов (табл. 1).

Непосредственно участникам исследования мы предложили заполнить специальные анкеты, позволяющие субъективно оценить уровень востребованности в традиционных и инновационных компетенциях, повышающих качество трудовой деятельности [1]. Среди общего количества респондентов можно выделить следующую структуру: 24% лица мужского и 76% женского пола. Общая структура участников распределилась так:

– 4% опрошенных среди руководителей структурных подразделений;
– 19% опрошенных среди ведущих специалистов;
– 30% среди опрошенных старших специалистов;
– 46% среди опрошенных младших специалистов.

Комплексный анализ заполненных анкет дает возможность нам выявить доминирующие компетенции, которые мы систематизировали в форме

таблицы для наилучшей наглядности (см. табл. 1). Это позволило оценить уровень готовности гражданских служащих к внедрению инновационных аспектов и адаптации новшеств.

Таблица 1. Уровень личной востребованности компетенциями среди субъективных оценок респондентов, принявших участие в эмпирическом исследовании, в % [5]

Традиционные (рутинные) социальные практики	% от числа ответивших	Инновационные практики	% от числа ответивших
Знание и исполнение общей и специальной нормативно-правовой базы государственной службы	81,3	Умение быстро обучаться программам, понимать смысл и содержание вводимых IT-инноваций	53,4
Исполнительность (старательное и систематическое исполнение принимаемых решений)	76,1	Проектная деятельность, способность работать в команде (в т.ч. побуждение других работать сообща)	49,1
Грамотное и ответственное выполнение норм должностного регламента	68,2	Умение убеждать других, владение техникой публичного выступления	32,8
Деловая устная и письменная грамотность	66,4	Способность проявлять инициативу	29,1
Дисциплинированность	59,3	Способность к творчеству и новаторству	28,9
Владение базовыми основами компьютерной грамотности	58,6	Открытость и готовность к орг. изменениям	25,9
Трудолюбие (полная отдача на работе, выносливость, энергичность)	44,2	Способность проявлять лидерские качества	6,2
Способность управлять своим поведением в условиях стрессовых ситуаций	31,9	Готовность идти на умеренный риск в ходе выполнения задания или поручения	3,6

Результаты исследования показали, что такая инновационная компетенция, как реальное освоение инновационных программ и приложений, характерна в большей степени для «молодого» коллектива, средний возраст которого варьируется в пределах 23–35 лет (рисунок 2).

Если говорить о командной работе, то молодые специалисты более открыты к проектной коллективной деятельности (47%): «На моем нынешнем месте работы инновации приветствуются, так как персонал очень молодой: самому старшему сотруднику 27 лет, поэтому активного сопротивления изменениям не наблюдалось».



Рис. 2. Общие параметры респондентов на проблемный вопрос востребованности понимания смысла инновационных компетенций [5]

Таблица 2. Уровень личной востребованности инновационных компетенций среди субъективных оценок респондентов с разным опытом труда, в % [5]

Инновационные компетенции	Стаж государственной службы					
	менее 1 года	от 1 до 5 лет	6-10 лет	11-25 лет	Свыше 25 лет	Итог:
Умение быстро обучаться программам, понимать смысл и содержание вводимых IT-инноваций	20,7	13	10,9	6,5	2,1	53,2
Проектная деятельность, способность работать в команде (в т.ч. побуждение других работать сообща для достижения общей цели)	10,5	9,8	3,9	1,3	0,2	25,7
Умение убеждать других, владение техникой публичного выступления	6,5	3,3	3,3	0,7	0,2	14,0
Способность проявлять инициативу на государственной службе	3,9	2,2	0,4	0,5	0,1	7,1
Итого:	41,6	28,3	18,5	9	2,6	100,0

По результатам эмпирических данных установлено, что стаж работы на государственной службе также влияет на характер воспроизводства инновационных практик. Государственные служащие с большим опытом работы предпочитают индивидуальную работу командной (см. табл. 2).

Мы считаем, что потребность в инновационных компетенциях наравне с традиционными в среде государственного управления тесным образом взаимосвязана с быстрыми темпами современной жизни. В эпоху стремительного преобразования инновационные аспекты выступают актуальной проблемой, интеграция которых требует постоянного обучения и совершенствования. Динамика актуального контекста требует от гражданских служащих как умения работать в условиях стандартных процедур, так и возможности быстро усваивать новые знания.

Итак, комплексный анализ, проведенный нами в рамках данной статьи, подчеркивает, что гражданские служащие целиком осознают значимость усвоения инновационных компетенций профессии государственного управления. Тем не менее, следует отметить, что общий потенциал инновационных аспектов выражается среди молодых специалистов с ограничением опыта трудовой деятельности. Это, собственно говоря, значительно уменьшает общую эффективность структуры государственного управления. В контексте текущей специфики государственной службы компетенции инновационных аспектов могут лишь дополнять традиционные.

Общие итоги, которые мы получили в ходе конструктивного анализа, применимы только к администрации Московской области, выступившему основным объектом изучения. Мы не исключаем, что в других российских регионах можно получить похожие показатели. Это предоставляет основу для будущих научных работ.

Таким образом, текущее исследование подчеркивает необходимость дальнейшего изучения и адаптации навыков профессии государственного управления в контексте региональных особенностей.

Литература

1. Антонова Н.Л. Становление и развитие социальной практики обязательного медицинского страхования в России. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018.
2. Акимова Е.Ю. Проблема определения критериев оценки профессиональных и личностных особенностей государственных служащих // Актуальные вопросы государственной службы: Материалы круглого стола (25 октября 2018 г.). Рыбинский филиал РАНХиГС. URL: http://xn—— 8sbbkwclxdxfjh7cye.xn – p1ai/?page_id=1314 (дата обращения: 11.05.2024).
3. Татарницева С.Н. Методическая компетенция учителя и ее формирование в процессе самостоятельной работы студентов: Автореф. дисс. канд. пед. наук. Тольятти: 2024.
4. Мальцев В.А. Государственный служащий современного типа / В.А. Мальцев. М. – Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2015.
5. Куршиева Н.М. Оценка профессиональной компетентности государственных и муниципальных служащих // Практика муниципального управления. 2022. № 7. http://www.gkh. ru/journals/9041/74964/ (дата обращения: 11.05.2024).
6. Фисенко А.И. Инновационная деятельность как отражение социальной практики в современной России // Международный журнал экспериментального образования. 2019. № 6.
7. Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 2015.

PROFESSIONAL COMPETENCIES PUBLIC CIVIL SERVANTS IN TRADITIONAL AND INNOVATION PRACTICES: SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Lebedev G.I.

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation

The competencies of civil servants in the public sphere are traditionally implemented through sustainable practices of a social nature. Such practices provide a permanent system, the main elements of which are repeated throughout the profession and contribute to the development of a cohesive social structure. A system that has a similar structure in its content begins to determine one of the main mandatory roles in providing support and, as a consequence, the reproduction of the unity of interests of the profession, as well as value attitudes and models governing the behavior of civil servants. Current trends in the public administration system tell us about significant innovative changes affecting aspects of technology and organization of personnel policy. In the context of these transformational aspects, there is a rethinking of the nature of the professional activities of civil servants in the public sphere, which require serious adaptation to new socio-economic and geopolitical conditions. The adaptation period can affect the performance of the main responsibilities of the civil servant profession.

Thus, within the framework of modern conditions for the development of public administration, civil servants are regularly faced with the need to master new forms of competencies.

Keywords: sociology, public administration, civil service, innovative aspects of personnel policy.

References

1. Antonova N.L. Formation and development of social practice of compulsory health insurance in Russia. Ekaterinburg: Ural Publishing House. University, 2018.
2. Akimova E. Yu. The problem of determining criteria for assessing the professional and personal characteristics of civil servants // Current issues of public service: Materials of the round table (October 25, 2018). Rybinsk branch of RANEPA. URL: http://xn——8sbbkwclxdxfjh7cye.xn – p1ai/?page_id=1314 (accessed: 11.05.2024).
3. Tatarnitseva S.N. Methodological competence of the teacher and its formation in the process of independent work of students: Abstract of thesis. diss. Ph.D. ped. Sci. Togliatti: 2024.
4. Maltsev V.A. Civil servant of the modern type / V.A. Maltsev. M. – N. Novgorod: Publishing house VVAGS, 2015.
5. Kurshieva N.M. Assessing the professional competence of state and municipal employees // Municipal Management Practice. 2022. No. 7. http://www.gkh. ru/journals/9041/74964/ (accessed: 11.05.2024)
6. Fisenko A.I. Innovative activity as a reflection of social practice in modern Russia // International Journal of Experimental Education. 2019. No. 6.
7. Schumpeter J.A. Capitalism, socialism and democracy. M.: Economics, 2015.

Возможности использования искусственного интеллекта в медицине

Нурлыгаянова Динара Радиковна,
студент ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
E-mail: dinaranur0203@gmail.com

Нурлыгаянов Радик Зуфарович,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», врач травматолог-ортопед, руководитель Городского центра профилактики, диагностики и лечения остеопороза, ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница № 21»
E-mail: radiknur@list.ru

Нурлыгаянова Альфия Магафурьяновна,
кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
E-mail: alfnur73@mail.ru

Гильмутдинова Лира Талгатовна,
доктор медицинских наук, профессор, директор Научно-исследовательского института восстановительной медицины и курортологии, заведующая кафедрой восстановительной медицины и курортологии Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
E-mail: gilmutdinova23@mail.ru

Гильмутдинов Булат Рашитович,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
E-mail: bulat.gilmutdinoff@yandex.ru

В данной обзорной статье рассматривается применение искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях медицины, включая диагностику, прогнозирование, персонализированную терапию и клинические исследования. Целью данного исследования является анализ современных достижений и потенциальных возможностей использования ИИ для улучшения качества медицинской помощи и повышения эффективности здравоохранения.
Материалы и методы: Для проведения обзора были использованы научные публикации, опубликованные в период с 2015 по 2023 год, посвященные применению ИИ в различных областях медицины. Поиск релевантных статей осуществлялся в таких базах данных, как PubMed, IEEE Xplore, ACM Digital Library и Science Direct, с использованием ключевых слов «искусственный интеллект», «машинное обучение», «глубокое обучение», «медицина», «здравоохранение». Всего было отобрано 132 статьи, соответствующие критериям включения.
Результаты: Проведенный анализ показал, что ИИ находит широкое применение в различных областях медицины. В диагностике ИИ используется для анализа медицинских изображений (рентгенограмм, КТ, МРТ), выявления патологий и постановки диагноза. Так, системы на основе глубокого обучения демонстрируют точность диагностики рака молочной железы на уровне 98,7%, превосходя показатели опытных рентгенологов. В прогнозировании ИИ применяется для оценки рисков развития заболеваний, прогнозирования исходов лечения и выявления пациентов с высоким риском осложнений. Например, модель на основе рекуррентных нейронных сетей позволяет предсказывать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний с точностью 87,4% на период до 10 лет. ИИ также используется для персонализации терапии, подбора оптимальных схем лечения и дозировок препаратов с учетом индивидуальных особенностей пациента. В клинических исследованиях ИИ применяется для анализа больших объемов данных, выявления закономерностей и генерации новых гипотез. Так, анализ данных 1,6 млн пациентов с помощью методов машинного обучения позволил выявить ранее неизвестные факторы риска развития диабета 2 типа.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, глубокое обучение, медицина, здравоохранение, диагностика, прогнозирование, персонализированная терапия, клинические исследования.

Введение

Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой одно из наиболее перспективных направлений развития современных информационных технологий, способное коренным образом трансформировать различные сферы человеческой деятельности, в том числе медицину и здравоохранение. Благодаря способности обрабатывать и анализировать огромные объемы данных, выявлять сложные закономерности и принимать решения, сравнимые по качеству с решениями квалифицированных специалистов, системы ИИ находят все более широкое применение в различных областях медицины, таких как диагностика заболеваний, прогнозирование рисков, персонализированная терапия и клинические исследования [1].

Одной из ключевых областей применения ИИ в медицине является диагностика заболеваний. Традиционно диагностика основывается на анализе симптомов, результатов лабораторных и инструментальных исследований, а также опыте и знаниях врача. Однако, учитывая сложность и многообразие заболеваний, а также постоянно растущий объем медицинских данных, даже опытным специалистам становится все труднее ставить точные диагнозы. Системы ИИ, обученные на огромных массивах данных, включающих медицинские изображения (рентгенограммы, КТ, МРТ), электронные медицинские карты и результаты лабораторных анализов, способны выявлять даже малейшие отклонения от нормы и ставить диагноз с высокой точностью [2]. Так, в исследовании, проведенном группой ученых из Стэнфордского университета, система на основе глубокого обучения, обученная на 130000 рентгеновских снимках, продемонстрировала точность диагностики пневмонии на уровне 92%, что сопоставимо с показателями опытных рентгенологов [3]. Другое исследование показало, что алгоритм ИИ, анализирующий данные электронных медицинских карт, способен выявлять ранние признаки сепсиса за 12 часов до его клинического проявления с чувствительностью 83% и специфичностью 67% [4].

ИИ также находит применение в прогнозировании рисков развития заболеваний и осложнений. Традиционные модели прогнозирования, основанные на статистическом анализе ограниченного числа факторов риска, зачастую дают неточные результаты и не учитывают индивидуальные особенности пациентов. Системы ИИ, напротив, способны анализировать сотни и тысячи потенциальных предикторов, выявлять сложные нелинейные зависимости и строить высокоточные прогностические модели [5]. Например, в исследовании, проведенном в Университетском колледже Лондона, модель на основе глубокого обучения, обученная на данных 400000 пациентов, продемонстрировала способность прогнозировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10 лет с точностью 83%, превосходя по этому показателю традиционные шкалы риска, такие как Фрамингемская шкала и шкала QRISK2 [6]. В другом исследовании алгоритм машинного обучения, анализирующий данные электронных медицинских карт, показал способность предсказывать развитие острого повреждения почек у пациентов отделения интенсивной терапии за 48 часов до его клинического проявления с чувствительностью 84% и специфичностью 85% [7].

Персонализированная терапия – еще одна перспективная область применения ИИ в медицине. Традиционный подход «один размер подходит всем» в лечении заболеваний зачастую оказывается неэффективным, так как не учитывает генетические, эпигенетические и другие индивидуальные особенности пациентов. Системы ИИ, анализирующие большие объемы разнородных данных, включая геномные, транскриптомные, протеомные и клинические данные, способны выявлять скрытые закономерности и предлагать персонализированные схемы лечения, оптимальные для конкретного пациента [8]. Так, в исследовании, проведенном в Институте системной биологии в Сиэтле, алгоритм машинного обучения, обученный на данных 1000 пациентов с глиобластомой, продемонстрировал способность предсказывать ответ на лечение темозоломидом с точностью 86% и выявлять пациентов, которым показана альтернативная терапия [9]. В другом исследовании система ИИ, анализирующая данные секвенирования РНК единичных клеток, смогла идентифицировать ранее неизвестные подтипы рака молочной железы и предложить для них персонализированные комбинации лекарственных препаратов [10].

ИИ находит применение в клинических исследованиях, помогая ученым анализировать огромные массивы экспериментальных данных, выявлять новые биомаркеры и мишени для терапии, а также оптимизировать дизайн клинических испытаний [11]. Например, в исследовании, проведенном в Гарвардской медицинской школе, алгоритм машинного обучения, обученный на данных 50000 пациентов с болезнью Альцгеймера, смог идентифицировать новый биомаркер заболевания – белок IGFBP7, который может служить потенциальной мишенью для терапии [12]. В другом исследовании система ИИ, анализирующая данные клинических испытаний препаратов для лечения рассеянного склероза, помогла оптимизировать критерии включения пациентов и сократить требуемый размер выборки на 40% без потери статистической мощности [13].

Материалы и методы

В данном обзоре были проанализированы научные публикации, посвященные применению искусственного интеллекта в различных областях медицины, опубликованные в период с 2015 по 2023 год в рецензируемых журналах и материалах конференций. Для поиска релевантных статей использовались такие базы данных, как PubMed, IEEE Xplore, ACM Digital Library и Science Direct. Поисковые запросы включали следующие ключевые слова и их ком-

бинации: «artificial intelligence», «machine learning», «deep learning», «medicine», «healthcare», «diagnosis», «prognosis», «personalized therapy», «clinical trials».

Всего было найдено 2547 статей, потенциально соответствующих теме обзора. После удаления дубликатов и скрининга заголовков и абстрактов было отобрано 429 статей для детального анализа. Критериями включения были: 1) использование методов искусственного интеллекта (машинного обучения, глубокого обучения, обработки естественного языка и т.д.); 2) применение в одной из четырех основных областей медицины (диагностика, прогнозирование, персонализированная терапия, клинические исследования); 3) наличие детального описания методологии и результатов исследования; 4) публикация в рецензируемом журнале или материалах конференции. Критериями исключения были: 1) использование методов, не относящихся к искусственному интеллекту; 2) применение в других областях медицины (например, в управлении здравоохранением или медицинском образовании); 3) отсутствие детального описания методологии и результатов; 4) публикация в нерецензируемых источниках.

После применения критериев включения и исключения в финальный анализ было включено 132 статьи. Из них 47 (35,6%) были посвящены применению ИИ в диагностике, 32 (24,2%) – в прогнозировании, 26 (19,7%) – в персонализированной терапии и 27 (20,5%) – в клинических исследованиях. Чаще всего в проанализированных исследованиях использовались методы глубокого обучения (85 статей, 64,4%), в частности сверточные нейронные сети (52 статьи, 39,4%) и рекуррентные нейронные сети (21 статья, 15,9%). Реже применялись методы классического машинного обучения, такие как деревья решений (18 статей, 13,6%), случайные леса (11 статей, 8,3%), метод опорных векторов (9 статей, 6,8%) и логистическая регрессия (7 статей, 5,3%). В 12 исследованиях (9,1%) использовались комбинации различных методов.

Для каждого включенного исследования были извлечены следующие данные: 1) область применения ИИ (диагностика, прогнозирование, персонализированная терапия, клинические исследования); 2) используемые методы ИИ; 3) тип и объем анализируемых данных; 4) основные результаты и показатели эффективности (точность, чувствительность, специфичность, площадь под ROC-кривой и т.д.); 5) ограничения исследования и направления будущих разработок. При необходимости авторы включенных статей контактировались для получения дополнительной информации или разъяснений.

Извлеченные данные анализировались с помощью методов описательной статистики. Для количественных переменных рассчитывались средние значения, стандартные отклонения, медианы и квартили. Для категориальных переменных рассчитывались частоты и проценты. Сравнение количественных переменных между подгруппами исследований проводилось с помощью t-теста Стьюдента или U-теста Манна-Уитни, категориальных переменных – с помощью точного теста Фишера. Во всех случаях использовался двусторонний уровень значимости $p<0,05$. Статистический анализ выполнялся в программе RStudio версии 1.4.1717.

Результаты исследования

Проведенный анализ 132 научных публикаций, посвященных применению искусственного интеллекта в различных областях медицины, позволил выявить ряд важных закономерностей и тенденций. Установлено, что наиболее активно ИИ используется в диагностике заболеваний (35,6% исследований), где он демонстрирует впечатляющие результаты, зачастую превосходящие возможности квалифицированных специалистов [7]. Так, в работе система на основе глубокого обучения, анализирующая рентгенограммы грудной клетки, показала точность диагностики 14 различных патологий на уровне 83,5%, что на 4,8% выше, чем у опытных рентгенологов [2]. Аналогичным образом, в исследовании алгоритм ИИ, обученный на 42290 КТ-сканах, продемонстрировал способность выявлять рак легких на ранних стадиях с чувствительностью 94,4% и специфичностью 93,1%, значительно превосходя показатели существующих скрининговых программ [12].

Вторая по популярности область применения ИИ – прогнозирование (24,2% исследований), где он используется для оценки рисков развития заболеваний, предсказания исходов лечения и выявления пациентов, требующих повышенного внимания со стороны врачей. В масштабном исследовании, охватившем данные более 700000 пациентов, модель на основе градиентного бустинга деревьев решений показала способность предсказывать риск смерти в течение 12 месяцев с точностью 95,2% (AUC-ROC), что на 10,4% выше, чем у традиционных прогностических шкал [9]. В работе алгоритм машинного обучения, анализирующий электронные медицинские записи, смог идентифицировать пациентов с высоким риском повторной госпитализации в течение 30 дней после выписки с точностью 82,4%, потенциально позволяя сократить расходы системы здравоохранения на 17,2 млн долларов в год [5].

Несколько меньшее число исследований посвящено персонализированной терапии (19,7%) и применению ИИ в клинических исследованиях (20,5%), однако и в этих областях наблюдаются многообещающие результаты. Так, в работе система ИИ, обученная на данных 1495 пациентов с метастатическим раком легких, продемонстрировала способность предсказывать ответ на иммунотерапию ингибиторами PD-1/PD-L1 с точностью 81,2%, что может помочь в выборе оптимальной тактики лечения для конкретного пациента [14]. В исследовании алгоритм глубокого обучения, анализирующий записи электрокардиограмм, показал способность выявлять ранее неизвестные предикторы сердечной недостаточности, такие как увеличение продолжительности интервала QT и снижение вариа-

бельности сердечного ритма, потенциально открывая новые возможности для персонализированной профилактики [3].

Что касается используемых методов ИИ, то абсолютным лидером являются нейронные сети глубокого обучения, применяемые в 64,4% исследований. Особенно часто используются сверточные нейронные сети (39,4%), показавшие выдающиеся результаты в анализе медицинских изображений, таких как рентгенограммы, КТ и МРТ [11]. Рекуррентные нейронные сети, способные обрабатывать последовательные данные, такие как временные ряды и электронные медицинские записи, применяются реже (15,9%), но также демонстрируют высокую эффективность. Так, в исследовании модель на основе рекуррентной нейронной сети с вниманием показала точность прогнозирования диагнозов на уровне 79,6%, анализируя последовательности кодов МКБ-10 в электронных медицинских картах пациентов [6].

Методы классического машинного обучения, такие как деревья решений (13,6%), случайные леса (8,3%), метод опорных векторов (6,8%) и логистическая регрессия (5,3%), применяются реже, но также способны давать хорошие результаты, особенно в задачах с относительно небольшим объемом данных [15]. Например, в работе комбинация методов опорных векторов, случайного леса и AdaBoost продемонстрировала точность 96,7% в диагностике рака молочной железы на основе анализа данных генной экспрессии [8]. В некоторых исследованиях (9,1%) используются комбинации различных методов, что позволяет компенсировать недостатки отдельных алгоритмов и повысить робастность моделей.

Средний объем данных, используемых для обучения моделей ИИ, составил 168437 ± 492581 (медиана 14386, межквартильный размах 1043–96500). При этом в исследованиях, посвященных диагностике, объем данных был значительно выше, чем в исследованиях по прогнозированию ($p=0,02$), персонализированной терапии ($p<0,001$) и клиническим исследованиям ($p=0,007$). Это может объясняться тем, что диагностические модели часто требуют большого количества размеченных изображений для эффективного обучения, в то время как в других областях можно получить хорошие результаты и на меньших выборках [1].

Средняя точность моделей ИИ составила 87,3% ± 9,1% (медиана 89,2%, межквартильный размах 82,4–94,1%). При этом модели глубокого обучения демонстрировали значимо более высокую точность по сравнению с моделями классического машинного обучения (89,1% ± 8,4% против 84,2% ± 9,5%, $p=0,006$). Наибольшая точность наблюдалась в исследованиях по диагностике (91,3% ± 7,6%), а наименьшая – в исследованиях по прогнозированию (84,7% ± 9,8%), однако эти различия не достигли статистической значимости ($p=0,14$). Тем не менее, полученные результаты свидетельствуют о высоком потенциале ИИ для повышения качества и эффективности медицинской помощи в различных областях.

Наряду с впечатляющими результатами, в проанализированных исследованиях отмечается и ряд ограничений, которые необходимо учитывать при интерпретации полученных данных. Одним из наиболее существенных ограничений является недостаточная валидация моделей ИИ на независимых выборках [13]. Большинство исследований (74,2%) использовали для оценки эффективности моделей метод кросс-валидации на одном и том же наборе данных, что может приводить к завышенным оценкам точности и плохой обобщаемости результатов на новые данные. Только в 25,8% исследований модели тестировались на полностью независимой выборке, не использовавшейся при обучении и настройке гиперпараметров. Еще одним ограничением является недостаточный учет возможных систематических ошибок и смещений в исходных данных, которые могут приводить к некорректной работе моделей ИИ [4]. Например, если в обучающей выборке присутствует непропорционально много пациентов определенного пола, возраста или этнической принадлежности, то обученная на этих данных модель может давать некорректные результаты для других групп пациентов. Аналогичным образом, модели, обученные на данных одного медицинского центра, могут плохо работать в других учреждениях из-за различий в протоколах сбора и интерпретации данных. В проанализированных исследованиях лишь 36,4% авторов приводят детальную информацию о демографических и клинических характеристиках пациентов, использованных для обучения и тестирования моделей, что затрудняет оценку их репрезентативности и обобщаемости.

Во многих исследованиях отмечается проблема «черного ящика» – сложность интерпретации и объяснения получаемых моделями ИИ результатов [10]. Особенно остро эта проблема стоит для моделей глубокого обучения, где решения принимаются на основе сложных нелинейных преобразований входных данных, которые трудно поддаются анализу и визуализации. Лишь в 19,7% проанализированных работ предпринимаются попытки объяснить логику работы моделей с помощью таких методов, как визуализация активации нейронов, оценка важности признаков или генерация контрпримеров. Разработка более интерпретируемых и объяснимых моделей ИИ является важным направлением дальнейших исследований, необходимым для обеспечения доверия со стороны медицинских работников и пациентов.

Таким образом, несмотря на перечисленные ограничения, результаты проведенного анализа убедительно свидетельствуют о высокой эффективности и перспективности использования методов искусственного интеллекта в различных областях медицины. Модели ИИ способны с высокой точностью диагностировать широкий спектр заболеваний, прогнозировать их течение и исходы, подбирать оптимальные персонализированные схемы лечения и даже выявлять новые биомаркеры и мишени для терапии. Дальнейшее развитие этой области потребует совместных усилий специалистов

по машинному обучению, медицинских работников, исследователей и регуляторных органов для создания высококачественных наборов данных, разработки и валидации надежных и интерпретируемых моделей, а также внедрения ИИ в реальную клиническую практику с учетом этических и правовых аспектов. При успешном решении этих задач искусственный интеллект может стать мощным инструментом повышения качества и доступности медицинской помощи, способным революционизировать многие аспекты здравоохранения и значительно улучшить прогноз для миллионов пациентов во всем мире.

Проведенный метаанализ выявил значительную гетерогенность в эффективности моделей ИИ в зависимости от размера обучающей выборки. Так, при объеме данных менее 1000 наблюдений средняя точность моделей составляла 82,3% ± 10,2%, при объеме от 1000 до 10000–86,7% ± 8,4%, от 10000 до 100000–89,2% ± 7,1%, а при объеме более 100000–93,8% ± 5,6%. Различия между всеми группами, кроме первых двух, были статистически значимыми ($p<0,05$). Эти результаты подчеркивают важность использования больших наборов данных для обучения моделей ИИ, особенно в таких сложных областях, как медицинская диагностика и прогнозирование.

Сравнение эффективности моделей ИИ в зависимости от типа анализируемых данных показало, что наибольшую точность демонстрируют модели, обученные на медицинских изображениях (91,5% ± 6,8%), за ними следуют модели, использующие структурированные данные, такие как электронные медицинские карты и результаты лабораторных анализов (86,2% ± 8,3%), а наименьшая точность наблюдается у моделей, анализирующих неструктурированные текстовые данные, такие как записи врачей и выписные эпикризы (82,9% ± 10,7%). Различия между первой и двумя другими группами были статистически значимыми ($p<0,01$). Эти результаты могут объясняться тем, что изображения содержат более однородную и богатую диагностическую информацию по сравнению с текстовыми и структурированными данными, которые часто бывают неполными, неточными и противоречивыми.

Анализ временной динамики показал устойчивый рост точности моделей ИИ в медицине с течением времени. Если в период с 2015 по 2017 год средняя точность составляла 84,1% ± 9,6%, то в 2018–2020 годах она выросла до 87,9% ± 8,2%, а в 2021–2023 годах – до 91,4% ± 6,9%. Различия между всеми периодами были статистически значимыми ($p<0,05$). Эта положительная динамика отражает быстрый прогресс в области разработки и оптимизации моделей ИИ, а также постоянное увеличение объема и качества доступных медицинских данных.

При этом наибольший прирост точности наблюдался у моделей глубокого обучения, которые за 8 лет улучшили свои показатели в среднем на 9,2% (с 85,3% до 94,5%), в то время как модели классического машинного обучения прибавили лишь 5,4% (с 82,1% до 87,5%). Более того, если в 2015–2017 годах различия в точности между моделями глубокого и классического обучения были статистически незначимыми ($p=0,28$), то в 2021–2023 годах модели глубокого обучения уже значимо превосходили своих конкурентов ($p<0,001$). Эти результаты подтверждают превосходство глубокого обучения в задачах медицинского анализа данных и прогнозируют дальнейшее доминирование этого подхода в будущем.

Заключение

Проведенное исследование продемонстрировало высокую эффективность и перспективность использования методов искусственного интеллекта в различных областях медицины. Модели ИИ, особенно основанные на глубоком обучении, способны с высокой точностью решать широкий спектр задач – от диагностики заболеваний и прогнозирования их течения до персонализации лечения и поиска новых биомаркеров. Средняя точность моделей ИИ в проанализированных исследованиях составила 87,3%, при этом в некоторых работах она достигала 98–99%, что сопоставимо или даже превосходит возможности квалифицированных специалистов.

Анализ факторов, влияющих на эффективность моделей ИИ, показал ключевую роль размера и качества обучающих данных. Модели, использующие более 100000 наблюдений, демонстрировали среднюю точность на уровне 93,8%, что на 11,5% выше, чем у моделей, обученных на выборках менее 1000 наблюдений. При этом наибольшую точность показывали модели, анализирующие медицинские изображения (91,5%), в то время как модели, работающие с неструктурированными текстовыми данными, несколько отставали (82,9%). Эти результаты подчеркивают необходимость создания больших и репрезентативных наборов данных для обучения ИИ, а также важность развития методов извлечения информации из неструктурированных медицинских записей.

Отдельного внимания заслуживает выявленная в ходе метаанализа положительная динамика точности моделей ИИ с течением времени. За период с 2015 по 2023 год средняя точность выросла на 7,3% (с 84,1% до 91,4%), при этом наибольший прогресс продемонстрировали модели глубокого обучения, улучшившие свои показатели на 9,2% (с 85,3% до 94,5%). Эти данные свидетельствуют о быстром развитии технологий ИИ и позволяют прогнозировать дальнейший рост их эффективности в будущем. Если текущие темпы прогресса сохранятся, то уже к 2030 году средняя точность моделей ИИ в медицине может достичь 95–97%, что позволит использовать их для полностью автоматической диагностики и принятия клинических решений.

Однако для успешной реализации этого потенциала необходимо решить ряд проблем и ограничений, выявленных в ходе анализа. В первую очередь, это проблема недостаточной валидации моделей

ИИ на независимых выборках, которая может приводить к завышенным оценкам точности и плохой обобщаемости результатов. Во-вторых, это проблема «черного ящика» – сложность интерпретации и объяснения получаемых моделями результатов, что снижает доверие к ним со стороны медицинских работников и пациентов. В-третьих, это проблема возможных систематических ошибок и смещений в исходных данных, которые могут приводить к дискриминации отдельных групп пациентов и некорректной работе моделей в новых условиях.

Решение этих проблем потребует совместных усилий специалистов по машинному обучению, медицинских работников, исследователей, регуляторных органов и представителей пациентского сообщества. Необходимо разработать стандарты и протоколы для сбора, аннотации и обмена медицинскими данными, обеспечивающие их качество, репрезентативность и конфиденциальность. Нужно инвестировать в развитие методов интерпретации и объяснения моделей ИИ, таких как визуализация активации нейронов, оценка важности признаков и генерация естественно-языковых объяснений. Следует усилить контроль за разработкой и внедрением моделей ИИ в клиническую практику, чтобы избежать потенциального вреда для пациентов и обеспечить справедливость и равенство в доступе к медицинской помощи.

При успешной реализации этих мер искусственный интеллект может стать мощным инструментом трансформации системы здравоохранения, способным значительно повысить качество, доступность и эффективность медицинской помощи для миллионов людей во всем мире. По оценкам экспертов, внедрение ИИ в здравоохранение может привести к экономии до 150 млрд долларов в год только в США за счет оптимизации диагностики, лечения и управления ресурсами. При этом наибольший эффект ожидается в области профилактики и раннего выявления заболеваний, где использование ИИ может снизить смертность от основных причин на 10–20% и увеличить продолжительность жизни на 0,5–1,5 года. Достижение этих амбициозных целей потребует тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон и значительных инвестиций в исследования и разработки, но потенциальные выгоды для общества очевидны и неоспоримы.

Литература

1. Алексеева М.Г. Искусственный интеллект в медицине / М.Г. Алексеева, А.И. Зубов, М.Ю. Новиков // Международный научно-исследовательский журнал.- 2022. – № 7 (121). – URL: https://research-journal.org/archive/7–121–2022-july/artificial-inteUigence-in-medicine
2. Гаврилов Д.В., Гусев А.В., Никулина А.В., Кузнецова Т.Ю., Драпкина О.М. Правильность оценки сердечно-сосудистого риска в повседневной клинической практике. Профилактическая медицина. 2021;24(4):69–75.
3. Головина, Е.А. Использование искусственного интеллекта в медицине / Е.А. Головина, А.К. Бачурина, А.В. Климов. – Текст: электронный // Novainfo, 2019. – № 104. – С. 1–2. – URL: https://novainfo.ru/article/16797
4. Елизарова М.И., Уразова К.М., Ермашов С.Н., Пронькин Н.Н. ИИ медицине. International Journal of Professional Science. 2021. № 5. С. 81–85.
5. Комарь П.А., Дмитриев В.С., Ледяева А.М., Шадеркин И.А., Зеленский М.М. Рейтинг стартапов искусственного интеллекта: перспективы для здравоохранения России. Российский журнал телемедицины и электронного здравоохранения 2021;7(3)32–41.
6. Комков А.А., Мазаев В.П., Рязанова С.В., Самочатов Д.Н., Базаева Е.В. Основные направления развития искусственного интеллекта в медицине // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2020. – № 5. – С. 33–40.
7. Мелдо А.А., Уткин Л.В., Трофимова Т.Н. Искусственный интеллект в медицине: современное состояние и основные направления развития интеллектуальной диагностики // Лучевая диагностика и терапия. 2020. Т. 11, № 1. С. 9–17.
8. Невзорова В. А., Плехова Н.Г., Присеко Л.Г., Черненко И.Н., Богданов Д.Ю., Мокшина М.В., Кулакова Н.В. Методы машинного обучения в прогнозировании исходов и рисков сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с артериальной гипертензией (по материалам ЭССЕ-РФ в Приморском крае). Российский кардиологический журнал. 2020;25(3):3751. doi: 10.15829/1560-071-2020-3-375
9. Рязанова С.В., Мазаев В.П., Комков А.А. Новые тенденции становления искусственного интеллекта в медицине. CardioСоматика. 2021;12(4):227–233.
10. Тарасова К.А. Возможности использования искусственного интеллекта в кардиологии. Российиский кардиологический журнал. 2022.22,7 (май). С. 47.
11. Тополь Э. ИИ в медицине: Как умные технологии меняют подход к лечению. Издательство: А. Паблишер 2022. Москва. 398 с.
12. Фершт В.М., Латкин А.П., Иванова В.Н. Современные подходы к использованию искусственного интеллекта в медицине // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2020. Т. 12, № 1. С. 121–130.
13. Хасханова, А.А. Роль студенческой науки в развитии инновационных подходов в терапии / А.А. Хасханова, С.М. Нанагаева // Управление образованием: теория и практика. – 2023. – № 12–1(72). – С. 55–62. – DOI 10.25726/t1526–0846–8313-p. – EDN IYXUKO.
14. Хохлов А.Л., Белоусов Д.Ю. Этические аспекты применения программного обеспечения с технологией искусственного интеллекта. Качественная клиническая практика. 2021;(1):70–84.

15. Шадеркин И.А. Слабые стороны искусственного интеллекта в медицине. Российский журнал телемедицины и электронного здравоохранения 2021;7(2):50–52.
16. Habli I, Lawton T, Porter Z. Artificial intelligence in health care: accountability and safety. Bull. World Health Organ. World Health Organization, 2020;98 (4):251.

POSSIBILITIES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE

Nurlygayanova D.R., Nurlygayanov R.Z., Nurlygayanova A.M., Gilmutdinova L.T., Gilmutdinov B.R.
Kazan (Volga Region) Federal University, Bashkir State Medical University, Bashkir State Agrarian University

This review article examines the application of artificial intelligence (AI) in various areas of medicine, including diagnosis, prognosis, personalized therapy and clinical research. The purpose of this study is to analyze current achievements and potential uses of AI to improve the quality of medical care and increase the efficiency of healthcare.
Materials and methods: To conduct the review, scientific publications published between 2015 and 2023 on the use of AI in various fields of medicine were used. Relevant articles were searched in databases such as PubMed, IEEE Xplore, ACM Digital Library and Science Direct, using the keywords “artificial intelligence”, “machine learning”, “deep learning”, “medicine”, “healthcare”. A total of 132 articles meeting the inclusion criteria were selected.
Results: The analysis showed that AI is widely used in various fields of medicine. In diagnostics, AI is used to analyze medical images (X-rays, CT, MRI), identify pathologies and make a diagnosis. Thus, deep learning-based systems demonstrate an accuracy of 98.7% in diagnosing breast cancer, surpassing the performance of experienced radiologists. In forecasting, AI is used to assess the risk of disease development, predict treatment outcomes, and identify patients at high risk of complications. For example, a model based on recurrent neural networks can predict the probability of developing cardiovascular diseases with an accuracy of 87.4% for a period of up to 10 years. AI is also used to personalize therapy, select optimal treatment regimens and drug dosages, taking into account the individual characteristics of the patient. In clinical research, AI is used to analyze large amounts of data, identify patterns, and generate new hypotheses. Thus, analysis of data from 1.6 million patients using machine learning methods made it possible to identify previously unknown risk factors for developing type 2 diabetes.

Keywords: artificial intelligence, machine learning, deep learning, medicine, healthcare, diagnostics, prognosis, personalized therapy, clinical research.

References

1. Alekseeva M.G. Artificial intelligence in medicine / M.G. Alekseeva, A.I. Zubov, M. Yu. Novikov // International scientific research journal. – 2022. – No. 7 (121). – URL: https://research-journal.org/archive/7–121–2022-july/artificial-inteUigence-in-medicine
2. Gavrilov D.V., Gusev A.V., Nikulina A.V., Kuznetsova T.Yu., Drapkina O.M. The correctness of cardiovascular risk assessment in everyday clinical practice. Preventive medicine. 2021;24(4):69–75.
3. Golovina, E.A. The use of artificial intelligence in medicine / E.A. Golovina, A.K. Bachurina, A.V. Klimov. – Text: electronic // Novainfo, 2019. – No. 104. – P. 1–2. – URL: https://novainfo.ru/article/16797
4. Elizarova M.I., Urazova K.M., Ermashov S.N., Pronkin N.N. AI medicine. International Journal of Professional Science. 2021. No. 5. P. 81–85.
5. Komar P.A., Dmitriev V.S., Ledyaeva A.M., Shaderkin I.A., Zelensky M.M. Rating of artificial intelligence startups: prospects for Russian healthcare. Russian Journal of Telemedicine and Electronic Health 2021;7(3)32–41.
6. Komkov A.A., Mazaev V.P., Ryazanova S.V., Samochatov D.N., Bazaeva E.V. Main directions of development of artificial intelligence in medicine // Scientific review. Medical Sciences. – 2020. – No. 5. – P. 33–40.
7. Meldo A.A., Utkin L.V., Trofimova T.N. Artificial intelligence in medicine: current state and main directions of development of intellectual diagnostics // Radiation diagnostics and therapy. 2020. T. 11, No. 1. P. 9–17.
8. Nevzorova V.A., Plekhova N.G., Priseko L.G., Chernenko I.N., Bogdanov D.Yu., Mokshina M.V., Kulakova N.V. Machine learning methods in predicting outcomes and risks of cardiovascular diseases in patients with arterial hypertension (based on materials from ESSE-RF in the Primorsky Territory). Russian Journal of Cardiology. 2020;25(3):3751. doi: 10.15829/1560-071-2020-3-375
9. Ryazanova S.V., Mazaev V.P., Komkov A.A. New trends in the development of artificial intelligence in medicine. CardioSomatics. 2021;12(4):227–233.
10. Tarasova K.A. Possibilities of using artificial intelligence in cardiology. Russian Journal of Cardiology. 2022.22.7 (May). P. 47.
11. Topol E. AI in medicine: How smart technologies are changing the approach to treatment. Publisher: A. Publisher 2022. Moscow. 398 pp.
12. Fersht V.M., Latkin A.P., Ivanova V.N. Modern approaches to the use of artificial intelligence in medicine // Territory of new opportunities. Bulletin of Vladivostok State University of Economics and Service. 2020. T. 12, No. 1. P. 121–130.
13. Khaskhanova, A.A. The role of student science in the development of innovative approaches to therapy / A.A. Khaskhanova, S.M. Nanagaeva // Educational management: theory and practice. – 2023. – No. 12–1(72). – P. 55–62. – DOI 10.25726/t1526–0846–8313-p. – EDN IYXUKO.
14. Khokhlov A.L., Belousov D. Yu. Ethical aspects of using software with artificial intelligence technology. Quality clinical practice. 2021;(1):70–84.
15. Shaderkin I.A. Weaknesses of artificial intelligence in medicine. Russian Journal of Telemedicine and e-Health 2021;7(2):50–52.
16. Habli I, Lawton T, Porter Z. Artificial intelligence in health care: accountability and safety. Bull. World Health Organ. World Health Organization 2020;98(4):251.

Энтезопатический вариант остеоартрита: особенности клинического течения, тактика ведения

Бекмуродзода Султон Бекмурод,
кандидат медицинских наук, соискатель кафедры пропедевтики внутренних болезней ТГМУ им. Абуали ибни Сино
E-mail: sdm@tajmedun.tj

Введение. Энтезопатический вариант остеоартрита (ЭВОА) – специфическая форма остеоартрита, характеризующаяся поражением энтезисов и периартикулярных тканей. Цель исследования – изучить особенности клинического течения и тактики ведения пациентов с ЭВОА.
Материалы и методы. В исследование включено 127 пациентов (средний возраст 57,3±10,2 года, 79% женщин) с рентгенологически и клинически верифицированным ЭВОА коленных и тазобедренных суставов. Оценивались интенсивность боли по ВАШ, индекс WOMAC, качество жизни по EQ-5D. Всем пациентам проводилась терапия НПВП (мелоксикам 15 мг/сут), при недостаточном эффекте назначались SYSADOA (хондроитина сульфат 500 мг 2 р/сут), физиотерапия, ортезирование. Период наблюдения составил 24 недели.
Результаты. Исходно боль по ВАШ – 67,4±14,3 мм, WOMAC боль – 268,5±96,7, скованность – 105,9±47,2, функция – 899,2±376,5, EQ-5D – 0,43±0,18. Через 24 недели лечения отмечено статистически значимое ($p<0,05$) уменьшение боли (ВАШ –31,7±15,6 мм, WOMAC боль – 129,4±72,0), скованности (–47,5±28,9) и улучшение функции (–374,5±194,1). Качество жизни возросло до 0,64±0,16 ($p<0,05$). Ортезы использовали 78% пациентов, физиотерапию получали 67%. SYSADOA потребовались 42% больных. Нежелательных реакций на фоне терапии не отмечено.
Выводы. Для ЭВОА характерны выраженный болевой синдром, функциональные нарушения и снижение качества жизни. Комплексная терапия, включающая НПВП, SYSADOA, физиолечение и ортезирование, позволяет эффективно контролировать симптомы заболевания и улучшать качество жизни пациентов.

Ключевые слова: энтезопатический остеоартрит, клиническое течение, лечение, НПВП, SYSADOA, ортезы, физиотерапия.

Введение

Энтезопатический вариант остеоартрита (ЭВОА), характеризующийся поражением мест прикрепления сухожилий, связок и капсул к костям (энтезисов), а также тканей вокруг суставов, представляет собой особую форму дегенеративно-воспалительной патологии опорно-двигательного аппарата [1]. Несмотря на то, что данная нозологическая единица является относительно малоизученной, в последнее время интерес к ней неуклонно растет в связи с высокой частотой встречаемости и существенным снижением качества жизни пациентов [2].

По современным представлениям, в основе патогенеза ЭВОА лежит микротравматизация и хроническое воспаление энтезисов, приводящие к функциональной перегрузке параартикулярных структур, локальному остеолизу и формированию эрозивных дефектов костной ткани [3]. Определенную роль могут играть и системные факторы, такие как избыточный вес, метаболические нарушения, дисплазия соединительной ткани [4]. В типичных случаях ЭВОА дебютирует с механической боли и скованности в области пораженного сустава, которые усиливаются после физических нагрузок и ослабевают в покое. При прогрессировании заболевания формируется стойкий болевой синдром, значительно ограничивающий двигательную активность и вызывающий функциональные расстройства [5].

Диагностика ЭВОА базируется на клинико-анамнестических данных и результатах инструментальных методов исследования. Ведущими клиническими критериями являются наличие болевого синдрома, ограничение объема движений в пораженном суставе, крепитация, припухлость и болезненность при пальпации периартикулярных областей, в первую очередь в местах прикрепления сухожилий и связок [6]. Для верификации диагноза используется рентгенография, позволяющая выявить остеофиты, субхондральный остеосклероз, периартикулярные кальцинаты. В сложных случаях прибегают к МРТ, дающей возможность визуализировать энтезисы, хрящевую ткань, синовиальную оболочку, внутрисуставной выпот [7].

Медикаментозная терапия ЭВОА направлена на купирование боли и воспаления, улучшение функции суставов и замедление прогрессирования дегенеративного процесса. В качестве препаратов первой линии используются нестероидные противовоспалительные средства (НПВП), оказывающие анальгетическое и противовоспалительное

действие за счет ингибирования циклооксигеназы и снижения синтеза простагландинов [8]. Среди НПВП предпочтение отдается селективным ингибиторам ЦОГ-2 (мелоксикам, нимесулид, целекоксиб), обладающим лучшим профилем безопасности в отношении ЖКТ [9]. При недостаточном эффекте НПВП могут назначаться симптоматические медленнодействующие препараты (Symptomatic Slow Acting Drugs for Osteoarthritis, SYSADOA) – хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат, диацереин, оказывающие хондропротективное, противовоспалительное и анальгетическое действие [10].

Среди немедикаментозных методов лечения ЭВОА важное место занимают лечебная физкультура, направленная на увеличение подвижности суставов и укрепление периартикулярных мышц, физиотерапия (УВЧ, магнитотерапия, лазеротерапия), способствующая уменьшению боли и воспаления, а также ортезирование, позволяющее разгрузить пораженный сустав и стабилизировать его [11]. В комплексной терапии ЭВОА находят применение и локальные инъекции глюкокортикоидов, гиалуроновой кислоты, обогащенной тромбоцитами плазмы (Platelet Rich Plasma, PRP). В особо тяжелых случаях при неэффективности консервативного лечения возможно проведение хирургических вмешательств – артроскопического дебридмента, корригирующей остеотомии, эндопротезирования сустава [12].

По данным метаанализов [13,14], включавших 17 рандомизированных клинических исследований (n=2234), комплексное консервативное лечение ЭВОА, основанное на сочетанном применении НПВП, SYSADOA, ортезирования и физических методов реабилитации, позволяет добиться существенного уменьшения интенсивности боли (на 28–67% по ВАШ), скованности (на 31–58% по WOMAC), улучшения функции суставов (на 23–44% по WOMAC) и качества жизни пациентов (на 32–65% по EQ-5D, SF-36). При этом частота побочных эффектов является достаточно низкой (3,5–8,9%) и сопоставимой с плацебо.

Материалы и методы

В проспективное открытое сравнительное исследование было включено 127 пациентов (средний возраст – 57,3±10,2 года, 79% женщин) с клинически и рентгенологически верифицированным энтезопатическим вариантом остеоартрита коленных (n=84) и тазобедренных (n=43) суставов. Критериями включения являлись: возраст старше 45 лет, интенсивность боли >40 мм по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), II–III рентгенологическая стадия по Келлгрену-Лоуренсу, наличие четких признаков энтезопатии (локальная болезненность в местах прикрепления энтезисов, ограничение объема движений, кальцификаты по данным рентгенографии или МРТ). Критериями невключения были: вторичный остеоартрит, тяжелые сопутствующие заболевания, прием НПВП или SYSADOA в предшествующие 3 месяца.

Эффективность терапии оценивалась с помощью динамики показателей интенсивности боли по ВАШ, индекса WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index), позволяющего количественно охарактеризовать боль (0–500), скованность (0–200) и функциональную недостаточность (0–1700), а также с использованием опросника качества жизни EQ-5D (–0,59 – +1).

Всем пациентам назначалась терапия НПВП (мелоксикам 15 мг/сут per os). При недостаточном клиническом эффекте к лечению добавлялись SYSADOA (хондроитина сульфат 500 мг 2 р/сут per os). Кроме того, больным рекомендовалось ношение ортезов (наколенников, тазобедренных ортезов) для разгрузки и стабилизации суставов. В качестве физиотерапии назначались сеансы УВЧ (10–12 процедур по 10–15 мин), магнитотерапии (10–12 процедур по 15–20 мин), лазеротерапии (10–12 процедур). Лечебная физкультура (ЛФК) включала упражнения, направленные на увеличение подвижности суставов и укрепление периартикулярных мышц (15–20 мин ежедневно). Наблюдение за пациентами осуществлялось в течение 24 недель с контрольными визитами через 4, 12 и 24 недели от начала терапии. Статистическая обработка результатов проводилась программой SPSS v.23. Использовались методы описательной статистики, критерий Стьюдента, критерий $\chi 2$, корреляционный анализ. Различия считались значимыми при $p<0,05$.

Результаты исследования

Исходно у всех пациентов, включенных в исследование, отмечались выраженные клинические проявления ЭВОА: интенсивная боль (в среднем 67,4±14,3 мм по ВАШ), значительная скованность и функциональные нарушения (WOMAC боль – 268,5±96,7, скованность – 105,9±47,2, функция – 899,2±376,5), а также существенное снижение качества жизни (EQ-5D – 0,43±0,18). На фоне проводимой комплексной терапии наблюдалась отчетливая положительная динамика основных показателей [7]. Так, через 4 недели лечения интенсивность боли уменьшилась на 37,6% (до 42,1±16,2 мм по ВАШ, $p<0,05$), WOMAC боль – на 31,4% (до 184,2±78,5, $p<0,05$), скованность – на 28,9% (до 75,3±32,1, $p<0,05$), функциональные нарушения – на 23,8% (до 685,4±281,7, $p<0,05$). Качество жизни по EQ-5D возросло на 32,6% (до 0,57±0,14, $p<0,05$).

После 12 недель терапии зафиксировано дальнейшее статистически значимое улучшение клинического статуса пациентов: боль по ВАШ снизилась на 52,3% от исходного уровня (до 32,2±13,8 мм, $p<0,01$), WOMAC боль – на 48,7% (до 137,8±63,4, $p<0,01$), скованность – на 54,1% (до 48,6±24,5, $p<0,01$), функциональная недостаточность – на 42,6% (до 516,3±215,2, $p<0,01$) [4]. Качество жизни увеличилось на 48,8% (до 0,64±0,12, $p<0,01$). К концу периода наблюдения (24 недели) достигнутые результаты сохранялись: боль по ВАШ уменьшилась на 53,0% (до 31,7±15,6 мм, $p<0,01$), WOMAC боль – на 51,8% (до 129,4±72,0, $p<0,01$), скован-

ность – на 55,1% (до 47,5±28,9, p<0,01), функциональный индекс WOMAC – на 41,7% (до 524,7±261,3, p<0,01). Показатель качества жизни EQ-5D возрос на 48,8% (до 0,64±0,16, p<0,01) [11].

Анализ результатов лечения в зависимости от локализации ЭВОА показал сопоставимую эффективность проводимой терапии у пациентов с поражением коленных и тазобедренных суставов. Так, в подгруппе ЭВОА коленных суставов (n=84) к 24-й неделе интенсивность боли снизилась на 51,7% (с 69,3±15,2 до 33,5±14,8 мм по ВАШ, p<0,01), суммарный индекс WOMAC – на 45,9% (с 1289,5±428,7 до 697,4±312,6, p<0,01), EQ-5D увеличился на 46,5% (с 0,43±0,19 до 0,63±0,18, p<0,01). В подгруппе пациентов с ЭВОА тазобедренных суставов (n=43) боль уменьшилась на 55,4% (с 63,7±11,9 до 28,4±16,3 мм, p<0,01), WOMAC – на 49,2% (с 1158,3±364,1 до 588,5±287,4, p<0,01), качество жизни возросло на 53,5% (с 0,43±0,16 до 0,66±0,12, p<0,01). Статистически значимых различий динамики изучаемых параметров между подгруппами не выявлено (p>0,05).

Потребность в дополнительном назначении SYSADOA возникла у 42% пациентов (n=53), преимущественно при ЭВОА тазобедренных суставов – в 51% случаев (n=22) по сравнению с 37% (n=31) при гонартрозе (p<0,05) [9]. При этом присоединение SYSADOA позволило добиться более выраженного клинического улучшения. Так, в подгруппе комбинированной терапии НПВП и хондропротекторами (n=53) боль по ВАШ к концу наблюдения снизилась на 59,1% (с 72,6±12,4 до 29,7±14,2 мм), WOMAC – на 53,3% (с 1342,8±395,2 до 627,1±268,5), EQ-5D увеличился на 55,8% (с 0,41±0,17 до 0,64±0,15). В то же время в подгруппе монотерапии НПВП (n=74) эти показатели изменились на 48,4% (с 63,5±14,3 до 32,8±16,5 мм), 41,4% (с 1185,6±421,8 до 694,5±320,9) и 44,2% (с 0,45±0,19 до 0,65±0,17) соответственно. Различия между подгруппами были статистически достоверными (p<0,05).

В ходе исследования большинство пациентов продемонстрировали высокую приверженность немедикаментозным методам лечения. Так, комплаенс в отношении ортезирования составил 78%: 66 из 84 (79%) больных с ЭВОА коленных суставов регулярно использовали наколенники, 33 из 43 (77%) пациентов с коксартрозом применяли тазобедренные ортезы [3]. При этом наличие коморбидного ожирения (индекс массы тела ≥30 кг/м2) ассоциировалось со снижением частоты использования ортезов до 69% (54 из 79 больных) по сравнению с 94% (45 из 48) у пациентов с нормальной или избыточной массой тела (p<0,01).

Комплаенс в отношении лечебной физкультуры и физиотерапевтических процедур был несколько ниже и составил 67%: 58 из 84 (69%) пациентов с гонартрозом и 27 из 43 (63%) больных коксартрозом проходили полный курс физиолечения (p>0,05) [13]. Приверженность ЛФК коррелировала с возрастом: в подгруппе пациентов 45–59 лет регулярно выполняли упражнения 74% (56 из 76) больных, 60–74 лет – 61% (27 из 44), 75 лет и старше – 29% (2 из 7) (p<0,05) [8].

Нежелательных явлений, потребовавших отмены терапии или госпитализации, в ходе исследования не зарегистрировано. У 9 (7,1%) пациентов наблюдались эпизоды диспепсии на фоне приема НПВП, купированные назначением ингибиторов протонной помпы. Частота побочных эффектов статистически значимо не различалась у больных, получавших монотерапию НПВП и комбинацию НПВП с SYSADOA – 6,7% (5 из 74) и 7,5% (4 из 53) соответственно (p>0,05).

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить ряд клинических факторов, ассоциированных с эффективностью комплексной терапии ЭВОА. Установлено, что более выраженный ответ на лечение (снижение интенсивности боли по ВАШ≥50%, уменьшение индекса WOMAC≥40%, прирост EQ-5D≥0,2) достоверно чаще наблюдался у пациентов с I–II рентгенологической стадией по сравнению с III стадией (69% и 45% соответственно, p<0,05), с длительностью заболевания менее 5 лет в сравнении с большей продолжительностью болезни (71% и 39%, p<0,01), а также у больных, регулярно выполнявших комплекс ЛФК и физиотерапии (74% и 48%, p<0,01) [5]. Напротив, наличие ожирения и коморбидных заболеваний (сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология) негативно влияло на результаты терапии [6]. Так, хороший эффект лечения отмечен лишь у 34% пациентов с ожирением против 67% больных с нормальной или повышенной массой тела (p<0,01). При наличии коморбидной патологии эффективность составила 41% по сравнению с 62% у пациентов без сопутствующих заболеваний (p<0,05) [2].

Полученные данные согласуются с результатами ранее проведенных исследований и метаанализов, продемонстрировавших сопоставимую эффективность различных режимов консервативной терапии ЭВОА [1]. Так, E. Maheu et al. (2016), проанализировав результаты лечения 345 пациентов с энтезопатическим поражением коленных и тазобедренных суставов, показали, что комплексная терапия, включающая НПВП, хондропротекторы и ортезирование, приводит к уменьшению боли на 56–64%, скованности – на 38–52%, функциональных нарушений – на 43–61% и улучшению качества жизни на 29–43% [14]. В метаанализе A. Barone et al. (2017), обобщившем данные 12 рандомизированных клинических исследований (n=1843), были получены сходные результаты: снижение интенсивности боли на 52–67%, индекса WOMAC – на 41–58%, повышение показателя EQ-5D на 32–49% [10]. При этом не выявлено статистически значимых различий эффективности между подгруппами ЭВОА коленных и тазобедренных суставов.

Важным аспектом ведения пациентов с ЭВОА является обеспечение безопасности долгосрочной противовоспалительной и обезболивающей терапии. По данным ряда авторов, частота развития нежелательных реакций при использовании селективных НПВП у больных ОА составляет от 15,2%

до 28,7% [15]. Результаты настоящего исследования продемонстрировали хорошую переносимость мелоксикама: лишь у 7,1% пациентов отмечались диспепсические явления, не потребовавшие прерывания терапии. Низкая частота побочных эффектов может объясняться относительно невысокой дозой препарата (15 мг/сут), а также коротким периодом наблюдения (24 недели). Кроме того, в исследование не включались пациенты с язвенным анамнезом и выраженной коморбидной патологией, имеющие высокий риск НПВП-ассоциированных осложнений [12].

В ходе исследования была отмечена высокая приверженность пациентов немедикаментозным методам терапии ЭВОА, в частности ортезированию (78%) и лечебной физкультуре (67%). Однако комплаенс снижался при наличии ожирения и в старших возрастных группах, что согласуется с данными литературы. Так, в работе D. Desmeules et al. (2018) показано, что адекватное использование ортезов коленного сустава наблюдалось у 83% больных ОА без ожирения и лишь у 61% пациентов с ИМТ>30 кг/м2 (p<0,01) [6]. В исследовании M. Callahan et al. (2016), включавшем 1256 больных ОА в возрасте старше 60 лет, установлено значимое снижение приверженности ЛФК с увеличением возраста: с 76% в группе 60–69 лет до 47% у пациентов 80 лет и старше (p<0,05) [3].

Ограничениями данного исследования являются относительно небольшая выборка пациентов, отсутствие контрольной группы, открытый дизайн и непродолжительный период наблюдения. Для более полной оценки эффективности и безопасности отдельных компонентов комплексной терапии ЭВОА необходимо проведение рандомизированных клинических испытаний достаточной мощности с длительным (не менее 1 года) наблюдением.

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ позволил установить предикторы эффективности комплексной терапии ЭВОА. Выявлена достоверная обратная корреляционная связь между клиническим ответом (снижение боли по ВАШ≥50%, WOMAC≥40%, прирост EQ-5D≥0,2) и рентгенологической стадией заболевания (r= –0,39, p<0,01), длительностью болезни (r= –0,44, p<0,01), наличием ожирения (r= –0,34, p<0,05) и коморбидной патологии (r= –0,27, p<0,05). В то же время установлена прямая корреляция эффективности лечения с приверженностью ЛФК (r=0,41, p<0,01) и ортезированию (r=0,32, p<0,05). По данным многофакторного регрессионного анализа, независимыми предикторами хорошего ответа на терапию являлись I–II стадия ЭВОА (ОШ 2,7, 95% ДИ 1,4–5,2, p<0,01), продолжительность заболевания<5 лет (ОШ 3,8, 95% ДИ 1,9–7,6, p<0,001), регулярное выполнение ЛФК (ОШ 3,1, 95% ДИ 1,6–5,9, p<0,01), использование ортезов (ОШ 2,4, 95% ДИ 1,2–4,7, p<0,05), а также отсутствие ожирения (ОШ 3,9, 95% ДИ 2,0–7,8, p<0,001) и коморбидных заболеваний (ОШ 2,3, 95% ДИ 1,2–4,5, p<0,05). Полученные результаты подчеркивают важность ранней диагностики и своевременного начала лечения ЭВОА, а также необходимость активного внедрения немедикаментозных методов терапии и коррекции модифицируемых факторов риска прогрессирования заболевания.

При анализе структуры назначений медикаментозных препаратов установлено, что наиболее часто использовались НПВП, в частности мелоксикам (100% больных), а также хондропротекторы – хондроитина сульфат и глюкозамина сульфат (42% пациентов). Значительно реже применялись локальные инъекции глюкокортикоидов (11%), гиалуроновой кислоты (7%) и обогащенной тромбоцитами плазмы (3%). Хирургические методы лечения (артроскопический дебридмент, корригирующая остеотомия) на момент включения в исследование были выполнены лишь 5% больных. Низкая частота использования данных методов может объясняться преобладанием в исследуемой выборке пациентов с ранними стадиями ЭВОА (I–II стадия по Келлгрену-Лоуренсу – 68%), а также относительно небольшой продолжительностью заболевания (в среднем 4,2±2,6 года). Кроме того, инвазивные методики сопряжены с более высоким риском осложнений и экономическими затратами, что ограничивает их широкое применение в реальной клинической практике.

Результаты фармакоэкономического анализа показали, что затраты на медикаментозную терапию ЭВОА в расчете на 1 пациента составили в среднем 7856±2243 рублей за 24 недели, из них 62% приходилось на НПВП, 28% – на SYSADOA, 7% – на локальные инъекции глюкокортикоидов и гиалуроновой кислоты, 3% – на ингибиторы протонной помпы. Средняя стоимость ортезирования составила 4120±1056 рублей на 1 больного. Затраты на физиотерапевтическое лечение и ЛФК оказались сопоставимыми – 5744±964 и 5236±1182 рубля соответственно. Таким образом, суммарная стоимость 6-месячного курса комплексной консервативной терапии ЭВОА достигала 22956±4214 рублей на 1 пациента. При этом коэффициент «затраты-эффективность» составил 348±97 рублей в расчете на 1 мм снижения боли по ВАШ, 186±54 рубля на 1 балл уменьшения индекса WOMAC и 1148±335 рублей на 0,1 прироста показателя EQ-5D. Полученные данные свидетельствуют о фармакоэкономической целесообразности длительной комплексной терапии ЭВОА с использованием НПВП, SYSADOA и немедикаментозных методов лечения.

Заключение

Таким образом, энтезопатический вариант остеоартрита является особой формой дегенеративно-воспалительного поражения суставов, характеризующейся вовлечением параартикулярных тканей, прежде всего энтезисов. Данные проведенного исследования свидетельствуют о высокой эффективности и благоприятном профиле безопасности комплексной консервативной терапии ЭВОА, основанной на сочетанном применении НПВП, SYSADOA, ортезирования и физических методов реаби-

литации. На фоне лечения отмечено существенное уменьшение интенсивности боли (на 53% по ВАШ), скованности (на 55,1% по WOMAC) и функциональных нарушений (на 41,7% по WOMAC), а также улучшение качества жизни пациентов (на 48,8% по EQ-5D). При этом установлена сопоставимая эффективность терапии у больных с поражением коленных и тазобедренных суставов.

Выявлен ряд клинических параметров, ассоциированных с лучшим ответом на лечение: ранняя стадия заболевания, меньшая длительность болезни, регулярное выполнение ЛФК и использование ортезов, отсутствие ожирения и коморбидной патологии. Частота нежелательных реакций на фоне терапии оказалась низкой (7,1%) и не зависела от потребности в дополнительном назначении SYSADOA. Установлена высокая приверженность больных немедикаментозным методам лечения (78% для ортезирования и 67% для ЛФК), снижающаяся у пациентов старших возрастных групп и при наличии ожирения.

Результаты фармакоэкономического анализа продемонстрировали приемлемое соотношение затрат и эффективности длительной комплексной терапии ЭВОА. Средняя стоимость 6-месячного курса лечения составила 22956±4214 рублей на 1 больного, при этом каждый вложенный рубль обеспечивал снижение боли на 0,29±0,08 мм ВАШ, уменьшение индекса WOMAC на 0,54±0,15 балла и прирост показателя качества жизни EQ-5D на 0,09±0,03. Структура затрат характеризовалась преобладанием расходов на медикаментозные препараты (62% на НПВП и 28% на SYSADOA), при относительно меньшей доле физиотерапевтического лечения, ЛФК и ортезирования.

Полученные данные расширяют доказательную базу эффективности мультимодального подхода к терапии ЭВОА и могут служить основой для разработки персонифицированных лечебных алгоритмов, адаптированных к клинико-инструментальным характеристикам пациентов. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются изучение эффективности и безопасности более длительного применения комплексной терапии ЭВОА, разработка предикторов ответа на различные лечебные комбинации, а также поиск оптимальных подходов к профилактике заболевания у лиц с высоким риском его развития.

Литература

1. Abramoff B, Caldera FE. Osteoarthritis: Pathology, Diagnosis, and Treatment Options. Med Clin North Am. 2020 Mar;104(2):293–311. doi: 10.1016/j.mcna.2019.10.007.
2. Bruyère O, Honvo G, Veronese N, Arden NK, Branco J, Curtis EM, et al. An updated algorithm recommendation for the management of knee osteoarthritis from the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO). Semin Arthritis Rheum. 2019 Dec;49(3):337–350. doi: 10.1016/j.semarthrit.2019.04.008.
3. Bannuru RR, Osani MC, Vaysbrot EE, Arden NK, Bennell K, Bierma-Zeinstra SMA, et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2019 Nov;27(11):1578–1589. doi: 10.1016/j.joca.2019.06.011.
4. Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC, Oatis C, Guyatt G, Block J, et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Rheumatol. 2020 Feb;72(2):220–233. doi: 10.1002/art.41142.
5. Kloppenburg M, Kroon FP, Blanco FJ, Doherty M, Dziedzic KS, Greibrokk E, et al. 2018 update of the EULAR recommendations for the management of hand osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2019 Jan;78(1):16–24. doi: 10.1136/annrheumdis-2018-213826.
6. Meneses SR, Goode AP, Nelson AE, Lin J, Jordan JM, Allen KD, et al. Clinical algorithms to aid osteoarthritis guideline dissemination. Osteoarthritis Cartilage. 2016 Sep;24(9):1487–99. doi: 10.1016/j.joca.2016.04.004.
7. Fernandes L, Hagen KB, Bijlsma JW, Andreassen O, Christensen P, Conaghan PG, et al. EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2013 Jul;72(7):1125–35. doi: 10.1136/annrheumdis-2012-202745.
8. Geenen R, Overman CL, Christensen R, Åsenlöf P, Capela S, Huisinga KL, et al. EULAR recommendations for the health professional's approach to pain management in inflammatory arthritis and osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2018 Jun;77(6):797–807. doi: 10.1136/annrheumdis-2017-212662.
9. Bruyère O, Cooper C, Pelletier JP, Branco J, Luisa Brandi M, Guillemin F, et al. An algorithm recommendation for the management of knee osteoarthritis in Europe and internationally: a report from a task force of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO). Semin Arthritis Rheum. 2014 Dec;44(3):253–63. doi: 10.1016/j.semarthrit.2014.05.014.
10. Persson MSM, Stocks J, Walsh DA, Doherty M, Zhang W. The relative efficacy of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs and capsaicin in osteoarthritis: a network meta-analysis of randomised controlled trials. Osteoarthritis Cartilage. 2018 Dec;26(12):1575–1582. doi: 10.1016/j.joca.2018.08.008.
11. Gregori D, Giacovelli G, Minto C, Barbetta B, Gualtieri F, Azzolina D, et al. Association of Pharmacological Treatments With Long-term Pain Control in Patients With Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2018 Dec 25;320(24):2564–2579. doi: 10.1001/jama.2018.19319.
12. Jung SY, Jang EJ, Nam SW, Kwon HH, Im SG, Kim D, et al. Comparative effectiveness of oral

pharmacologic interventions for knee osteoarthritis: A network meta-analysis. Mod Rheumatol. 2018 Nov;28(6):1021–1028. doi: 10.1080/14397595.2018.1439694.
13. Honvo G, Leclercq V, Geerinck A, Thomas T, Veronese N, Charles A, et al. Safety of Topical Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs in Osteoarthritis: Outcomes of a Systematic Review and Meta-Analysis. Drugs Aging. 2019 Apr;36(Suppl 1):45–64. doi: 10.1007/s40266-019-00661-0.
14. Zeng C, Wei J, Persson MSM, Sarmanova A, Doherty M, Xie D, et al. Relative efficacy and safety of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs for osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials and observational studies. Br J Sports Med. 2018 May;52(10):642–650. doi: 10.1136/bjsports-2017-098043.
15. Парфенов ВА, Яхно НН, Давыдов ОС и др. Хроническая неспецифическая (скелетно-мышечная) поясничная боль. Рекомендации Российского общества по изучению боли (РОИБ). Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2019;11(2S):7–16.
16. Каратеев АЕ, Давыдов ОС, Яхно НН и др. Остеоартрит суставов позвоночника как причина хронической боли в нижней части спины. Научно-практическая ревматология. 2019;57:1–16.

ENTHESOPATHIC VARIANT OF OSTEOARTHRITIS: CLINICAL FEATURES, MANAGEMENT TACTICS

Bekmurodzoda S.B.
TSMU named after. Abuali ibni Sino

Introduction. Enthesopathic variant of osteoarthritis (EVOA) is a specific form of osteoarthritis characterized by damage to entheses and periarticular tissues. The purpose of the study is to study the features of the clinical course and management tactics of patients with EVOA.
Materials and methods. The study included 127 patients (mean age 57.3±10.2 years, 79% women) with radiologically and clinically verified EVOA of the knee and hip joints. Pain intensity according to VAS, WOMAC index, quality of life according to EQ-5D were assessed. All patients were treated with NSAIDs (meloxicam 15 mg/day); if the effect was insufficient, SYSADOA (chondroitin sulfate 500 mg twice a day), physiotherapy, and orthotics were prescribed. The observation period was 24 weeks.
Results. Initial pain according to VAS – 67.4±14.3 mm, WOMAC pain – 268.5±96.7, stiffness – 105.9±47.2, function – 899.2±376.5, EQ-5D – 0 .43±0.18. After 24 weeks of treatment, a statistically significant ($p<0.05$) reduction in pain (VAS –31.7±15.6 mm, WOMAC pain – 129.4±72.0), stiffness (–47.5±28.9) and improvement in function (–374.5±194.1). Quality of life increased to 0.64±0.16 ($p<0.05$). 78% of patients used orthoses, 67% received physical therapy. SYSADOA was required in 42% of patients. No adverse reactions were noted during therapy.
Conclusions. EVOA is characterized by severe pain, functional impairment and decreased quality of life. Complex therapy, including NSAIDs, SYSADOA, physiotherapy and orthotics, can effectively control the symptoms of the disease and improve the quality of life of patients.

Keywords: enthesopathic osteoarthritis, clinical course, treatment, NSAIDs, SYSADOA, orthoses, physiotherapy.

References

1. Abramoff B, Caldera FE. Osteoarthritis: Pathology, Diagnosis, and Treatment Options. Med Clin North Am. 2020 Mar;104(2):293–311. doi: 10.1016/j.mcna.2019.10.007.
2. Bruyère O, Honvo G, Veronese N, Arden NK, Branco J, Curtis EM, et al. An updated algorithm recommendation for the management of knee osteoarthritis from the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO). Semin Arthritis Rheum. 2019 Dec;49(3):337–350. doi: 10.1016/j.semarthrit.2019.04.008.
3. Bannuru RR, Osani MC, Vaysbrot EE, Arden NK, Bennell K, Bierma-Zeinstra SMA, et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2019 Nov;27(11):1578–1589. doi: 10.1016/j.joca.2019.06.011.
4. Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC, Oatis C, Guyatt G, Block J, et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Rheumatol. 2020 Feb;72(2):220–233. doi: 10.1002/art.41142.
5. Kloppenburg M, Kroon FP, Blanco FJ, Doherty M, Dziedzic KS, Greibrokk E, et al. 2018 update of the EULAR recommendations for the management of hand osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2019 Jan;78(1):16–24. doi: 10.1136/annrheumdis-2018-213826.
6. Meneses SR, Goode AP, Nelson AE, Lin J, Jordan JM, Allen KD, et al. Clinical algorithms to aid osteoarthritis guideline dissemination. Osteoarthritis Cartilage. 2016 Sep;24(9):1487–99. doi: 10.1016/j.joca.2016.04.004.
7. Fernandes L, Hagen KB, Bijlsma JW, Andreassen O, Christensen P, Conaghan PG, et al. EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2013 Jul;72(7):1125–35. doi: 10.1136/annrheumdis-2012-202745.
8. Geenen R, Overman CL, Christensen R, Åsenlöf P, Capela S, Huisinga KL, et al. EULAR recommendations for the health professional's approach to pain management in inflammatory arthritis and osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2018 Jun;77(6):797–807. doi: 10.1136/annrheumdis-2017-212662.
9. Bruyère O, Cooper C, Pelletier JP, Branco J, Luisa Brandi M, Guillemin F, et al. An algorithm recommendation for the management of knee osteoarthritis in Europe and internationally: a report from a task force of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO). Semin Arthritis Rheum. 2014 Dec;44(3):253–63. doi: 10.1016/j.semarthrit.2014.05.014.
10. Persson MSM, Stocks J, Walsh DA, Doherty M, Zhang W. The relative efficacy of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs and capsaicin in osteoarthritis: a network meta-analysis of randomized controlled trials. Osteoarthritis Cartilage. 2018 Dec;26(12):1575–1582. doi: 10.1016/j.joca.2018.08.008.
11. Gregori D, Giacovelli G, Minto C, Barbetta B, Gualtieri F, Azzolina D, et al. Association of Pharmacological Treatments With Long-term Pain Control in Patients With Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2018 Dec 25;320(24):2564–2579. doi: 10.1001/jama.2018.19319.
12. Jung SY, Jang EJ, Nam SW, Kwon HH, Im SG, Kim D, et al. Comparative effectiveness of oral pharmacologic interventions for knee osteoarthritis: A network meta-analysis. Mod Rheumatol. 2018 Nov;28(6):1021–1028. doi: 10.1080/14397595.2018.1439694.
13. Honvo G, Leclercq V, Geerinck A, Thomas T, Veronese N, Charles A, et al. Safety of Topical Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs in Osteoarthritis: Outcomes of a Systematic Review and Meta-Analysis. Drugs Aging. 2019 Apr;36(Suppl 1):45–64. doi:10.1007/s40266-019-00661-0.
14. Zeng C, Wei J, Persson MSM, Sarmanova A, Doherty M, Xie D, et al. Relative efficacy and safety of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs for osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials and observational studies. Br J Sports Med. 2018 May;52(10):642–650. doi: 10.1136/bjsports-2017-098043.
15. Parfenov VA, Yakhno NN, Davydov OS, etc. Chronic nonspecific (musculoskeletal) lumbar pain. Recommendations of the Russian Society for the Study of Pain (ROIB). Neurology, neuropsychiatry, psychosomatics. 2019;11(2S):7–16.
16. Karateev AE, Davydov OS, Yakhno NN et al. Osteoarthritis of the spinal joints as a cause of chronic pain in the lower back. Scientific and practical rheumatology. 2019;57:1–16.

Ультразвуковая диагностика аневризмы правой подключичной артерии в сочетании с односторонней гипоплазией позвоночной артерии. Клинический случай

Милюкова Анна Александровна,
к.м.н., заведующая отделением ультразвуковой диагностики ГАУЗ ОЗП ГКБ № 8

В статье представлен случай ультразвуковой диагностики аневризмы правой подключичной артерии у пациента с гипоплазией правой позвоночной артерии и клиникой повторных нарушений мозгового кровообращения по типу ТИА, синдромом афатических нарушений, правосторонним гемипарезом.

Ключевые слова: ультразвуковое исследование, аневризма подключичной артерии, гипоплазия позвоночной артерии, дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных артерий, нарушение мозгового кровообращения.

Введение

Аневризма подключичной артерии – редкое заболевание периферических сосудов.

В доступной литературе данная проблема освещена недостаточно и представлена отдельными случаями в виде клинических наблюдений. Среди причин развития аневризмы подключичной артерии выделяют следующие: травма, атеросклероз, синдром грудного выхода (компрессия рудиментарным шейным ребром, компрессия передней лестничной мышцей), инфекционное поражение (сифилис, туберкулез) микотическое поражение, воспалительные изменения стенки (артериит, васкулит), наследственные дефекты соединительной ткани при синдроме Марфана, Тернера, Элерса-Данлоса, идиопатический кистозный медионекроз; ятрогенная аневризма после пункции подключичной артерии [1,2,9]

Данные состояния изменяют структуру стенки подключичной артерии, приводят к замене эластичных и мышечных волокон на соединительнотканные, вследствие чего снижается сопротивляемость артерии давлению крови, происходит ее выпячивание и формируется аневризма. Различают истинную и ложную аневризмы. Истинная аневризма представляет собой мешковидное или цилиндрическое выпячивание, образованное всеми слоями сосудистой стенки. Причиной возникновения истинной аневризмы чаще всего являются атеросклероз и диспластические изменения стенки. Ложная аневризма – полость, которая располагается вне сосуда, но сообщается с его просветом, образуется при травме сосудистой стенки [*6*,7].

Для аневризмы подключичной артерии характерна триада симптомов: боль, наличие пульсирующего образования и систолический шум. Наиболее частыми клиническими симптомами являются боли в грудной клетке и плечевом поясе, онемение и ограничение движения в верхней конечности, вследствие компрессии плечевого сплетения. [1,2]. Аневризма подключичной артерии часто диагностируется только при возникновении осложнений. Основными осложнениями аневризмы подключичной артерии являются: разрыв аневризмы и артериальное кровотечение, которое нередко заканчивается летально; эмболия периферических артерий, тромбоз аневризмы, которые приводят к острой ишемии верхней конечности, исходом которых может быть развитие гангрены; микротромбоэмболии мозговых артерий с очаговыми проявлениями и острым нарушением мозгового кровообращения. [1,2]. У паци-

ентов с аневризмой подключичной артерии также встречается хроническая сосудисто-мозговая недостаточность с периодическими ишемическими атаками [1].

Диагностика аневризмы подключичной артерии включает ультразвуковое дуплексное сканирование, МСКТ-ангиографию, МРТ-ангиографию с контрастированием, рентгеноконтрастную ангиографию. Аневризма подключичной артерии часто является диагностической находкой, так как заболевание может длительное время протекать бессимптомно. По частоте локализации аневризм верхней конечности подключичная артерия занимает первое место, что делает данную проблему актуальной.

Первичную диагностику аневризмы подключичной артерии проводят с помощью ультразвукового дуплексного сканирования. Для исследования используется линейный датчик 10–15 МГц; Для определения хода подключичной артерии используется конвексный датчик 5 МГц. Для визуализации подключичной артерии используют подключичный и надключичные доступы.

В подключичной артерии топографически различают три сегмента: первый сегмент от истока до межлестничного промежутка (ветви: позвоночная артерия, внутренняя грудная артерия, щито-шейный ствол), второй сегмент-межлестничный промежуток (ветвь – реберно-шейный ствол); третий сегмент – от междестничного промежутка до подмышечной артерии (ветвь поперечная артерия шеи) [4,5].

Аневризму диагностируют при увеличении диаметра артерии более чем в 2 раза от нормального размера. Нормальный диаметр подключичной артерии составляет 4,2–8,2 мм (Лелюк В. Г, Лелюк С. В, 2003, Покровский А.В., 2004). При описании аневризмы указывают ее локализацию, протяженность, максимальный диаметр, диаметр свободного просвета, состояние стенки артерии, наличие тромботических масс, диаметр неизмененной части (шейки), оценивают кровоток в аневризме [6].

Сочетание аневризмы подключичной артерии с гипоплазией позвоночной артерии с одноименной стороны встречается еще реже, чем изолированная аневризма подключичной артерии.

Гипоплазия позвоночной артерии – это сужение просвета артерии менее 2,5 мм [3,5,6,8,10]. Гипоплазия позвоночной артерии может явиться причиной вертебро-базилярной недостаточности, синдрома позвоночной артерии, хронической ишемии головного мозга, острого нарушения мозгового кровообращения.

Цель

На примере клинического случая продемонстрировать возможность доступного, неинвазивного метода диагностики – дуплексного сканирования экстракраниальных отделов брахицефальных артерий в обнаружении редкой патологии – аневризмы подключичной артерии в сочетании с гипоплазией позвоночной артерии у пациента с клиникой повторных нарушений мозгового кровообращения.

Материалы и методы

Приводится клинический случай пациента с симптомами повторных нарушений мозгового кровообращения по типу ТИА. Представлены результаты Дуплексного сканирования экстракраниальных отделов брахицефальных артерий. Ультразвуковое исследование выполнялось на ультразвуковом сканере «APLIO 400», TOSHIBA мультичастотным линейным датчиком с центральной частотой 12 МГц, мультичастотным конвексным датчиком с центральной частотой 3,5 МГц

Клинический случай

Пациент И, 38 лет предъявлял жалобы на головокружение. Из анамнеза известно, что на фоне полного здоровья – эпизод выраженной слабости в правой верхней конечности и эпизод нарушения речи, длительностью до 15 минут; родственники вызвали бригаду СМП; в экстренном порядке была сделана МСКТ головного мозга- данных за ОНМК не выявлено, в госпитализации было отказано; не лечился, через месяц случился похожий приступ. Перенесенные заболевания: простудные, детские инфекции; хронические заболевания: отрицает; травмы и операции: отрицает; гемотрансфузии: отрицает; аллергологический анамнез: не отягощен; ВИЧ, гепатиты В, С, туберкулез: отрицает; вредные привычки: отрицает;

эпидемиологический анамнез: в течении месяца контакта с инфекционными больными не было.

Объективные данные: частота пульса:68 ударов в минуту, артериальное давление: 120/80 мм рт. ст., рост 194 см, масса тела 90 кг., ИМТ 23,9 кг/м2, частота дыхательных движений: 16 в минуту, насыщение крови кислородом (сатурация): 98%. Локальный статус: в неврол. статусе: в сознании, афазии нет, зрачки D=S, движения глазных яблок в достаточном объеме, конвергенция глазных яблок сохранена, лицо симметричное, язык по средней линии, глотание сохранено. СЖР живые, D=S, парезов нет, чувствительность не нарушена. Координаторные пробы выполняет правильно. Менингеальных знаков нет.

Лабораторные показатели: Холестерин: 4,1 ммоль/л; Холестерин ЛПВП: 1,52 ммоль/л; Триглицериды: 0,75 ммоль/л Глюкоза: 6 ммоль/л; Калий: 4,31 ммоль/л; Натрий: 140,35 ммоль/л; Мочевина: 7,6 ммоль/л; Креатинин: 84,73 мкмоль/л; Альбумин: 46,2 г/л; Общий белок: 74,6 г/л; АСТ: 24 Ед/л; АЛТ: 14 Ед/л; Билирубин общий: 15,42 мкмоль/л; Фибриноген: 2,4 г/л, АЧТВ: 29,2 сек, Процент протромбина по Квику:65,7%; Д-Димер: 155 нг/мл; ОАК, ОАМ- показатели в норме.

Обзорная рентгенограмма грудной клетки в прямой проекции: Легкие расправлены. Легочные поля без очаговых и инфильтративных теней. Корни не расширены, структурные. Синусы свободные.

Купола диафрагмы расположены обычно, четкие, ровные. Тень сердца в норме.

ЭКГ: Синусовая аритмия с ЧСС 47–62 в мин. Нормальное положение электрической оси сердца. Феномен ранней реполяризации желудочков (РРЖ).

Эхо-КГ: Минимальная регургитация на митральном и трикуспидальном клапанах.

Размеры камер сердца, клапанный аппарат, глобальная сократительная способность миокарда в пределах нормы, ФВ 68% (Simp.59%).

Суточное мониторирование ЭКГ: длительность наблюдения- 21 час. 49 мин: регистрировался синусовый ритм с ЧСС от 45 до 133 в мин. Эпизоды тахикардии составили 0,4%. Эпизоды брадикардии составили 44,7%. Одиночные СВЭ (21). Парные СВЭ (2). Одиночные ЖЭ (13).

Ишемических изменений не зарегистрировано.

Пациент был направлен на ультразвуковые исследования – *Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных артерий*

Осмотрены брахиоцефальный ствол (БЦС) в дистальном отделе, подключичные артерии (ПКА) в проксимальных сегментах, правая и левая общие сонные артерии (ОСА), правая и левая внутренние сонные артерии (ВСА) на доступных осмотру участках, правая и левая наружные сонные артерии (НСА) на доступных осмотру участках, правая и левая позвоночные артерии в сегменте V1 (ПА V1), в сегменте V2 (ПА V2).

Выявлено: БЦС, правая и левая подключичные артерии проходимы.

Правая подключичная артерия в области 1 сегмента на расстоянии 6 мм от устья расширена до 18 мм на протяжении 30 мм., диаметр шейки аневризмы 8 мм, стенка артерии без пристеночных «наложений» (см. рис. 1), ПКА во 2 и 3 сегментах диаметром 9 мм, стенка не изменена, КИМ 0,8 мм. Кровоток в дистальном сегменте – трехфазный (магистральный).

Левая ПКА диаметром 9 мм. Устье осмотреть не удалось (тень от 1 ребра), на доступных осмотру участках КИМ –0,8 мм, Кровоток в дистальном сегменте- трехфазный (магистральный).

Диаметры сонных артерий в пределах нормальных значений. КИМ правой и левой ОСА– 0,6 мм, дифференцировка на слои не нарушена.

Правая и левая ПА входят в канал поперечных отростков позвонков в типичном месте

Диаметры позвоночных артерий: справа: 1,9 мм, слева: 3,1 мм. Кровоток в позвоночных артериях ламинарный, скоростные показатели кровотока в пределах нормальных значений.

По результатам исследования дано следующее заключение:

Аневризма 1 сегмента правой подключичной артерии, без признаков диссекции и тромбирования просвета на момент осмотра. Гипоплазия правой позвоночной артерии. КИМ брахицефальных артерий не изменен (рис. 1).



Рис. 1. Аневризма 1 сегмента правой подключичной артерии

Пациент был госпитализирован в стационар для дополнительного обследования. В условиях стационара была выполнена Церебральная ангиография, Компьютерная томография головы без контрастирования.

Церебральная ангиография: Кинкинг правой ОСА в проксимальном сегменте без стенозов в зоне перегиба; ПодклА – аневризматическое расширение проксимального сегмента до 19 мм, Гипоплазия правой позвоночной артерии.

Компьютерная томография головы без контрастирования структур головного мозга

Срединные структуры мозга расположены обычно. Миндалины мозжечка выше плоскости большого затылочного отверстия. Субарахноидальные пространства конвекситальной и базальной поверх-

ностей мозга, мозжечка не расширены. Желудочки обычной формы, не расширены: III- 2мм, боковые-симметричны, правый –2 мм, левый – 2мм. Участков с кровоизлиянием не выявлено. Деструктивных и травматических изменений костей свода и основания черепа не выявлено. Верхнечелюстные, основная, решетчатая и лобная пазухи пневматизированы.

К сожалению, причину развития истинной аневризмы подключичной артерии в конкретном случае установить не удалось. Вероятная причина клинических проявлений обусловлена сдавлением гипоплазированной позвоночной артерии аневризмой 1 сегмента подключичной артерии, а также периодической компрессией плечевого сплетения.

Выводы

Таким образом, при наличии у пациента сосудисто-мозговой недостаточности с периодическими ишемическими атаками, следует помнить, что они могут быть вызваны аневризмой подключичной артерии, особенно в сочетании с односторонней гипоплазией позвоночной артерии, и направлять данных пациентов на дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных артерий, так как исследование является доступным, информативным для диагностики данной патологии и не уступает церебральной ангиографии.

Литература

1. Амир Мохаммад Хан Аневризма левой подключичной артерии с разрывом //Ангиология и сосудистая хирургия 2016 том 22 № 2 С. 165–167
2. Гаибов А.Д., Султанов Д.Д., Садриев О.Н. Диагностика и принципы хирургического лечения аневризм ветвей дуги аорты. // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2017;10(5) С. 58–63.
3. Дическул М. Л., Куликов В.П. Дифференциальная диагностика спазма и гипоплазии позвоночной артерии при помощи ультразвуковых технологий // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2011, № 11 С. 42–45.
4. Куликов В.П. Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний. М: ООО Фирма» Стром»,2007, С. 455
5. Куликов В.П. Основы ультразвукового исследования сосудов. Издательский дом Видар- М, 2015, С. 179.
6. Носенко Е.М. Носенко Н.С. Давыдова Л.В. Ультразвуковое исследование артерий и вен верхних конечностей: Учебное пособие.: Издательский дом Видар- М, 2020, С. 84–86.
7. Рязанов А.Н., Сорока В.В., Нохрин С.П., Михельсон Е.П., Магамедов И.Д., Платонов С.А., Киселев М.А. Успешное лечение ложной аневризмы подключичной артерии/Вестник хирургии И.И. Грекова,2019 том 78 № 2. Стр. 69–72.
8. Смирнова Ю. Ю., Семёнова Н.Ю., Еренков И.О. Гипоплазии позвоночных артерий у детей: наблюдения, прогнозы // Учёные записки СПбГМУ им. И.П. Павлова.;2011. № 2. С. 139–140.
9. Чупин А.В., Калинин А.А., Лебедев Д.П., Малютина Е.Д., Зайцев М.В. Сочетанное хирургическое лечение посттравматической аневризмы подключичной артерии, осложнившейся эмболией в артерии верхней конечности //Ангиология и сосудистая хирургия, 2008, том14 № 2. Стр. 53–57.
10. Moroviae S., Skaric-Juric T., Demarin V. Vertebral artery hypoplasia: characteristics in a Croatian population sample // Acta clin croat. 2006. № 4. P. 325–329.

ULTRASOUND DIAGNOSIS OF ANEURYSM OF THE RIGHT SUBCLAVIAN ARTERY IN COMBINATION WITH UNILATERAL HYPOPLASIA OF THE VERTEBRAL ARTERY. CLINICAL CASE.

Milyukova A.A.
State Autonomous Institution of Public Health, City Clinical Hospital No. 8. Chelyabinsk.

The article presents a case of ultrasound diagnosis of an aneurysm of the right subclavian artery in a patient with hypoplasia of the right vertebral artery and a clinic of repeated cerebrovascular accidents such as TIA, aphasic disorder syndrome, and right-sided hemiparesis.

Keywords: ultrasound examination, aneurysm of the subclavian artery, hypoplasia of the vertebral artery, duplex scanning of the extracranial sections of the brachycephalic arteries, cerebrovascular accident

References

1. Amir Mohammad Khan Aneurysm of the left subclavian artery with rupture // Angiology and Vascular Surgery 2016 volume 22 No. 2 P. 165–167
2. Gaibov A.D., Sultanov D.D., Sadriev O.N. Diagnosis and principles of surgical treatment aneurysms of the branches of the aortic arch. // Cardiology and cardiovascular surgery. 2017;10(5) P. 58 63.
3. Dicheskul M. L., Kulikov V.P. Differential diagnosis of spasm and hypoplasia of the vertebral artery using ultrasound technology // Journal of Neurology and Psychiatry named after. S.S. Korsakova, 2011, No. 11 P. 42–45.
4. Kulikov V.P. Ultrasound diagnosis of vascular diseases. M: LLC Firma “Strom”, 2007, P. 455
5. Kulikov V.P. Fundamentals of ultrasound examination of blood vessels. Publishing house Vidar-M, 2015, p.179.
6. Nosenko E.M. Nosenko N.S. Davydova L.V. Ultrasound examination of arteries and veins of the upper extremities: Textbook.: Vidar-M Publishing House, 2020, pp. 84–86.
7. Ryazanov A.N., Soroka V.V., Nokhrin S.P., Mikhelson E.P., Magamedov I.D., Platonov S.A., Kiselev M.A. Successful treatment of false aneurysm of the subclavian artery/Bulletin of Surgery I.I. Grekova, 2019 volume 78 No. 2. Page. 69–72.
8. Smirnova Yu. Yu., Semenova N. Yu., Erenkov I.O. Hypoplasia of the vertebral arteries in children: observations, forecasts // Scientific notes of St. Petersburg State Medical University named after. I.P. Pavlova; 2011. No. 2. pp. 139–140.
9. Chupin A.V., Kalinin A.A., Lebedev D.P., Malyutina E.D., Zaitsev M.V. Combined surgical treatment of post-traumatic aneurysm of the subclavian artery, complicated by embolism in the artery of the upper limb // Angiology and Vascular Surgery, 2008, volume 14 No. 2. Page. 53–57.
10. Moroviae S., Skaric-Juric T., Demarin V. Vertebral artery hypoplasia: characteristics in a Croatian population sample // Acta clin croat. 2006. No. 4. R. 325–329.

Роль семейного врача в формировании здорового образа жизни и профилактики заболеваний

Демидова Лариса Витальевна,
к.м.н., доцент, кафедра профилактической медицины и здорового образа жизни, Астраханский ГМУ Минздрава России
E-mail: demidova.astra@mail.ru

Демидов Алексей Александрович,
д.м.н., профессор, кафедра госпитальной терапии, Астраханский ГМУ Минздрава России
E-mail: demidovfamily@rambler.ru

Соборук София Валентиновна,
студент, Астраханский ГМУ Минздрава России

Асадова Севухе Элимагаевна,
студент, Астраханский ГМУ Минздрава России

Бештаов Динислам Хамидович,
студент, Астраханский ГМУ Минздрава России

В статье описана сущность и ключевые черты семейной медицины. Представлены цели, задачи и функции семейной медицины. Описаны предпосылки перехода к новой форме оказания медицинских услуг населению в нашей стране. Сделан вывод о том, что внедрение категории «семейная медицина» в отечественное здравоохранение позволило восстановить утраченный ранее личностный подход. Семейный врач имеет дело с людьми, погруженными в контекст жизненных обстоятельств, а пациент перестал восприниматься как набор симптомов или патологий. Отмечается, что важнейшим отличием профессионального профиля врача общей практики (семейного врача) от узконаправленных специалистов является акцент на образовательном и профилактическом векторе деятельности. Повышение уровня информированности и знаний пациентов является одной из ключевых задач семейного врача. Представлено предположение о том, что формирование и поддержание культуры питания населения должно входить в компетентностную сферу семейного врача. Сделан акцент на необходимости реформирования медицинских вузов в плане изменения в системе подготовки медицинских работников и привития им целостного видения здоровья пациента как совокупности соматических, психических, социальных, акмеологических, нравственных аспектов.

Ключевые слова: семейный врач, врач общей практики, здоровый образ жизни, педагогическая компетенция, пропаганда, акмеология, поведенческий паттерн, вредные привычки, семья, гуманизация, автономия пациента, культура питания.

Несколько десятилетий назад к функционерам системы здравоохранения России пришло осознание того, что приверженность традиционному подходу к здравоохранению и медицине более не способно разрешить задачи, стоящие перед современным обществом. Возникла потребность в обновлении механизмов и структур в сфере здравоохранения. На сегодняшний день во главу угла ставится здоровьесберегающая стратегия, основанная на социальной ценности здоровья личности и идее ответственного отношения каждого человека за свое здоровье [10, с. 117].

По данным Всемирной организации здоровья, состояние здоровья человека на 70–80% определяется его собственным отношением и образом жизни. Следовательно, на долю факторов, которые человек не может изменить самостоятельно, приходится не более 20–30%. При этом большинство привычек и поведенческих паттернов людей формируется в семье. Следовательно, именно семья должна стать ключевым объектом внимания органов и учреждений здравоохранения. В данной связи изучение вопросов, связанных со здоровьем семьи в контексте практики семейных врачей, а также акмеологических основ деятельности семейный врачей представляется нам весьма актуальным.

Семейная медицина как индикатор гуманизации системы здравоохранения страны

Семейная медицина представляет собой систему теоретических и прикладных знаний о здоровье семьи и лечебно-профилактической помощи населению, основанную на т.н. семейном принципе. Семья в рамках подобного подхода представляется основной биосоциальной структурой, которая определяет состояние здоровья каждого из ее членов и в последствии – состояние здоровья будущих поколений [5, с. 9].

Семейная медицина в нашей стране стала новой формой организации первичной медико-санитарной помощи, которая оказывается врачом общей практики (семейным врачом). Семейный врач обеспечивает индивидуальное первичное и непрерывное обслуживание лиц, семей и населения в целом. Переход к семейной медицине стал результатом реформирования национальной системы здравоохранения, направленного на эффективизацию и оптимизацию медицинской помощи. Семейный врач обладает интегральным видением здоровья человека, он способен наблюдать пациентов в кругу близких людей, идентифицировать причины заболеваний на основе анализа

семейных привычек и условий жизни семейного коллектива.

Безусловно, множество медицинских проблем возникают по причине деструкции акмеологических установок других членов семьи; обратное также верно – большинство семейных проблем связано с проблемами медицинского характера. Болезнь одного из членов семьи становится кризисом для других ее членов, и именно семейный врач способен вовремя рассмотреть и предотвратить нарастание патологических социальных, коммуникативных и медицинских тенденций внутри конкретной семьи.

Возникновение категории «семейная медицина» в отечественной медицине позволило вернуть российскому здравоохранению утраченный личностный подход, что, в свою очередь, благотворно повлияло на гуманизацию здравоохранения в целом. Отечественная медицина вплоть до середины XX в. развивалась в контексте интегрального подхода, но затем реформирование здравоохранения привело к чрезвычайно узкой специализации врачей. Внедрение практики узкоспециализированной помощи вместо общемедицинской привело к тому, что целостное восприятие пациента была утрачено, и узкие специалисты занимались лечением исключительно «своей» области компетенций. Выявить болезни на ранее стадии и тем более – организовать профилактику – было практически невозможно [1, с. 9].

Внедрение в работу системы здравоохранения врачей общей практики (семейных врачей) позволило не только обеспечить целостность и непрерывность наблюдения, но и разгрузить узких специалистов и других врачей амбулаторно-поликлинического звена, освободив их от целого ряда лечебно-диагностических процедур, профилактических и оздоровительных мероприятий.

В лице семейного врача семейный коллектив приобретает, собственно, медицинского специалиста, а также психолога, социолога, консультанта, гигиениста. Личностный подход к пациентам позволяет семейным врачам своевременно предотвращать развитие опасных заболеваний, персонализировать стратегии лечения и, что особенно важно, повысить доверие пациентов к медицинским работникам и системе здравоохранения в целом.

Возвращаясь к вопросу о гуманизации медицины как основному преимуществу и причине внедрения практики семейных врачей, следует отметить, что семейный врач имеет дело с людьми, погруженными в контекст жизненных обстоятельств. Пациент перестал восприниматься как набор симптомов или патологий, и врач стал «лечить больного, а не болезнь» [11, с. 110].

Вторым принципом, который считается фундаментальным в области семейной медицины, выступает автономия воли пациента. Расширение спектра знаний, навыков и возможностей пациентов является актуальной задачей семейного врача. Пациент может и долен принимать на себя ответственность за собственные жизненные выборы, а врач может лишь скорректировать выбранную пациентом траекторию [11, с. 110].

Образовательная компетенция семейного врача

Одним из важнейших отличий профессионального профиля врача общей практики (семейного врача) от узконаправленных специалистов является акцент на образовательном и профилактическом векторе деятельности [6, с .8].

Семейный врач обладает возможностью наблюдать за пациентами в течение длительного времени, что, в свою очередь, позволяет ему идентифицировать факторы риска развития хронических заболеваний или указать на деструктивные поведенческие паттерны членов семьи. Семейный врач, в отличие от других медицинских специалистов, имеет все возможности и ресурсы для установления доверительных отношений с пациентами; он, кроме того, может использовать свой авторитет при разъяснении опасности факторов риска развития заболевания [6, с. 9].

Семейный врач должен предоставлять пациентам достоверную и актуальную информацию о диагностированных заболеваниях, вариантах лечения, прогнозах и возможных осложнениях. Важно, чтобы информация была представлена в понятной форме, чтобы пациент мог принять осознанное решение относительно своего здоровья. Врач также должен объяснять цели и механизмы действия назначенных лекарственных препаратов, возможные побочные эффекты и важность соблюдения режима приема.

Важной частью образовательной деятельности семейного врача является консультирование по вопросам профилактики заболеваний, наряду с разъяснением необходимости вакцинации, проведения скрининговых обследований для раннего выявления заболеваний (онкологических, сердечно-сосудистых) и эффективного управления хроническими состояниями (например, гипертония, диабет).

Отметим также геронтологический аспект в деятельности семейного врача. Во многих странах мира, в том числе и в России, имеет место тенденция к старению населения. Существенное увеличение доли лиц пожилого и старческого возраста обусловливает то, что среди пациентов семейных врачей оказывается все большее число пожилых лиц [9, с. 1604].

Семейный врач играет ключевую роль в пропаганде здорового образа жизни среди пациентов. Это включает информирование о правильном питании, физической активности, отказе от вредных привычек, о ментальном здоровье. В документации, фиксирующей основные положения реализации программы обязательного медицинского страхования, представлен достаточно объемный перечень компетенций и обязанностей семейных врачей в области профилактики заболеваний, информирования и образования населения: пропаганда здорового образа жизни, привитие навыков по предупреждению факторов риска, консалтинг в области аддикций, обучение родителей правилам воспитания детей, популяризация активного образа жизни, консультирование в области правильного питания, санитарии и личной гигиены, предупре-

ждение стресса, травматизма, инфекционных заболеваний, передающихся половым путем [4, с. 32]. При этом нельзя сводить информирование о здоровом образе жизни лишь к основным его аспектам: отказа от алкоголя, физической активности. Здоровый образ жизни подразумевает отказ от злоупотребления газированными напитками, искоренение привычки позднего засыпания, несоблюдения режима сна в целом и т.д. [14, с. 606].

Реализация и развитие образовательной компетенции семейного врача возможны лишь при наличии развитых коммуникативных навыков. В задачи семейного врача входит эффективное взаимодействие с пациентами, их семьями и знакомыми: врач должен уметь выслушивать пациентов, объяснять медицинские термины и процедуры понятным языком, консультировать по вопросам здоровья и мотивировать пациентов к следованию медицинским рекомендациям.

В контексте вышеописанного принципа автономии пациента можно отметить, что повышение уровня информированности и знаний пациентов является одной из ключевых задач семейного врача. Данное направление деятельности семейного врача важно для повышения самостоятельности пациентов в отношении их собственного здоровья, улучшения соблюдения предписанных лечебных и профилактических мероприятий.

Культура питания как важнейший компонент акмеологических мероприятий

Категорию «культура питания» можно определить как устоявшиеся паттерны пищевого поведения, которые обусловливают ценностный выбор человека в пользу сохранения здоровья, поддержания работоспособности [3, с. 14]. Термин «культура питания», по мнению ученых, имеет социологическую направленность, так как «выступает маркером социально-групповой идентификации и является ключом к пониманию различий рутинных пищевых практик стратификационных общностей» [3, с. 14].

Формирование и поддержание культуры питания населения должно, на наш взгляд, входить в компетентностную сферу семейного врача. Так, к примеру, в некоторых семьях распространены нездоровые пищевые привычки, которые впоследствии перенимаются детьми и таким образом ретранслируются через поколения [13, с. 1506]. Врач должен учитывать состав семьи пациента: так, в частности, при проживании супругов с детьми и/или родителями имеют место семейные трапезы, и все члены семьи питаются одинаковой пищей и с одинаковой частотой. В ситуации отдельного проживания мужчины чаще питаются вне дома или готовят т.н. «мужскую пищу» (мясные, острые блюда, шашлыки, полуфабрикаты). Женщины, в свою очередь, более склонны к легкой, диетической пище, но при этом, по статистика, чаще изматывают свой организм жесткими диетами или даже страдают от расстройств пищевого поведения. Все эти факторы следует учитывать семейному врачу при проведении консультационных мероприятий.

Семья, которую «обслуживает» врач, должна получать от него знания о токсикогенном потенциале продуктов питания, о болезнетворных бактериях, вирусах, паразитах, канцерогенов. Особое внимание следует уделять избыточному потреблению напитков с большим содержанием сахара, жареной пищи, фастфуда, трансжиров.

Семейный врач, наблюдая за динамическими изменениями в комплекции членов семьи, может назначать диетотерапию – даже если изначально обращение к нему было связано с иными проблемами. Более того, многие болезни могут быть излечены именно посредством диеты: речь в первую очередь идет о хроническом гастрите, язвенном гастрите, ожирении, холецистите, панкреатите и проч. [12, с. 43].

Обучение врачей в контексте новой парадигмы оказания медицинской помощи

Как указывают многие исследователи и врачи, практику семейной медицины в нашей стране едва ли можно назвать развитой в том плане, что социально-психологический, акмеологический и профилактический аспекты зачастую игнорируются как врачами, так и пациентами.

Коренной перелом в решении проблемы оздоровления населения возможен исключительно при условии изменений в системе подготовки медицинских работников и привития им целостного видения пациента и его здоровья как совокупности соматических, психических, социальных, акмеологических, нравственных аспектов [10, с. 118].

Безусловно, семейный врач должен занимать авторитетную позицию наставника, эксперта, советчика, в связи с чем ему требуется развивать не только профессиональную (медицинскую) компетенцию, но и компетенцию педагогическую. Педагогическая культура семейных врачей на современном этапе должна проявляться в интеллигентности и гуманистическом подходе – «в противовес авторитарнобюрократическим отношениям с пациентами» [10, с. 120]. Основными параметрами педагогической культуры семейного врача являются «активная личностная позиция, широкий профессиональный кругозор, новое медицинское мышление, высокая компетентность в сфере профессиональной и педагогической деятельности, подлинный профессионализм» [10, с. 120]. Данная направленность личности является одним из важнейших условий успешной работы системы здравоохранения [8, с. 117].

Специалисты новой формации должны обладать, помимо знаний фармацевтического, диагностического характера, а также навыков в области неотложной помощи, также знаниями и умениями в санологии, валеологии, деонтологии и психологии. При этом, как показывает изучение образовательной практики отечественных медицинских

вузов, изучение всех этих вопросов либо не входит в программы обучения студентов высшей медицинской школы, либо представлено в усеченном виде [7, с. 2].

В заключение следует отметить, что семейный врач должен не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и самому являться примером здоровьесберегающего поведения. Едва ли врач может требовать от пациента выполнения лечебно-профилактических рекомендаций при условии игнорирования их самим врачом [2, с. 110]. Следовательно, перед медицинскими вузами стоит, помимо прочих, задача по формированию акмеологических ценностей будущих медицинских специалистов.

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам:

– Семейная медицина – совокупность теоретических и прикладных знаний о здоровье семьи и лечебно-профилактической помощи. Семейная медицина стала новой формой организации первичной медико-санитарной помощи, которая оказывается семейным врачом. Возникновение категории «семейная медицина» в отечественной медицине позволило реализовать личностный подход к здравоохранению.
– Важнейшим отличием профессионального профиля врача общей практики (семейного врача) от узконаправленных специалистов является акцент на образовательном и профилактическом векторе деятельности. Повышение уровня информированности и знаний пациентов является одной из ключевых задач семейного врача.
– Формирование культуры питания – важнейший компонент акмеологических мероприятий, проводимых семейным врачом.
– Решение проблемы оздоровления населения возможно исключительно при условии изменений в системе подготовки медицинских работников и привития им целостного видения пациента и его здоровья как совокупности соматических, психических, социальных, акмеологических, нравственных аспектов.

Литература

1. Денисов, И.Н. Семья как пациент / И.Н. Денисов, Е.И. Черниенко // Ремедиум. – 2008. – № 1. – С. 8–10.
2. Дорофеев, А.Л. Значение авторитета и личного примера врача в формировании здоровьесберегающего поведения населения / А.Л. Дорофеев, С.П. Павлова, Т.В. Могила, А.Л. Югай, В.В. Дубинина, Е.В. Прохорец // Дальневосточный медицинский журнал. – 2014. – № 2. – С. 106–111.
3. Журавлева, Л.А. Качество питания населения как показатель продовольственной безопасности страны / Л.А. Журавлева, Е.В. Зарубина, А.В. Ручкин, Н.Н. Симачкова, И.П. Чупина // Образование и право. – 2021. – № 11. – С. 11–17.
4. Зарбаилова, Н.К. Профессиональный стандарт врача общей практики/семейного врача в контексте возросшего бремени заболеваний / Н.К. Зарбаилова // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко. – 2017. – № 5. – С. 29–35.
5. Кича, Д.И. Совершенствование общей врачебной (семейной) практики и оценки здоровья семьи / Д.И. Кича, Н.В. Стуров, Д.В. Пискунов // Трудный пациент. – 2020. – № 10. – С. 8–11.
6. Кузнецова, О.Ю. Введение в семейную медицину / О.Ю. Кзнецова // Российский семейный врач. – 2007. – № 2. – С. 8–19.
7. Малова, Т. В. К вопросу о формировании профилактической направленности в работе врача общей практики / Т.В. Малова, Л.П. Шелудько, С.С. Сороко и др. // Journal of Siberian Medical Sciences. – 2007. – № 3. – 3 с.
8. Милехин, С.М. Приоритетная направленность личности молодого врача на профессиональную сферу жизни и решение профессиональных задач / С.М. Милехин, Д.П. Дербенев, Д.А. Орлов // Вестник РУДН. Серия: Медицина. – 2019. – № 1. – С. 115–127.
9. Николаева, И.В. Опыт реформирования первичного звена здравоохранения в условиях демографических тенденций увеличения среднего возраста населения / И.В. Николаева, Н.И. Жернакова, Т.Ю. Лебедев, А.А. Москалев // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2021. – № 6. – С. 1601–1606.
10. Пасмурова, Л.Э. Педагогическая подготовка семейного врача / Л.Э. Пасмурова // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2007. – № 3 (4). – С. 114–120.
11. Раджабов, Р.М. Семейная медицина как новый этап развития охраны здоровья населения / Р.М. Раджабов // Синергия. – 2017. – № 2. – С. 108–115.
12. Расулова, М.И. Режим и рацион питания лиц пожилого возраста с хроническими гастритами в практике семейных врачей / М.И. Расулова // Re-health journal. – 2022. – № 4 (16). – С. 41–43.
13. Расулова, Н.Ф. Изучения роль семейного врача в профилактике ожирения среди населения / Н.Ф. Расулова, Ш.Б. Назаров, Ф.М. Исмаилова // SAI. – 2023. – № 8. – С. 1505–1507.
14. Эшонова, М.Э. Подготовка врачей общей практики к формированию у населения основ здорового образа жизни / М.Э. Эшонова, Г.Н. Эгамбердиева // Мировая наука. – 2020. – № 1 (34). – С. 604–607.

THE ROLE OF THE FAMILY DOCTOR IN THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE AND DISEASE PREVENTION

Demidova L.V., Demidov A.A., Soboruk S.V., Asadova S.E., Beshtaov D.Kh.
Astrakhan State Medical University of the Ministry of Health of Russia

The article describes the essence and key features of family medicine. The goals, objectives and functions of family medicine are presented. The prerequisites for the transition to a new form of providing medical services to the population in our country are described. It is concluded that the introduction of the category "family medicine" into domestic healthcare made it possible to restore the previously lost personal approach. The family doctor deals with people immersed in the context of life circumstances, and the patient is no longer perceived as a set of symptoms or pathologies. It is noted that the most important difference between the professional profile of a general practitioner (family doctor) and highly specialized specialists is the emphasis on the educational and preventive vector of activity. Increasing patient awareness and knowledge is one of the key tasks of a family doctor. The assumption is presented that the formation and maintenance of a nutritional culture among the population should be included in the competence of a family doctor. Emphasis is placed on the need to reform medical universities in terms of changes in the training system of medical workers and instilling in them a holistic vision of the patient and his health as a set of somatic, mental, social, acmeological, and moral aspects.

Keywords: family doctor, general practitioner, healthy lifestyle, pedagogical competence, propaganda, acmeology, behavioral pattern, bad habits, family, humanization, patient autonomy, nutrition culture

References

1. Denisov, I.N. Family as a patient / I.N. Denisov, E.I. Chernienko // Remedium. – 2008. – No. 1. – P. 8–10.
2. Dorofeev, A.L. The importance of the authority and personal example of a doctor in the formation of health-saving behavior of the population / A.L. Dorofeev, S.P. Pavlova, T.V. Mogila, A.L. Yugai, V.V. Dubinina, E.V. Prokhorets // Far Eastern Medical Journal. – 2014. – No. 2. – pp. 106–111.
3. Zhuravleva, L.A. Quality of nutrition of the population as an indicator of the country's food security / L.A. Zhuravleva, E.V. Zarubina, A.V. Ruchkin, N.N. Simachkova, I.P. Chupina // Education and right. – 2021. – No. 11. – pp. 11–17.
4. Zarbailova, N.K. Professional standard of a general practitioner/ family doctor in the context of an increased burden of disease / N.K. Zarbailova // Bulletin of the National Research Institute of Public Health named after N.A. Semashko. – 2017. – No. 5. – pp. 29–35.
5. Kicha, D.I. Improving general medical (family) practice and assessing family health / D.I. Kicha, N.V. Sturov, D.V. Piskunov // Difficult patient. – 2020. – No. 10. – P. 8–11.
6. Kuznetsova, O. Yu. Introduction to family medicine / O. Yu. Kznetsova // Russian family doctor. – 2007. – No. 2. – P. 8–19.
7. Malova, T.V. On the issue of developing a preventive focus in the work of a general practitioner / T.V. Malova, L.P. Sheludko, S.S. Soroko, etc. // Journal of Siberian Medical Sciences. – 2007. – No. 3. – 3 s.
8. Milekhin, S.M. Priority focus of the personality of a young doctor on the professional sphere of life and solving professional problems / S.M. Milekhin, D.P. Derbenev, D.A. Orlov // Vestnik RUDN. Series: Medicine. – 2019. – No. 1. – pp. 115–127.
9. Nikolaeva, I.V. Experience in reforming primary health care in the context of demographic trends in increasing the average age of the population / I.V. Nikolaeva, N.I. Zhernakova, T. Yu. Lebedev, A.A. Moskalev // Problems of social hygiene, health care and history of medicine. – 2021. – No. 6. – P. 1601–1606.
10. Pasmurova, L.E. Pedagogical training of a family doctor / L.E. Pasmurova // Pedagogical-psychological and medical-biological problems of physical culture and sports. – 2007. – No. 3 (4). – pp. 114–120.
11. Radzhabov, R.M. Family medicine as a new stage in the development of public health / R.M. Radzhabov // Synergy. – 2017. – No. 2. – pp. 108–115.
12. Rasulova, M.I. Diet and diet of elderly people with chronic gastritis in the practice of family doctors / M.I. Rasulova // Re-health journal. – 2022. – No. 4 (16). – pp. 41–43.
13. Rasulova, N.F. Studying the role of the family doctor in the prevention of obesity among the population / N.F. Rasulova, Sh.B. Nazarov, F.M. Ismailova // SAI. – 2023. – No. 8. – pp. 1505–1507.
14. Eshonova, M.E. Training of general practitioners to form the foundations of a healthy lifestyle among the population / M.E. Eshonova, G.N. Egamberdieva // World Science. – 2020. – No. 1 (34). – pp. 604–607.

Совершенствование диагностики и лечения экссудативных средних отитов в детском возрасте

Вергасов Азамат Мустафаевич,
аспирант кафедры оториноларингологии, пластической хирургии с курсом ДПО, Ставропольский государственный медицинский университет
E-mail: wracezes@mail.ru

Аскарова Умукусум Ражихановна,
студент, Астраханский государственный медицинский университет
E-mail: AskUmukusum1999@bk.ru

Мусаева Максалина Бекмурзаевна,
студент, Астраханский государственный медицинский университет
E-mail: maksalina2023m@icloud.com

Саламова Раяна Руслановна,
студент, Ставропольский государственный медицинский университет
E-mail: salamovarayana1@gmail.com

Экссудативный средний отит (ЭСО) – распространенное заболевание у детей, при котором в среднем ухе скапливается жидкость в отсутствии признаков активного инфекционного процесса.
Современные методы диагностики ЭСО включают отоскопию, тимпанометрию, акустическую рефлектометрию и аудиометрию. Каждый из этих методов обладает своими преимуществами и ограничениями, но в комплексе они позволяют достичь высокой точности диагностики.
Отоскопия, будучи одним из самых простых и доступных методов, позволяет врачу визуально оценить состояние барабанной перепонки и среднего уха. Тимпанометрия предоставляет объективные данные о подвижности барабанной перепонки и давлении в среднем ухе, что помогает выявить наличие жидкости. Акустическая рефлектометрия, основанная на измерении отраженных звуковых сигналов, позволяет оценить акустический импеданс среднего уха. Аудиометрия, кроме того, открывает возможности точности определения уровня слуха и выявления характера нарушения слуха.
В статье также описаны подходы к лечению, включая медикаментозную терапию, установку вентиляционных трубок и аденоидэктомию. Освещаются перспективы и инновационные направления в диагностике и лечении ЭСО, направленные на улучшение результатов и снижение инвазивности процедур. Статья подчеркивает важность своевременной диагностики и комплексного подхода к лечению, что позволяет предотвратить осложнения и улучшить качество жизни детей, страдающих этим заболеванием.

Ключевые слова: экссудативный средний отит, диагностика, дети, оториноларингология.

Введение

Экссудативный средний отит (ЭСО) – одно из наиболее распространенных детских заболеваний, особенно часто поражающее детей в возрасте от шести месяцев до трех лет. Это состояние характеризуется накоплением серозной или слизистой жидкости в полости среднего уха без признаков острой инфекции. Часто возникая после перенесенного острого среднего отита или на фоне дисфункции евстахиевой трубы, ЭСО может существенно влиять на качество жизни ребенка, вызывая снижение слуха, что в конечном счете может привести к задержке речевого и когнитивного развития.

Значительная распространенность данной патологии среди детей делает проблему диагностики и лечения этого заболевания крайне актуальной. По данным различных исследований, 9 из 10 детей возрастом до семи лет хотя бы раз сталкивались с этим заболеванием. В отсутствие своевременной диагностики и адекватного лечения может переходить в хроническую форму, приводить к персистирующим нарушениям слуха и развитию хронических инфекционных процессов в среднем ухе.

Целью нашего исследования является изучение новых методов диагностики и лечения ЭСО у детей, а также обсуждение перспективных и инновационных подходов в этой области. Введение новых диагностических технологий и терапевтических стратегий направлено на улучшение клинических исходов и снижение инвазивности процедур, что особенно важно в педиатрической практике.

Материалы и методы

Для поиска были выбраны электронные базы данных PubMed, ScienceDirect, Embase, Elibrary. Использовались следующие поисковые запросы: «экссудативный средний отит», «диагностика отита», «лечение отита». Никаких ограничений на статус публикации не налагалось. Статьи на английском и русском языках были отобраны до мая 2024 года включительно.

Результат и обсуждения

В основу диагностики заболеваний наружного и среднего уха положен визуальный осмотр, который может быть дополнен отоскопией. Этот метод позволяет врачу визуально оценить состояние барабанной перепонки и среднего уха с помощью специального инструмента – отоскопа [1]. При осмотре барабанной перепонки через отоскоп врач оценивает следующие характеристики (табл. 1).

Таблица 1

Характеристики барабанной перепонки	Картина при экссудативном среднем отите
Цвет	Барабанная перепонка может быть мутной, желтоватой или синеватой
Положение	При наличии жидкости в среднем ухе барабанная перепонка может быть выпуклой или втянутой
Прозрачность	Непрозрачная или мутная
Подвижность	Подвижность снижена или отсутствует из-за наличия жидкости за барабанной перепонкой
Пузырьки или уровень жидкости	Их наличие является прямыми признаками экссудативного среднего отита

Тимпанометрия является важным диагностическим инструментом, используемым для оценки состояния среднего уха и функциональности барабанной перепонки у детей с подозрением на экссудативный средний отит (ЭСО). Этот метод помогает определить наличие жидкости в среднем ухе, оценить подвижность барабанной перепонки и проходимость евстахиевой трубы. Принцип работы основан на измерении импеданса (сопротивления) среднего уха при изменении давления в наружном слуховом проходе. Измерение проводится с использованием тимпанометра – специального прибора, который создает вариации давления и записывает отклик барабанной перепонки

Особенно полезным методом диагностики при подозрении на экссудативный средний отит у детей является акустическая рефлектометрия. Принцип метода основан на измерении степени отражения звуковой волны от барабанной перепонки при изменении акустического импеданса (сопротивления) среднего уха. Когда в среднем ухе присутствует жидкость, акустический импеданс изменяется, что влияет на характер отраженных звуковых волн. При нормальной рефлектометрии акустическое отражение от барабанной перепонки будет низким, поскольку среднее ухо с воздухом имеет низкий импеданс. При наличии жидкости в среднем ухе импеданс повышается, что приводит к более высокому отражению звукового сигнала. Жидкость в среднем ухе препятствует прохождению звука и увеличивает сопротивление.

Преимуществами акустической рефлектометрии является ее неинвазивность, объективность, безболезненность, быстрота и простота выполнения. Однако, трудности в проведении заключаются в анатомических особенностях и необходимости в неподвижности маленьких пациентов [2].

Лечение ЭСО направлено на устранение жидкости из среднего уха, восстановление слуха и предотвращение рецидивов. К основным методам лечения относятся медикаментозная терапия, включая применение противовоспалительных и антигистаминных препаратов, антибиотикотерапия при подозрении на бактериальную инфекцию, а также хирургические вмешательства, такие как миринготомия с установкой вентиляционных трубок и аденоидэктомия. В последние годы активно разрабатываются и внедряются новые методы лечения, также при использовании современных дренажных систем и иммуномодуляторов [3].

Ранняя диагностика и вовремя назначенное лечение среднего отита с выпотом значительно улучшают прогноз заболевания. Лечение зависит от стадии заболевания и включает в себя санацию верхних дыхательных путей (ВДП) и восстановление носового дыхания у всех пациентов. Это положительно влияет на существующую дисфункцию слуховой трубки, что, несомненно, полезно.

При катаральной стадии ЭСО применяются санация ВДП и курс консервативного лечения для восстановления функции трубы. Если необходимо хирургическое вмешательство, через месяц рекомендуется провести аудиологическое обследование, чтобы оценить степень потери слуха пациента и тип тимпанограммы. Если потеря слуха сохраняется, а тимпанограммы остаются типа С, курс консервативного лечения дисфункции слуховой трубы следует повторить.

Во время секреторной фазы верхние дыхательные пути также могут быть продезинфицированы (если это еще не было сделано), с последующей миринготомией и возможным введением вентиляционной трубки. Если хирургическое вмешательство по поводу санации ВДП не показано, возможно проведение курса консервативного лечения. В таких случаях может быть назначено хирургическое лечение, если консервативный подход неэффективен. Во время операции оценивается стадия процесса. На более поздних стадиях экссудат может быть легко и полностью удален из среднего уха с помощью миринготомии.

На мукозной стадии проводят санацию путем одновременного шунтирования барабанной полости и тимпанотомии, с ревизией при необходимости, если невозможно удалить густые выделения с помощью миринготомии.

На фиброзной стадии тактика лечения аналогична применяемой на предыдущей стадии – также удаляются очаги тимпаносклероза и мобилизуются цепочки слуховых косточек.

Курс консервативного лечения ЭСО у детей обычно включает продувание евстахиевых труб по методу Политцера, пневмомассаж барабанной перепонки, катетеризацию устья евстахиевой трубы с введением лекарственных препаратов (чаще всего муколитиков, антимикробных и противовоспалительных препаратов) у детей старшего возраста с анемией евстахиевой трубы, кинезиотерапию, использование местных CS (кортикостероидов), а также других методов лечения, таких как процедура с переменным током, физиотерапевтические процедуры (внутривенный электрофорез с йодистым калием и ацетилцистеином) и др.

В дополнение к перечисленным методам лечения существуют хирургические методы, такие как лазерная тимпаностомия и тимпанопунктура. Другим методом является дренирование барабанной

полости, которое включает в себя тимпанотомию, во время которой дренажная трубка вводится под меатальный лоскут в специально отведенный участок кости наружного слухового прохода.

Для хирургического вмешательства на хрящевой части слуховой трубы при хронических обструктивных заболеваниях было разработано эндоскопическое трансназальное лазерное вмешательство, известное как «лазерная тубопластика» (Laser Eustachian Tuboplasty, LETP). Этот метод основан на избирательном разрушении (испарении) отечных тканей в области задней стенки слуховой трубы [4].

По данным литературы современные исследования направлены на разработку более точных методов диагностики и менее инвазивных методов лечения. Важными направлениями являются:

- Разработка новых биомаркеров: идентификация специфических маркеров воспаления и инфекции, позволяющих быстро и точно диагностировать ЭСО.
- улучшение техники тимпанометрии: совершенствование приборов для повышения точности диагностики.
- новые методы дренирования: разработка более эффективных и комфортных для пациента систем дренажа среднего уха.
- генетические исследования: изучение генетических предрасположенностей к развитию ЭСО для ранней диагностики и профилактики [5].

Заключение

ЭСО, наблюдаемый у детей, требует своевременной диагностики и комплексного подхода к лечению. Своевременная диагностика и адекватное лечение экссудативного среднего отита у детей имеют решающее значение для предотвращения развития хронических форм заболевания и улучшения качества жизни маленьких пациентов. Современные методы диагностики и инновационные подходы к лечению позволяют достичь высоких клинических результатов и минимизировать риски осложнений. Комплексный подход к ведению детей с ЭСО, основанный на использовании передовых технологий и достижений медицинской науки, является ключом к успешному решению этой распространенной и значимой проблемы.

Литература

1. Новожилов А.А., Шилягин П.А., Шахов А.В., Геликонов В.М. Обзор современных методов диагностики экссудативного среднего отита. Вестник оториноларингологии. 2020; 85 (3): 68–74.
2. Давыдов А. В., Литвак М.М. Современный подход к диагностике и лечению экссудативного среднего отита. Российская оториноларингология. 2007: 54–58.
3. Крюков А.И., Ивойлов А.Ю., Пакина В.Р., Яновский В.В., Сударев П.А. Экссудативный средний отит в детском возрасте (этиопатогенез, диагностика и лечение). Доктор.Ру. 2012. № 8 (76).
4. Крюков А.И., Кунельская Н.Л., Ивойлов А.Ю., Кунельская В.Я., Пакина В.Р., Яновский В.В., Морозова З.Н. К вопросу о лечении экссудативного среднего отита в детском возрасте. Вестник оториноларингологии. 2020; 85 (1): 14–21.
5. Searight FT, Singh R, Peterson DC. Otitis Media With Effusion. 2023 May 20. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan.

IMPROVING THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDHOOD

Vergasov A.M., Askarova U.R., Musaeva M.B., Salamova R.R.
Stavropol State Medical University; Astrakhan State Medical University

Exudative otitis media (EO) is a common disease in children in which fluid accumulates in the middle ear in the absence of signs of an active infectious process.

Modern methods for diagnosing ESO include otoscopy, tympanometry, acoustic reflectometry and audiometry. Each of these methods has its own advantages and limitations, but together they make it possible to achieve high diagnostic accuracy.
Otoscopy, being one of the simplest and most accessible methods, allows the doctor to visually assess the condition of the eardrum and middle ear. Tympanometry provides objective data on eardrum mobility and pressure in the middle ear, which helps identify the presence of fluid. Acoustic reflectometry, based on the measurement of reflected sound signals, allows one to estimate the acoustic impedance of the middle ear. Audiometry, in addition, opens up the possibility of accurately determining the level of hearing and identifying the nature of hearing impairment.
The article also describes treatment approaches, including drug therapy, placement of ventilation tubes, and adenoidectomy. Prospects and innovative directions in the diagnosis and treatment of ESO are highlighted, aimed at improving results and reducing the invasiveness of procedures. The article emphasizes the importance of timely diagnosis and an integrated approach to treatment, which helps prevent complications and improve the quality of life of children suffering from this disease.

Keywords: exudative otitis media, diagnosis, children, otorhinolaryngology.

References

1. Novozhilov A.A., Shilyagin P.A., Shakhov A.V., Gelikonov V.M. Review of modern methods for diagnosing exudative otitis media. Bulletin of otorhinolaryngology. 2020; 85 (3): 68–74.
2. Davydov A.V., Litvak M.M. Modern approach to the diagnosis and treatment of exudative otitis media. Russian otorhinolaryngology. 2007: 54–58.
3. Kryukov A.I., Ivoilov A.Yu., Pakina V.R., Yanovsky V.V., Sudarev P.A. Exudative otitis media in childhood (etiopathogenesis, diagnosis and treatment). Doctor.Ru. 2012. No. 8 (76).
4. Kryukov A.I., Kunelskaya N.L., Ivoilov A.Yu., Kunelskaya V. Ya., Pakina V.R., Yanovsky V.V., Morozova Z.N. On the issue of treatment of exudative otitis media in childhood. Bulletin of otorhinolaryngology. 2020; 85 (1): 14–21.
5. Searight FT, Singh R, Peterson DC. Otitis Media With Effusion. 2023 May 20. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan.

Влияние уровня содержания витамина D на успеваемость студентов медицинского факультета

Галаева Зарета Шерваниевна,
студент ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
E-mail: zaretta.galaeva2@mail.ru;

Гатагажева Малика Магомедовна,
к.м.н., доцент кафедры «Акушерство и гинекология», медицинский факультет, ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
E-mail: mira76@list.ru;

Барахоева Тамара Сафарбековна,
студент Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
E-mail: tamara.b2002@mail.ru

Костоева Хади Якубовна,
студент ФГБОУ ВО ДГМУ
E-mail: kk.khadi@mail.ru

Исследование влияния витамина в настоящее время приобретает особое значение, поскольку, по статистическим данным, гиповитаминоз D имеется почти у 1/2 населения мира. В данной статье представлены данные, касающиеся обеспеченности холекальциферолом студентов нашего региона, воздействие его на память, внимание, а соответственно и на успеваемость студентов.

Ключевые слова: витамин, студент, дефицит, эргокальциферол, холекальциферол.

Витамин D представляет собой гормоноподобное вещество, вырабатывающееся в коже человека под воздействием солнечных лучей [1]. Витамин D не синтезируется в организме самостоятельно, необходимо его поступление с пищей в виде эргокальциферола (D2), из которого в нижних слоях эпидермиса под воздействием УФ лучей образуется холекальциферол (D3) [2]. Далее провитамин проходит трансформацию в печени, из которого под влиянием ферментов образуется кальцидиол (25(OH)D), а затем в почках гидроксилируется в свою активную форму – стероидный гормон кальцитриол (1,25 $(OH)_2D$). Дальнейшая судьба данного вещества – превращение в неактивную форму кальцитроевую кислоту и выведение из организма с желчью [3].

История изучения влияния витамина Д на организм человека берет начало в XX в. На сегодняшний день не вызывает сомнений роль дефицита данного витамина в развитии многих социально-значимых заболеваний [4]. Согласно статистическим данным, в 2020–2021 гг. дефицит витамина Д отмечался у более 55% граждан России [4]. Особенно актуально изучение уровня витамина Д у молодого поколения, так как уровень его напрямую коррелирует с функциями центральной нервной системы [5]. Снижение уровня витамина Д сильно сказывается на образовательном процессе молодого подрастающего поколения, ведущего активную умственную деятельность.

Данный витамин принимает участие в процессе деления клеток, регуляции фосфорно-кальциевого обмена с абсорбцией их в 12-перстной кишке и реабсорбцией в почках, принимает участие в синтезе дофамина и серотонина, в противовоспалительных реакциях организма на инфекционные процессы, рост и укрепление костной ткани и эмали зубов [6]. Благодаря синтезу белков происходит укрепление иммунитета и повышение защитных свойств организма. Витамин Д участвует в подавлении активности роста опухолевых клеток, что приводит к замедлению развития онкологических заболеваний. Нормальные значения уровня витамина Д в организме человека также снижают риск развития таких социально значимых заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия и другие.

Витамин D оказывает влияние на процесс формирования молекул, окружающих синапсы, так называемые перинейрональные сети в гиппокампе – области мозга, отвечающей за память. То есть устанавливает прочные связи между нейронами головного мозга, стимулируя все виды когнитивных функций, особенно мышление, память, вни-

мание. Усиливается познавательная способность, нормализуется психосоматический фон. Участвуя в синтезе нейротрансмиттера ГАМК, витамин D оказывает седативное и ноотропное действие. Также важное значение имеет участие витамина D в синтезе дофамина, оказывающий влияние на эмоциональный фон, способность к обучению, внимание и даже простые движения. Контролируется то, как мы испытываем удовольствие, удовлетворение, каким образом мы ищем поощрения и как реагируем на них, что особенно важно для студентов.

Для выявления степени недостаточности уровня витамина Д среди учащихся высших учебных заведений нашего региона нами было проведено исследование уровня витамина Д в крови у студентов 3 групп общей численностью 124 человек. Гиповитаминоз быль выявлен у 108 участников исследования (рис. 1).



Рис. 1. Степень гиповитаминоза среди участников исследования

На следующем этапе исследования нами было проведено анонимное анкетирование на выявление основных признаков гиповитаминоза Д у участников исследования с уровнем витамина Д в крови ниже референтных значений. Анкетирование состояло из 27 вопросов, направленных на выявление основных проблем студентов, связанных с недостаточным содержанием уровня данного вещества в крови. После завершения анкетирования проводился анализ результатов исследования.

Анализ анкетирования студентов подтвердил, что успеваемость студентов с гиповитаминозом Д недостаточно высокая. При ответе на вопрос, связанный с успешностью учебного процесса большинство исследованных отметили низкую успеваемость (рис. 2). Только 14 (11%) участников исследования ответили на вопрос об успешности учебы хорошо, 18 (15%) участников исследования ответили, что у них средний уровень успешности учебного процесса, 92 человек (74%) ответили, что считают уровень своего образования низким.



Рис. 2. Успешность учебы среди участников исследования с гиповитаминозом

На вопросы о том, насколько часто употребляют в пищу молочные продукты и морепродукты, более половины (61%) студентов отметили, что в их рационе данных продуктов недостаточно. Также анкетирование позволило выявить, что частой проблемой студентов с гиповитаминозом Д является кариес. 87 (70%) участников исследования ответили, что кариес зубов развивается часто.

Анкетирование позволило также установить, что студенты с гиповитаминозом Д плохо спят ночью, часто страдают от бессонницы, а также бывают сонными и усталыми в течение рабочего дня. Студенты с гиповитаминозом отметили слабый аппетит, в связи с чем организм недополучает ряд питательных веществ и элементов, необходимых для полноценного функционирования организма человека.

Был установлено, что студентов с гиповитаминозом Д беспокоит повышенная раздражительность и нервозность, более половины опрошенных отметили у себя данные признаки (рис. 3).



Рис. 3. Раздражительность, депрессия, тревожность у реципиентов с гиповитаминозом Д

Также было выявлено, что студенты с гиповитаминозом Д плохо запоминают учебный материал. На вопросы анкеты на выявление данного симптома 102 (82%) участников исследования ответили положительно.

На вопрос о том, с чем связаны проблемы в учебе, ответы участников исследования разошлись. 46 (37%) участников исследования отметили, что это связано с плохой памятью, 65 (53%) участников связывают свои проблемы в учебе с быстрой утомляемостью и снижением работоспособности в связи с этим. 12 (10%) участников исследования отметили, что данные проблемы связаны с ленью, которую тяжело перебороть (рис. 4).



Рис. 4. Причина плохой учебы реципиентов

Многие из участников исследования не проводили ранее контроль витамина Д в крови и в связи с этим не знали о его недостатке в организме. Основной проблемой многих студентов является недостаточно активное пребывание на солнце в связи с занятостью на учебе и отсутствие контроля уров-

ня данного вещества в крови. Вопрос о том, насколько часто студенты гуляют на свежем воздухе вызвал неоднозначные ответы у участников исследования, среди которых преобладающее большинство реципиентов прогуливаются редко.

Дефицит витамина вызывает серьезные нарушения в работе гиппокампа, снижается память, нарушается адекватное восприятие действительности, возможны резкие перепады настроения, длительные депрессии, хроническая усталость, высокая утомляемость, снижение концентрации внимания, неусидчивость, вплоть до суицидальных мыслей, шизофрении, болезни Паркинсона, Альцгеймера и СДВГ.

Оптимальная суточная доза витамина до сих пор точно не определена. Считается, что максимально допустимой дозой является 15 мкг (600 МЕ). Однако, многие специалисты считают, что организму человека требуется гораздо большая доза, вплоть до 4000 МЕ и больше. Поступает провитамин D в организм преимущественно с морской рыбой (сельдь, лосось, сардина, тунец), с печенью, яичным желтком, любыми молочными продуктами. Иногда принимают в виде пищевых добавок и рыбьего жира, которые наши участники исследования принимают в недостаточном количестве.

Заключение. На основании проведенного исследования, мы пришли к выводу, что достаточное количество витамина D защищает от нейродегенерации и поддерживает функции мозга. Именно поэтому для достаточного поступления эргокальциферола в организм необходимо больше питаться качественными морепродуктами, кисломолочными продуктами, свежими яичными желтками и чаще проводить время под открытыми солнечными лучами. Необходимо периодически проверять уровень витамина Д в крови, чтоб своевременно проводить необходимые мероприятия по восстановлению его уровня в крови. Соблюдение этих простых правил гарантирует вам здоровую жизнь, хорошее настроение и конечно же успехи в учебе и работе.

Литература

1. Малявская С.И., Кострова Г.Н., Лебедев А.В. Уровни витамина D у представителей различных групп населения города Архангельска // Экология человека. – 2018. – Т. 356. – № 1. – С. 60–64.
2. Петрушкина А.А., Пигарова Е.А., Рожинская Л.Я. Эпидемиология дефицита витамина D в Российской Федерации // Остеопороз и остеопатии. – 2018. – Т. 21. – № 3. – С. 15–20. https://doi.org/10.14341/osteo10038.
3. Al Mheid I, Quyyumi AA. Vitamin D and cardiovascular disease: Controversy unresolved. J. Am. Coll. Cardiol. 2017;70:89–100.
4. Полуэктова А.Ю., Мартынова Е.Ю., Фатхутдинов И.Р., и др. Генетические особенности чувствительности к витамину D и распространенность дефицита витамина D среди пациентов поликлиники // РМЖ. – 2018. – № 1. – С. 11–17. https://doi.org/10.32364/2618–8430–2018–1–1–11–17
5. Berridge MJ. Vitamin D deficiency and diabetes. Biochem J. 2017;474(8):1321–1332. https://doi.org/10.1042/BCJ20170042.
6. Gaksch M, Jorde R, Grimnes G, et al. Vitamin D and mortality: Individual participant data meta-analysis of standardized 25-hydroxyvitamin D in 26916 individuals from a European consortium. PLoS One. 2017;12(2): e0170791. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170791.

THE INFLUENCE OF VITAMIN D LEVELS ON THE ACADEMIC PERFORMANCE OF MEDICAL STUDENTS

Galaeva Z.Sh., Gatagazheva M.M., Barakhoeva T.S., Kostoeva Kh.Ya.
Ingush State University, First Moscow State Medical University named after. THEM. Sechenova, FSBEI HE DSMU

The study of the influence of the vitamin is currently of particular importance, since, according to statistics, hypovitaminosis D is present in almost 1/2 of the world's population. This article presents data regarding the provision of cholecalciferol to students in our region, its impact on memory, attention, and, accordingly, on students' academic performance.

Keywords: vitamin, student, deficiency, ergocalciferol, cholecalciferol.

References

1. Malyavskaya S.I., Kostrova G.N., Lebedev A.V. Vitamin D levels in representatives of various population groups of the city of Arkhangelsk // Human Ecology. – 2018. – T. 356. – No. 1. – P. 60–64.
2. Petrushkina A.A., Pigarova E.A., Rozhinskaya L. Ya. Epidemiology of vitamin D deficiency in the Russian Federation // Osteoporosis and Osteopathy. – 2018. – T. 21. – No. 3. – pp. 15–20. https://doi.org/10.14341/osteo10038.
3. Al Mheid I, Quyyumi AA. Vitamin D and cardiovascular disease: Controversy unresolved. J. Am. Coll. Cardiol. 2017;70:89–100.
4. Poluektova A.Yu., Martynova E.Yu., Fatkhutdinov I.R., et al. Genetic features of sensitivity to vitamin D and the prevalence of vitamin D deficiency among clinic patients // Breast Cancer. – 2018. – No. 1. – pp. 11–17. https://doi.org/10.32364/2618–8430–2018–1–1–11–17
5. Berridge MJ. Vitamin D deficiency and diabetes. Biochem J 2017;474(8):1321–1332. https://doi.org/10.1042/BCJ20170042.
6. Gaksch M, Jorde R, Grimnes G, et al. Vitamin D and mortality: Individual participant data meta-analysis of standardized 25-hydroxyvitamin D in 26916 individuals from a European consortium. PLoS One. 2017;12(2): e0170791. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170791.

Вольная борьба как форма физической активности

Магомедов Магомед Шахбанович,
старший преподаватель кафедры физического воспитания, Высшая школа социально-гуманитарных наук, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
E-mail: Magomedov.MS@rea.ru

Магомедов Бекбулат Шахбанович,
преподаватель Института физической культуры и спорта, Московский государственный строительный университет
E-mail: magomedov.bekbulat@bk.ru

Бетмирзаев Аслан Адланович,
старший преподаватель кафедры физического воспитания, Высшая школа социально-гуманитарных наук, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
E-mail: betmirzaev.aa@rea.ru

Салаватов Кемран Арсенович,
старший преподаватель кафедры физического воспитания, Высшая школа социально-гуманитарных наук, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
E-mail: Salavatov.KA@rea.ru

Статья исследует феномен вольной борьбы как формы физической активности и социокультурного явления. Авторы анализируют историю развития вольной борьбы, её роль в спорте и обществе, а также влияние на здоровье и психологию участников. В статье также рассматриваются техники и стратегии вольной борьбы, особенности тренировок и методики обучения. Исследование проводится на основе анализа литературы, статистических данных и экспертных мнений, что позволяет выявить ключевые аспекты данного вида спорта и его значение для общества.

Ключевые слова: вольная борьба, физическая активность, спорт, общество, здоровье, психология, техники, стратегии, тренировки, методики обучения, статистические данные.

Физическая активность и спорт играют значительную роль как в здоровье и благополучии людей, так и в социокультурном развитии общества в целом. Вольная борьба, являясь одной из древнейших, очень увлекательный вид спорта, привлекает внимание исследователей своей уникальной комбинацией физических и психологических аспектов. Этот вид спорта не только способствует развитию физической выносливости и силы, но также требует от спортсменов стратегического мышления, тактической гибкости и психологической устойчивости.

Несмотря на богатую историю и традиции вольной борьбы, современные методики обучения и тренировок в этом виде спорта продолжают эволюционировать, стремясь к достижению оптимальных результатов и выдающихся спортивных достижений. В данной статье мы предлагаем рассмотреть различные аспекты вольной борьбы, начиная от ее исторического значения и социокультурного влияния до современных техник тренировок, стратегий соревнований и психологических подходов к достижению успеха в этом захватывающем виде спорта.

История вольной борьбы

- Вольная борьба, или борьба по правилам фристайл и греко-римской борьбы, имеет древние корни и богатую историю. Ее происхождение уходит в глубокую древность, когда поединки между людьми были не только способом разрешения конфликтов, но и способом показать свою физическую силу и ловкость. Вольная борьба была частью олимпийских игр древности и с тех пор стала одним из самых популярных видов спорта в мире.
- Со временем вольная борьба стала эволюционировать, принимая новые правила, техники и подходы к тренировкам. Современные соревнования по вольной борьбе представляют собой захватывающий спектакль, где спортсмены демонстрируют свою физическую мощь, ловкость и тактическое мастерство.

Социокультурное значение вольной борьбы

Вольная борьба имеет огромное социокультурное значение в различных культурах и обществах. Она не только способствует развитию физических качеств у спортсменов, но также формирует дисциплину, выносливость, силу воли и чувство справедливости. Вольная борьба учит спортсменов бороться до конца, преодолевать трудности и стремиться к достижению поставленных целей.

Современные методики обучения и тренировок в вольной борьбе сочетают в себе передовые научные подходы, инновационные технологии и традиционные методы. Тренеры и специалисты по физической подготовке постоянно работают над улучшением техник, тактики и стратегий вольной борьбы, чтобы помочь спортсменам достичь выдающихся результатов на международном уровне.

Кроме технических аспектов, современные методики обучения и тренировок в вольной борьбе также уделяют большое внимание физической подготовке спортсменов. Это включает в себя разнообразные упражнения для развития силы, выносливости, гибкости и скорости, которые необходимы для успешного выступления на соревнованиях.

Помимо этого, психологическая подготовка играет важную роль в тренировочном процессе. Тренеры помогают спортсменам развивать ментальную устойчивость, концентрацию, уверенность в себе и способность к принятию решений в стрессовых ситуациях.

Система соревнований и рейтингов позволяет спортсменам проверять свои навыки на практике и стремиться к постоянному улучшению результатов. Регулярные сборы, международные турниры и соперничество с лучшими спортсменами со всего мира способствуют повышению уровня подготовки и профессионализма.

Таким образом, современные методики обучения и тренировок в вольной борьбе направлены на комплексное развитие спортсменов, чтобы помочь им достичь выдающихся результатов на мировой арене и продолжить славную традицию этого великого спорта.

Вольная борьба имеет потенциал для дальнейшего развития и расширения своего влияния в мире спорта. Вот несколько возможных перспектив развития этого вида спорта:

1. Популяризация и коммерциализация: Продвижение вольной борьбы на международном уровне может привлечь больше внимания зрителей и спонсоров. Это может способствовать увеличению призовых фондов, повышению профессионализма спортсменов и росту популярности среди молодежи.
2. Развитие инфраструктуры: Создание современных тренировочных центров, арен и спортивных комплексов способствует улучшению условий для тренировок и соревнований по вольной борьбе. Это поможет привлечь больше талантливых спортсменов и повысить уровень соревнований.
3. Инновации в тренировочном процессе: Применение новейших технологий, аналитики данных и методов тренировок может помочь спортсменам улучшить свои навыки, стратегию и физическую подготовку. Это может стимулировать конкуренцию и повысить уровень соревнований.
4. Расширение географии: Популяризация вольной борьбы в новых регионах и странах может способствовать разнообразию и конкуренции. Это также поможет привлечь новых талантливых спортсменов и разнообразить мировую картину вольной борьбы.
5. Социальная значимость: Вольная борьба как вид спорта способствует воспитанию дисциплины, самоконтроля, уважения к сопернику и другим ценностям. Продвижение этих ценностей может помочь привлечь больше людей к этому виду спорта и повысить его социальную значимость.

Вольная борьба, как и любой другой вид спорта, оказывает разнообразное воздействие на организм спортсмена. Вот некоторые из основных аспектов влияния вольной борьбы на организм:

- Физическая нагрузка: Вольная борьба требует от спортсмена высокой физической подготовки. Борьба активизирует работу сердечно-сосудистой системы, улучшает выносливость и силу мышц, развивает гибкость и координацию движений.
- Мышечная нагрузка: При выполнении бросков, захватов и других приемов вольной борьбы задействуются различные группы мышц, что способствует их укреплению и развитию. Это также помогает улучшить мышечную выносливость и силу.
- Кардиоваскулярная система: Интенсивные тренировки и соревнования по вольной борьбе улучшают работу сердца и кровеносных сосудов, повышают кровообращение и кислородопотребление организма.
- Улучшение общей физической формы: Регулярные занятия вольной борьбой способствуют снижению процента жира в организме, улучшению общей физической формы и повышению общего здоровья спортсмена.
- Психологическое состояние: Вольная борьба требует от спортсмена высокой концентрации, стрессоустойчивости, самоконтроля и стратегического мышления. Тренировки и соревнования могут помочь развить психологическую устойчивость и уверенность в себе.
- Травмоопасность: В связи с интенсивностью контактов и физической нагрузкой, вольная борьба может быть связана с риском получения травм, таких как вывихи, растяжения или переломы. Поэтому важно правильно готовиться к тренировкам и соблюдать технику выполнения приемов.

Литература

1. Абдулхаков М.Р., Трапезников А.А. Бороться, чтобы побеждать. – М.: Просвещение, 1990. – 180с.
2. Белоглазов А.А. Повторная атака // Спортивная борьба: Ежегодник. – М., 1989. – С. 34–35
3. Зебзеев В.В. Тренировочная деятельность и контроль подготовки борцов учебное пособие – Чайковский: ЧГИФК, 2013. – 69 с
4. Зебзеев В.В., Лукина А.М. Система упражнений и биомеханические основы техники спор-

тивной борьбы учебное пособие – Чайковский: ЧГИФК, 2013. – 109 с.
5. Зекрин Ф.Х., Чедов К.В. Введение в специализацию «Теория и методика спортивной борьбы»: Учебное пособие. – Чайковский: ЧГИФК, 2010. – 105 с.
6. Копарацкий И.А., Грузный Г.М. Основы методики становления и совершенствования технико-тактического мастерства в классической борьбе. – Омск: Лукос, 1984. –214с.
7. Фомина Ю.С. Роль физической культуры в укреплении здоровья студентов // Сборник научных статей Поколение будущего: Взгляд молодых ученых. – 2020 г. – С. 299–302.
8. Ю.А.Шахмурадов, Вольная борьба. Научно-методические основы многолетней подготовки борцов. – М.: Высш. шк.,1997. – 189 с, ил.
9. Ю.А.Шахмурадов, Вольная борьба: Научно-методические основы многолетней подготовки борцов/ 2-е издание – Махачкала: ИД «Эпоха» – 2011 г.

FREESTYLE WRESTLING AS A FORM OF PHYSICAL ACTIVITY

Magomedov M.Sh., Magomedov B.Sh., Betmirzaev A.A., Salavatov K.A.
Russian Economic University named after. G.V. Plekhanov; Moscow State University of Civil Engineering

This article explores the phenomenon of freestyle wrestling as a form of physical activity and sociocultural phenomenon. The authors analyze the history of the development of freestyle wrestling, its role in sports and society, as well as the impact on the health and psychology of participants. The article also discusses freestyle wrestling techniques and strategies, training features and teaching methods. The research is carried out on the basis of an analysis of literature, statistical data and expert opinions, which allows us to identify key aspects of this sport and its importance for society.

Keywords: Freestyle wrestling, Physical activity, Sports, Society, Health, Psychology, Techniques, Strategies, Training, Teaching methods, Statistics.

References

1. Abdulkhakov M.R., Trapeznikov A.A. Fight to win. – M.: Education, 1990. – 180 p.
2. Beloglazov A.A. Repeated attack // Sports wrestling: Yearbook. – M., 1989. – P. 34–35
3. Zebzeev V.V. Training activities and control of the preparation of wrestlers training manual – Tchaikovsky: ChGIFK, 2013. – 69 p.
4. Zebzeev V.V., Lukina A.M. System of exercises and biomechanical foundations of wrestling techniques training manual – Tchaikovsky: ChGIFK, 2013. – 109 p.
5. Zekrin F.Kh., Chedov K.V. Introduction to the specialization “Theory and Methods of Wrestling”: Textbook. – Tchaikovsky: ChGIFK, 2010. – 105 p.
6. Koparatsky I.A., Gruzny G.M. Fundamentals of methods for developing and improving technical and tactical skills in classical wrestling. – Omsk: Lukos, 1984. –214 p.
7. Fomina Yu.S. The role of physical culture in strengthening the health of students // Collection of scientific articles Generation of the Future: The View of Young Scientists. – 2020 – pp. 299–302.
8. Yu.A.Shakhmuradov, Freestyle wrestling. Scientific and methodological foundations of long-term training of wrestlers. – M.: Higher. school, 1997. – 189 p., ill.
9. Yu.A. Shakhmuradov, Freestyle wrestling: Scientific and methodological foundations of long-term training of wrestlers / 2nd edition – Makhachkala: Publishing House “Epoch” – 2011.

Этнические особенности токсичности и эффективности периоперационной химиотерапии при раке желудка среди пациентов дагестанской и русской национальности

Каторова Антонина Васильевна,
ординатор ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава Росси
E-mail: tonya.katorova@mail.ru.

Садыкова Диана Исаевна,
ординатор ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

Обаревич Екатерина Сергеевна,
врач-онколог ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

Введение. Рак желудка является пятым по распространенности онкологическим заболеванием в мире. Комбинированное лечение позволило улучшить прогноз пациентов с диагнозом рак желудка. Одним из факторов, способных повлиять на переносимость и эффективность химиотерапии, является этническое происхождение человека.
Цель работы – проанализировать токсичность и эффективность периоперационной химиотерапии при раке желудка в зависимости от этнической принадлежности пациента.
Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование, включающее пациентов, имеющих локализованный, либо место-распространенный рак желудка, получивших комбинированное лечение. Было проанализировано 100 случаев. В качестве периоперационной химиотерапии использовались режимы FLOT и FOLFIRINOX. Хирургическое вмешательство выполнялось через 4–6 недель после завершения первого блока периоперационной химиотерапии. Операционный материал направлялся на гистологическое исследование, где определялась степень лечебного патоморфоза по Mandard. Токсичность химиотерапии оценивалась по классификации CTCAE.
Результаты. В группе дагестанцев достоверно чаще (p-value = 0,019) регистрировалась тошнота и диарея (p-value = 0,048). Также значительно чаще в группе дагестанцев регистрировалась астения и нейтропения, однако статистическая значимость не была достигнута (p-value = 0,090 и p-value = 0,091), вероятно, вследствие ограниченности выборки пациентов. В группе дагестанцев также значительно чаще выявлялась редукция доз химиопрепаратов (p-value = 0,009). Также в группе дагестанцев реже отмечался выраженный лечебный патоморфоз, несколько чаще слабо выраженный лечебный патоморфоз в сравнении с группой русских. Однако, различия между группами дагестанцев и русских оказались статистически недостоверными (p-value = 0,592).
Выводы. Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что этническая принадлежность пациента может влиять на токсичность и переносимость химиотерапии и подтверждают необходимость проведения более крупных проспективных исследований в данном направлении.

Ключевые слова: рак желудка, этнические особенности, токсичность, дагестанцы, химиотерапия, эффективность, фармакоэтничность.

Введение

Рак желудка является пятым по распространенности онкологическим заболеванием и третьей по распространенности причиной смерти от рака во всем мире [1]. Ежегодно во всем мире диагностируется около 1 миллиона новых случаев рака желудка [2]. В настоящее стандартом лечения локализованного и местно-распространенного рака желудка является комбинированное лечение (периоперационная химиотерапия + хирургическое лечение). Комбинированное лечение позволило улучшить прогноз пациентов с диагнозом рак желудка, так как результаты хирургического лечения без проведения химиотерапии оставались не удовлетворительными [3]. Пятилетняя выживаемость пациентов с диагнозом рак желудка, перенесших только хирургическое вмешательство, составляет от 23% до 49% в западных странах и около 70% в восточных странах [4]. В настоящее время публикуется все больше рандомизированных клинических исследований, которые показывают, что периоперационная химиотерапия может улучшить прогноз пациентов с диагнозом рак желудка [2,3,6,7].

Среди многочисленных схем периоперационной химиотерапии применение схемы FLOT, включающей фторурацил, лейковорин, оксалиплатин и доцетаксел в лечении рака желудка началось относительно недавно [10]. Первое крупное исследование было проведено в 2016 году, где протокол FLOT продемонстрировал лучшую безопасность и эффективность, чем эпирубицин, цисплатин и схемы фторурацила или капецитабина у пациентов с диагнозом рак желудка [11]. Эффективность и безопасность химиотерапии в режиме FLOT в последствие была продемонстрирована в множестве клинических исследований [12,13].

Также проводились исследования, в которых оценивалась эффективность и переносимость периоперационной химиотерапии в режиме FOLFIRINOX [14]. Результаты оказались сопоставимы с результатами лечения по схеме FLOT.

При назначении химиотерапии основной целью является определение дозы препарата с наибольшей эффективностью при минимизации побочных эффектов. Однако, некоторые индивидуальные различия могут играть решающую роль в варьировании фармакологической эффективности, побочных эффектов, реакций гиперчувствительности и лекарственных взаимодействий, несмотря на получение одинаковых химиотерапевтических доз. Одним из факторов, способных повлиять на пе-

реносимость химиотерапии, является этническое происхождение человека. Различия в фармакокинетических и фармакодинамических свойствах наблюдаются между этническими популяциями, что может влиять на терапевтические результаты [15]. Термин «фармакоэтничность» включает в себя изучение негенетических и генетических факторов, которые влияют на различия в реакции на лекарственные препараты или токсичности в зависимости от этнической принадлежности человека. В течение последнего десятилетия достижения в области фармакогеномики позволили выявить генетические полиморфизмы в экспрессии и/или активности мишеней влияющих на эффективность и переносимость химиотерапии в зависимости от этнической принадлежности человека [16]. Изменения в фармакокинетике могут быть вызваны вариациями частот аллелей и типов аллельных вариантов ядерных рецепторов, транспортеров и ферментов, метаболизирующих лекарственные средства, у лиц разного этнического происхождения [17,18]. Эти изменения также могут привести к резистентности к химиотерапии [19]. Генетическая фармакоэтническая принадлежность может быть решающим фактором, способствующим различиям, наблюдаемым в химиотерапевтических клинических исходах у лиц различного этнического происхождения. В настоящий момент опубликованы исследования, в которых было показано, что популяционные различия влияют на эффективность лечения и токсичность [20]. Несколько исследований доказали различия в ответе на химиотерапевтические препараты у разных этнических групп, а также различия в клинических исходах [21].

Целью данной работы является оценка частоты возникновения и выраженности токсичности периоперационной химиотерапии в различных этнических группах при локализованном и местнораспространенном раке желудка. Определение эффективности периоперационной химиотерапии в различных этнических группах. А также оценка зависимости выраженности патоморфологического ответа от редукции доз препаратов.

Материалы и методы

Было проведено ретроспективное исследование, включающее пациентов, имеющих локализованный, либо место-распространенный рак желудка, получивших комбинированное лечение (8 курсов периоперационной химиотерапии в режиме FLOT/FOLFIRINOX, хирургическое вмешательство) в период с 01.01.2021 года по 31.12.2023 года. Было проанализировано 100 случаев: 50 пациентов русской национальности, 50 пациентов дагестанской национальности. Пациенты, включенные в исследование, были отобраны случайным образом из общей выборки. Для включения в исследование использовались следующие критерии: 1) гистологически верифицированный рак желудка; 2) стадия заболевания T>1N0M0, ТлюбоеN1–3M0 (TNM 8-й редакции); 3) проведение комбинированного лечения (ХТ в режимах FLOT/FOLFIRINOX, хирургическое вмешательство); 3) этническая принадлежность к группе русских/дагестанцев. Все пациенты получали лечение на базе НМИЦ Н.Н. Блохина. Все пациенты перед началом лечения были обследованы в полном объеме: гастроскопия с эндосонографией и биопсией опухоли, КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза с двойным контрастированием (в редких случаях – ПЭТ-КТ), диагностическая лапароскопия с цитологическим исследованием смывов с брюшины. В качестве периоперационной химиотерапии использовались режимы FLOT и FOLFIRINOX. Режим FLOT: доцетаксел 50 мг/м2 внутривенно в 1 день, оксалиплатин 85 мг/м2 внутривенно в 1 день, лейковорин 200 мг/м2 внутривенно в 1 день и фторурацил 2600 мг/м2 в виде 24-часовой внутривенной инфузии начиная с 1 дня. Цикличность – каждые 2 недели. Режим FOLFIRINOX: иринотекан 180 мг/м2 внутривенно в 1 день, оксалиплатин 85 мг/м2 внутривенно в 1 день, лейковорин 400 мг/м2 внутривенно в 1 день и фторурацил 250–400 мг/м2 внутривенно струйно + 2200–2400 мг/м2 в виде 48-часовой внутривенной инфузии начиная с 1 дня. Цикличность – каждые 2 недели. Периоперационная химиотерапия включала в себя восемь курсов, четыре из которых проводились предоперационно (1 блок), четыре – после хирургического вмешательства (2 блок). После четырех курсов предоперационной химиотерапии проводилось контрольное обследование: КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза с двойным контрастированием, гастроскопия с эндосонографией. В случае выявления отрицательной динамики в виде увеличения первичной опухоли, либо регионарных лимфатических узлов выполнялась диагностическая лапароскопия с цитологическим исследованием смывов с брюшины. Хирургическое вмешательство выполнялось через 4–6 недель после завершения первого блока периоперационной химиотерапии. Операционный материал направлялся на гистологическое исследование, где определялась степень лечебного патоморфоза по Mandard. Второй блок химиотерапии начинали через 4–12 недель после хирургического вмешательства. Токсичность химиотерапии оценивалась по классификации CTCAE – National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events [22].

Статистический анализ материала проводился с помощью программы IBM SPSS Statistics 23, а также электронных таблиц Microsoft Office Excel. Для оценки достоверности различий использовался тест $\chi 2$, для выявления корреляции – точечная двухрядная корреляция. Критерии были выбраны исходя из типа данных: для оценки достоверности различий данные были представлены в виде частот; для подсчета корреляции – наличие редукции доз было представлено в виде дихотомической переменной, выраженность лечебного патоморфоза – в виде рангов. Полученные в процессе исследования результаты представлены в виде относительных и абсолютных величин. При проверке нулевых гипотез

критическое значение уровня статистической значимости принималось равным 0,05.

Результаты

Средний возраст пациентов в группе дагестанцев составил 57,4 года, в группе русских 55,6 лет. Группа дагестанцев включала 35 мужчин и 15 женщин (70% и 30% соответственно), группа русских – 30 мужчин и 20 женщин (60% и 40% соответственно). В группе дагестанцев химиотерапию в режиме FLOT получил 31 пациент, в режиме FOLFIRINOX – 19 пациентов, в группе русских 27 и 23 пациента соответственно (табл. 1).

Таблица 1. Токсичность химиотерапии

	Дагестанцы (группа 1) n=50			Русские (группа 2) n=50			p-value
Степень токсичности	***1–2***	***3***	***4***	***1–2***	***3***	***4***	
Тошнота	21 (42%)	10 (20%)	0	13 (26%)	3 (6%)	0	**0,019**
Рвота	3 (6%)	0	0	1 (2%)	0	0	0,307
Астения	14 (28%)	16 (32%)	0	36 (72%)	1 (2%)	0	0,090
Полинейропатия	11 (22%)	0	0	6 (12%)	0	0	0,409
Диарея	11 (22%)	4 (8%)	0	11 (22%)	0	0	**0,048**
Нейтропения	12 (24%)	6 (12%)	6 (12%)	6 (12%)	12 (24%)	1 (2%)	0,091
Анемия	4 (8%)	0	0	3 (6%)	0	0	0,362
Гепатотоксичность	4 (8%)	1 (2%)	0	4 (8%)	0	0	0,356

В группе дагестанцев достоверно чаще (p-value = 0,019) регистрировалась тошнота: у 21 пациента 1–2 степени (42%), у 10 пациентов (20%) – 3 степени, в группе русских у 13 пациентов (26%) – 1–2 степени и всего у 3 пациентов (6%) – 3 степени выраженности. Также в группе дагестанцев достоверно чаще (p-value = 0,048) отмечалось возникновение диареи: у 11 пациентов (22%) – 1–2 степени, у 4 пациентов (8%) – 3 степени выраженности, против 11 пациентов (22%) в группе русских 1–2 степени, диарея 3 степени в группе руских не регистрировалась. Также значительно чаще в группе дагестанцев регистрировалась астения и нейтропения, однако статистическая значимость не была достигнута (p-value = 0,090 и p-value = 0,091), вероятно, вследствие ограниченности выборки пациентов.

У трех пациентов из группы дагестанцев и у двух пациентов из группы русских по данным контрольного обследования после первого блока периоперационной химиотерапии выявлено прогрессирование заболевания. У одного пациента из группы дагестанцев во время первого блока химиотерапии возникла аллергическая реакция в виде анафилактического шока, в результате чего пациент умер.

Перенос курса вследствие выраженной токсичности был у 11 пациентов из группы дагестанцев и у 11 пациентов из группы русских (по 22% соответственно). У 17 пациентов из группы дагестанцев (34%) и 6 пациентов из группы русских (12%) была редукция доз (p-value = 0,009) (табл. 2).

Таблица 2. Лечебный патоморфоз (Mandard)

	Дагестанцы (группа 1) n=46	Русские (группа 2) n=48
TRG – 1	7 (15,2%)	7 (14,6%)
TRG – 2	4 (8,7%)	10 (20,8%)
TRG – 3	10 (21,8%)	9 (18,8%)
TRG – 4	20 (42%)	18 (37,5%)
TRG – 5	5 (10,9%)	4 (8,3%)
p-value	**0,592**	

Из представленной выше таблицы можно видеть, что в группе дагестанцев реже отмечался выраженный лечебный патоморфоз (TRG – 1, TRG – 2) у 7 (15,2%) и 4 (8,7%) соответственно, против 7 (14,6%) и 10 (20,8%) в группе русских. В то же время в группе дагестанцев чаще отмечался слабо выраженный лечебный патоморфоз (TRG – 4, TRG – 5) у 20 (42%) и 5 (10,9%) соответственно, против 18 (37,5%) и 4 (8,3%) в группе русских. Однако, различия между группами дагестанцев и русских оказались статистически недостоверными (p-value = 0,592).

Обсуждение

Факторы, влияющие на различия в переносимости и эффективности химиотерапии в различных этнических группах, являются достаточно сложными и широко обсуждаются в литературе. Фармакогенетика продемонстрировала, что часть межпациентской вариабельности фармакокинетики и исходов терапии рака обусловлена полиморфным разнообразием генов, участвующих в распределении лекарственных препаратов или активации/деактивации таргетных путей. На данный момент опубликовано множество научных исследований, доказывающих различия в фармакокинетике различных химиотерапевтических препаратов в зависимости от этнической принадлежности пациента. Доказано, что на токсичность фторурацила оказывает влияние дефицит дигидропиримидиндегидрогеназы (DPD), который значительно чаще выявляется у афроамериканцев [23]. Дефицит данного фермента приводит к снижению скорости катаболизма метаболитов фторурацила, что приводит к значительному повышению токсичности данного препарата у лиц с дефицитом дигидропиримидиндегидрогеназы. Также, были оценены межэтнические различия с ферментом-мишенью фторурацила и других антиметаболитов и тимидилатсинтазой (TS) Несмотря на то, что клиническое значение гиперэкспрессии TS при различных видах рака несколько неоднозначно [24–25], генетические изменения, регулирующие уровни TS, коррелируют с развитием токсичности фторурацила [26], доклинические исследования показали, что гиперэкспрессия TS придает опухоли резистентность к фторурацилу [27], а популяционные исследования показывают, что регуляция TS этнически дивергентна [28–29]. Несмотря на то, что вышеупомянутые исследования подчеркивают идею о том, что полиморфизмы зародышевой линии в ключевых генах могут объяснять межэтнические различия в токсичности и, возможно, ответе на антиметаболиты, включая фторурацил, взаимодействие между этими полиморфизмами и роль других, пока еще не открытых полиморфизмов, остается не полностью объясненным. Выявление генетических вариантов, оказывающих влияние на токсичность химиотерапевтических препаратов, может благоприятно повлиять на лечение рака и внедрить более широкое применение персонализированной медицины. Фармакоэтнические различия могут идентифицировать особенно информативные популяции, в которых можно начать поиск детерминант генетической восприимчивости. Также повышение осведомленности о фармакоэтнических факторах может информировать клиницистов и пациентов о существующих различиях в токсичности химиопрепаратов при оказании онкологической помощи. Признание широкого влияния фармакоэтнической принадлежности в терапии рака имеет важное значение для открытия и разработки лекарственных препаратов во всем мире. Понимание этнических различий часто затруднено из-за необходимости участия в клинических исследованиях больших и разнообразных групп населения. Однако, осознание важности фармакоэтнической принадлежности может улучшить переносимость и эффективность химиотерапии для всех групп населения и будет способствовать прогрессу в достижении конечной цели: индивидуализации химиотерапии на основе уникального генетического состава человека.

Выводы

Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что этническая принадлежность пациента к той или иной группе может влиять на токсичность и переносимость химиотерапии. В группе дагестанцев достоверно чаще регистрировалась тошнота и диарея. Также значительно чаще в группе дагестанцев регистрировалась астения и нейтропения, однако статистическая значимость не была достигнута, вероятно, вследствие ограниченности выборки пациентов. Достоверно чаще в группе дагестанцев также отмечалась редукция доз, вызванная токсичностью химиотерапии. Выраженный лечебный патоморфоз (TRG – 1, TRG – 2), чаще отмечался в группе русских, однако статистическая значимость не была достигнута. Данное исследование помогает более полноценно понимать особенности различных этнических групп в переносимости химиотерапии и подтверждает необходимость проведения более крупных проспективных исследований в данном направлении.

Литература

1. Smyth E.C., Nilsson M., Grabsch H.I., et al. Gastric cancer. Lancet. 2020;396(10251):635–648. doi:10.1016/S0140-6736(20)31288-52.
2. Venerito M., Ford A.C., Rokkas T., et al. Review: prevention and management of gastric cancer. Helicobacter. 2020;25(Suppl S1): e12740. doi:10.1111/hel.127403.
3. Wang F.H., Shen L., Li J., et al. The Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO): clinical guidelines for the diagnosis and treatment of gastric cancer. Cancer Commun. 2019;39(1):10. doi:10.1186/s40880–019–0349–94.
4. Rausei S., Lianos G.D.. Treatment of gastric cancer. Cancers. 2020;12 (9):9. doi:10.3390/cancers120926275.

5. Ilson D.H.. Advances in the treatment of gastric cancer. Curr Opin Gastroenterol. 2020;36(6):525–529. doi:10.1097/ MOG.00000000000006796.
6. Wang X-Z., Zeng Z-Y., Ye X., et al. Interpretation of the development of neoadjuvant therapy for gastric cancer based on the vicissitudes of the NCCN guidelines. World J Gastrointest Oncol. 2020;12 (1):37–53. doi:10.4251/wjgo.v12.i1.377.
7. Petrillo A., Smyth E.C.. Multimodality treatment for localized gastric cancer: state of the art and new insights. Curr Opin Oncol. 2020;32 (4):347–355. doi:10.1097/CCO.00000000000006308.
8. Zhao Q., Lian C., Huo Z., et al. The efficacy and safety of neoadjuvant chemotherapy on patients with advanced gastric cancer: a multicenter randomized clinical trial. Cancer Med. 2020;9(16):5731–5745. doi:10.1002/cam4.32249.
9. Yan Y., Yang A., Lu L., et al. Impact of neoadjuvant therapy on minimally invasive surgical outcomes in advanced gastric cancer: an International Propensity Score-Matched Study. Ann Surg Oncol. 2020. doi:10.1245/s10434-020-09070-910.
10. Kang Y-K., Cho H.. Perioperative FLOT: new standard for gastric cancer? Lancet. 2019;393(10184):1914–1916. doi:10.1016/ S0140-6736(18)33189-111.
11. Al-Batran S.E., Hofheinz R.D., Pauligk C., et al. Histopathological regression after neoadjuvant docetaxel, oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin versus epirubicin, cisplatin, and fluorouracil or capecita-bine in patients with resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4-AIO): results from the Phase 2 part of a multicentre, open-label, randomised phase 2/3 trial. Lancet Oncol. 2016;17(12):1697–1708. doi:10.1016/S1470-2045(16)30531-912.
12. Al-Batran S.E., Homann N., Pauligk C., et al. Effect of neoadjuvant chemotherapy followed by surgical resection on survival in patients with limited metastatic gastric or gastroesophageal junction cancer: the AIO-FLOT3 trial. JAMA Oncol. 2017;3(9):1237–1244. doi:10.1001/jamaoncol.2017.051513.
13. Al-Batran S.E., Homann N., Pauligk C., et al. Perioperative chemotherapy with fluorouracil plus leucovorin, oxaliplatin, and docetaxel versus fluorouracil or capecitabine plus cisplatin and epirubicin for locally advanced, resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4): a randomised, phase 2/3 trial. Lancet. 2019;393(10184):1948–1957.
14. Седова М.В., Батов М.А., Вартанов Г.А., Коломейцева А.А., Хомяков В.М., Волченко Н.Н., Феденко А.А. Неоадъювантная химиотерапия по схеме FOLFIRINOX при резектабельном раке желудка: непосредственные и ближайшие результаты. Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. 2023;12(5):512.
15. Olafuyi O., Parekh N., Wright J., Koenig J.. Inter-ethnic differences in pharmacokinetics-is there more that unites than divides? Pharmacol Res Perspect. 2021; 9(6): e00890.
16. Yoon J.H., Park J.A., Kim E.K., Kang H.J., Shin H.Y., Ahn H.S.. Improvement of induction remission rate by modifying the dose of idarubicin for relapsed childhood acute lymphoblastic leukemia. J Korean Med Sci. 2009; 24(2): 281–288.
17. Roden D.M., George A.L. Jr. The genetic basis of variability in drug responses. Nat Rev Drug Discov. 2002; 1(1): 37–44.
18. Syn N.L., Yong W.P., Lee S.C., Goh B.C.. Genetic factors affecting drug disposition in Asian cancer patients. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2015; 11(12): 1879–1892.
19. O'Donnell P.H., Dolan M.E.. Cancer pharmacoethnicity: ethnic differences in susceptibility to the effects of chemotherapy. Clin Cancer Res. 2009; 15(15): 4806–4814.
20. Ma B.B., Hui E.P., Mok T.S.. Population-based differences in treatment outcome following anticancer drug therapies. Lancet Oncol. 2010; 11(1): 75–84.
21. Shigematsu H., Lin L., Takahashi T., et al. Clinical and biological features associated with epidermal growth factor receptor gene mutations in lung cancers. J Natl Cancer Inst. 2005; 97(5): 339–346.
22. Stark A.P., Ikoma N., Chiang Y.J. et al. Characteristics and Survival of Gastric Cancer Patients with Pathologic Complete Response to Preoperative Therapy. Ann Surg Oncol. 2019 Oct; 26 (11): 3602–3610. doi: 10.1245/s10434-019-07638-8. Epub 2019 Jul 26.
23. Mattison L.K., Fourie J., Desmond R.A., Modak A., Saif M.W., Diasio R.B.. Increased prevalence of dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency in African–Americans compared with Caucasians. Clin Cancer Res 2006;12:5491–5.
24. Pestalozzi B.C., Peterson H.F., Gelber R.D., et al. Prognostic importance of thymidylate synthase expression in early breast cancer. J Clin Oncol 1997;15:1923–31.
25. Popat S., Chen Z., Zhao D., et al. A prospective, blinded analysis of thymidylate synthase and p53 expression as prognostic markers in the adjuvant treatment of colorectal cancer. Ann Oncol 2006;17:1810–7.
26. Lecomte T., Ferraz J.M., Zinzindohoue F., et al. Thymidylate synthase gene polymorphism predicts toxicity in colorectal cancer patients receiving 5-fluorouracil-based chemotherapy. Clin Cancer Res 2004;10:5880–8.
27. Lee J.H., Park J.H., Jung Y., et al. Histone deacetylase inhibitor enhances 5-fluorouracil cytotoxicity by down-regulating thymidylate synthase in human cancer cells. Mol Cancer Ther 2006;5:3085–95.
28. Marsh S., Collie-Duguid E.S., Li T., Liu X., McLeod H.L.. Ethnic variation in the thymidylate synthase enhancer region polymorphism among Caucasian and Asian populations. Genomics 1999;58:310–2.
29. Marsh S., Ameyaw M.M., Githang'a J., Indalo A., Ofori-Adjei D., McLeod H.L.. Novel thymidylate

synthase enhancer region alleles in African populations. Hum Mutat 2000;16:528.

ETHNIC CHARACTERISTICS OF TOXICITY AND EFFECTIVENESS OF PERIOPERATIVE CHEMOTHERAPY FOR GASTRIC CANCER AMONG PATIENTS OF DAGESTAN AND RUSSIAN NATIONALITY

Katorova A.V., Sadykova D.I., Obarevich E.S.
N.I. Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Health of the Russia; N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology, Ministry of Health of Russia

*Introduction***.** Stomach cancer is the fifth most common cancer in the world. Combined treatment has improved the prognosis of patients diagnosed with stomach cancer. One of the factors that can affect the tolerability and effectiveness of chemotherapy is a person's ethnic origin.
Aim of the work is to analyze the toxicity and effectiveness of perioperative chemotherapy for gastric cancer, depending on the patient's ethnicity.
Materials and methods. A retrospective study was conducted, including patients with localized or locally advanced gastric cancer who received combined treatment. 100 cases were analyzed. FLOT and FOLFIRINOX regimens were used as perioperative chemotherapy. Surgical intervention was performed 4–6 weeks after completion of the first block of perioperative chemotherapy. The surgical material was sent for histological examination, where the degree of therapeutic pathomorphosis according to Mandard was determined. The toxicity of chemotherapy was assessed according to the CTCAE classification.
*Results***.** Nausea and diarrhea were significantly more common in the Dagestani group (p-value = 0.019) (p-value = 0.048). Asthenia and neutropenia were also significantly more common in the Dagestani group, but statistical significance was not achieved (p-value = 0.090 and p-value = 0.091), probably due to the limited sample of patients. In the group of Dagestanis, dose reduction of chemotherapy drugs was also significantly more often detected (p-value = 0.009). Also, in the group of Dagestanis, pronounced therapeutic pathomorphosis was less often noted, and slightly pronounced therapeutic pathomorphosis was more common compared to the group of Russians. However, the differences between the groups of Dagestanis and Russians turned out to be statistically unreliable (p-value = 0.592).
*Conclusions***.** The results of this study indicate that the patient's ethnicity may affect the toxicity and tolerability of chemotherapy and confirm the need for larger prospective studies in this area.

Keywords: gastric cancer, ethnic characteristics, toxicity, Dagestanis, chemotherapy, efficacy, pharmacoethnicity.

References

1. Smyth E.C., Nilsson M., Grabsch H.I., et al. Gastric cancer. Lancet. 2020;396(10251):635–648. doi:10.1016/S0140-6736(20)31288-52.
2. Venerito M., Ford A.C., Rokkas T., et al. Review: prevention and management of gastric cancer. Helicobacter. 2020;25(Suppl S1): e12740. doi:10.1111/hel.127403.
3. Wang F.H., Shen L., Li J., et al. The Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO): clinical guidelines for the diagnosis and treatment of gastric cancer. Cancer Commun. 2019;39(1):10. doi:10.1186/ s40880–019–0349–94.
4. Rausei S., Lianos G.D.. Treatment of gastric cancer. Cancers. 2020;12(9):9. doi:10.3390/cancers120926275.
5. Ilson D.H.. Advances in the treatment of gastric cancer. Curr Opin Gastroenterol. 2020;36(6):525–529. doi:10.1097/MOG.00000000000006796.
6. Wang X-Z., Zeng Z-Y., Ye X., et al. Interpretation of the development of neoadjuvant therapy for gastric cancer based on the vicissitudes of the NCCN guidelines. World J Gastrointest Oncol. 2020;12(1):37–53. doi:10.4251/wjgo.v12.i1.377.
7. Petrillo A., Smyth E.C.. Multimodality treatment for localized gastric cancer: state of the art and new insights. Curr Opin Oncol. 2020;32(4):347–355. doi:10.1097/CCO.00000000000006308.
8. Zhao Q., Lian C., Huo Z., et al. The efficacy and safety of neoadjuvant chemotherapy on patients with advanced gastric cancer: a multicenter randomized clinical trial. Cancer Med. 2020;9(16):5731–5745. doi:10.1002/cam4.32249.
9. Yan Y., Yang A., Lu L., et al. Impact of neoadjuvant therapy on minimally invasive surgical outcomes in advanced gastric cancer: an International Propensity Score-Matched Study. Ann Surg Oncol. 2020. doi:10.1245/s10434-020-09070-910.
10. Kang Y-K., Cho H.. Perioperative FLOT: new standard for gastric cancer? Lancet. 2019;393(10184):1914–1916. doi:10.1016/S0140-6736(18)33189-111.
11. Al-Batran S.E., Hofheinz R.D., Pauligk C., et al. Histopathological regression after neoadjuvant docetaxel, oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin versus epirubicin, cisplatin, and fluorouracil or capecita-bine in patients with resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4-AIO): results from the Phase 2 part of a multicentre, open-label, randomized phase 2/3 trial. Lancet Oncol. 2016;17(12):1697–1708. doi:10.1016/S1470-2045(16)30531-912.
12. Al-Batran S.E., Homann N., Pauligk C., et al. Effect of neoadjuvant chemotherapy followed by surgical resection on survival in patients with limited metastatic gastric or gastroesophageal junction cancer: the AIO-FLOT3 trial. JAMA Oncol. 2017;3(9):1237–1244. doi:10.1001/jamaoncol.2017.051513.
13. Al-Batran S.E., Homann N., Pauligk C., et al. Perioperative chemotherapy with fluorouracil plus leucovorin, oxaliplatin, and docetaxel versus fluorouracil or capecitabine plus cisplatin and epirubicin for locally advanced, resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (FLOT4): a randomized, phase 2/3 trial. Lancet. 2019;393(10184):1948–1957.
14. Sedova M.V., Batov M.A., Vartanov G.A., Kolomeitseva A.A., Khomyakov V.M., Volchenko N.N., Fedenko A.A. Neoadjuvant chemotherapy according to the FOLFIRINOX regimen for resectable gastric cancer: immediate and short-term results. Oncology. Journal named after P.A. Herzen. 2023;12(5):5 12.
15. Olafuyi O., Parekh N., Wright J., Koenig J.. Inter-ethnic differences in pharmacokinetics – is there more that units than divides? Pharmacol Res Perspect. 2021; 9(6): e00890.
16. Yoon J.H., Park J.A., Kim E.K., Kang H.J., Shin H.Y., Ahn H.S.. Improvement of induction remission rate by modifying the dose of idarubicin for relapsed childhood acute lymphoblastic leukemia. J Korean Med Sci. 2009; 24(2): 281–288.
17. Roden D.M., George A.L. Jr. The genetic basis of variability in drug responses. Nat Rev Drug Discov. 2002; 1(1): 37–44.
18. Syn N.L., Yong W.P., Lee S.C., Goh B.C.. Genetic factors affecting drug disposition in Asian cancer patients. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2015; 11(12): 1879–1892.
19. O'Donnell P.H., Dolan M.E.. Cancer pharmacoethnicity: ethnic differences in susceptibility to the effects of chemotherapy. Clin Cancer Res. 2009; 15(15): 4806–4814.
20. Ma B.B., Hui E.P., Mok T.S.. Population-based differences in treatment outcome following anticancer drug therapies. Lancet Oncol. 2010; 11(1): 75–84.
21. Shigematsu H., Lin L., Takahashi T., et al. Clinical and biological features associated with epidermal growth factor receptor gene mutations in lung cancers. J Natl Cancer Inst. 2005; 97(5): 339–346.
22. Stark A.P., Ikoma N., Chiang Y.J. et al. Characteristics and Survival of Gastric Cancer Patients with Pathologic Complete Response to Preoperative Therapy. Ann Surg Oncol. Oct 2019; 26 (11): 3602–3610. doi: 10.1245/s10434-019-07638-8. Epub 2019 Jul 26.
23. Mattison L.K., Fourie J., Desmond R.A., Modak A., Saif M.W., Diasio R.B.. Increased prevalence of dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency in African–Americans compared with Caucasians. Clin Cancer Res 2006;12:5491–5.
24. Pestalozzi B.C., Peterson H.F., Gelber R.D., et al. Prognostic importance of thymidylate synthase expression in early breast cancer. J Clin Oncol 1997;15:1923–31.
25. Popat S., Chen Z., Zhao D., et al. A prospective, blinded analysis of thymidylate synthase and p53 expression as prognostic markers in the adjuvant treatment of colorectal cancer. Ann Oncol 2006;17:1810–7.
26. Lecomte T., Ferraz J.M., Zinzindohoue F., et al. Thymidylate synthase gene polymorphism predicts toxicity in colorectal cancer patients receiving 5-fluorouracil-based chemotherapy. Clin Cancer Res 2004;10:5880–8.

27. Lee J.H., Park J.H., Jung Y., et al. Histone deacetylase inhibitor enhances 5-fluorouracil cytotoxicity by down-regulating thymidylate synthase in human cancer cells. Mol Cancer Ther 2006;5:3085–95.
28. Marsh S., Collie-Duguid E.S., Li T., Liu X., McLeod H.L.. Ethnic variation in the thymidylate synthase enhancer region polymorphism among Caucasian and Asian populations. Genomics 1999;58:310–2.
29. Marsh S., Ameyaw M.M., Githang'a J., Indalo A., Ofori-Adjei D., McLeod H.L.. Novel thymidylate synthase enhancer region alleles in African populations. Hum Mutat 2000;16:528.

Физическая культура как часть общечеловеческой культуры

Магомедов Магомед Шахбанович,
старший преподаватель кафедры физического воспитания, Высшая школа социально-гуманитарных наук, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
E-mail: Magomedov.MS@rea.ru

Магомедов Бекбулат Шахбанович,
преподаватель Института физической культуры и спорта, Московский государственный строительный университет
E-mail: magomedov.bekbulat@bk.ru

Бетмирзаев Аслан Адланович,
старший преподаватель кафедры физического воспитания, Высшая школа социально-гуманитарных наук, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
E-mail: betmirzaev.aa@rea.ru

Салаватов Кемран Арсенович,
старший преподаватель кафедры физического воспитания, Высшая школа социально-гуманитарных наук, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
E-mail: Salavatov.KA@rea.ru

Исследование посвящено физической культуре как части общечеловеческой культуры.
Физическая культура является особой и самостоятельной областью общечеловеческой культуры. С одной стороны, она специфический процесс деятельности человека, средство физического совершенства.
С другой, физическая культура влияет на те жизненные задатки человека, которые передаются генетически и способны к развитию на протяжении жизненного пути под влиянием окружающей среды, деятельности и воспитания. В каждый общественный период, вся физическая и умственная деятельность человека связана с обеспечением условий его существования, жизнедеятельности, сохранения жизни. Вышеизложенные и многие другие обстоятельства требуют более пристального изучения данного вопроса.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, культура, физическое совершенствование.

Если первобытному человеку, с целью выживания, для сбора плодов было достаточно природных физических задатков (ходьба, бег, прыжки, лазание), то уже в охоте на зверя и во владении орудиями труда потребовались иные навыки. Появились качественно новые движения, ранее не известные (метание камня, копья, стрельба из лука в цель), которым нужно было обучать, передавая опыт.

Охотнику необходимо было постоянно тренироваться для быстрого бега, осторожных движений, быть сильным и ловким в борьбе со зверем. Путем проб и ошибок велся поиск рациональных движений для достижения цели. Физическая подготовка военной направленности, во все общественные формации была одной из приоритетных целей физического воспитания.

Это объясняется большим количеством военных действий каждого исторического периода. Если формы, средства и методы физической подготовки воинов отличались, то это было обусловлено особенностями того или иного государства.

Общественное значение физической культуры прошедших эпох отображено в картинах художников, в сказаниях, былинах и летописях. Яркие образы богатырей, воинов, защитников олицетворяют ценность физического развития человека.

Долгое время, при отсутствии форм государственного управления физической культурой основными организационными видами в подготовке населения были обрядные танцы, национальные игры, праздники и развлечения, связанные с двигательной активностью. По мере общественного развития, научного и технического прогресса физическая культура расширяет связь с материальным производством и духовной жизнью общества.

Она способствует поддержанию равновесия между человеком и меняющейся окружающей средой. Теперь физические упражнения применяются не только для адаптации к условиям общественной жизни, для выживания и укрепления здоровья, но и для проявления индивидуальных возможностей в различных областях жизнедеятельности.

Термин «физическая культура» прочно вошел в общественный лексикон с начала XX в. В 1918 г. в Москве был открыт институт физической культуры, а в 1919 г. Всеобучем был проведен съезд по физической культуре. Для военной подготовки населения страны, в 1918 г. был введен физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Позднее его все больше и больше ориентировали на мирную жизнь.

Получив новый импульс в 2 0 1 4 году, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО стал, нацелен на привлечение разновозрастного

населения страны к систематическим занятиям физическими упражнениями и развитие физических качеств, улучшение функциональных способностей.

Уже в двадцатые годы активно создавались спортивные общества, физкультурные кружки для занятий в свободное от работы время. Для трудящихся и учащейся молодежи предлагали немалый выбор: занятия трудовой, корригирующей, шведской, сокольской, немецкой, французской гимнастикой. В период с 1922 г. публиковался журнал «Физическая культура», а с 1925 г. и по настоящее время – журнал «Теория и практика физической культуры».

Основоположником научной системы физического воспитания, физкультурного образования в России признан профессор Петр Францевич Лесгафт (1837–1909). Будучи разносторонним специалистом, изучив вопросы физического воспитания в странах Западной Европы, обобщив опыт России «…он оставил большое педагогическое наследие в области истории физической культуры, физического воспитания детей в семье и школе».

Основателем советской школы по теории физического воспитания, физической культуры и спорта стал ученый, автор первой докторской диссертации по направлению «Физическая культура» Лев Павлович Матвеев (1924–2006). Всемирно признана научная деятельность отечественных ученых в области проблем теории и 8 практики физической культуры, методики физического воспитания и спортивной тренировки, биомеханики, истории и социологии физической культуры.

Среди них: Бернштейн Н.А., Зациорский, В.М., Курамшин Ю.Ф., Озолин Н.А., Пономарев Н.И., Пуни А.Ц. и многие другие. Какую бы сферу современной общечеловеческой культуры мы не рассматривали (научные открытия, технические изобретения, произведения искусства, нормы морали, права и пр.) их необходимо оценивать в зависимости от того, какое влияние они оказывают на человека и как гуманизируют общество в целом.

Ко всем слагаемым общей культуры человека, безусловно, принадлежит культура физическая. На протяжении всего периода развития общества она стала одним из важнейших факторов сохранения и приумножения естественных жизненных сил человека.

Именно ей отводится главная роль в формировании культуры здоровья личности. В свою очередь культура здоровья стала новым ценностным критерием дееспособности общества и ориентиром прогресса.

Существующие средства и методы физической культуры, при всей своей простоте и доступности, не перестают удивлять эффективностью. Создавая благоприятный базис для основной жизнедеятельности, они еще и обеспечивают направленное развитие быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости, совершенствуют телосложение.

Сегодня можно утверждать без преувеличения, что многое из перечисленного успешно может удовлетворяться в общедоступной и демократичной области человеческой деятельности – физической культуре.

Особенно этот факт заметен в спорте.

Спорт открывает простор для удовлетворения еще и в самоутверждении. Этот положительный опыт может быть перенесен и как правило переносится на другие сферы человеческой жизнедеятельности.

В подтверждении чего существует немало поучительных примеров из жизни спортсменов разных стран и во все исторические периоды развития общества. Хорошо известно, что здоровый, физически подготовленный человек, быстрый, сильный, выносливый, координированный, владеющий многообразием двигательных умений и навыков, имеет способность быстрее и успешнее приспосабливаться к стремительно меняющемуся современному миру.

Он имеет жизненные резервы к освоению новых профессий. Его труд будет наиболее эффективным.

Рациональное применение физических упражнений способствует увеличению умственной работоспособности и является наиболее действенным способом снятия, такого утомления и нервнопсихического напряжения. Регулярное применение физических упражнений не только развивает физические способности (кондиции), увеличивает функциональные резервы.

Совершенствуются функции вегетативной, соматической и центральной нервной системы. Движение как таковое может по своему действию заменить любое лекарство, любое лечебное средство. Но все лечебные средства не могут заменить движение.

Наиболее травмоопасными в спортивной деятельности являются экстремальные виды спорта. Главными атрибутами экстремальных видов спорта являются критичные для человека условия внешней среды, высокая степень риска для здоровья и жизни.

Наиболее широкое распространение экстремальные виды спорта получили у молодежи. Занимающиеся стремятся достичь предела своих возможностей, преодолеть страх, испытать ни с чем не сравнимые чувства.

Экстремальный спорт – обобщенное название новых популярных видов спорта, которые связаны со скоростью, высотой, глубиной, различного рода опасностями и зрелищностью. В основе которых лежит фактор экстрима, вызывающий выброс адреналина в кровь.

И как следствие это заставляет экстремальных спортсменов вновь и вновь рисковать. Ощущения эти настолько сильны, что в медицине даже появилось определение «адреналиновый наркоман», чем сами экстремалы и объясняют свою зависимость и тягу к риску.

К экстремальном спорту относят: альпинизм, скалолазание, спортивный туризм, зимнее плавание, дайвинг, паркур, триал (экстремальное катание на мотоциклах), стрит(экстремальное катание в условиях города на велосипеде), скейтинг, рол-

линг, бейсджампинг (экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов), роупджампинг (прыжки на альпинистских веревках с различных высоких объектов: скал, многоэтажных домов, кранов, мостов, труб, различных вышек).

В том числе, способствуют восстановлению дееспособности органов и систем организма, утраченных при травмах и заболеваниях. Последствия информационно-технического прогресса, изменения характера труда и быта человека, смена форм отдыха и ценностных ориентиров приводят к снижению двигательной активности современного человека во всех возрастных категориях.

Двигательная активность – это естественная и специально организованная двигательная деятельность человека, обеспечивающая его успешное физическое и психическое развитие. Мышечная деятельность человека, количество движений (локомоций), которые он выполняет в единицу времени (в течение дня, суток, недели, месяца и пр.).

Сформулировано правило двигательной активности (энергетическое правило скелетных мышц), по которому в результате выполненной физической работы энергетический потенциал организма не только не снижается, но и возрастает. Это же означает, что двигательная активность обеспечивает энергетический фонд человека, накапливая его.

Вместе с тем все чаще оценку физическому, психическому и нравственному здоровью дают не по наличию или отсутствию болезней. В большей степени оцениваются положительные качества и достоинства личности (коммуникабельность, оптимизм, работоспособность, творческий подход к решению задач и др.). Занятия физической культурой и спортом способствуют обогащению этими достоинствами.

Коллективный характер физической культуры способствует развитию умения соотносить личные и общественные интересы, подчиняться правилам, соблюдать этику и культуру общения. В образовательном и воспитательном процессе физической культуры взращивается трудолюбие, обязательность и прилежность, выносливость и терпение, настойчивость и упорство.

Спорт в современном мире все больше и больше приобретает популярность. Наряду с наукой, техникой, искусством, он стал полноправным компонентом социальной жизни общества.

Спортивную деятельность сопровождает огромный мир эмоций, порождаемых успехами и переживаниями неудач, популярное зрелище, эффективное средство воспитания и самовоспитания. С одной стороны, спорт влияет на личность, а с другой на культурное и экономическое развитие общества в целом, на государство.

При единстве задач физического развития, использования средств и методов тренировки, физическая культура и спорт имеют различные цели. Так физкультурные занятия разнообразные по форме и направленности имеют цель гармоничного развития личности, ведение здорового стиля жизни.

В то время, как спортсмен все свои действия направляет для достижения наивысшего результата в избранном виде спорта. Если для физкультурника наградой за усилия будет хорошее самочувствие, продолжительный период жизни в здравии и бодрости, то наградой для спортсмена является медаль и пьедестал чемпиона на соревнованиях наивысшего ранга.

Литература

1. Славинский Н. В., Кузнецова З.В. Исследование влияния физической культуры на мотивацию в обычной жизнедеятельности // Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2022. – № . 6 (208). – С. 348–350.
2. Хабибуллин И.М. Врачебно-педагогический контроль в адаптивной физической культуре //Проблемы научной мысли. – 2022. – Т. 2. – № . 2. – С. 7–10.
3. Желтушкина Е. В. и др. Актуальные проблемы физической культуры и спорта в высших учебных заведениях //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2022. – № . 9 (211). – С. 123–126.
4. Михайлов Владислав Сергеевич, Цыганкова Виктория Олеговна Отличия адаптивной физической культуры от лечебной физической культуры // Интерактивная наука. 2022. № 6 (71).
5. Ведящев, А.Д. Ценностный потенциал физической культуры и спорта как основа формирования физической культуры личности / А.Д. Ведящев // Гуманитарные знания и естественные науки: современные проблемы и перспективы развития: Материалы II Межвузовской научно-практической конференции; под общ. редакцией Е.В. Королюк, Тихорецк, 11 апреля 2014 года. – Тихорецк: Краснодарский центр научно-технической информации, 2014. – С. 24–28.
6. Гудина, Г.В. Научно – методические проблемы физической культуры, спорта и адаптивной физической культуры / Г.В. Гудина, В.С. Завязкин // НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции, Стерлитамак, 13 декабря 2018 года. Том Часть 2. – Стерлитамак: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство международных исследований», 2018. – С. 53–55.
7. Социально-экономические и гуманитарные аспекты физической культуры, спорта и адаптивной физической культуры: сборник статей Национальной всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к 100-летнему юбилею Министерства спорта Республики Башкортостан, Уфа, 30 апреля 2023 года. – Уфа: Башкирский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский

государственный университет физической культуры», 2023. – 86 с.
8. Жукова, С.Д. Лечебная физическая культура как основа занятий физической культурой со студентами с ослабленным здоровьем / С.Д. Жукова, Л.М. Лукьянова // Наука-2020. – 2021. – № 9(54). – С. 5–11.

PHYSICAL CULTURE AS PART OF UNIVERSAL HUMAN CULTURE

Magomedov M.Sh., Magomedov B.Sh., Betmirzaev A.A., Salavatov K.A.
Russian Economic University named after. G.V. Plekhanov; Moscow State University of Civil Engineering

This study is devoted to physical culture as part of universal human culture.
Physical culture is a special and independent area of universal human culture. On the one hand, it is a specific process of human activity, a means of physical perfection.
On the other hand, physical culture influences those life inclinations of a person that are transmitted genetically and are capable of development throughout life under the influence of the environment, activity and upbringing. In every social period, all physical and mental activity of a person is associated with ensuring the conditions for his existence, vital activity, and preservation of life. The above and many other circumstances require a closer study of this issue.

Keywords: physical education, sports, culture, physical improvement.

References

1. Slavinsky N.V., Kuznetsova Z.V. Study of the influence of physical culture on motivation in everyday life // Scientific notes of the University. PF Lesgafta. – 2022. – No. 6 (208). – WITH. 348–350.
2. Khabibullin I.M. Medical and pedagogical control in adaptive physical culture // Problems of scientific thought. – 2022. – T. 2. – No. 2. – pp. 7–10.
3. Zheltushkina E. V. et al. Current problems of physical culture and sports in higher educational institutions // Scientific notes of the University. PF Lesgafta. – 2022. – No. 9 (211). – pp. 123–126.
4. Mikhailov Vladislav Sergeevich, Tsygankova Victoria Olegovna Differences between adaptive physical culture and therapeutic physical culture // Interactive science. 2022. No. 6 (71).
5. Vedyashchev, A.D. The value potential of physical culture and sports as the basis for the formation of a person's physical culture / A.D. Vedyashchev // Humanities and natural sciences: modern problems and development prospects: Materials of the II Interuniversity scientific-practical conference; under general edited by E.V. Korolyuk, Tikhoretsk, April 11, 2014. – Tikhoretsk: Krasnodar Center for Scientific and Technical Information, 2014. – P. 24–28.
6. Gudina, G.V. Scientific and methodological problems of physical culture, sports and adaptive physical culture / G.V. Gudina, V.S. Zavyazkin // NEW SCIENCE: HISTORY OF FORMATION, CURRENT STATE, DEVELOPMENT PROSPECTS: collection of articles based on the results International scientific and practical conference, Sterlitamak, December 13, 2018. Volume Part 2. – Sterlitamak: Limited Liability Company "Agency for International Research", 2018. – P. 53–55.
7. Socio-economic and humanitarian aspects of physical culture, sports and adaptive physical culture: collection of articles of the National All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 100th anniversary of the Ministry of Sports of the Republic of Bashkortostan, Ufa, April 30, 2023. – Ufa: Bashkir Institute of Physical Culture (branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ural State University of Physical Culture", 2023. – 86 p.
8. Zhukova, S.D. Therapeutic physical culture as the basis for physical education classes with students with poor health / S.D. Zhukova, L.M. Lukyanova // Science-2020. – 2021. – No. 9(54). – P. 5–11.

Возможности ультразвуковых методов исследования в диагностике синдрома Лериша

Милюкова Анна Александровна,
к.м.н., заведующая отделением ультразвуковой диагностики ГАУЗ ОЗП ГКБ № 8

В статье представлен случай первичной диагностики синдрома Лериша у молодого пациента с помощью методов ультразвуковой диагностики.

Ключевые слова: синдром Лериша, ультразвуковая диагностика, дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, дуплексное сканирование артерий нижних конечностей артерий нижних конечностей окклюзирующее поражение бифуркации аорты.

Введение

Синдром Лериша – это окклюзирующее поражение бифуркации аорты и подвздошных артерий. Основным симптомом данной патологии является хроническая ишемия нижних конечностей и органов малого таза. Подробное описание данного симптомокомплекса дал R. Leriche и в дальнейшем последний получил имя автора.

Характер поражения артерий аорто-подвздошно-бедренной зоны вариабелен. Изолированное поражение аорты встречается очень редко. В большинстве случаев в процесс вовлечена бифуркация аорты и ее терминальный отдел [2,5,6]

Различают следующие типы окклюзий брюшного отдела аорты: [3]

– низкая окклюзия (окклюзия бифуркации брюшной аорты дистальнее нижней брыжеечной артерии);
– средняя окклюзия (окклюзия аорты проксимальнее нижней брыжеечной артерии);
– высокая окклюзия (тотчас ниже уровня почечных артерий или в пределах 2 см дистальнее).

Основной причиной синдрома Лериша является атеросклероз, доля которого составляет от 75% до 95% в этиологии данного заболевания [1,4,5]. Второй по частоте причиной является неспецифический аортоартериит, на долю которого приходится от 5% до 8% случаев [5]. Еще реже встречается облитерирующий тромбангиит, посттравматические и эмболические окклюзии.

По данным Фрамингемского исследования, в рамках которого проводился анализ факторов риска, было установлено, что пожилой возраст, курение, диабет, гипертензия и гиперхолестеринемия являются основными факторами риска, связанными с развитием атеросклероза периферических артерий. Повышенные показатели маркеров воспаления, включая высокочувствительный С-реактивный белок, интерлейкин-6, фибриноген, ICAM-1, ассиметричный диметиларгинин, b-2 макроглобулин и цистатин С являются новыми факторами риска []

Локализация атеросклеротических стенозов и окклюзий определяет классификацию стеноокклюзирующих заболеваний аорто-подвздошного сегмента [7]:

тип I, ограниченный терминальным отделом брюшной аортой и общими подвздошными артериями; тип II, с поражением терминального отдела брюшной аорты, общих и наружных подвздошных артерий; тип III, затрагивающий аорто-подвздошный и бедренноподколенный сегменты.

По данным литературы синдром Лериша у молодых пациентов составляет от 0,5% до 6,9% [5]

Для диагностики поражений аорто-подвздошной –бедренной зоны применяют ультразвуковое дуплексное сканирование, МСКТ-ангиографию, МРТ-ангиографию с контрастированием, рентгеноконтрастную ангиографию.

Ультразвуковой метод – является основным для диагностики стено-окклюзирующих заболеваний аорто-подвздошной –бедренной зоны. Для ультразвуковых признаков окклюзии характерно наличие эхогенных масс и отсутствие кровотока в просвете артерии, по данным цветового допплеровского картирования и допплерографии, и регистрация однофазного (коллатерального) кровотока дистальнее окклюзии [4]. Стенозирование аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей регистрируют в В -режиме при продольном и поперечном сканировании с измерением процента стенозирования по диаметру и площади [4].

Цель: На примере клинического случая продемонстрировать возможность ультразвуковых методов диагностики в первичной диагностике синдрома Лериша

Материалы и методы: Приводится клинический случай пациента с проявлениями хронической ишемии нижних конечностей Представлены результаты дуплексного сканирования аорты, подвздошных артерий, артерий нижних конечностей до и после оперативного лечения, результаты компьютерной томографии аорты и артерий нижних конечностей; оценивается сопоставимость этих методов. Ультразвуковое исследование выполнялось на ультразвуковом сканере «APLIO 400», TOSHIBA мультичастотным линейным датчиком с центральной частотой 10МГц, мультичастотным конвексным датчиком с центральной частотой 3,5 МГц

Клинический случай

Пациент Х, 43 года предъявлял жалобы на боли в икроножных мышцах с обеих сторон при ходьбе на расстояние до 500 метров, парестезии в пальцах стоп. Из анамнеза известно, что данные симптомы наблюдались в течение последних 4 лет, постепенно прогрессировали. Курит. Сахарный диабет отрицает. При физикальном осмотре и пальпации – нижние конечности были холодные на ощупь, пульсация на бедренных, подколенных и артериях голени в типичных местах не определялась, выявлен систолический шум над аортой. Стопы -обычной окраски, прохладные на ощупь. Икроножные мышцы мягкие, безболезненные. Движения, чувствительность не нарушены. АД справа 130/78 мм рт. ст. АД слева 128/76 мм рт. ст

Пациент, ранее не обследовался, к врачам не обращался; был направлен в отделение УЗД для проведения дуплексного сканирования артерий нижних конечностей с цветовым допплеровским картированием

На УЗ аппарате TOSHIBA APLIO 400, при использовании линейного датчика – 10 МГц с обеих сторон осмотрены артерии нижних конечностей: общие бедренные и поверхностные бедренные (ОБА И ПБА) на протяжении, глубокие бедренные (ГБА) в проксимальном сегменте, подколенные (ПКА) на протяжении, передние (ПББА) и задние (ЗББА) в проксимальном и дистальном сегментах. Выявлено следующее:

Справа

ОБА – проходима, сегментарный стеноз 45–50%. Кровоток однофазный (коллатеральный),

ПСС 86 см/сек.

ГБА – проходима, стеноз в устье – до 30%. Кровоток однофазный (коллатеральный), нормоскоростной

ПБА – проходима, с участками стеноза на протяжении от 30% до 50%, с/з – сегментарный стеноз 65–70%. Кровоток однофазный (коллатеральный), ПСС в месте максимального стеноза

до 140 см/сек

ПКА – проходима, с участками стеноза 30–35%. Кровоток однофазный (коллатеральный),

ПСС 30 см/сек

ЗББА – проходима, без значимых стенозов. Кровоток однофазный (коллатеральный),

ПСС 18 см/сек

ПББА – проходима, без значимых стенозов. Кровоток однофазный (коллатеральный),

ПСС 19 см/сек

ЛПИ 0,7

Слева:

ОБА – проходима, сегментарный стеноз 50–55%. Кровоток коллатеральный, ПСС 82 см/сек.

ГБА – проходима, стеноз в устье – до 20%. Кровоток однофазный (коллатеральный), ПСС 70 см/сек.

ПБА – проходима, с участками стеноза с/з и н/з- от 30% до 55%. Кровоток однофазный (коллатеральный), ПСС 60 см/сек.

ПКА – проходима, с участками стеноза до 55%. Кровоток однофазный (коллатеральный), ПСС 37 см/сек

ЗББА – проходима, без значимых стенозов. Кровоток однофазный (коллатеральный), ПСС 14 см/сек

ПББА – проходима, без значимых стенозов. Кровоток однофазный (коллатеральный) ПСС 17 см/сек

ЛПИ –0,8

Учитывая коллатеральный тип кровотока в артериях нижних конечностей с обеих сторон дополнительно было выполнено дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий.

Результаты исследования: ход аорты не изменен; диаметр аорты в супраренальном отделе – 20 мм, в интраренальном – 19 мм, в инфраренальном – 19 мм. В инфраренальном отделе просвет аорты выполнен эхогенными массами, кровоток при ЦДК не картируется. Просвет подвздошных артерий выполнен эхогенными массами, кровоток при ЦДК не картируется.

По результатам ультразвуковых исследований дано заключение: Окклюзия инфраренального отдела аорты, подвздошных артерий с обеих сторон (вероятно тромботического генеза); значимый сегментарный стеноз с/з правой поверхностный

бедренной артерии, незначимые стенозы правой общей бедренной артерии, правой подколенной артерии, берцовых артерий справа, артерий левой нижней конечности. Данные УЗ исследований представлены на рис. 1–3.



Рис. 1. Сонограмма. Окклюзия брюшного отдела аорты и подвздошных артерий.



Рис. 2. Сонограмма. В–режим. Стеноз поверхностной бедренной артерии 65–70%



Рис. 3. Сонограмма. В –режим. ЦДК –режим. Стеноз поверхностной бедренной артерии 65–70%

Результаты лабораторных методов исследования: Холестерин: 4,40 ммоль/л; Холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП): 2,69 ммоль/л; Холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП): 0,91 ммоль/л; Триглицериды (ТГ):1,75 ммоль/л; Билирубин общий:6,50 мкмоль/л; Аланинаминотрансфераза (АлАТ): 21,70 Ед/л; Аспартатаминотрансфера (АсАТ):21,60 Ед/л; Мочевая кислота: 352,0 мкмоль/л; С-реактивный белок, массовая концентрация в сыворотке или плазме крови: 0,63 мг/л; Креатинин: 91,40 мкмоль/л; Мочевина: 7,20 ммоль/л; Глюкоза: 4,06 ммоль/л; Общий белок: 71,10 г/л; Натрий (Na): 139,0 ммоль/л; Калий (K): 4,10 ммоль/л. ОАК, ОАМ – в пределах нормальных значений.

В условиях стационара пациенту была проведена компьютерная томография нижних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием. Дано следующее заключение:

Протокол: Исследование выполнено от инфраренального отдела аорты до нижних отделов берцовых артерий. Просвет сосудов неравномерно сужен за счет циркулярных, частично кальцинированных, атеросклеротических бляшек. Просвет верхней брыжеечной артерии неравномерно сужен на 50%. Просвет левой почечной артерии неравномерно сужен на 40–50%. Просвет инфраренального отдела аорты неравномерно сужен на 20–30%. На 64 мм ниже устья правой почечной артерии определяется окклюзия инфраренального отдела аорты с распространением на правую ОПА на 60 мм и на левую ОПА на 15 мм.

Справа: окклюзия ОПА на всем протяжении; просвет НПА неравномерно сужен на 30–50%; – просвет ВПА неравномерно сужен на 30–60%; просвет ОБА неравномерно сужен на 30–45%; просвет ГБА неравномерно сужен на 5–10%; просвет ПБА неравномерно сужен на 40–60%, на 192 мм выше суставной щели определяется субтотальный стеноз протяженностью 13 мм; просвет ПкА неравномерно сужен на 20–50%; просвет берцовых артерий неравномерно сужен на 10–20%. *Слева*: просвет ОПА на остальном протяжении неравномерно сужен на 30–50%; на 16 мм от устья НПА определяется окклюзия с восстановлением кровотока в в/3 ОБА; просвет ВПА неравномерно сужен на 40–60%; на остальном протяжении просвет ОБА неравномерно сужен на 40–50%; просвет ГБА неравномерно сужен на 10–20%; просвет ПБА неравномерно сужен на 30–40%; просвет ПкА неравномерно сужен на 30–40%; просвет берцовых артерий неравномерно сужен на 10–20%. Заключение: КТ–признаки распространенного атеросклеротического поражения сосудов аорто-подвздошной зоны и нижних конечностей. Окклюзии: инфраренального отдела аорты, ПОПА, ЛОПА. Субтотальный стеноз ППБА.

Таким образом результаты ультразвуковых методов исследования сопоставимы с результатами МСКТ ангиографии.

Пациент был осмотрен врачом-сосудистым хирургом. Выставлен диагноз: Атеросклероз. Высокая окклюзия брюшной аорты. Хроническая ишемия нижних конечностей 2б ст. по Фонтейну.

Выполнена операция: Тромбэктомия из аорты, аортобифеморальное шунтирование.

При контрольном ультразвуковом исследовании дано следующее заключение: Состояние после тромбэктомии из инфраренального отдела брюшной аорты, АБШ (от 17 01.2024 г.) – протез проходим на всем протяжении. Атеросклероз магистральных артерий нижних конечностей: сегмен-

тарный стеноз с/3 правой ПБА до 70%. Незначимые стенозы правой ОБА, правой ПкА,, левой ОБА, левой ПБА, левой ПкА, берцовых артерий с обеих сторон. Кровоток с уровня бедренных артерий – трехфазный (магистральный), нормоскоростной.

Таким образом с помощью дуплексного сканирования брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей удалось оценить положительные результаты оперативного лечения – восстановление магистрального кровотока на артериях нижних конечностях.

Ультразвуковые методы исследования, такие, как дуплексное сканирование аорты, подвздошных артерий, дуплексное сканирование артерий нижних конечностей являются неинвазивными, доступными, высоко информативными в первичной диагностике синдрома Лериша у пациентов с клиническими проявлениями хронической ишемии нижних конечностей, а также для оценки результатов оперативного лечения.

Литература

1. Абалмасов К.Г., Бузиашвили Ю.И., Морозов К.М. и др. Качество жизни больных с хронической ишемией нижних конечностей // Ангиология и сосудистая хирургия – 2004; 2: 8–13.
2. Белов Ю.В. Хирургическое лечение больных с множественным поражением артерий нижних конечностей / Ю.В. Белов, А.П. Степаненко, А.П. Гене, И.Т. Халимов // Ангиология и сосудистая хирургия. – 2002. – Т. 8. – № 1. С. 72–79.
3. Куликов В.П. Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний. М: ООО Фирма» Стром»,2007, С. 455
4. Покровский, А.В. Клиническая ангиология / А.В. Покровский.- М.: Медицина, 2004.- Т 2.- 887 с.
5. Салех Амро Зухайр Салах Преимущество малоинвазивных технологий в хирургическом лечении больных пожилого и старческого возраста с поражением аортоподвздошного сегмента/ Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук /2019.-Москва
6. Троицкий А.В. Сочетанные операции при этажных поражениях аортоподвздошного и беренно-подколенного сегментов / А.В. Троицкий, Р.И. Хабадов, П.Ю Паршин, О.Х. Грязное, Е.Р. Лысенко, П.Ю. Орехов, Н.В. Зайцев, Е.Д. Шабалтас, Е.Д. Мимотина // Ангиология и сосудистая хирургия. – 2005. – Т. 11. № 2. – С. 113–121.
7. Wooten C, Hayat M, du Plessis M, Cesmebasi A, Koesterer M, Daly KP, Matusz P, Tubbs RS, Loukas M. Anatomical significance in aortoiliac occlusive disease. Clin Anat. 2014 Nov; 27(8):1264–74.

POSSIBILITIES OF ULTRASOUND RESEARCH METHODS IN THE DIAGNOSIS OF LERICHE SYNDROME

Milyukova A.A.
State Autonomous Institution of Public Health

The article presents a case of primary diagnosis of Leriche syndrome in a young patient using ultrasound diagnostic methods.

Keywords: Leriche syndrome, ultrasound diagnostics, duplex scanning of the abdominal aorta, duplex scanning of the arteries of the lower extremities, occlusive lesions of the aortic bifurcation

References

1. Abalmasov K.G., Buziashvili Yu.I., Morozov K.M. and others. Quality of life of patients with chronic ischemia of the lower extremities // Angiology and Vascular Surgery – 2004; 2:8–13.
2. Belov Yu.V. Surgical treatment of patients with multiple lesions of the arteries of the lower extremities / Yu.V. Belov, A.P. Stepanenko, A.P. Gene, I.T. Khalimov // Angiology and vascular surgery. – 2002. – T. 8. – No. 1. P. 72–79.
3. Kulikov V.P. Ultrasound diagnosis of vascular diseases. M: LLC Firma “Strom”, 2007, P. 455
4. Pokrovsky, A.V. Clinical angiology / A.V. Pokrovsky.- M.: Medicine, 2004.- T 2.-887 p.
5. Saleh Amro Zuhair Salah The advantage of minimally invasive technologies in the surgical treatment of elderly and senile patients with damage to the aortoiliac segment / Dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences / 2019.-Moscow
6. Troitsky A.V. Combined operations for floor lesions of the aortoiliac and beno-popliteal segments / A.V. Troitsky, R.I. Khabadov, P.Yu Parshin, O. Kh. Dirty, E.R. Lysenko, P. Yu. Orekhov, N.V. Zaitsev, E.D. Shabaltas, E.D. Mimotina // Angiology and vascular surgery. – 2005. – T. 11. No. 2. – WITH. 113–121.
7. Wooten C, Hayat M, du Plessis M, Cesmebasi A, Koesterer M, Daly KP, Matusz P, Tubbs RS, Loukas M. Anatomical significance in aortoiliac occlusive disease. Clin Anat. 2014 Nov; 27(8):1264–74.

Синдром полиорганной недостаточности, инициированной травмой: тактика и стратегия лечения

Хамавов Тимур Маратович,
студент, Дагестанский государственный медицинский университет
E-mail: Collector981@mail.ru

Эседова Ифриз Адилаховна,
студент, Дагестанский государственный медицинский университет
E-mail: i.esedova@yandex.ru

Уморина Юлия Олеговна,
студент, лечебное дело, Национальный Исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
E-mail: umorina.iu@yandex.ru

Ибрагимов Саид-Умар Ситхалил-угли,
студент, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского
E-mail: Giganblood@mail.ru

Ляшенко Елена Николаевна,
к.м.н., доцент, Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского» Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
E-mail: helen.lyashen@mail.ru

Введение: ПИТ-синдром, характеризующийся полиорганной недостаточностью, инициированной травмой, представляет собой актуальную проблему современной медицины. Целью данного исследования является разработка комплексной стратегии диагностики и лечения ПИТ-синдрома.
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 512 случаев ПИТ-синдрома, зарегистрированных в период с 2015 по 2023 год в многопрофильных стационарах г. Москвы. Средний возраст пациентов составил 42,6±11,3 лет. Оценка тяжести состояния проводилась по шкалам APACHE II, SOFA и MODS. Лабораторная диагностика включала определение биомаркеров системного воспаления (IL-6, TNF-α, PCT) и органной дисфункции (трансаминазы, креатинин, лактат). Применялись методы интенсивной терапии согласно международным рекомендациям (Surviving Sepsis Campaign, 2021).
Результаты: Установлено, что ранняя диагностика ПИТ-синдрома, основанная на комплексной оценке клинических и лабораторных показателей, позволяет своевременно начать интенсивную терапию и улучшить прогноз. Использование гемодинамического мониторинга, респираторной поддержки, нутритивной коррекции и заместительной почечной терапии способствует стабилизации витальных функций. Целенаправленная антибактериальная терапия, основанная на результатах микробиологического исследования, снижает риск развития септических осложнений на 38,2% ($p<0,05$). Применение экстракорпоральных методов детоксикации (плазмаферез, гемосорбция) у пациентов с рефрактерным шоком сопровождается улучшением показателей гемодинамики и оксигенации. Комплексная стратегия лечения ПИТ-синдрома обеспечивает снижение летальности с 45,6% до 28,9% ($p<0,01$).

Ключевые слова: ПИТ-синдром, полиорганная недостаточность, интенсивная терапия, биомаркеры, экстракорпоральная детоксикация.

,

Введение

ПИТ-синдром (синдром полиорганной недостаточности, инициированной травмой) представляет собой жизнеугрожающее состояние, характеризующееся прогрессирующей дисфункцией двух и более органов и систем вследствие тяжелой травмы [1]. Несмотря на достижения современной медицины, летальность при ПИТ-синдроме остается высокой и достигает 40–60% [2]. Патогенез ПИТ-синдрома обусловлен комплексным взаимодействием факторов, включающих системную воспалительную реакцию, микроциркуляторные расстройства, митохондриальную дисфункцию и апоптоз [3]. Триггерами развития ПИТ-синдрома являются тяжелая сочетанная травма, массивная кровопотеря, длительная гипоперфузия органов и тканей, реперфузионное повреждение [4].

Клиническая картина ПИТ-синдрома характеризуется прогрессирующей недостаточностью жизненно важных органов, включая острое повреждение легких (ОПЛ), острое почечное повреждение (ОПП), печеночную дисфункцию, коагулопатию и энцефалопатию [5]. По данным крупного многоцентрового исследования SOAP II, частота развития ОПЛ при ПИТ-синдроме составляет 67,3%, ОПП – 42,6%, коагулопатии – 38,1%, печеночной дисфункции – 31,4% [6]. Развитие ПИТ-синдрома ассоциировано с увеличением продолжительности пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) в среднем на 12,8±3,2 дня и госпитальной летальности до 52,3% [7].

Своевременная диагностика ПИТ-синдрома является ключевым фактором, определяющим эффективность лечения и прогноз [8]. Диагностический алгоритм включает комплексную оценку клинических, лабораторных и инструментальных показателей [9]. К наиболее значимым клиническим критериям относятся нарушения гемодинамики (артериальная гипотензия, тахикардия, снижение сердечного выброса), дыхательная недостаточность (тахипноэ, гипоксемия), олигурия, энцефалопатия, нарушения гемостаза [10]. Лабораторная диагностика направлена на выявление маркеров системного воспаления (лейкоцитоз, С-реактивный белок, прокальцитонин), органной дисфункции (повышение трансаминаз, билирубина, креатинина, лактата) и коагулопатии (тромбоцитопения, гипокоагуляция) [11]. В качестве дополнительных инструментальных методов используются рентгенография органов грудной клетки, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, компьютерная томография,

позволяющие выявить травматические повреждения и очаги инфекции [12].

Лечение ПИТ-синдрома основано на принципах ранней целенаправленной терапии (early goal-directed therapy) и включает поддержание адекватной перфузии органов, коррекцию гипоксемии, нутритивную поддержку, профилактику и лечение инфекционных осложнений [13]. Инфузионная терапия проводится под контролем гемодинамики, транспорта кислорода и показателей волемического статуса [14]. Целевыми параметрами являются среднее артериальное давление ≥65 мм рт. ст., сатурация центральной венозной крови ≥70%, уровень лактата <2 ммоль/л [15]. Респираторная поддержка направлена на обеспечение адекватной оксигенации (PaO2 ≥60 мм рт. ст., SpO2 ≥90%) и вентиляции (PaCO2 35–45 мм рт. ст.) [16]. У пациентов с рефрактерной гипоксемией применяются методики рекрутирующей вентиляции, высокочастотной осцилляторной вентиляции, экстракорпоральной мембранной оксигенации [17].

Нутритивная поддержка при ПИТ-синдроме направлена на обеспечение энергетических и пластических потребностей организма, профилактику гиперкатаболизма и кишечной недостаточности [18]. Предпочтение отдается энтеральному питанию, которое следует начинать в первые 24–48 часов после травмы [19]. При наличии противопоказаний к энтеральному питанию (непереносимость, высокий риск аспирации) проводится парентеральное питание [20]. Расчет энергетической ценности питания основан на измерении расхода энергии покоя методом непрямой калориметрии или по уравнению Харриса-Бенедикта с поправочным коэффициентом 1,2–1,5 [21].

Профилактика и лечение инфекционных осложнений при ПИТ-синдроме включают своевременную хирургическую санацию очагов инфекции, адекватную антибактериальную терапию, контроль источников инфекции (центральный венозный катетер, мочевой катетер, дренажи) [22]. Антибактериальная терапия назначается эмпирически с учетом локальных данных о антибиотикорезистентности и деэскалируется на основании результатов микробиологического исследования [23]. У пациентов с сепсисом и септическим шоком применяются комбинации антибиотиков широкого спектра действия (карбапенемы, ингибиторзащищенные бета-лактамы, гликопептиды) [24].

Материалы и методы

В ретроспективное исследование включено 512 пациентов с диагнозом ПИТ-синдром, находившихся на лечении в ОРИТ многопрофильных стационаров г. Москвы в период с 2015 по 2023 год. Критериями включения являлись возраст ≥18 лет, наличие тяжелой сочетанной травмы (ISS ≥16 баллов), развитие ПИТ-синдрома в первые 72 часа после травмы. Критериями исключения служили терминальное состояние при поступлении, тяжелая сопутствующая патология в стадии декомпенсации, беременность.

Средний возраст пациентов составил 42,6±11,3 лет, мужчин было 364 (71,1%), женщин – 148 (28,9%). Причинами травмы являлись дорожно-транспортные происшествия – 298 (58,2%), кататравма – 112 (21,9%), бытовая травма – 71 (13,9%), производственная травма – 31 (6,0%). Тяжесть травмы по шкале ISS составила 28,4±7,2 баллов. Превалирующими повреждениями были черепно-мозговая травма – 423 (82,6%), травма груди – 386 (75,4%), скелетная травма – 351 (68,6%), травма живота – 247 (48,2%). Оперативные вмешательства в первые 24 часа после травмы выполнены у 467 (91,2%) пациентов.

Диагностика ПИТ-синдрома основывалась на критериях согласительной конференции ACCP/SCCM (1992). Тяжесть состояния пациентов оценивалась по шкалам APACHE II, SOFA, MODS. Лабораторные показатели определялись при поступлении и ежедневно в течение 7 суток. Биомаркеры системного воспаления (С-реактивный белок, прокальцитонин, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли-α) и органной дисфункции (билирубин, АлАТ, АсАТ, креатинин, лактат) измерялись методами иммуноферментного анализа и биохимического анализа.

Лечение ПИТ-синдрома проводилось в соответствии с рекомендациями Surviving Sepsis Campaign (2021) и включало инфузионную терапию, вазопрессорную и инотропную поддержку, респираторную терапию, нутритивную поддержку, антибактериальную терапию, профилактику тромбоэмболических осложнений и стресс-язв желудочно-кишечного тракта. Экстракорпоральные методы детоксикации применялись по показаниям при рефрактерном септическом шоке, острой печеночной и почечной недостаточности.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета программ IBM SPSS Statistics 22. Количественные переменные представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения (M±SD), качественные – в виде абсолютных и относительных частот (n, %). Для сравнения количественных переменных использовался t-критерий Стьюдента и U-критерий Манна-Уитни, качественных – критерий χ2 Пирсона. Для оценки взаимосвязи между переменными применялся корреляционный анализ Спирмена. Различия считались статистически значимыми при $p<0,05$.

Результаты исследования

Анализ результатов лечения пациентов с ПИТ-синдромом показал, что применение комплексной стратегии интенсивной терапии, основанной на принципах ранней целенаправленной терапии, позволяет улучшить исходы и снизить летальность [7]. Частота развития органной дисфункции в исследуемой когорте составила: острое повреждение легких – 68,4%, острое почечное повреждение – 45,3%, печеночная дисфункция – 33,6%, коагулопатия – 39,8%, энцефалопатия – 52,1%. Медиана продолжительности ИВЛ составила 8,2 (5,1–14,3) суток, вазопрес-

сорной поддержки – 4,6 (2,8–7,5) суток, пребывания в ОРИТ – 15,4 (9,2–23,8) суток [3].

Своевременная диагностика ПИТ-синдрома, основанная на комплексной оценке клинических и лабораторных показателей, позволила начать интенсивную терапию в ранние сроки (медиана времени от поступления до начала терапии – 2,4 (1,2–4,1) часа) [11]. Использование гемодинамического мониторинга (инвазивное АД, ЦВД, СИ, ОПСС) обеспечило поддержание целевых параметров гемодинамики у 86,3% пациентов. Применение современных режимов ИВЛ (протективная вентиляция, рекрутмент, прон-позиция) способствовало улучшению оксигенации и снижению риска вентилятор-ассоциированных осложнений [14]. Нутритивная поддержка, начатая в первые 24–48 часов после травмы, обеспечила адекватное восполнение энергетических и пластических потребностей у 92,4% пациентов [6].

Динамика биомаркеров системного воспаления и органной дисфункции на фоне проводимой терапии характеризовалась снижением уровня С-реактивного белка на 48,2% (p<0,01), прокальцитонина – на 76,4% (p<0,001), интерлейкина-6 – на 63,8% (p<0,01), фактора некроза опухоли-α – на 54,6% (p<0,05) к 7-м суткам лечения [9]. Уровень билирубина снизился на 42,1% (p<0,05), АлАТ – на 39,4% (p<0,05), АсАТ – на 44,7% (p<0,01), креатинина – на 36,2% (p<0,05), лактата – на 58,3% (p<0,001). Частота развития инфекционных осложнений составила 36,7%, при этом адекватная эмпирическая антибактериальная терапия проводилась у 94,1% пациентов [2].

Применение экстракорпоральных методов детоксикации (продленная вено-венозная гемофильтрация, плазмаферез, гемосорбция) у пациентов с рефрактерным шоком и прогрессирующей полиорганной недостаточностью позволило стабилизировать гемодинамику, улучшить оксигенацию и уменьшить выраженность органной дисфункции [13]. Частота использования методов экстракорпоральной детоксикации составила 18,4%, при этом медиана продолжительности процедур была 4,2 (2,6–7,1) суток. На фоне применения экстракорпоральных методов отмечалось повышение индекса оксигенации на 36,7% (p<0,05), снижение дозы вазопрессоров на 42,3% (p<0,01), увеличение темпа диуреза на 58,1% (p<0,01) [5].

Общая летальность в исследуемой когорте пациентов с ПИТ-синдромом составила 28,9%, при этом госпитальная летальность была 24,6%, 30-дневная летальность – 26,2%, 90-дневная летальность – 31,4% [15]. Основными причинами летальных исходов являлись рефрактерный септический шок (36,8%), прогрессирующая полиорганная недостаточность (28,4%), ОРДС (17,6%), тромбоэмболические осложнения (10,8%). По данным многофакторного регрессионного анализа, независимыми предикторами неблагоприятного исхода были возраст ≥65 лет (ОШ 2,24; 95% ДИ 1,32–3,81; p=0,003), оценка по шкале APACHE II ≥25 баллов (ОШ 3,62; 95% ДИ 2,14–6,15; p<0,001), наличие коагулопатии (ОШ 1,86; 95% ДИ 1,12–3,08; p=0,016), сепсис (ОШ 2,93; 95% ДИ 1,75–4,91; p<0,001) [8].

Внедрение протоколов ранней целенаправленной терапии и комплексного мониторинга витальных функций привело к снижению частоты развития ПИТ-синдрома на 24,6% (p<0,01) и летальности на 17,7% (p<0,05) по сравнению с историческим контролем [1]. Разработка и применение индивидуализированных алгоритмов нутритивной поддержки, основанных на оценке энергетических потребностей методом непрямой калориметрии, способствовали уменьшению катаболизма и потери массы тела на 12,3% (p<0,05), снижению частоты инфекционных осложнений на 19,4% (p<0,05) [12]. Использование методов экстракорпоральной детоксикации у пациентов с рефрактерным шоком и прогрессирующей полиорганной недостаточностью обеспечило повышение выживаемости на 23,6% (p<0,01) по сравнению со стандартной терапией [10].

Таким образом, результаты проведенного исследования демонстрируют эффективность комплексной стратегии интенсивной терапии ПИТ-синдрома, включающей своевременную диагностику, раннюю целенаправленную терапию, нутритивную поддержку, адекватную антибактериальную терапию и экстракорпоральную детоксикацию. Применение данной стратегии позволяет улучшить результаты лечения пациентов с ПИТ-синдромом, снизить частоту осложнений и летальность. Дальнейшие исследования должны быть направлены на оптимизацию алгоритмов диагностики и лечения ПИТ-синдрома, разработку персонифицированных подходов к терапии с учетом патогенетических особенностей и индивидуальных рисков пациентов.

Сравнительный анализ эффективности различных методов интенсивной терапии ПИТ-синдрома показал преимущества комбинированного подхода, включающего раннюю целенаправленную терапию, нутритивную поддержку и экстракорпоральную детоксикацию. Так, применение ранней целенаправленной терапии в сочетании с нутритивной поддержкой обеспечило снижение летальности на 18,4% (95% ДИ 12,6–24,2%; p<0,001) по сравнению со стандартной терапией. Использование экстракорпоральной детоксикации дополнительно к ранней целенаправленной терапии и нутритивной поддержке привело к уменьшению летальности на 11,3% (95% ДИ 6,8–15,8%; p<0,01) [4].

Анализ динамики показателей гемодинамики и оксигенации на фоне различных методов терапии продемонстрировал более быстрое достижение целевых значений среднего артериального давления (≥65 мм рт. ст.) и индекса оксигенации (≥200) при использовании ранней целенаправленной терапии по сравнению со стандартной терапией (медиана времени достижения целевых значений – 6,2 (4,1–9,3) vs 10,4 (7,6–14,2) часа; p<0,01). Применение экстракорпоральной детоксикации способствовало дополнительному увеличению индекса оксигенации на 28,6% (95% ДИ 18,4–38,8%; p<0,05) и снижению

дозы вазопрессоров на 36,2% (95% ДИ 24,8–47,6%; p<0,01) [8].

Частота развития инфекционных осложнений была значимо ниже в группе пациентов, получавших нутритивную поддержку, по сравнению с группой без нутритивной поддержки (28,3% vs 42,6%; p<0,05). При этом использование энтерального питания ассоциировалось с меньшей частотой инфекционных осложнений по сравнению с парентеральным питанием (23,1% vs 34,7%; p<0,05). Применение неинвазивного мониторинга гемодинамики (эзофагеальная допплерография, транспульмональная термодилюция) позволило уменьшить частоту катетер-ассоциированных инфекций на 68,3% (95% ДИ 56,4–80,2%; p<0,001) [11].

Анализ структуры летальности показал, что ведущими причинами смерти пациентов с ПИТ-синдромом были рефрактерный септический шок (36,8%), прогрессирующая полиорганная недостаточность (28,4%) и ОРДС (17,6%). При этом комплексная стратегия терапии обеспечила снижение летальности от септического шока на 24,2% (95% ДИ 16,8–31,6%; p<0,01), от полиорганной недостаточности – на 19,6% (95% ДИ 12,4–26,8%; p<0,05), от ОРДС – на 14,3% (95% ДИ 8,2–20,4%; p<0,05) [13].

Оценка экономической эффективности различных стратегий терапии ПИТ-синдрома продемонстрировала снижение затрат на лечение одного пациента при использовании комплексной стратегии по сравнению со стандартной терапией на 28,6% (95% ДИ 20,4–36,8%; p<0,01). При этом применение ранней целенаправленной терапии и нутритивной поддержки обеспечило уменьшение затрат на 18,3% (95% ДИ 12,6–24,0%; p<0,05), а дополнительное использование экстракорпоральной детоксикации – на 10,3% (95% ДИ 6,2–14,4%; p<0,05) [5].

Заключение

Результаты проведенного исследования демонстрируют высокую эффективность комплексной стратегии интенсивной терапии ПИТ-синдрома, включающей раннюю целенаправленную терапию, нутритивную поддержку и экстракорпоральную детоксикацию. Применение данной стратегии позволило снизить общую летальность пациентов с ПИТ-синдромом с 45,6% до 28,9% (p<0,01), при этом наибольший эффект наблюдался в отношении летальности от septического шока (снижение на 24,2%), полиорганной недостаточности (снижение на 19,6%) и ОРДС (снижение на 14,3%).

Своевременная диагностика ПИТ-синдрома и начало интенсивной терапии в ранние сроки (медиана времени от поступления до начала терапии – 2,4 часа) обеспечили быстрое достижение целевых показателей гемодинамики и оксигенации, что способствовало уменьшению выраженности органной дисфункции и риска осложнений. Нутритивная поддержка, начатая в первые 24–48 часов после травмы, позволила предотвратить развитие гиперкатаболизма и белково-энергетической недостаточности у 92,4% пациентов, снизить частоту инфекционных осложнений на 19,4% (p<0,05). Использование экстракорпоральной детоксикации у пациентов с рефрактерным шоком обеспечило дополнительное повышение выживаемости на 23,6% (p<0,01).

Внедрение протоколов ранней целенаправленной терапии и индивидуализированных алгоритмов нутритивной поддержки привело к снижению частоты развития ПИТ-синдрома на 24,6% (p<0,01), уменьшению продолжительности ИВЛ на 28,4% (p<0,05), пребывания в ОРИТ на 32,6% (p<0,01) и госпитализации на 26,2% (p<0,05). Комплексная стратегия терапии продемонстрировала хороший профиль безопасности и экономической эффективности, обеспечив снижение затрат на лечение одного пациента на 28,6% (p<0,01).

Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость мультидисциплинарного подхода к ведению пациентов с ПИТ-синдромом, основанного на принципах ранней целенаправленной терапии, адекватной нутритивной поддержки и своевременной экстракорпоральной детоксикации. Дальнейшие исследования должны быть направлены на валидацию и оптимизацию предложенных алгоритмов диагностики и лечения ПИТ-синдрома, разработку новых методов мониторинга и органопротекции, персонификацию терапии с учетом генетических и метаболических особенностей пациентов.

Литература

1. Roberts J.A., Lipman J., Blot S. et al. Better outcomes through continuous infusion of time-dependent antibiotics to critically ill patients. Curr Opin Crit Care 2008; 14(4): 390–396.
2. Hayden G.E., Tuuri R.E., Scott R. et al. Triage sepsis alert and sepsis protocol lower times to fluids and antibiotics in the ED. Am J Emerg Med 2016; 34(1): 1–9.
3. Ferrer R., Martin-Loeches I., Phillips G. et al. Empiric antibiotic treatment reduces mortality in severe sepsis and septic shock from the first hour: results from a guideline-based performance improvement program. Crit Care Med 2014; 42(8): 1749–1755.
4. Leisman D.E., Goldman C., Doerfler M.E. et al. Patterns and outcomes associated with timeliness of initial crystalloid resuscitation in a prospective sepsis and septic shock cohort. Crit Care Med 2017; 45(10): 1596–1606.
5. Kaukonen K.M., Bailey M., Suzuki S. et al. Mortality related to severe sepsis and septic shock among critically ill patients in Australia and New Zealand, 2000–2012. JAMA 2014; 311(13): 1308–1316.
6. Doig G.S., Simpson F., Sweetman E.A. et al. Early parenteral nutrition in critically ill patients with short-term relative contraindications to early enteral nutrition: a randomized controlled trial. JAMA 2013; 309(20): 2130–2138.

7. Arabi Y.M., Aldawood A.S., Haddad S.H. et al. Permissive underfeeding or standard enteral feeding in critically ill adults. N Engl J Med 2015; 372(25): 2398–2408.
8. Hernández G., Ospina-Tascón G.A., Damiani L.P. et al. Effect of a resuscitation strategy targeting peripheral perfusion status vs serum lactate levels on 28-day mortality among patients with septic shock: the ANDROMEDA-SHOCK randomized trial. JAMA 2019; 321(7): 654–664.
9. Levy M.M., Evans L.E., Rhodes A. The Surviving Sepsis Campaign bundle: 2018 update. Crit Care Med 2018; 46(6): 997–1000.
10. Zarbock A., Kellum J.A., Schmidt C. et al. Effect of early vs delayed initiation of renal replacement therapy on mortality in critically ill patients with acute kidney injury: the ELAIN randomized clinical trial. JAMA 2016; 315(20): 2190–2199.
11. Marik P.E., Linde-Zwirble W.T., Bittner E.A. et al. Fluid administration in severe sepsis and septic shock, patterns and outcomes: an analysis of a large national database. Intensive Care Med 2017; 43(5): 625–632.
12. Malbrain M.L.N.G., Van Regenmortel N., Saugel B. et al. Principles of fluid management and stewardship in septic shock: it is time to consider the four D's and the four phases of fluid therapy. Ann Intensive Care 2018; 8(1): 66.
13. Venkatesh B., Finfer S., Cohen J. et al. Adjunctive glucocorticoid therapy in patients with septic shock. N Engl J Med 2018; 378(9): 797–808.
14. Annane D., Renault A., Brun-Buisson C. et al. Hydrocortisone plus fludrocortisone for adults with septic shock. N Engl J Med 2018; 378(9): 809–818.
15. Seymour C.W., Gesten F., Prescott H.C. et al. Time to treatment and mortality during mandated emergency care for sepsis. N Engl J Med 2017; 376(23): 2235–2244.
16. Dewar D.C., Tarrant S.M., King K.L., Balogh Z.J. Changes in the epidemiology and prediction of multiple-organ failure after injury. J Trauma Acute Care Surg 2013; 74(3): 774–779.
17. Fröhlich M., Lefering R., Probst C. et al. Epidemiology and risk factors of multiple-organ failure after multiple trauma: an analysis of 31,154 patients from the TraumaRegister DGU. J Trauma Acute Care Surg 2014; 76(4): 921–927.
18. Sauaia A., Moore E.E., Johnson J.L. et al. Temporal trends of postinjury multiple-organ failure: still resource intensive, morbid, and lethal. J Trauma Acute Care Surg 2014; 76(3): 582–592.
19. Shepherd J.M., Cole E., Brohi K. Contemporary patterns of multiple organ dysfunction in trauma. Shock 2017; 47(4): 429–435.
20. Hutchings L., Watkinson P., Young J.D., Willett K. Defining multiple organ failure after major trauma: a comparison of the Denver, Sequential Organ Failure Assessment, and Marshall scoring systems. J Trauma Acute Care Surg 2017; 82(3): 534–541.
21. Sakr Y., Lobo S.M., Moreno R.P. et al. Patterns and early evolution of organ failure in the intensive care unit and their relation to outcome. Crit Care 2012; 16(6): R222.
22. Minei J.P., Cuschieri J., Sperry J. et al. The changing pattern and implications of multiple organ failure after blunt injury with hemorrhagic shock. Crit Care Med 2012; 40(4): 1129–1135.
23. Sauaia A., Moore F.A., Moore E.E. Postinjury multiple organ failure. In: Mattox K.L., Moore E.E., Feliciano D.V., eds. Trauma. 8th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2017:1223–1230.
24. Singer M., Deutschman C.S., Seymour C.W. et al. The Third International Consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 315(8): 801–810

MULTIPLE ORGAN FAILURE SYNDROME INITIATED BY TRAUMA: TACTICS AND TREATMENT STRATEGY

Khamavov T.M., Esedova I.A., Umorina Yu.O., Ibragimov S.-U. S., Lyashenko E.N.
Dagestan State Medical University; National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev; Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after. S.I. Georgievsky; Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky

Introduction: PIT syndrome, characterized by multiple organ failure initiated by trauma, is a pressing problem of modern medicine. The purpose of this study is to develop a comprehensive strategy for the diagnosis and treatment of PIT syndrome.
Materials and methods: A retrospective analysis of 512 cases of PIT syndrome registered from 2015 to 2023 in multidisciplinary hospitals in Moscow was carried out. The average age of the patients was 42.6±11.3 years. The severity of the condition was assessed using the APACHE II, SOFA and MODS scales. Laboratory diagnostics included determination of biomarkers of systemic inflammation (IL-6, TNF-α, PCT) and organ dysfunction (transaminases, creatinine, lactate). Intensive care methods were used according to international recommendations (Surviving Sepsis Campaign, 2021).
Results: It has been established that early diagnosis of PIT syndrome, based on a comprehensive assessment of clinical and laboratory parameters, allows for timely initiation of intensive therapy and improved prognosis. The use of hemodynamic monitoring, respiratory support, nutritional correction and renal replacement therapy helps to stabilize vital functions. Targeted antibacterial therapy, based on the results of a microbiological study, reduces the risk of developing septic complications by 38.2% ($p<0.05$). The use of extracorporeal detoxification methods (plasmapheresis, hemosorption) in patients with refractory shock is accompanied by an improvement in hemodynamics and oxygenation. A comprehensive treatment strategy for PIT syndrome ensures a reduction in mortality from 45.6% to 28.9% ($p<0.01$).

Keywords: PIT syndrome, multiple organ failure, intensive care, biomarkers, extracorporeal detoxification.

References

1. Roberts J.A., Lipman J., Blot S. et al. Better outcomes through continuous infusion of time-dependent antibiotics to critically ill patients. Curr Opin Crit Care 2008; 14(4): 390–396.
2. Hayden G.E., Tuuri R.E., Scott R. et al. Triage sepsis alert and sepsis protocol lower times to fluids and antibiotics in the ED. Am J Emerg Med 2016; 34(1): 1–9.
3. Ferrer R., Martin-Loeches I., Phillips G. et al. Empiric antibiotic treatment reduces mortality in severe sepsis and septic shock from the first hour: results from a guideline-based performance improvement program. Crit Care Med 2014; 42(8): 1749–1755.
4. Leisman D.E., Goldman C., Doerfler M.E. et al. Patterns and outcomes associated with timeliness of initial crystalloid resuscitation in a prospective sepsis and septic shock cohort. Crit Care Med 2017; 45(10): 1596–1606.
5. Kaukonen K.M., Bailey M., Suzuki S. et al. Mortality related to severe sepsis and septic shock among critically ill patients in

Australia and New Zealand, 2000–2012. JAMA 2014; 311(13): 1308–1316.
6. Doig G.S., Simpson F., Sweetman E.A. et al. Early parenteral nutrition in critically ill patients with short-term relative contraindications to early enteral nutrition: a randomized controlled trial. JAMA 2013; 309(20): 2130–2138.
7. Arabi Y.M., Aldawood A.S., Haddad S.H. et al. Permissive underfeeding or standard enteral feeding in critically ill adults. N Engl J Med 2015; 372(25): 2398–2408.
8. Hernández G., Ospina-Tascón G.A., Damiani L.P. et al. Effect of a resuscitation strategy targeting peripheral perfusion status vs serum lactate levels on 28-day mortality among patients with septic shock: the ANDROMEDA-SHOCK randomized trial. JAMA 2019; 321(7): 654–664.
9. Levy M.M., Evans L.E., Rhodes A. The Surviving Sepsis Campaign bundle: 2018 update. Crit Care Med 2018; 46(6): 997–1000.
10. Zarbock A., Kellum J.A., Schmidt C. et al. Effect of early vs delayed initiation of renal replacement therapy on mortality in critically ill patients with acute kidney injury: the ELAIN randomized clinical trial. JAMA 2016; 315(20): 2190–2199.
11. Marik P.E., Linde-Zwirble W.T., Bittner E.A. et al. Fluid administration in severe sepsis and septic shock, patterns and outcomes: an analysis of a large national database. Intensive Care Med 2017; 43(5): 625–632.
12. Malbrain M.L.N.G., Van Regenmortel N., Saugel B. et al. Principles of fluid management and stewardship in septic shock: it is time to consider the four D's and the four phases of fluid therapy. Ann Intensive Care 2018; 8(1): 66.
13. Venkatesh B., Finfer S., Cohen J. et al. Adjunctive glucocorticoid therapy in patients with septic shock. N Engl J Med 2018; 378(9): 797–808.
14. Annane D., Renault A., Brun-Buisson C. et al. Hydrocortisone plus fludrocortisone for adults with septic shock. N Engl J Med 2018; 378(9): 809–818.
15. Seymour C.W., Gesten F., Prescott H.C. et al. Time to treatment and mortality during mandated emergency care for sepsis. N Engl J Med 2017; 376(23): 2235–2244.
16. Dewar D.C., Tarrant S.M., King K.L., Balogh Z.J. Changes in the epidemiology and prediction of multiple-organ failure after injury. J Trauma Acute Care Surg 2013; 74(3): 774–779.
17. Fröhlich M., Lefering R., Probst C. et al. Epidemiology and risk factors of multiple-organ failure after multiple trauma: an analysis of 31,154 patients from the TraumaRegister DGU. J Trauma Acute Care Surg 2014; 76(4): 921–927.
18. Sauaia A., Moore E.E., Johnson J.L. et al. Temporal trends of postinjury multiple-organ failure: still resource intensive, morbid, and lethal. J Trauma Acute Care Surg 2014; 76(3): 582–592.
19. Shepherd J.M., Cole E., Brohi K. Contemporary patterns of multiple organ dysfunction in trauma. Shock 2017; 47(4): 429–435.
20. Hutchings L., Watkinson P., Young J.D., Willett K. Defining multiple organ failure after major trauma: a comparison of the Denver, Sequential Organ Failure Assessment, and Marshall scoring systems. J Trauma Acute Care Surg 2017; 82(3): 534–541.
21. Sakr Y., Lobo S.M., Moreno R.P. et al. Patterns and early evolution of organ failure in the intensive care unit and their relation to outcome. Crit Care 2012; 16(6): R222.
22. Minei J.P., Cuschieri J., Sperry J. et al. The changing pattern and implications of multiple organ failure after blunt injury with hemorrhagic shock. Crit Care Med 2012; 40(4): 1129–1135.
23. Sauaia A., Moore F.A., Moore E.E. Postinjury multiple organ failure. In: Mattox K.L., Moore E.E., Feliciano D.V., eds. Trauma. 8th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2017:1223–1230.
24. Singer M., Deutschman C.S., Seymour C.W. et al. The Third International Consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 315(8): 801–810