



СОДЕРЖАНИЕ

МЕДИЦИНА. ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ

Андреев Д.И., Абрамов С.В. Неблагоприятный детский опыт и расстройства психотического спектра	6
Абусуева А.С., Шабанов Д.С., Рамазанова С.З., Пашаева С.А., Даниялбекова З.М. Современные тенденции эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в республике Дагестан в 2021–2025 гг.	12
Алексеева К.И., Прокопьева Н.С., Колодезникова С.И. Анализ структуры и тяжести боевых травм, полученных в ходе специальной военной операции	14
Сысоева С.А., Перетокина О.В., Гальченко А.А., Булатня А.Н., Дураков Д.В. Эндоскопическое лигирование варикозно расширенных вен пищевода: эволюция метода и современные возможности	16
Абусуева А.С., Шабанов Д.С., Пашаева С.А., Даниялбекова З.М., Билолова С.К. Пространственная неоднородность заболеваемости бруцеллезом в Республике Дагестан за 2025 год	19
Гараев Р.Р., Шагабудинова Д.И., Хатомкин Д.М. Невралгия тройничного нерва: методы хирургического лечения	23
Горлов А.А., Челпук Д.Р., Смаглюк А.Г., Живилова Е.А., Крапива А.А. Нарушения системы свертывания крови при циррозе печени	26
Жиркова А.Г., Капралов С.В., Мыльников А.М., Клименко Г.А., Полиданов М.А. Пути улучшения результатов лечения хронического парапроктита	29
Игнатова Е.В. Ранняя диагностика кариеса: современные возможности терапевтической стоматологии	32
Ипекчи З.Р., Барило А.Д., Маевская А.Т., Мельник С.А., Асанов Н.Э. 3D-реконструкция нижней челюсти эндопротезами из никелида титана, изготовленных методом селективного лазерного спекания	37
Федорова М.Г., Комарова Е.В., Акимова А.Р., Суханова В.Д., Гундрова Е.В. Анализ смертности от рака молочной железы в Пензенской области за 2021–2024 гг. Статистика смертности от злокачественных новообразований молочной железы	39
Стяжкин С.Н., Зайцев Д.В., Гуцин С.Г., Данилова Ю.А., Королёва А.Л. Клинико-диагностическое значение маркеров системного воспаления при остром панкреатите различной этиологии	42
Кузьмина Д.С., Окунева Е.Р., Радзивил М.П., Дроздик А.Р. Топографоморфологическое строение пахового канала и современная пластика скользящих грыж	45
Куница В.Н., Мартынова Е.В., Сеит-Умерова Д.Р., Скрипченко К.А. Новые «физикальные методы» в пропедевтике внутренних болезней	49
Магомедова А.А., Сулейманова А.Ш., Шогенова Ж.Л. Состояние полости рта и зубов у детей с врожденными пороками сердца, сопровождающиеся легочной артериальной гипертензией	52

Издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер:

ПН № ФС77-76398 от 26.07.2019

Индекс Роспечати 65002

ISSN 2686-9365

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

Учредитель: ООО «Городец»

Издаётся с 2010 года

Издатель: ООО «Издательство КНОРУС»

Адрес редакции и издателя: 117218, Москва, ул. Кедровая, д. 14, корп. 2

E-mail: tapz@list.ru Сайт: www.medsociofil.ru

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Агапов Платон Валериевич, канд. соц. наук, доц., МГУ имени М.В. Ломоносова; Аликханов Халлар Абуумуслимович, д-р мед. наук, проф., Государственная классическая академия им. Маймонида; Аликханов Багдади Абуумуслимович, д-р мед. наук, проф., Центральная клиническая больница РАН; Багдасарьян Надежда Гегамовна, д-р филос. наук, проф., МГТУ им. Н.Э. Баумана; Барков Сергей Александрович, д-р соц. наук, проф., зав. кафедрой социологии организаций и менеджмента социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; Бородин Владимир Иванович, д-р мед. наук, проф., ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского» Минздрава России; Бурмыкина Ирина Викторовна, д-р соц. наук, проф., Липецкий государственный педагогический университет; Волков Юрий Григорьевич, д-р филос. наук, проф., НИЦ Московского мед. исследовательского ун-та им. И.М. Сеченова; Желтов Виктор Васильевич, д-р филос. наук, проф., Сибирский институт социально-политических исследований; Каплунова Вера Юрьевна, д-р мед. наук, гл. научный сотрудник НИО «Метаболический синдром» НИЦ Московского мед. исследовательского ун-та им. И.М. Сеченова; Кравченко Альберт Иванович, д-р соц. наук, проф., Мамедов Агамали Кулам-Оглы, д-р соц. наук, проф., зав. кафедрой социологии коммуникаций и систем социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; Маршак Аркадий Львович, д-р филос. наук, проф., главный научный сотрудник Института социологии РАН; Найдыш Вячеслав Михайлович, д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой онтологии и теории познания Российского ун-та дружбы народов; Овсянников Сергей Александрович, д-р мед. наук, проф., МГМСУ; Осипов Александр Михайлович, д-р соц. наук, проф., главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого; Петров Владимир Николаевич, д-р соц. наук, проф., заведующий кафедрой социологии Кубанского государственного университета; Петрова Татьяна Эдуардовна, д-р соц. наук, проф. кафедры социологии молодежи и молодежной политики Санкт-Петербургского государственного университета; Пятницкий Николай Юрьевич, канд. мед. наук, доц., н.н.с. ФГБНУ НЦПЗ; Рахманов Азат Борисович, д-р филос. наук, доц., социологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова; Садохин Александр Петрович, д-р культурологии, проф., почетный работник высшего профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; Самыгин Сергей Иванович, д-р соц. наук, проф., Южный федеральный университет; Силласте Галина Георгиевна, д-р филос. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой «Социология» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; Сычев Андрей Анатольевич, д-р филос. наук, проф., кафедра философии Мордовского государственного ун-та им. Н.П. Огарева; Терентьев Александр Александрович, д-р мед. наук, проф., чл.-корр. РАН, проф. кафедры биохимии Российского исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова

СОСТАВ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА

Ахметов Сайранбек Махсумович, д-р тех. наук, проф., академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан, академик РАЕН; Вукичевич Слободан, проф., факультет философии, Университет Черногории; Кропп Фредрик, декан факультета Монтеррейского университета (США); Митрович Любиша, проф., факультет философии, Университет г. Ниш (Сербия); Титаренко Лариса Григорьевна, д-р соц. наук, проф., факультет философии и социальных наук, Белорусский государственный университет (Республика Беларусь); Фарро Антонио Луиджи, д-р социологии, проф., Римский университет Сапиенца; Чжан Шулуа, директор Института научной информации Академии общественных наук Китая; Соколова Галина Николаевна, д-р филос. наук, проф., заведующий отделом экономической социологии и социальной демографии Института социологии НАН Беларуси (Минск); Ари Палениус, проф., директор кампуса г. Керва Университета прикладных наук Лауреа (Финляндия); Джун Гуан, проф., зам. декана Института экономики и бизнесадминистрирования, Пекинский технологический университет (Китай); Ли Дешен, проф., декан Института экономики и бизнесадминистрирования, Пекинский технологический университет (Китай); Марек Вочозка, проф., ректор Техничко-экономического института в Чешских Будеювицах (Чехия); Христман Мундт, доктор медицины, директор психиатрической клиники (г. Гейдельберг, Германия); Она Гражина Рахаускиене, проф., Университет им. Миколаса Ромериса (Литва)

Главный редактор:

Бородин В.И., д-р мед. наук, проф.

Отпечатано в типографии ООО «Русайнс», 117218, Москва, ул. Кедровая, д. 14, корп. 2

Тираж 300 экз. Формат А4. Дата выхода в свет: 31.03.2026 Цена свободная

Все материалы, публикуемые в журнале, подлежат внутреннему и внешнему рецензированию

Издание не подлежит маркировке согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Малкова А.А., Смирнова К.С., Мухомудинова И.И. Нейропластичность: возможности восстановления после инсульта.....	54
Куница В.Н., Трифанова Т.Е., Мустафаева А.М., Круглякова Д.Ю. Дифференциальная диагностика сердечных, почечных, венозных и лимфатических отеков: от пропедевтики к инструментальной верификации	58
Масляков В.В., Капранов С.В., Полиданов М.А., Кашихин А.А., Волков К.А. Оценка эффективности хирургической тактики реконструкции тазового дна после сmodellированной минно-осколочной травмы с эквентрацией.....	62
Магомедова А.А. Проблемы организации медицинской помощи детям с врожденными пороками сердца, сопровождающимися легочной артериальной гипертензией на региональном уровне.....	66
Пшукова Е.М., Мирзоева Н.М., Жилокова А.О., Мидов А.З., Карчаева А.Э. Гистологическая верификация опухолей кишечника	69
Николаев Н.В., Орлова Д.Ю., Хатомкин Д.М. Роль биомаркеров повреждения мозга (NSE, S-100, GFAP, UCH-L1) в прогнозировании исходов у реанимационных пациентов после черепно-мозговой травмы.....	72
Куница В.Н., Нишанов Д.И. Современные представления о диагностической ценности биохимического анализа крови при патологии печени	76
Белякова А.Г., Мартынова Е.В., Сеит-Умерова Д.Р., Скрипченко К.А. Комплексный анализ профиля безопасности и нежелательных эффектов семаглутида в современной клинической практике	80
Стяжкина С.Н., Порываев Г.А., Аширова Д.Д., Дмитриева Е.А., Иванова С.И. Современные аспекты хирургического лечения ведущих заболеваний пищевода	83
Хилько С.С., Буралиева У.А., Куцела А.И., Чернявская А.П., Солдатова В.А. Острый аппендицит и беременность: сложности диагностики и особенности хирургического лечения	86
Халилова С.Р., Джемилева Р.Р., Асанов М.К., Дроздик А.Р. Шваннома (невринома, неврилеммома): Общая характеристика, особенности орбитальной локализации и клиническая картина	90
Шишкарёва Л.В., Жесткова П.А. Сравнительная оценка клинических результатов имплантации псевдоаккомодирующих и мультифокальных интраокулярных линз	93
Хилько С.С., Мустафаева Э.О., Рамазанова А.М., Аметова С.С., Мотова М.С. Применение плюрипотентных мезенхимальных стромальных клеток в лечении трофических хронических язв нижних конечностей.....	98

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА, ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА, КУРОРТОЛОГИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ

Плещёв И.Е., Горохова Т.А., Проходимов А.А., Преображенский Я.И. Эффективность персонализированной физической реабилитации пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на санаторно-курортном этапе	101
Сташкевич С.С. Физиологические механизмы воздействия статических упражнений на тонус паравертебральной мускулатуры при занятиях лечебно-оздоровительной физкультурой	105

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Нурлыгаянова Д.Р., Семенова Е.В., Ахатов А.Ф., Нурлыгаянов Р.З. Применение методов автоматизации и управления качеством для совершенствования процесса формирования заключений в отделении лучевой диагностики	108
Рубекина Ю.С. Разработка автоматического аппарата для борьбы с апноэ во сне и храпом	111

ФАРМАКОЛОГИЯ

Афанасьева Т.А., Савин В.П., Гареева А.З. Исследование кинетики гидролиза парацетамола в различных средах.....	114
Белякова А.Г., Аметов Э.Н. Фармакологическая коррекция немоторных проявлений паркинсонизма: депрессия, деменция и нарушения сна	116
Краевская А.Г., Изютина С.В. Радиофарм-синтез: мобильный комплекс по производству ультракороткоживущих радиофармпрепаратов	119
Норбоев М.Д., Евгений А.Л., Валентина М.Л. Исследование фотозащитных свойств феруловой кислоты, троксерутина и их смесей.....	121
Чкалин И.В., Белянин В.В., Павлова М.М. Оценка биодоступности антибиотиков тетрациклинового ряда при комбинированном воздействии нутриентов (спектрофотометрический анализ invitro)	124
Щербакова К.К. Разработка методологии контроля примесей в иммунобиологических препаратах и ее влияние на содержание регистрационного досье	128

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

Доготарь О.А., Артамонов С.П. Современный институт медицинской сестры и гериатрическая практика.....	132
Аргунова А.Н., Хорунов А.Н. Анализ распространенности симптомов и хронических респираторных заболеваний в популяции взрослого населения города Якутск	137

ФИЛОСОФСКИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Заховаева А.Г., Урсу А.В. Экзистенциальный смысл семантического расщепления феномена «душевнобольной» от модели «симптом → подавление» к гуманистической модели «опыт → осмысление»	140
Кудряшова Е.В. Проект философии хозяйства С.Н. Булгакова и критика традиционной философии.....	144

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Акимова О.В., Депутатова Н.А., Шангараева Л.Ф. Межкультурная компетентность как социокультурный феномен в обучении иностранному языку	148
Тихомирова Г.И., Сычева С.А., Бабурина А.В. Проблема адаптации студентов-первокурсников к образовательному процессу в медицинском вузе и ее влияние на качество обучения	153
Соломанина О.О., Микуляк Н.И., Шепелев А.А., Акимова А.Р. Заболевания почек, приводящие к развитию хронической почечной недостаточности: этиологическая структура и патофизиологическая характеристика.....	156
Алимусаева Ф.М., Казанбиева З.Д., Рагимов Р.М. Нейросетевые методы анализа функционального состояния дыхательной системы у детей и взрослых: интеграция капнографии, импульсной осциллометрии и КТ- денситометрии	160

Алхасан Алаа, Мазепа Е.А. Выявление слабого эффекта влияния возрастного фактора на результаты РТМ-измерений в особых точках молочной железы	165	Пахолок Ю.П., Кравцов Ю.А., Ворошилов А.Д., Лисица Г.Т. Роль диетотерапии в периоперационном ведении у пациентов с заболеваниями прямой кишки	202
Грезин А.Г., Лазарян Т.Р., Паньков А.Г., Герасимов Т.И., Асланлы М.М. Хирургическое лечение послеоперационных вентральных грыж: современные сетчатые импланты	169	Куница В.Н., Григоришина Н.Е. Ятрогенные маски: как лекарства изменяют симптомы и аускультативную картину	207
Куница В.Н., Григоришина Н.Е., Карачик Э.У. Визуальная диагностика в пропедевтике: что может сказать внешний осмотр о состоянии внутренних органов (цианоз, отеки, иктеричность)	173	Куровский С.В., Мишин Д.А., Андгуладзе Г.Р. Стоматология как пространство цифровой трансформации и персонализированной регенерации	211
Гусниев А.М., Магомедова Н.А., Даниялбекова З.М., Джанмурзаева А.М., Сааева Н.М. Новое о COVID-19 за 2025 год в Республике Дагестан	178	Магомедова У.А., Сулейманова Р.Г., Магомедов М.М., Арсланкадиева М.М., Даудов Ш.М. Экологические факторы риска для здоровья человека в условиях аграрного региона	216
Есиев Р.К., Узденов И.Р., Хасянова З.М., Пестова А.Н., Романова М.В. Клинико-лабораторная характеристика заболеваний пародонта у подростков с сахарным диабетом 1-го типа	181	Митькин В.И., Билововк А.И., Назаренко Н.А., Громова Л.Е. Эффективность тромболитической терапии при остром инфаркте миокарда на этапе скорой медицинской помощи	220
Ильин Ю.В. Молекулярные и эпигенетические механизмы биологического старения и их значение для анализа средовых воздействий: концептуальный обзор	184	Красильникова Н.В., Плетнев В.В., Петрова Ю.А., Кишкина М.А. Исследование противовоспалительных эффектов настойки корней лопуха большого на модели ожирения у крыс	223
Джанмурзаева А.М., Ахмедов Д.Р., Билалова С.К., Джапилова А.Н., Тагирова К.В. Оценка эффективности комбинированной терапии хронического бруцеллеза с поражением локомоторного аппарата	188	Рясенский Д.С., Ноздреватых О.В., Доренская А.А., Абдуллоева З.А., Евтюгина А. А. Заболеваемость вирусными гепатитами и острыми кишечными инфекциями в Тверской области	226
Есиев Р.К., Нуралиев Р.Т., Терентьев И.Г., Ямалтдинова Л.В., Сергеева Е.В. Микробиологические аспекты применения ортодонтических и ортопедических конструкций в полости рта	193	Малкова А.А., Петров К.Б., Коротаев Р.А. Кожные проявления хронической формы Лайм-Боррелиоза	230
Кодзоева М.И., Кодзоева Т.И., Яндиева М.А. Психотропные состояния и влияние нормотимиков: клинико-эпидемиологический анализ на материалах официальной статистики и психоневрологической службы Республики Ингушетия	196	Красильникова Н.В., Плетнев В.В., Петрова Ю.А., Кишкина М.А. Противовоспалительные и липолитические свойства настойки корней лопуха большого	235
Кордас О.М. Между открытостью и ограничением: анализ концепции сотворчества У. Эко в работах «Открытое произведение» и «Роль читателя»	199	Тиномагомедова З.Д., Скрябина Д.В., Шульга Е.П., Сейт-Аджиева Л.Р., Колесникова А.А. Использование 3D-визуализации и алгоритмов автоматической сегментации МРТ малого таза для планирования органосохраняющих операций в гинекологии	239
		Самохвалов М.М. Раннее прогнозирование профессиональных рисков в химической промышленности для снижения заболеваемости персонала	243
		Холин Д.Е., Холина Е.Д., Кайшева Е.А., Борисова П.А., Лепехина А.В. Обзор приложений для интраоральных сканеров: инновации	248

TABLE OF CONTENTS

MEDICINE. APPLIED RESEARCH AND METHODS

<i>Andreev D.I., Abramov S.V.</i> Adverse Childhood Experiences and Psychotic Spectrum Disorders: Epidemiological, Clinical, and Neurobiological Aspects	6
<i>Abusueva A.S., Shabanov D.S., Ramazanova S.Z., Pashaeva S.A., Daniyalbekova Z.M.</i> Current Trends in the HIV Epidemic Process in the Republic of Dagestan in 2021–2025.....	12
<i>Alekseyeva K.I., Prokopyeva N.S., Kolodeznikova S.I.</i> Analysis of the structure and severity of combat injuries received during a special military operation	14
<i>Sysoeva S.A., Peretokina O.V., Galchenko A.A., Bulatnyaya A.N., Durakov D.V.</i> Endoscopic Variceal Ligation: Evolution of the Method and current Possibilities	16
<i>Abusueva A.S., Shabanov D.S., Pashayeva S.A., Daniyalbekova Z.M., Bilalova S.K.</i> Spatial Heterogeneity of Brucellosis Incidence in the Republic of Dagestan in 2025.....	19
<i>Garaev R.R., Shagabutdinova D.I., Khatomkin D.M.</i> Trigeminal Neuralgia: Surgical Treatment Methods	23
<i>Gorlov A.A., Chelbukh D.R., Smaglyuk A.G., Zhivilova E.A., Krapiva A.A.</i> Disorders of the blood coagulation system in liver cirrhosis.....	26
<i>Zhirkova A.G., Kapralov S.V., Mylnikov A.M., Klimenko G.A., Polidanov M.A.</i> Strategies for improving treatment outcomes in chronic paraproctitis	29
<i>Ignatova E.V.</i> Early diagnosis of dental caries: modern possibilities of therapeutic dentistry	32
<i>Ipekchi Z.R., Barilo A.D., Mayevskaya A.T., Melnik S.A., Asanov N.</i> 3D reconstruction of the lower jaw with nickel-titanium endoprostheses manufactured by selective laser sintering. 37	
<i>Fedorova M.G., Komarova E.V., Akimova A.R., Sukhanova V.D., Gundrova E.V.</i> Analysis of breast cancer mortality in the Penza region for 2021–2024. Statistics on mortality from malignant neoplasms of the breast	39
<i>Styazhkina S.N., Zaitsev D.V., Gushchin S.G., Danilova Yu.A., Koroleva A.L.</i> Clinical and diagnostic significance of markers of systemic inflammation in acute pancreatitis of various etiologies....	42
<i>Kuzmina D.S., Okuneva E.R., Radzivil M.P., Drozdik A.R.</i> Topographic and morphologic structure of the inguinal canal and modern plastic surgery for hernias	45
<i>Kunitsa V.N., Martynova E.V., Seit-Umerova D.R., Skripchenko K.A.</i> New «physical methods» in internal medicine propaedeutics	49
<i>Magomedova A.A., Suleymanova A.Sh., Shogenova Zh.L.</i> Oral and dental health in children with congenital heart defects associated with pulmonary arterial hypertension	52
<i>Malkova A.A., Smirnova K.S., Mukhultdinova I.I.</i> Neuroplasticity: opportunities for recovery after stroke	54
<i>Marten V.N., Trifanova T.E., Mustafaeva A.M., Kruglyakova D. Yu.</i> Differential diagnosis of cardiac, renal, venous, and lymphatic edema: from propaedeutics to instrumental verification ..	58
<i>Maslyakov V.V., Kapralov S.V., Polidanov M.A., Kashikhin A.A., Volkov K.A.</i> Evaluation of the effectiveness of surgical tactics for pelvic floor reconstruction after simulated mine fragmentation injury with eventration	62
<i>Magomedova A.A.</i> Problems of organizing medical care for children with congenital heart defects accompanied by pulmonary arterial hypertension at the regional level	66
<i>Pshukova E.M., Mirzoeva N.M., Zhilokova A.O., Midov A.Z., Karchaeva A.E.</i> Histological verification of intestinal tumors	69
<i>Nikolaev N.V., Orlova D.Yu., Khatomkin D.M.</i> The role of brain injury biomarkers (NSE, S-100, GFAP, UCH-L1) in predicting outcomes in ICU patients after traumatic brain injury.....	72

<i>Kunitsa V.N., Nishanov D.I., Nurbaeva D.A.</i> Modern views on the diagnostic value of biochemical blood analysis in liver pathology.....	76
<i>Belyakova A.G., Martynova E.V., Seit-Umerova D.R., Skripchenko K.A.</i> Comprehensive analysis of the safety profile and adverse effects of semaglutide in current clinical practice.....	80
<i>Styazhkina S.N., Poryvaev G.A., Ashirova D.D., Dmitrieva E.A., Ivanova S.I.</i> Modern aspects of surgical treatment of leading diseases of the esophagus.....	83
<i>Hilko S.S., Buralieva U.A., Kutsela A.I., Chernyavskaya A.P., Soldatova V.A.</i> Acute appendix and pregnancy: difficulties of diagnosis and features of surgical treatment	86
<i>Khalilova S.R., Dzhemileva R.R., Asanov M.K., Drozdik A.R.</i> Schwannoma (Neurilemmoma, Neurilemmoma): General Characteristics, Orbital Localization Features, and Clinical Presentation.....	90
<i>Shishkareva L.V., Zhestkova P.A.</i> Comparative Evaluation of Clinical Outcomes of Pseudo-Accommodating and Multifocal Intraocular Lens Implantation	93
<i>Hilko S.S., Mustafaeva E.O., Ramazanova A.M., Ametova S.S., Motova M.S.</i> Application of pluripotent mesenchymal stromal cells in the treatment of chronic trophic leg ulcers.....	98

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE, THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE, RESORT MEDICINE AND PHYSIO THERAPY

<i>Pleshchev I.E., Gorokhova T.A., Prohodimov A.A., Preobrazhenskiy Ya.I., Karakchiev D.A.</i> The effectiveness of a personalized approach at the sanatorium – resort stage of rehabilitation treatment of patients with type 2 diabetes mellitus...	101
<i>Stashkevich S.S.</i> Physiological mechanisms of the effect of static exercises on the tone of the paravertebral muscles during therapeutic and recreational physical training	105

MEDICAL AND PREVENTIVE TECHNOLOGIES

<i>Nurlygayanova D.R., Semenova E.V., Akhatov A.F., Nurlygayanov R.Z.</i> Using Automation and Quality Management Methods to Improve the Report Generation Process in the Radiology Department	108
<i>Rubekina Yu.S.</i> Development of an automatic device to combat sleep apnea and snoring	111

PHARMACOLOGY

<i>Afanasyeva T.A., Savin V.P., Gareeva A.Z.</i> Study of the kinetics of paracetamol hydrolysis in various media.....	114
<i>Belyakova A.G., Ametov E.N., Klyuev A.I., Mustafayev Z.M.</i> Pharmacological Correction of Non-Motor Manifestations of Parkinsonism: Depression, Dementia, and Sleep Disorders	116
<i>Kraevskaia A.G., Izutina S.V.</i> Radiopharm-synthesis: a mobile complex for the production of ultra-short-lived radiopharmaceuticals.....	119
<i>Norboev M.D., Larionov E.A., Larionova V.M.</i> Research into the photoprotective properties of ferulic acid, troxerutin, and their mixtures.....	121
<i>Chkalin I.V., Belyanin V.V., Pavlova M.M.</i> Assessment of tetracycline antibiotics bioavailability under combined nutrient exposure (spectrophotometric analysis in vitro).....	124
<i>Shcherbakova K.K.</i> Development of a methodology for monitoring impurities in immunobiological drugs and its impact on the content of the registration dossier	128

MODERN APPROACHES TO HEALTH PROTECTION

<i>Dogotar O.A., Artamonov S.P.</i> Modern institute of nursing and geriatric practice.....	132
<i>Argunova A.N., Khorunov A.N.</i> Analysis of the prevalence of symptoms and chronic respiratory diseases in the adult population of the city of Yakutsk.....	137

PHILOSOPHICAL WORLDVIEWS

<i>Zakhovaeva A.G., Ursu A.V.</i> Existential meaning of semantic split of the phenomenon "mental ill" from the model "symptom → suppression" to the humanistic to the humanistic model "experience → understanding".....	140
<i>Kudryashova E.V.</i> Draft philosophy of economy by S.N. Bulgakov and criticism of traditional philosophy	144

INTERDISCIPLINARY RESEARCH

<i>Akimova O.V., Deputatova N.A., Shangaraeva L.F.</i> Intercultural competence as a sociocultural phenomenon in foreign language teaching	148
<i>Tikhomirova G.I., Sycheva S.A., Baburina A.V.</i> The challenge of first-year medical students' adaptation to the educational process and its impact on learning quality	153
<i>Solomanina O.O., Mikulyak N.I., Shepelev A.A., Akimova A.R.</i> Kidney diseases leading to the development of chronic renal failure: etiological structure and pathophysiological characteristics.....	156
<i>Alimysaeva F.M., Kazanbieva Z.D., Ragimov R.M.</i> Neural Network Methods for Analyzing Respiratory Function in Children and Adults: Integration of Capnography, Impulse Oscillometry, and CT Densitometry	160
<i>Alhasan Alaa, Mazepa E.A.</i> Identification of the weak effect of age factor on the results of rtm measurements in special points of the breast.....	165
<i>Grezin A.G., Lazaryan T.R., Pankov A.G., Gerasimov T.I., Aslanly M.M.</i> Surgical treatment of incisional ventral hernias: modern mesh implants.....	169
<i>Kunitsa V.N., Grigorishina N.E., Karachik E.U.</i> Visual diagnostics in propedeutics: what external examination can reveal about the state of internal organs (cyanosis, edema, icterus)	173
<i>Gusniev A.M. -Z., Magomedova N.A., Daniyalbekova Z.M., Dzhanmurzeva A.M., Saayeva N.M.</i> New on COVID-19 in 2025 in the Republic of Dagestan	178
<i>Esiev R.K., Uzdenov I.R., Khasyanova Z.M., Pestova A.N., Romanova M.V.</i> Clinical and laboratory characteristics of periodontal disease in adolescents with type 1 diabetes mellitus...	181
<i>Ilyin Yu.V.</i> Molecular and Epigenetic Mechanisms of Biological Aging and Their Implications for the Analysis of Environmental Impacts: A Conceptual Review.....	184

<i>Dzhanmurzaeva A.M., Akhmedov D.R., Bilalova S.K., Dzhailova A.N., Tagirova K.V.</i> Evaluation of the effectiveness of combination therapy for chronic brucellosis with locomotor system involvement.....	188
<i>Esiev R.K., Nuraliev R.T., Terentyev I.G., Yamaltdinova L.V., Sergeeva E.V.</i> Microbiological Aspects of the Use of Orthodontic and Prosthetic Appliances in the Oral Cavity.....	193
<i>Kodzoeva M.I., Kodzoeva T.I., Yandieva M.A.</i> Psychotropic States and the Impact of Normothymic Agents: A Clinico-Epidemiological Analysis Based on Official Statistics and the Psychoneurological Service of the Republic of Ingushetia	196
<i>Kordas O.M.</i> Between Openness and Constraint: An Analysis of Umberto Eco's Concept of Co-Creation in The Open Work and The Role of the Reader.....	199
<i>Pakholyuk Yu.P., Kravtsov Yu. A., Lisitsa G.T., Voroshilov A.D.</i> The role of diet therapy in perioperative management of patients with rectal diseases (literature review)	202
<i>Kunitsa V.N., Grigorishina N.E., Karachik E.U.</i> Iatrogenic masks: how drugs alter symptoms and auscultatory findings.....	207
<i>Kurovsky S.V., Mishin D.A., Andguladze G.R.</i> Dentistry as a space for digital transformation and personalized regeneration	211
<i>Magomedova U.A., Suleymanova R.G., Magomedov M.M., Arslankadiyeva M.M., Daudov Sh.M.</i> Ecological risk factors for human health in an agricultural region	216
<i>Mitkin V.I., Bilovkov A.I., Nazarenko N.A., Gromova L.E.</i> Effectiveness of Thrombolytic Therapy for Acute Myocardial Infarction in the Emergency Care Stage.....	220
<i>Krasilnikova N.V., Pletnev V.V., Petrova J.A., Kishkina M.A.</i> Investigation of the anti-inflammatory effects of burdock root tincture on a model of obesity in rats	223
<i>Ryasensky D.S., Nozdrevatych O.V., Abdulloeva Z.A., Dorenskaya A.A., Evtyugina A.A.</i> Incidence of viral hepatitis and acute intestinal infections in the Tver region.....	226
<i>Petrov K.B., Korotaev R.A., Malkova A.A.</i> Cutaneous manifestations of chronic Lyme Borreliosis.....	230
<i>Krasilnikova N.V., Pletnev V.V., Petrova J.A., Kishkina M.A.</i> Anti-inflammatory and lipolytic properties of burdock root tincture	235
<i>Tinomagomedova Z.D., Skryabina D.V., Shulga E.P., Seit-Adzhieva L.R., Kolesnikova A.A.</i> Using 3D Visualization and Automatic Pelvic MRI Segmentation Algorithms for Planning Organ-Preserving Gynecological Surgeries	239
<i>Samokhvalov M.M.</i> Early prediction of occupational risks in the chemical industry to reduce staff morbidity.....	243
<i>Kholin D.E., Kholina E.D., Kaisheva E.A., Borisova P.A., Lepekhina A.V.</i> Overview of applications for interactive scanners: innovation.....	248

Неблагоприятный детский опыт и расстройства психотического спектра

Андреев Даниил Игоревич,

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России
E-mail: andreevdanya7@gmail.com;

Абрамов Сергей Владимирович

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, ГКОУ Московской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр психолого-педагогической реабилитации, коррекции и образования «Ариадна»
E-mail: asw2000@rambler.ru

В обзоре систематизированы современные эпидемиологические, клинические и нейробиологические данные о связи неблагоприятного детского опыта (НДО) с шизофренией и острыми психотическими состояниями. Метаанализы показывают увеличение риска психоза в 2–3 раза при воздействии НДО. Различные формы насилия (сексуальное, физическое, эмоциональное) связаны со специфическими симптоматическими профилями. Рассматриваются возможные механизмы, включая эпигенетические изменения, дисрегуляцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, нейровоспаление и психологические медиаторы (нарушения привязанности, дезадаптивные когнитивные схемы). Отдельно отмечен феномен трансгенерационной передачи уязвимости, подтвержденный проспективными когортными исследованиями.

Ключевые слова: неблагоприятный детский опыт, шизофрения, психоз, эпигенетика, трансгенерационная травма, стресс, диатез-стресс, профилактика, психообразование

Введение

В последние десятилетия неблагоприятный детский опыт (НДО) – совокупность стрессовых и травматических воздействий детского и подросткового возраста (физическое, сексуальное, эмоциональное насилие, пренебрежение) [1] – рассматривается как значимый средовой фактор риска расстройств психотического спектра [2–4]. Ранняя травматизация широко распространена и ассоциирована с суицидальностью, зависимым поведением и другими неблагоприятными последствиями [5].

Метааналитические исследования продемонстрировали, что НДО увеличивает риск развития психоза приблизительно в 2–3 раза; в метаанализе Varese и соавт. $OR = 2,78$ (95% $CI = 2,34–3,31$) [2]. Шизофрения является многофакторным расстройством: несмотря на высокую наследуемость (60–80%), феномен «недостающей наследуемости» указывает на роль эпигенетических механизмов во взаимодействии генетической уязвимости со средовыми факторами [6–8].

Целью настоящего обзора является анализ современных данных о роли НДО в формировании шизофрении и острых психотических состояний.

Понятие неблагоприятного детского опыта

Оригинальное ACE-исследование Felitti и соавт. [9] охватывает как прямые формы насилия и пренебрежения, так и опосредованные факторы семейной дисфункции. Систематические обзоры подчеркивают методологическую неоднородность: дискретный подход выявляет связи типа травмы с исходом; кумулятивный отражает принцип дозозависимости, но утрачивает специфичность; измерительный использует стандартизированные инструменты (CTQ, ACE-IQ) и является наиболее строгим, но зависит от шкалы [10]. Поскольку НДО – сложное понятие, по-разному определяемое в исследованиях, их результаты сложно сопоставлять напрямую [11].

Инструменты CTQ и ACE-IQ позволяют дифференцировать типы воздействия [12]; отечественный обзор рекомендует биопсихосоциальную модель с учетом взаимодействия генома и среды [13]. НДО обычно представляет собой хроническое воздействие в чувствительные периоды нейроразвития [14] – уместен термин «травма развития».

Ключевым принципом современной концепции является дозозависимый характер: риск психопатологии возрастает пропорционально числу перенесенных неблагоприятных воздействий [2]. Тип, возраст начала и хроничность травматизации вносят независимый вклад в психотическую уязвимость [15, 16]; пренебрежение как форма травмы ассоциировано с депрессией, тревогой, ПТСР, суицидальным поведением и зависимостью [17]. Проспективные данные подтверждают, что НДО предшествует развитию галлюцинаций, бреда и расстройств мышления в подростковом возрасте [18], а субклинические психотические переживания в общей популяции клинически значимы, подтверждающая концепцию континуума уязвимости [19].

Распространенность и эпидемиологические данные

Связь между НДО и развитием психотических расстройств подтверждена в многочисленных эпидемиологических исследованиях. Систематический обзор 2012 г. показал, что суммарный риск, связанный с неблагоприятными событиями, составляет 33% от общей вероятности развития шизофрении в популяции [2]; при этом относительные риски для отдельных видов насилия составили: сексуальное насилие $OR\ 2,38$ (1,98–2,87), физическое насилие $OR\ 2,95$ (2,25–3,88), эмоциональное насилие $OR\ 3,40$ (2,06–5,62). Метаанализ 2013 г. выявил, что среди лиц с шизофренией 26% пережили сексуальное насилие, 39% – физическое и 34% – эмоциональное [20]. Важно учитывать, что около 40% случаев жестокого обращения, зафиксированных по самоотчетам, не отражены в медицинской документации [21], что объясняет более низкие показатели в документальных исследованиях (47,4% в когорте первого эпизода психоза [22]).

По данным систематических метаанализов, значительная часть пациентов с шизофренией (от половины до двух третей) сообщают о на-

личии по меньшей мере одной формы детской травматизации [23]. Систематический обзор влияния насилия и пренебрежения на развитие шизофрении и психозов подтвердил устойчивость данной ассоциации в различных клинических и популяционных выборках [24].

Специфические формы НДО ассоциированы с различными симптоматическими профилями: физическое насилие – с параноидной симптоматикой, сексуальное – с галлюцинациями [25, 26]. Угрозы и насилие в детстве связаны с психозом в популяционных выборках даже после учета генетических конфаундеров [27]. Наличие множественных форм НДО коррелирует с более тяжелым началом и выраженной позитивной симптоматикой [23, 24]. Проспективные данные подтверждают причинную направленность: детская травматизация предшествует манифестации психоза [18, 28], а в когорте лиц, достигших 40 лет ($N = 6087$) все подтвержденные типы жестокого обращения были связаны с последующими госпитализациями по поводу неаффективного психоза [29]. Более тяжелое и затяжное течение психотических расстройств коррелирует с выраженностью травматизации [30].

Дополнительные социальные факторы (миграция, урбанизация и социальная изоляция) также повышают риск психоза [31, 32]. Риск психотических расстройств повышен у детей из неполных семей, что согласуется с концепцией хронически дезорганизующей ранней среды [33]. Употребление каннабиса, особенно в подростковом возрасте, рассматривается как независимый фактор риска манифестации психоза у генетически предрасположенных лиц [34, 35].

Клинические особенности шизофрении и острых психозов при НДО

Исследования клинических характеристик психозов при детской травме выявляют более раннее начало, более выраженную позитивную симптоматику и ряд специфических клинических паттернов [36].

Детское сексуальное насилие ассоциировано с более ранним возрастом манифестации первого психотического эпизода: в группе с сексуальным насилием скорректированный средний возраст дебюта составил 15,97 лет против 16,21 года в популяции; связь сохранилась после учета злоупотребления психоактивными веществами [37]. Свидетельство насилия в детстве – значимый предиктор раннего дебюта ($OR = 1,045$; $p = 0,029$) и более выраженной симптоматики по PANSS ($\beta = 0,212$; $p < 0,05$) [37]; ранний стресс ускоряет реализацию генетической уязвимости [6, 38].

Метааналитические данные показывают, что специфические формы НДО ассоциированы с определенными симптоматическими изменениями при психозе: сексуальное насилие наиболее тесно связано с галлюцинаторной симптоматикой, физическое насилие – с параноидными переживаниями [26]. Нарушения распознавания эмоций у лиц с высоким клиническим риском психоза связаны с перенесенным НДО, что указывает на роль социально-когнитивных нарушений как медиатора [39].

Угрожающие жизненные события, включая опыт насилия, провоцируют специфические патологические паттерны антиципации угрозы и психопатологические реакции, опосредующие связь между травмой и психозом [40, 41]. Дезадаптивные когнитивные схемы, формирующиеся при хроническом насилии и пренебрежении в детстве, являются независимым предиктором психотических проявлений [42].

Пациенты с резистентной к клоzapину шизофренией демонстрируют более высокую распространенность тяжелых форм детской травматизации, что предполагает связь НДО с формированием фармакорезистентного фенотипа [43]. Тип перенесенной детской травмы может влиять на ответ на антипсихотическую терапию и долгосрочные клинические исходы [44].

НДО ассоциирован с повторными психотическими эпизодами [45], худшим функциональным прогнозом (снижение общего функционирования $r = -0,109$, $p < 0,001$; наибольший эффект – эмоциональное и физическое пренебрежение $r = -0,199$ – $0,250$) [46], аффективной нестабильностью и утяжелением симптоматики [47]. Шизотипные черты в неклинических выборках также ассоциированы с детской травмой, что указывает на континуум психотической уязвимости [48], а ранние средовые факторы риска способствуют долгосрочному когнитивному снижению [49].

Пациенты с психотическими расстройствами относятся к группе высокого суицидального риска [50, 51], при этом НДО является самостоятельным предиктором суицидальных попыток при шизофрении [52]. Детская травма формирует широкий спектр негативных исходов: нарушения аффективной регуляции, когнитивные дефициты, нестабильную идентичность и небезопасную привязанность [53]. Вместе с тем у пациентов с историей травматизации возможно формирование адаптивных стратегий преодоления, что открывает перспективы для психотерапевтических вмешательств [54].

Патогенетические механизмы связи НДО с психозом

Современные модели шизофрении рассматривают заболевание как результат взаимодействия генетических, средовых и нейробиологических факторов [6]. Прежде чем перейти к конкретным механизмам, важно обозначить концептуальные рамки роли ранней среды в формировании психотической уязвимости.

Исторический концепт «шизофреногенной матери» [55] переосмыслен в современных категориях хронически дезорганизующей ранней среды. Теория «двойного послания» Бейтсона [56] и концепция «контейнирования» Биона–Винникотта [57] описывают механизмы, посредством которых нарушенная ранняя привязанность формирует фрагментацию самооощущения и дефицит ментализации [58].

Близнецовые исследования демонстрируют высокую наследуемость шизофрении (60–80%), однако конкордантность монозиготных близнецов составляет лишь 40–50%, а полигенный риск охватывает сотни локусов синаптической функции [6, 59]; феномен «недостающей наследуемости» указывает на ключевую роль эпигенетики [7, 8].

В диатез-стрессовой концепции «диатез» включает не только наследственные черты, но и факторы воспитания, реализующиеся при накоплении средового «груза» [60]. Ранний стресс вызывает стойкие эпигенетические изменения, включая метилирование ДНК генов стресс-ответа [14, 61]. В рамках проекта EU-GEI продемонстрирована роль ДНК-метилирования как медиатора связи между НДО и психозом [62], а изменения метилирования гена *NR3C1* ассоциированы с изменениями стресс-реактивности [60].

Три основных эпигенетических механизма (метилирование ДНК, модификации гистонов, некодирующие РНК) программируют нейроэндокринные и нейровоспалительные системы [60, 63], объясняя фенотипическую вариабельность монозиготных близнецов [7, 8, 62]. Дисрегуляция HPA-оси при этом ведет к нарушениям ритма кортизола и структурным изменениям гиппокампа, префронтальной коры и миндалины [14, 60, 64].

Дофаминергическая дисрегуляция вследствие гиперактивации HPA-оси усиливает аберрантное присвоение значимости стимулам – ключевой механизм позитивной симптоматики [6, 65]; НДО также повышает провоспалительные цитокины [66] и влияет на синаптический прунинг через систему комплемента C4 [66–68]. Взаимодействие НДО с полиморфизмом *TNF-α* значимо модулирует когнитивно-дезорганизационную симптоматику [69], подчеркивая роль нейровоспаления [67].

Наряду с нейробиологическими механизмами действуют психологические медиаторы: жестокое обращение снижает IQ [70], формирует дефициты во всех доменах негативной симптоматики (ангедония, абулия, асоциальность, уплощенный аффект, алогия) [71], нарушения привязанности и когнитивные схемы угрозы [72]. Причинные механизмы риска психоза включают взаимодействие стресс-реактивности, нейровоспаления и когнитивно-аффективных нарушений [67].

Трансгенерационная передача НДО и психотической уязвимости

Современные данные позволяют рассматривать НДО не только как индивидуальный фактор риска, но и как механизм межпоколенческой передачи уязвимости. Эпигенетические особенности матери, сформированные ее НДО, влияют на внутриутробную среду (плацентарная функция, гормоны стресса, иммунное программирование плода) и могут передаваться через половые клетки, нарушая адаптацию потомства [73].

Молекулярные механизмы передачи включают метилирование ДНК (гены *FKBP5* и др.), модификации гистонов и некодирующие РНК, способные передаваться через половые клетки; пренатальный стресс дополнительно воздействует на созревающий мозг плода через нейроэндокринное состояние матери [73].

Проспективное исследование Generation R ($N = 3068$ диад мать–ребенок) показало: НДО матери ассоциировано с НДО у потомства ($\beta = 0,12$), а НДО потомства опосредовало 16,3% связи материнского НДО с галлюцинациями и 13,1% – с бредом у подростков [74], подтверждая, что межпоколенческая трансмиссия травмы является модифицируемой мишенью для профилактики.

Заключение

Проведенный анализ подтверждает, что неблагоприятный детский опыт является значимым средовым фактором, ассоциированным с повышенным риском развития шизофрении и острых психотических состояний. Эпидемиологические, клинические и нейробиологические данные свидетельствуют об устойчивой, дозозависимой и воспроизводимой в различных выборках связи НДО с психотической симптоматикой.

Ключевыми направлениями дальнейших исследований являются: разработка методов эпигенетической стратификации риска психоза; изучение обратимости эпигенетических изменений на фоне ранних психотерапевтических вмешательств; создание программ, направленных на разрыв цикла межпоколенческой передачи НДО.

Литература

1. Adverse Childhood Experiences International Questionnaire (ACE-IQ) [Electronic resource] // World Health Organization. 28 January 2020. URL: [https://www.who.int/publications/m/item/adverse-childhood-experiences-international-questionnaire-\(ace-iq\)](https://www.who.int/publications/m/item/adverse-childhood-experiences-international-questionnaire-(ace-iq)) (дата обращения: 12.03.2026).
2. Varese F, Smeets F, Drukker M, et al. Childhood adversities increase the risk of psychosis: a meta-analysis of patient-control, prospective- and cross-sectional cohort studies // *Schizophrenia Bulletin*. 2012. Vol. 38, № 4. P. 661–671.
3. Trotta A, Murray RM, Fisher HL. The impact of childhood adversity on the persistence of psychotic symptoms: a systematic review and meta-analysis // *Psychological Medicine*. 2015. Vol. 45, № 12. P. 2481–2498.
4. Gibson LE, Alloy LB, Ellman LM. Trauma and the psychosis spectrum: a review of symptom specificity and explanatory mechanisms // *Clinical Psychology Review*. 2016. Vol. 49. P. 92–105.
5. Scott KM, McLaughlin KA, Smith DA, Ellis PM. Childhood maltreatment and DSM-IV adult mental disorders: comparison of retrospective and prospective findings // *British Journal of Psychiatry*. 2012. Vol. 200, № 6. P. 469–475.
6. Owen MJ, Sawa A, Mortensen PB. Schizophrenia // *Lancet*. 2016. Vol. 388, № 10039. P. 86–97.
7. Sullivan PF, Kendler KS, Neale MC. Schizophrenia as a complex trait: evidence from a meta-analysis of twin studies // *Archives of General Psychiatry*. 2003. Vol. 60, № 12. P. 1187–1192.
8. van Os J, Kenis G, Rutten BP. The environment and schizophrenia // *Nature*. 2010. Vol. 468, № 7321. P. 203–212.
9. Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, et al. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study // *American Journal of Preventive Medicine*. 1998. Vol. 14, № 4. P. 245–258.
10. McKay MT, Cannon M, Chambers D, et al. Childhood trauma and adult mental disorder: A systematic review and meta-analysis of longitudinal cohort studies // *Acta Psychiatrica Scandinavica*. 2021. Vol. 143, № 3. P. 189–205.
11. Sævioren SS, Bjørnstad JR, Ottesen AA, et al. Unraveling the Concept of Childhood Adversity in Psychosis Research: A Systematic Review // *Schizophrenia Bulletin*. 2024. Vol. 50, № 5. P. 1055–1066.
12. Fisher HL, Craig TK, Fearon P, et al. Reliability and comparability of psychosis patients' retrospective reports of childhood abuse // *Schizophrenia Bulletin*. 2011. Vol. 37, № 3. P. 546–553.
13. Шумская Д.С., Трусова А.В., Кибитов А.О. Неблагоприятный детский опыт: термины, концепции и методы анализа // *Обзор психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева*. 2025. Т. 59, № 3. С. 40–51. – EDN: EZPPNK. [Shumskaya D.S., Trusova A.V., Kibitov A.O. Adverse childhood experiences: terms, concepts, and study methods // V.M. Bekhterev review of psychiatry and medical psychology. 2025. Vol. 59, № 3. P. 40–51. (In Russ.)]
14. Teicher MH, Samson JA. Annual research review: enduring neurobiological effects of childhood abuse and neglect // *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. 2016. Vol. 57, № 3. P. 241–266.
15. Schalinski I, Breinlinger S, Hirt V, et al. Environmental adversities and psychotic symptoms: The impact of timing of trauma, abuse, and neglect // *Schizophrenia Research*. 2019. Vol. 205. P. 4–9.
16. Isvoranu AM, van Borkulo CD, Boyette LL, et al. A Network Approach to Psychosis: Pathways Between Childhood Trauma and Psychotic Symptoms // *Schizophrenia Bulletin*. 2017. Vol. 43, № 1. P. 187–196.
17. Norman RE, Byambaa M, De R, et al. The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: a systematic review and meta-analysis // *PLoS Medicine*. 2012. Vol. 9, № 11. e1001349.
18. Arseneault L, Cannon M, Fisher HL, et al. Childhood trauma and children's emerging psychotic symptoms: A genetically sensitive longitudinal cohort study // *American Journal of Psychiatry*. 2011. Vol. 168, № 1. P. 65–72.
19. Kelleher I, Keeley H, Corcoran P, et al. Clinicopathological significance of psychotic experiences in non-psychotic young people: evidence from four population-based studies // *British Journal of Psychiatry*. 2012. Vol. 201, № 1. P. 26–32.
20. Bonoldi I, Simeone E, Rocchetti M, et al. Prevalence of self-reported childhood abuse in psychosis: a meta-analysis of retrospective studies // *Psychiatry Research*. 2013. Vol. 210, № 1. P. 8–15.
21. Negriff S, Schneiderman JU, Trickett PK. Concordance Between Self-Reported Childhood Maltreatment Versus Case Record Reviews for Child Welfare-Affiliated Adolescents // *Child Maltreatment*. 2017. Vol. 22, № 1. P. 34–44.
22. Redmond A, Gaynor K, Naughton S, Clarke M. Recorded Rates of Trauma-Exposure in a Retrospective Epidemiologically Complete First-Episode Psychosis Cohort // *Early Intervention in Psychiatry*. 2025. Vol. 19, № 1. e13610.
23. Matheson SL, Shepherd AM, Pinchbeck RM, et al. Childhood adversity in schizophrenia: a systematic meta-analysis // *Psychological Medicine*. 2013. Vol. 43, № 2. P. 225–238.
24. Chaiyachati BH, Gur RE. Effect of child abuse and neglect on schizophrenia and other psychotic disorders // *Pharmacology Biochemistry and Behavior*. 2021. Vol. 206. 173195.
25. Trotta A, Di Forti M, Mondelli V, et al. Prevalence of bullying victimisation amongst first-episode psychosis patients and unaffected controls // *Schizophrenia Research*. 2013. Vol. 150, № 1. P. 169–175.
26. Alameda L, Christy A, Rodriguez V, et al. Association Between Specific Childhood Adversities and Symptom Dimensions in People With Psychosis: Systematic Review and Meta-Analysis // *Schizophrenia Bulletin*. 2021. Vol. 47, № 4. P. 975–985.
27. Morgan C, Gayer-Anderson C, Beards S, et al. Threat, hostility and violence in childhood and later psychotic disorder: population-based case-control study // *British Journal of Psychiatry*. 2020. Vol. 217, № 4. P. 575–582.
28. Janssen I, Krabbendam L, Bak M, et al. Childhood abuse as a risk factor for psychotic experiences // *Acta Psychiatrica Scandinavica*. 2004. Vol. 109, № 1. P. 38–45.
29. Kisely S, Arnautovska U, Siskind D, et al. Admissions for psychosis following agency-notified child maltreatment at 40-year-follow-up: Results from the Childhood Adversity and Lifetime Morbidity (CALM) cohort // *Schizophrenia Research*. 2024. Vol. 267. P. 247–253.
30. Uçok A, Bıkmaz S. The effects of childhood trauma in patients with first-episode schizophrenia // *Acta Psychiatrica Scandinavica*. 2007. Vol. 116, № 5. P. 371–377.
31. Cantor-Graae E, Selten JP. Schizophrenia and migration: a meta-analysis and review // *American Journal of Psychiatry*. 2005. Vol. 162, № 1. P. 12–24.
32. Drukker M, Krabbendam L, Driessen G, van Os J. Social disadvantage and schizophrenia. A combined neighbourhood and individual-level analysis // *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*. 2006. Vol. 41, № 8. P. 595–604.
33. Ayerbe L, Pérez-Piñar M, Foguet-Boreu Q, et al. Psychosis in children of separated parents: A systematic review and meta-analysis // *European Psychiatry*. 2020. Vol. 63, № 1. e3.
34. Arseneault L, Cannon M, Poulton R, Murray R, Moffitt TE, Caspi A. Cannabis use in adolescence and risk for adult psychosis: longitudinal prospective study // *BMJ*. 2002. Vol. 325, № 7374. P. 1212–1213.
35. Di Forti M, Quattrone D, Freeman TP, et al. The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI) // *Lancet Psychiatry*. 2019. Vol. 6, № 5. P. 427–436.
36. Lovric S, Klaric M, Lovric I, et al. Clinical characteristics of psychotic disorders in patients with childhood trauma // *Medicine (Baltimore)*. 2023. Vol. 102, № 51. e36733.
37. Bourgeois C, Lecomte T, McDuff P, et al. Child Sexual Abuse and Age at Onset of Psychotic Disorders: A Matched-cohort Study // *Canadian Journal of Psychiatry*. 2021. Vol. 66, № 6. P. 569–576.
38. Insel TR. Rethinking schizophrenia // *Nature*. 2010. Vol. 468, № 7321. P. 187–193.
39. Tognin S, Catalan A, Modinos G, et al. Emotion Recognition and Adverse Childhood Experiences in Individuals at Clinical High Risk of Psychosis // *Schizophrenia Bulletin*. 2020. Vol. 46, № 4. P. 823–833.
40. Beards S, Fisher HL, Gayer-Anderson C, et al. Threatening Life Events and Difficulties and Psychotic Disorder // *Schizophrenia Bulletin*. 2020. Vol. 46, № 4. P. 814–822.
41. Paetzold I, Gugel J, Schick A, et al. The role of threat anticipation in the development of psychopathology in adolescence: findings from the SIGMA Study // *European Child and Adolescent Psychiatry*. 2023. Vol. 32, № 11. P. 2119–2127.
42. May T, Younan R, Pilkington PD, et al. Adolescent maladaptive schemas and childhood abuse and neglect: A systematic review and meta-analysis // *Clinical Psychology and Psychotherapy*. 2022. Vol. 29, № 4. P. 1159–1171.
43. Dudley R, Turkington D, Coulthard N, et al. Childhood Trauma in Clozapine-Resistant Schizophrenia: Prevalence, and Relationship With Symptoms // *Schizophrenia Bulletin Open*. 2023. Vol. 4, № 1. sgad030.

44. Mørkved N, Johnsen E, Kroken RA, et al. Childhood trauma types in relation to antipsychotic effectiveness in schizophrenia spectrum disorders: A prospective, pragmatic, randomized controlled study // *Psychiatry Research*. 2024. Vol. 341. 116169.
45. Dhondt N, Staines L, Healy C, et al. Childhood adversity and recurrence of psychotic experiences during adolescence: the role of mediation in an analysis of a population-based longitudinal cohort study // *Psychological Medicine*. 2023. Vol. 53, № 9. P. 4046–4054.
46. Christy A, Cavero D, Navajeeva S, et al. Association Between Childhood Adversity and Functional Outcomes in People With Psychosis: A Meta-analysis // *Schizophrenia Bulletin*. 2023. Vol. 49, № 2. P. 285–296.
47. Sheinbaum T, Gizdic A, Kwapił TR, et al. A longitudinal study of the impact of childhood adversity dimensions on social and psychological factors and symptoms of psychosis, depression, and anxiety // *Schizophrenia Research*. 2024. Vol. 270. P. 102–110.
48. Toutountzidis D, Gale TM, Irvine K, et al. Childhood trauma and schizotypy in non-clinical samples: A systematic review and meta-analysis // *PLoS One*. 2022. Vol. 17, № 6. e0270494.
49. Lipner E, O'Brien KJ, Pike MR, et al. Environmental Risk Factors and Cognitive Outcomes in Psychosis: Pre-, Perinatal, and Early Life Adversity // *Current Topics in Behavioral Neurosciences*. 2023. Vol. 63. P. 205–240.
50. Hawton K, Sutton L, Haw C, et al. Schizophrenia and suicide: systematic review of risk factors // *British Journal of Psychiatry*. 2005. Vol. 187. P. 9–20.
51. Popovic D, Benabarre A, Crespo JM, et al. Risk factors for suicide in schizophrenia: systematic review and clinical recommendations // *Acta Psychiatrica Scandinavica*. 2014. Vol. 130, № 6. P. 418–426.
52. Hassan AN, Stuart EA, De Luca V. Childhood maltreatment increases the risk of suicide attempt in schizophrenia // *Schizophrenia Research*. 2016. Vol. 176, № 2–3. P. 572–577.
53. Кадыров Р.В., Венгер В.В. Психологические последствия ранней детской травмы: обзор зарубежных исследований // *Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности*. 2021. № 11. С. 25–33. – EDN: WBRZHM. [Kadyrov R.V., Wenger V.V. Psychological consequences of early childhood trauma: review of foreign studies // *Personality in extreme conditions and crisis situations of life*. 2021. № 11. P. 25–33. (In Russ.).]
54. Wambua GN, Kilian S, Chiliza B. A qualitative study of coping strategies and resilience in the aftermath of childhood adversity in first-episode psychosis // *Early Intervention in Psychiatry*. 2025. Vol. 19, № 1. e13551.
55. Fromm-Reichmann F. Notes on the development of treatment of schizophrenics by psychoanalytic psychotherapy // *Psychiatry*. 1948. Vol. 11, № 3. P. 263–273.
56. Bateson G, Jackson DD, Haley J, Weakland J. Toward a theory of schizophrenia // *Behavioral Science*. 1956. Vol. 1, № 4. P. 251–254.
57. Bion WR. Attacks on linking // *International Journal of Psychoanalysis*. 1959. Vol. 40. P. 308–315.
58. Nonweiler J, Torrecilla P, Kwapił TR, et al. I don't understand how I feel: mediating role of impaired self-mentalizing in the relationship between childhood adversity and psychosis spectrum experiences // *Frontiers in Psychiatry*. 2023. Vol. 14. 1268247.
59. Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci // *Nature*. 2014. Vol. 511, № 7510. P. 421–427.
60. Абрамов С.В., Игумнов С.А. Формирование аддиктивной личности: исторический, социальный, нейробиологический и молекулярно-генетический подходы // *Вопросы охраны психического здоровья*. 2022. Т. 1, № 2. С. 12–19. – EDN: DIJNFC. [Abramov S.V., Igumnov S.A. Addictive personality formation: historical, social, neurobiological and molecular genetic approach // *Mental Health Issues*. 2022. Vol. 1, № 2. P. 12–19. (In Russ.).]
61. Pruessner M, Cullen AE, Aas M, Walker EF. The neural diathesis-stress model of schizophrenia revisited: An update on recent findings considering illness stage and neurobiological and methodological complexities // *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*. 2017. Vol. 73. P. 191–218.
62. Alameda L, Liu X, Sham PC, et al. Exploring the mediation of DNA methylation across the epigenome between childhood adversity and First Episode of Psychosis-findings from the EU-GEI study // *Molecular Psychiatry*. 2023. Vol. 28, № 5. P. 2095–2106.
63. Nestler EJ, Pena CJ, Kundakovic M, et al. Epigenetic basis of mental illness // *Neuroscientist*. 2016. Vol. 22, № 5. P. 447–463.
64. Corcoran C, Walker E, Huot R, et al. The stress cascade and schizophrenia: etiology and onset // *Schizophrenia Bulletin*. 2003. Vol. 29, № 4. P. 671–692.
65. Howes OD, Kapur S. The dopamine hypothesis of schizophrenia: version III // *Schizophrenia Bulletin*. 2009. Vol. 35, № 3. P. 549–562.
66. Dennison U, McKernan D, Cryan J, Dinan T. Schizophrenia patients with a history of childhood trauma have a pro-inflammatory phenotype // *Psychological Medicine*. 2012. Vol. 42, № 9. P. 1865–1871.
67. Oliver D, Chesney E, Cullen AE, et al. Exploring causal mechanisms of psychosis risk // *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*. 2024. Vol. 162. 105699.
68. Sekar A, Bialas AR, de Rivera H, et al. Schizophrenia risk from complex variation of complement component 4 // *Nature*. 2016. Vol. 530, № 7589. P. 177–183.
69. Алфимова М.В., Коровайцева Г.И., Габаева М.В., Плакунова В.В., Лежейко Т.В., Голибмет В.Е. Генетический полиморфизм цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-4 и TNF-α как фактор, модифицирующий влияние неблагоприятного детского опыта на симптоматику шизофрении // *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 2022. Т. 122, № 9. С. 110–117. – EDN: EKFGUA. [Alfimova M.V., Korovaitseva G.I., Gabaeva M.V., Plakunova V.V., Lezheiko T.V., Golimbet V.E. Genetic polymorphism of cytokines il-1β, il-4 and tnf-α as a factor modifying the impact of childhood adversity on schizophrenia symptoms // *S.S. Korsakov journal of neurology and psychiatry*. 2022. Vol. 122, № 9. P. 110–117. (In Russ.).]
70. Sideli L, Schimmenti A, La Barbera D, et al. Childhood maltreatment, educational attainment and IQ in psychosis (EU-GEI) // *Schizophrenia Bulletin*. 2022. Vol. 48, № 3. P. 575–589.
71. Ayawwi G, Berglund AM, James SH, et al. The association between early traumatic experiences and the five domains of negative symptoms in participants at clinical high risk for psychosis // *Early Intervention in Psychiatry*. 2023. Vol. 17, № 11. P. 1131–1135.
72. Lei MK, Berg MT, Simons RL, et al. Specifying the psychosocial pathways whereby child and adolescent adversity shape adult health outcomes // *Psychological Medicine*. 2023. Vol. 53, № 13. P. 6027–6036.
73. Абрамов С.В. Молекулярные механизмы формирования трансгенерационной психической травмы // *Вопросы охраны психического здоровья*. 2023. Т. 2, № 2. С. 47–55. – EDN: PELXYC. [Abramov S.V. Molecular mechanisms of forming transgenerational mental trauma // *Mental Health Issues*. 2023. Vol. 2, № 2. P. 47–55. (In Russ.).]
74. Bolhuis K, Steenkamp LR, Tiemeier H, et al. A Prospective Cohort Study on the Intergenerational Transmission of Childhood Adversity and Subsequent Risk of Psychotic Experiences in Adolescence // *Schizophrenia Bulletin*. 2023. Vol. 49, № 3. P. 799–808.

ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES AND PSYCHOTIC SPECTRUM DISORDERS: EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL, AND NEUROBIOLOGICAL ASPECTS

Andreev D.I., Abramov S.V.

V. Serbsky National Medical Research Center for Psychiatry and Narcology, State Educational Institution of the Moscow Region for children in need of psychological, pedagogical, and medical-social assistance, Center for Psychological and Pedagogical Rehabilitation, Correction, and Education "Ariadna", Lyubertsy, Russia

This review systematizes current epidemiological, clinical, and neurobiological evidence on the association between adverse childhood experiences (ACEs) and schizophrenia as well as acute psychotic states. Meta-analyses indicate a 2–3-fold increase in the risk of psychosis following exposure to ACEs. Specific forms of abuse (sexual, physical, emotional) are associated with distinct symptom profiles. Possible mechanisms are discussed, including epigenetic modifications, dysregulation of the hypothalamic–pituitary–adrenal axis, neuroinflammation, and psychological mediators such as attachment disturbances and maladaptive cognitive schemas. Special attention is given to the phenomenon of transgenerational transmission of vulnerability, supported by prospective cohort studies.

Keywords: adverse childhood experiences, schizophrenia, psychosis, epigenetics, transgenerational trauma, stress, diathesis-stress, prevention, psychoeducation

References

1. Adverse Childhood Experiences International Questionnaire (ACE-IQ) [Electronic resource] // World Health Organization. 28 January 2020. URL: [https://www.who.int/publications/m/item/adverse-childhood-experiences-international-questionnaire-\(ace-iq\)](https://www.who.int/publications/m/item/adverse-childhood-experiences-international-questionnaire-(ace-iq)) (дата обращения: 12.03.2026).
2. Varese F, Smeets F, Drukker M, et al. Childhood adversities increase the risk of psychosis: a meta-analysis of patient-control, prospective- and cross-sectional cohort studies // *Schizophrenia Bulletin*. 2012. Vol. 38, № 4. P. 661–671.
3. Trotta A, Murray RM, Fisher HL. The impact of childhood adversity on the persistence of psychotic symptoms: a systematic review and meta-analysis // *Psychological Medicine*. 2015. Vol. 45, № 12. P. 2481–2498.
4. Gibson LE, Alloy LB, Ellman LM. Trauma and the psychosis spectrum: a review of symptom specificity and explanatory mechanisms // *Clinical Psychology Review*. 2016. Vol. 49. P. 92–105.
5. Scott KM, McLaughlin KA, Smith DA, Ellis PM. Childhood maltreatment and DSM-IV adult mental disorders: comparison of retrospective and prospective findings // *British Journal of Psychiatry*. 2012. Vol. 200, № 6. P. 469–475.
6. Owen MJ, Sawa A, Mortensen PB. Schizophrenia // *Lancet*. 2016. Vol. 388, № 10039. P. 86–97.

7. Sullivan PF, Kendler KS, Neale MC. Schizophrenia as a complex trait: evidence from a meta-analysis of twin studies // *Archives of General Psychiatry*. 2003. Vol. 60, № 12. P. 1187–1192.
8. van Os J, Kenis G, Rutten BP. The environment and schizophrenia // *Nature*. 2010. Vol. 468, № 7321. P. 203–212.
9. Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, et al. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study // *American Journal of Preventive Medicine*. 1998. Vol. 14, № 4. P. 245–258.
10. McKay MT, Cannon M, Chambers D, et al. Childhood trauma and adult mental disorder: A systematic review and meta-analysis of longitudinal cohort studies // *Acta Psychiatrica Scandinavica*. 2021. Vol. 143, № 3. P. 189–205.
11. Sætern SS, Bjørnstad JR, Ottesen AA, et al. Unraveling the Concept of Childhood Adversity in Psychosis Research: A Systematic Review // *Schizophrenia Bulletin*. 2024. Vol. 50, № 5. P. 1055–1066.
12. Fisher HL, Craig TK, Fearon P, et al. Reliability and comparability of psychosis patients' retrospective reports of childhood abuse // *Schizophrenia Bulletin*. 2011. Vol. 37, № 3. P. 546–553.
13. Шумская Д.С., Трусова А.В., Кибитов А.О. Неблагоприятный детский опыт: термины, концепции и методы анализа // *Обзор психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева*. 2025. Т. 59, № 3. С. 40–51. – EDN: EZPPNK. [Shumskaya D.S., Trusova A.V., Kibitov A.O. Adverse childhood experiences: terms, concepts, and study methods // *V.M. Bekhterev review of psychiatry and medical psychology*. 2025. Vol. 59, № 3. P. 40–51. (In Russ.).]
14. Teicher MH, Samson JA. Annual research review: enduring neurobiological effects of childhood abuse and neglect // *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. 2016. Vol. 57, № 3. P. 241–266.
15. Schalinski I, Breinlinger S, Hirt V, et al. Environmental adversities and psychotic symptoms: The impact of timing of trauma, abuse, and neglect // *Schizophrenia Research*. 2019. Vol. 205. P. 4–9.
16. Isvoranu AM, van Borkulo CD, Boyette LL, et al. A Network Approach to Psychosis: Pathways Between Childhood Trauma and Psychotic Symptoms // *Schizophrenia Bulletin*. 2017. Vol. 43, № 1. P. 187–196.
17. Norman RE, Byambaa M, De R, et al. The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: a systematic review and meta-analysis // *PLoS Medicine*. 2012. Vol. 9, № 11. e1001349.
18. Arseneault L, Cannon M, Fisher HL, et al. Childhood trauma and children's emerging psychotic symptoms: A genetically sensitive longitudinal cohort study // *American Journal of Psychiatry*. 2011. Vol. 168, № 1. P. 65–72.
19. Kelleher I, Keeley H, Corcoran P, et al. Clinicopathological significance of psychotic experiences in non-psychotic young people: evidence from four population-based studies // *British Journal of Psychiatry*. 2012. Vol. 201, № 1. P. 26–32.
20. Bonaldi I, Simeone E, Rocchetti M, et al. Prevalence of self-reported childhood abuse in psychosis: a meta-analysis of retrospective studies // *Psychiatry Research*. 2013. Vol. 210, № 1. P. 8–15.
21. Negriff S, Schneiderman JU, Trickett PK. Concordance Between Self-Reported Childhood Maltreatment Versus Case Record Reviews for Child Welfare-Affiliated Adolescents // *Child Maltreatment*. 2017. Vol. 22, № 1. P. 34–44.
22. Redmond A, Gaynor K, Naughton S, Clarke M. Recorded Rates of Trauma-Exposure in a Retrospective Epidemiologically Complete First-Episode Psychosis Cohort // *Early Intervention in Psychiatry*. 2025. Vol. 19, № 1. e13610.
23. Matheson SL, Shepherd AM, Pinchbeck RM, et al. Childhood adversity in schizophrenia: a systematic meta-analysis // *Psychological Medicine*. 2013. Vol. 43, № 2. P. 225–238.
24. Chaiyachati BH, Gur RE. Effect of child abuse and neglect on schizophrenia and other psychotic disorders // *Pharmacology Biochemistry and Behavior*. 2021. Vol. 206. 173195.
25. Trotta A, Di Forti M, Mondelli V, et al. Prevalence of bullying victimisation amongst first-episode psychosis patients and unaffected controls // *Schizophrenia Research*. 2013. Vol. 150, № 1. P. 169–175.
26. Alameda L, Christy A, Rodriguez V, et al. Association Between Specific Childhood Adversities and Symptom Dimensions in People With Psychosis: Systematic Review and Meta-Analysis // *Schizophrenia Bulletin*. 2021. Vol. 47, № 4. P. 975–985.
27. Morgan C, Gayer-Anderson C, Beards S, et al. Threat, hostility and violence in childhood and later psychotic disorder: population-based case-control study // *British Journal of Psychiatry*. 2020. Vol. 217, № 4. P. 575–582.
28. Janssen I, Krabbendam L, Bak M, et al. Childhood abuse as a risk factor for psychotic experiences // *Acta Psychiatrica Scandinavica*. 2004. Vol. 109, № 1. P. 38–45.
29. Kisely S, Arnavotska U, Siskind D, et al. Admissions for psychosis following agency-notified child maltreatment at 40-year-follow-up: Results from the Childhood Adversity and Lifetime Morbidity (CALM) cohort // *Schizophrenia Research*. 2024. Vol. 267. P. 247–253.
30. Uocak A, Bikmaz S. The effects of childhood trauma in patients with first-episode schizophrenia // *Acta Psychiatrica Scandinavica*. 2007. Vol. 116, № 5. P. 371–377.
31. Cantor-Graae E, Selten JP. Schizophrenia and migration: a meta-analysis and review // *American Journal of Psychiatry*. 2005. Vol. 162, № 1. P. 12–24.
32. Drukker M, Krabbendam L, Driessen G, van Os J. Social disadvantage and schizophrenia. A combined neighbourhood and individual-level analysis // *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*. 2006. Vol. 41, № 8. P. 595–604.
33. Ayerbe L, Pérez-Piñar M, Fogueat-Boreu Q, et al. Psychosis in children of separated parents: A systematic review and meta-analysis // *European Psychiatry*. 2020. Vol. 63, № 1. e3.
34. Arseneault L, Cannon M, Poulton R, Murray R, Moffitt TE, Caspi A. Cannabis use in adolescence and risk for adult psychosis: longitudinal prospective study // *BMJ*. 2002. Vol. 325, № 7374. P. 1212–1213.
35. Di Forti M, Quattrone D, Freeman TP, et al. The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI) // *Lancet Psychiatry*. 2019. Vol. 6, № 5. P. 427–436.
36. Lovric S, Klaric M, Lovric I, et al. Clinical characteristics of psychotic disorders in patients with childhood trauma // *Medicine (Baltimore)*. 2023. Vol. 102, № 51. e36733.
37. Bourgeois C, Lecomte T, McDuff P, et al. Child Sexual Abuse and Age at Onset of Psychotic Disorders: A Matched-cohort Study // *Canadian Journal of Psychiatry*. 2021. Vol. 66, № 6. P. 569–576.
38. Insel TR. Rethinking schizophrenia // *Nature*. 2010. Vol. 468, № 7321. P. 187–193.
39. Tognin S, Catalan A, Modinos G, et al. Emotion Recognition and Adverse Childhood Experiences in Individuals at Clinical High Risk of Psychosis // *Schizophrenia Bulletin*. 2020. Vol. 46, № 4. P. 823–833.
40. Beards S, Fisher HL, Gayer-Anderson C, et al. Threatening Life Events and Difficulties and Psychotic Disorder // *Schizophrenia Bulletin*. 2020. Vol. 46, № 4. P. 814–822.
41. Paetzold I, Gugel J, Schick A, et al. The role of threat anticipation in the development of psychopathology in adolescence: findings from the SIGMA Study // *European Child and Adolescent Psychiatry*. 2023. Vol. 32, № 11. P. 2119–2127.
42. May T, Younan R, Pilkington PD, et al. Adolescent maladaptive schemas and childhood abuse and neglect: A systematic review and meta-analysis // *Clinical Psychology and Psychotherapy*. 2022. Vol. 29, № 4. P. 1159–1171.
43. Dudley R, Turkington D, Coulthard N, et al. Childhood Trauma in Clozapine-Resistant Schizophrenia: Prevalence, and Relationship With Symptoms // *Schizophrenia Bulletin*. 2023. Vol. 4, № 1. sgad030.
44. Mørkved N, Johnsen E, Kroken RA, et al. Childhood trauma types in relation to antipsychotic effectiveness in schizophrenia spectrum disorders: A prospective, pragmatic, randomized controlled study // *Psychiatry Research*. 2024. Vol. 341. 116169.
45. Dhondt N, Staines L, Healy C, et al. Childhood adversity and recurrence of psychotic experiences during adolescence: the role of mediation in an analysis of a population-based longitudinal cohort study // *Psychological Medicine*. 2023. Vol. 53, № 9. P. 4046–4054.
46. Christy A, Caverio D, Navajeeva S, et al. Association Between Childhood Adversity and Functional Outcomes in People With Psychosis: A Meta-analysis // *Schizophrenia Bulletin*. 2023. Vol. 49, № 2. P. 285–296.
47. Sheinbaum T, Gizdic A, Kwapił TR, et al. A longitudinal study of the impact of childhood adversity dimensions on social and psychological factors and symptoms of psychosis, depression, and anxiety // *Schizophrenia Research*. 2024. Vol. 270. P. 102–110.
48. Toutountzidis D, Gale TM, Irvine K, et al. Childhood trauma and schizotypy in non-clinical samples: A systematic review and meta-analysis // *PLoS One*. 2022. Vol. 17, № 6. e0270494.
49. Lipner E, O'Brien KJ, Pike MR, et al. Environmental Risk Factors and Cognitive Outcomes in Psychosis: Pre-, Perinatal, and Early Life Adversity // *Current Topics in Behavioral Neurosciences*. 2023. Vol. 63. P. 205–240.
50. Hawton K, Sutton L, Haw C, et al. Schizophrenia and suicide: systematic review of risk factors // *British Journal of Psychiatry*. 2005. Vol. 187. P. 9–20.
51. Popovic D, Benabarre A, Crespo JM, et al. Risk factors for suicide in schizophrenia: systematic review and clinical recommendations // *Acta Psychiatrica Scandinavica*. 2014. Vol. 130, № 6. P. 418–426.
52. Hassan AN, Stuart EA, De Luca V. Childhood maltreatment increases the risk of suicide attempt in schizophrenia // *Schizophrenia Research*. 2016. Vol. 176, № 2–3. P. 572–577.
53. Кадыров Р.В., Венгер В.В. Психологические последствия ранней детской травмы: обзор зарубежных исследований // *Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности*. 2021. № 11. С. 25–33. – EDN: WBRZHM. [Kadyrov R.V., Wenger V.V. Psychological consequences of early childhood trauma: review of foreign studies // *Personality in extreme conditions and crisis situations of life*. 2021. № 11. P. 25–33. (In Russ.).]
54. Wambua GN, Kilian S, Chiliza B. A qualitative study of coping strategies and resilience in the aftermath of childhood adversity in first-episode psychosis // *Early Intervention in Psychiatry*. 2025. Vol. 19, № 1. e13551.
55. Fromm-Reichmann F. Notes on the development of treatment of schizophrenics by psychoanalytic psychotherapy // *Psychiatry*. 1948. Vol. 11, № 3. P. 263–273.
56. Bateson G, Jackson DD, Haley J, Weakland J. Toward a theory of schizophrenia // *Behavioral Science*. 1956. Vol. 1, № 4. P. 251–254.
57. Bion WR. Attacks on linking // *International Journal of Psychoanalysis*. 1959. Vol. 40. P. 308–315.
58. Nonweiler J, Torrecilla P, Kwapił TR, et al. I don't understand how I feel: mediating role of impaired self-mentalizing in the relationship between childhood adversity and psychosis spectrum experiences // *Frontiers in Psychiatry*. 2023. Vol. 14. 1268247.
59. Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci // *Nature*. 2014. Vol. 511, № 7510. P. 421–427.
60. Абрамов С.В., Игумнов С.А. Формирование аддиктивной личности: исторический, социальный, нейробиологический и молекулярно-генетический подходы // *Вопросы охраны психического здоровья*. 2022. Т. 1, № 2. С. 12–19. – EDN: DIJNFC. [Abramov S.V., Igumnov S.A. Addictive personality formation: historical, social, neurobiological and molecular genetic approach // *Mental Health Issues*. 2022. Vol. 1, № 2. P. 12–19. (In Russ.).]
61. Pruessner M, Cullen AE, Aas M, Walker EF. The neural diathesis-stress model of schizophrenia revisited: An update on recent findings considering illness stage and neurobiological and methodological complexities // *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*. 2017. Vol. 73. P. 191–218.
62. Alameda L, Liu Z, Sham PC, et al. Exploring the mediation of DNA methylation across the epigenome between childhood adversity and First Episode of Psychosis: findings from the EU-GEI study // *Molecular Psychiatry*. 2023. Vol. 28, № 5. P. 2095–2106.
63. Nestler EJ, Pena CJ, Kundakovic M, et al. Epigenetic basis of mental illness // *Neuroscientist*. 2016. Vol. 22, № 5. P. 447–463.
64. Corcoran C, Walker E, Huot R, et al. The stress cascade and schizophrenia: etiology and onset // *Schizophrenia Bulletin*. 2003. Vol. 29, № 4. P. 671–692.
65. Howes OD, Kapur S. The dopamine hypothesis of schizophrenia: version III // *Schizophrenia Bulletin*. 2009. Vol. 35, № 3. P. 549–562.

66. Dennison U, McKernan D, Cryan J, Dinan T. Schizophrenia patients with a history of childhood trauma have a pro-inflammatory phenotype // *Psychological Medicine*. 2012. Vol. 42, № 9. P. 1865–1871.

67. Oliver D, Chesney E, Cullen AE, et al. Exploring causal mechanisms of psychosis risk // *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*. 2024. Vol. 162. 105699.

68. Sekar A, Bialas AR, de Rivera H, et al. Schizophrenia risk from complex variation of complement component 4 // *Nature*. 2016. Vol. 530, № 7589. P. 177–183.

69. Алфимова М.В., Коровайцева Г.И., Габаева М.В., Плакунова В.В., Лежейко Т.В., Голимбет В.Е. Генетический полиморфизм цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-4 и TNF-α как фактор, модифицирующий влияние неблагоприятного детского опыта на симптоматику шизофрении // *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 2022. Т. 122, № 9. С. 110–117. – EDN: EKFGUA. [Alfimova M.V., Korovaitseva G.I., Gabaeva M.V., Plakunova V.V., Lezheiko T.V., Golimbet V.E. Genetic polymorphism of cytokines il-1β, il-4 and tnf-α as a factor modifying the impact of childhood adversity on schizophrenia symptoms // *S.S. Korsakov journal of neurology and psychiatry*. 2022. Vol. 122, № 9. P. 110–117. (In Russ.).]

70. Sideli L, Schimmenti A, La Barbera D, et al. Childhood maltreatment, educational attainment and IQ in psychosis (EU-GEI) // *Schizophrenia Bulletin*. 2022. Vol. 48, № 3. P. 575–589.

71. Ayawvi G, Berglund AM, James SH, et al. The association between early traumatic experiences and the five domains of negative symptoms in participants at clinical high risk for psychosis // *Early Intervention in Psychiatry*. 2023. Vol. 17, № 11. P. 1131–1135.

72. Lei MK, Berg MT, Simons RL, et al. Specifying the psychosocial pathways whereby child and adolescent adversity shape adult health outcomes // *Psychological Medicine*. 2023. Vol. 53, № 13. P. 6027–6036.

73. Абрамов С.В. Молекулярные механизмы формирования трансгенерационной психической травмы // *Вопросы охраны психического здоровья*. 2023. Т. 2, № 2. С. 47–55. – EDN: PELXYC. [Abramov S.V. Molecular mechanisms of forming transgenerational mental trauma // *Mental Health Issues*. 2023. Vol. 2, № 2. P. 47–55. (In Russ.).]

74. Bolhuis K, Steenkamp LR, Tiemeier H, et al. A Prospective Cohort Study on the Intergenerational Transmission of Childhood Adversity and Subsequent Risk of Psychotic Experiences in Adolescence // *Schizophrenia Bulletin*. 2023. Vol. 49, № 3. P. 799–808.

Современные тенденции эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в республике Дагестан в 2021–2025 гг.

Абусеува Аида Сагадуллаевна,

кандидат медицинских наук доцент, кафедра инфекционных болезней
им. акад. Г.П. Руднева, ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: aida39@list.ru

Шабанов Даниял Сундарович,

студент, ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: daniyal_shabanov@mail.ru

Рамазанова Самира Закировна,

студент, ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: samira.ramazanova.17@mail.ru

Пашаева Саида Алимпашаевна,

кандидат медицинских наук, доцент, кафедра инфекционных болезней
им. акад. Г.П. Руднева, ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: saida-p05@mail.ru

Даниялбекова Заира Мутагировна,

кандидат медицинских наук, доцент, кафедра инфекционных болезней
им. акад. Г.П. Руднева, ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: ZairaD05@mail.ru.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) – хроническая антропонозная инфекционная болезнь с контактным механизмом передачи возбудителя, который характеризуется прогрессирующим поражением иммунной системы, приводящим к развитию синдрому приобретенного иммунодефицита и смерти от вторичных заболеваний. Проблема ВИЧ – инфекции продолжает сохранять высокую социальную и медицинскую значимость не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Согласно последним оценкам UNAIDS и Всемирной организации здравоохранения, 1,3 млн человек заразились ВИЧ в 2024 году, около 40 миллионов человек жили с ВИЧ в 2024 году, а 630.000 умерли от ВИЧ- связанных причин а 2024 году. В России, по экспертным оценкам академика В.Покровского в России ВИЧ-инфицировано около 1.25 млн человек.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекции, заболеваемость, распространенность, эпидемиология.

В Республике Дагестан, несмотря на относительно более низкие показатели по сравнению со среднероссийскими значениями, эпидемиологическая ситуация характеризуется устойчивым ростом числа выявляемых случаев и расширением возрастных границ пораженного контингента.

Цель исследования: представить анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в республике Дагестан за 2021–2025 г.г., с учетом оценки динамики заболеваемости, распространенности, структуры путей передачи, гендерных и возрастных особенностей, а также показателей антиретровирусной терапии.

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ данных ГБУ РД «РЦИБ и СПИД» за 2021–2025 годы. Оценивались следующие показатели: число впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции, показатели заболеваемости на 100 тысяч населения, распространенность, структура путей передачи, гендерная и возрастная структура, охват антиретровирусной терапией. Применялись методы описательной статистики, сравнительного анализа и динамического наблюдения

Результаты исследования: исходя из динамики заболеваемости, в 2021 году было зарегистрировано 343 новых случая ВИЧ-инфекции, в 2022 году– 450 новых случаев, а в 2023 году– 504 случая. Таким образом, в период с 2021–2023 г.г. отмечался рост заболеваемости на 46,9%. Эпидемиологи отмечают данный рост в связи с увеличением внутренней миграции населения в стране и в республике. В 2024 году было зарегистрировано 409 случаев, а в 2025 году –378 случаев, что свидетельствует о снижении показателя на 23, 4%, по сравнению с пиковым 2023 годом. Однако, «опять таки», эпидемиологи отмечают о неуверенности населения о своем здоровье, и боязни проверяться (рис. 1).



Рис. 1

По состоянию на 31.12.2025 г. всего с 1989 года выявлено 5939 ВИЧ-инфицированных. Показатель пораженности составил 132,8 на 100 тысяч населения (рис. 2).



Рис. 2

Наиболее неблагополучными территориями в республике являются (на 100 тысяч населения): города Дербент 310,3, Каспийск 211,8, Буйнакск 202,7, Дагестанские Огни 197,9, Махачкала (столица Дагестана) 180,8. Выявлена выраженная концентрация инфекции в городском населении. Однако распространенность заболевания сохраняется и на территории горных и равнинных районов региона.

На нижепредставленном графике указана распространенность ВИЧ-инфекции по отдельным городам и районам республики Дагестан на 100 тысяч населения (рис. 3).

Распространенность ВИЧ по районам и городам Дагестана (на 100 тыс. населения, 2025 г.)




Рис. 3

Акцентируя внимание на путях передачи вируса, с 2009 года доминирует половой (гетеросексуальный) путь передачи, в связи с тем что парентеральный путь передачи стал «неактуальным», в связи с появлением синтетических наркотических средств, которые предотвращают вероятность распространения вируса через шприцы.

В 2025 году среди новых случаев:

- половой путь — 85,2%
- парентеральный — 8,8%
- не установлен — 4,9%
- вертикальный — 1,1%

По гендерной структуре в 2025 году среди всех зарегистрированных: мужчины — 63,4%, женщины — 34,8%, а дети — 1,8% (рис. 4).

Гендерная структура ВИЧ-инфицированных в Республике Дагестан (2025 г.)




Рис. 4

Доля женщин среди впервые выявленных случаев в 2025 году составила 40,5%, а увеличение доли женщин формирует риск роста вертикального пути передачи.

Говоря о возрастной структуре, основную долю составляют лица трудоспособного возраста 31–50 лет — 55,3%. Лица от 21–30 лет — 16,5%, 60+ — 7,1%, а 18–20 лет — 1,4%.

Из числа зараженных, антиретровирусную терапию получают 90,7%, что говорит о повышении эффективности организации медицинской помощи.

Обсуждение

Анализ динамики показателей свидетельствует о фазе роста эпидемического процесса в 2021–2023 гг. с последующей стабилизацией в 2024–2025 гг. Снижение заболеваемости при одновременном росте распространенности указывает на улучшение выявляемости и выживаемости пациентов за счет расширения охвата АРТ. Доминирование полового пути передачи отражает смещение эпидемии в общую популяцию. Для предотвращения рисков распространения ВИЧ-инфекции среди семейных пар, в Чеченской республике внедрена практика о заключении религиозного и гражданского браков только после предоставления справки об отсутствии вируса в организме, либо получении АРТ. Выраженная территориальная неравномерность тре-

бует адресных профилактических программ в наиболее неблагополучных муниципалитетах.

Выводы: 1. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Дагестан остается напряженной. 2. В 2021–2023 гг. наблюдался рост заболеваемости с последующим снижением в 2024–2025 гг. 3. Доминирует половой путь передачи (более 80%). 4. Основной контингент — лица трудоспособного возраста. 5. Отмечается положительная динамика охвата АРТ (до 90,7%). 6. Требуется усиление профилактических мероприятий, направленных на городское население и женщин репродуктивного возраста.

Литература

1. ЮНЭЙДС. Глобальный отчет по ВИЧ/СПИДу 2024. — Женева: UNAIDS, 2024. — 386 с.
2. Всемирная организация здравоохранения. ВИЧ-инфекция: информационный бюллетень [Электронный ресурс]. — Женева: ВОЗ, 2024. — Режим доступа: <https://www.who.int> — Дата обращения: 03.03.2026.
3. Покровский В.В., Ладная Н.Н., Соколова Е.В. ВИЧ-инфекция в Российской Федерации: современные тенденции развития эпидемии // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2023. — Т. 28, № 4. — С. 5–12.
4. Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом. ВИЧ-инфекция в Российской Федерации в 2024 году: информационный бюллетень. — М., 2025. — 52 с.
5. Роспотребнадзор. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2024 году: государственный доклад. — М., 2025. — 412 с.
6. Абусуева А.С., Ризванов Д.М., Ахмедов Д.Р., Пашаева С.А. Эпидемиологические аспекты ВИЧ-инфекции в Республике Дагестан. Актуальные вопросы инфекционных болезней и иммунопрофилактики у взрослых и детей. 2024 г.г. Махачкала. Стр.100–103
7. Ахмедов Д.Р., Ризванов Д.М., Абусуева А.С., Джанмурзаева А.М. Эпидемия ВИЧ-инфекции. Проблемы и пути их решения. Актуальные вопросы инфекционных болезней в клинике и эксперименте.г. Махачкала 2015 г. Стр. 178–181
8. Д.С. Шабанов, С.М. Гайбулаева, Б.М. Саидова Проблема распространения вируса иммунодефицита человека в республике Дагестан// Материалы 72-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов с международным участием., 2024—486—487с.
9. UNAIDS. Global AIDS Update 2024: The Urgency of Now — AIDS at a Crossroads. — Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 2024. — 248 p.

CURRENT TRENDS IN THE HIV EPIDEMIC PROCESS IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN IN 2021–2025

Abusueva A.S., Shabanov D.S., Ramazanov S.Z., Pashayeva S.A., Daniyalbekova Z.M.
Dagestan State Medical University

Human immunodeficiency virus (HIV) is a chronic, anthroponotic, contact-transmitted infectious disease characterized by progressive damage to the immune system, leading to acquired immunodeficiency syndrome and death from secondary diseases. HIV infection continues to be a significant social and medical problem not only in the Russian Federation but also worldwide. According to the latest estimates from UNAIDS and the World Health Organization, 1.3 million people were infected with HIV in 2024, about 40 million people were living with HIV in 2024, and 630,000 died from HIV-related causes in 2024. In Russia, according to expert estimates by Academician V. Pokrovsky, about 1.25 million people are infected with HIV.

Keywords: HIV infection, incidence, prevalence, epidemiology.

References

1. UNAIDS. Global HIV/AIDS Report 2024. Geneva: UNAIDS, 2024, 386 p.
2. World Health Organization. HIV infection: fact sheet [Electronic resource]. Geneva: WHO, 2024, Available at: <https://www.who.int>. Accessed: 03.03.2026.
3. Pokrovsky V.V., Ladnaya N.N., Sokolova E.V. HIV infection in the Russian Federation: current trends in the epidemic // Epidemiology and infectious diseases. 2023, Vol. 28, No. 4, pp. 5–12.
4. Federal Scientific and Methodological Center for AIDS Prevention and Control. HIV infection in the Russian Federation in 2024: information bulletin. Moscow, 2025. 52 p.
5. Rosпотребнадзор. On the state of sanitary and epidemiological well-being of the population of the Russian Federation in 2024: state report. Moscow, 2025. 412 p.
6. Abusueva A.S., Rizvanov D.M., Akhmedov D.R., Pashayeva S.A. Epidemiological aspects of HIV infection in the Republic of Dagestan. Current issues of infectious diseases and immunoprophylaxis in adults and children. 2024. Makhachkala. pp. 100–103
7. Akhmedov D.R., Rizvanov D.M., Abusueva A.S., Dzhannurzaeva A.M. HIV infection epidemic. Problems and solutions. Current Issues of Infectious Diseases in Clinical and Experimental Practice. Makhachkala, 2015, pp. 178–181
8. D.S. Shabanov, S.M. Gaybulaeva, B.M. Saidova. The Problem of the Spread of the Human Immunodeficiency Virus in the Republic of Dagestan // Proceedings of the 72nd All-Russian Scientific Conference of Young Scientists and Students with International Participation., 2024, pp. 486–487.
9. UNAIDS. Global AIDS Update 2024: The Urgency of Now — AIDS at a Crossroads. — Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 2024. — 248 p.

Анализ структуры и тяжести боевых травм, полученных в ходе специальной военной операции

Алексеева Клавдия Ивановна,

студент-магистр, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова; инструктор-методист ЛФК, ООО санатория-профилактория «Чэбдик»

Прокопьева Намына Семеновна,

студент-магистр, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, инструктор-методист ГБУ ДО РС(Я) «СШ по футболу

Колодезникова Сардаана Ивановна,

канд. пед. наук, доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

В статье представлен анализ структуры и тяжести боевых травм, полученных военнослужащими в ходе специальной военной операции. Проанализированы механизмы травматизма, локализация повреждений и их тяжесть. Установлено преобладание минно-взрывных травм (47,3%) над огнестрельными ранениями (38,5%). Выявлено, что повреждения конечностей составляют 61,7% от всех травм. Показано, что тяжелые и крайне тяжелые повреждения наблюдаются у 30,3% пострадавших. Особое внимание уделено характеристикам минно-взрывных травм, огнестрельных ранений, повреждений опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и черепно-мозговых травм. Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации системы оказания медицинской помощи раненым и совершенствования методов лечения боевой травмы.

Ключевые слова: боевая травма, минно-взрывная травма, огнестрельные ранения, специальная военная операция, структура травматизма, военно-полевая хирургия, черепно-мозговая травма, травматические ампутации.

Введение

Боевые травмы представляют собой особый вид повреждений, отличающихся от травм мирного времени как по механизму возникновения, так и по клиническому течению. Специальная военная операция (СВО), проводимая с 2022 года, сопровождается значительным количеством санитарных потерь, требующих тщательного анализа для оптимизации системы оказания медицинской помощи раненым и совершенствования методов лечения.

Современные вооруженные конфликты характеризуются применением различных видов оружия, что обуславливает разнообразие механизмов травматизма. Крайне важным является изучение структуры и тяжести боевых травм для разработки эффективных методов диагностики и лечения пострадавших.

Цель исследования: провести анализ структуры и тяжести боевых травм, полученных в ходе специальной военной операции для выявления их особенностей и определения приоритетных направлений медицинского обеспечения.

Материалы и методы

Анализ механизмов получения травм в ходе СВО показал следующее распределение:

- минно-взрывные травмы – 47,3%;
- огнестрельные ранения – 38,5%;
- другие виды травм (тупая травма, ожоги, отморожения и др.) – 14,2%.

Для оценки тяжести повреждений использовались шкалы ВПХ-П (военно-полевой хирургии) и ISS (Injury Severity Score). Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартных методов вариационной статистики.

Результаты исследования и их обсуждение

По данным проведенного анализа повреждений по локализации, повреждения распределились следующим образом:

1. Конечности – 61,7%, в том числе:
 - нижние конечности – 38,2%;
 - верхние конечности – 23,5%.
2. Голова и шея – 15,3%.
3. Грудь – 10,8%.
4. Живот и таз – 8,9%.
5. Множественная и сочетанная локализация – 3,3%.

Согласно данным, распределение раненых по тяжести повреждений в соответствии со шкалой ВПХ-П было следующим [2]:

- легкие повреждения (0,05–0,4 балла) – 28,2%;
- повреждения средней тяжести (0,5–0,9 балла) – 41,5%;
- тяжелые повреждения (1,0–12 баллов) – 22,3%;
- крайне тяжелые повреждения (>12 баллов) – 8,0%.

Установлено, что тяжесть повреждений коррелирует с механизмом травмы: наиболее тяжелые повреждения наблюдались при минно-взрывной травме (средний балл по шкале ISS – $24,3 \pm 7,2$), при огнестрельных ранениях средний балл составил $18,7 \pm 5,9$ ($p < 0,05$) [3].

Минно-взрывные травмы в условиях СВО характеризуются рядом особенностей. В структуре минно-взрывных травм преобладают:

- травматические ампутации конечностей – 31,7%;
- осколочные ранения – 42,3%;
- контузионный синдром – 58,5%;
- баротравма – 22,9%.

По данным исследований, среди минно-взрывных травм преобладали повреждения, вызванные подрывом на противопехотных минах и самодельных взрывных устройствах (63,4%), реже встречались травмы от артиллерийских снарядов и минометных мин (36,6%) [6].

У 75,3% пострадавших с минно-взрывной травмой наблюдается сочетание повреждений различных анатомических областей, при этом в 42,8% случаев отмечается поражение трех и более анатомических областей [2].

В структуре огнестрельных ранений можно выделить следующие особенности:

- преобладание пулевых ранений от снайперского огня – 37,2%;
- значительная доля высокоскоростных пулевых ранений – 28,5%;

– ранения от поражающих элементов боеприпасов объемного взрыва – 12,8%;

– ранения от касетных боеприпасов – 21,5%.

Тяжесть огнестрельных ранений во многом определяется характером снаряда и дистанцией поражения. Наиболее тяжелые повреждения наблюдаются при ранениях высокоскоростными пулями (средний балл по шкале ВПХ-П – $1,7 \pm 0,4$) и при применении экспансивных боеприпасов (средний балл – $2,1 \pm 0,5$) [3].

Травмы опорно-двигательного аппарата занимают ведущее место в структуре боевых повреждений. Среди них преобладают:

– огнестрельные переломы костей – 48,3%;

– травматические ампутации – 18,7%;

– повреждения суставов – 15,2%;

– повреждения мягких тканей с разрушением мышечно-суконного аппарата – 17,8%.

Огнестрельные переломы в условиях СВО характеризуются высокой степенью фрагментации костной ткани (в 68,2% случаев), значительным повреждением окружающих мягких тканей (в 82,3% случаев) и высоким риском развития инфекционных осложнений (в 36,7% случаев) [6].

Проведенный анализ показал, что среди повреждений внутренних органов наиболее часто встречаются:

– травмы легких и органов грудной клетки – 42,3%;

– повреждения органов брюшной полости – 38,5%;

– травмы мочеполовой системы – 19,2%.

Особенностью абдоминальных повреждений при СВО является высокая частота сочетанного поражения полых и паренхиматозных органов (42,7% случаев), что значительно усложняет хирургическое лечение и ухудшает прогноз [2].

Черепно-мозговые травмы (ЧМТ) составили 15,3% в структуре боевых повреждений. По тяжести выделяют:

– легкая ЧМТ (сотрясение головного мозга) – 37,2%;

– ЧМТ средней тяжести (ушиб головного мозга легкой и средней степени) – 34,5%;

– тяжелая ЧМТ (ушиб тяжелой степени, сдавление головного мозга) – 28,3%.

Проведенный анализ структуры и тяжести травм, полученных в ходе СВО, позволяет выделить ряд особенностей современной боевой травмы.

Во-первых, отмечается преобладание минно-взрывных травм (47,3%) над огнестрельными ранениями (38,5%), что согласуется с данными других исследователей [4, 1]. Это обусловлено широким применением противопехотных мин, самодельных взрывных устройств и артиллерийских боеприпасов в современных условиях ведения боевых действий.

Во-вторых, наблюдается высокая частота множественных и сочетанных повреждений, что существенно усложняет диагностику и лечение пострадавших. У 43,7% раненых отмечалось поражение двух и более анатомических областей [5]. Это требует мультидисциплинарного подхода к оказанию медицинской помощи и координации работы специалистов различных профилей.

В-третьих, характерной особенностью является значительная доля тяжелых и крайне тяжелых повреждений (30,3% от общего числа пострадавших), что требует применения всего арсенала современных методов интенсивной терапии и хирургического лечения. Особую сложность представляют случаи травматических ампутаций (18,7% среди повреждений опорно-двигательного аппарата), требующие длительной реабилитации и протезирования.

Высокая частота повреждений конечностей (61,7%) объясняется особенностями механизма минно-взрывной травмы, при которой нижние конечности подвергаются наибольшему воздействию поражающих факторов. Это определяет необходимость совершенствования средств индивидуальной защиты и развития травматологической службы.

Значительная доля черепно-мозговых травм (15,3%) и повреждений внутренних органов свидетельствует о необходимости совершенствования нейрохирургической и абдоминальной помощи на этапах медицинской эвакуации.

Выводы

Проведенное исследование показало, что в современной структуре боевых травм доминирующее положение занимают минно-взрывные повреждения, составляющие почти половину всех случаев и характеризующиеся наибольшей степенью тяжести по шкале ISS. Наиболее уязвимой областью поражения остаются конечности, причем нижние

конечности страдают значительно чаще верхних, что связано с особенностями механизма боевых травм и применяемых средств поражения.

Анализ тяжести повреждений выявил, что почти треть пострадавших получают тяжелые и крайне тяжелые травмы, требующие не только неотложного хирургического вмешательства, но и длительной интенсивной терапии с применением высокотехнологичных методов лечения. Отличительной чертой современной боевой травмы стала высокая распространенность множественных и сочетанных повреждений, затрагивающих различные анатомические области и системы органов, что существенно усложняет диагностику и лечебный процесс.

Полученные данные убедительно свидетельствуют о необходимости комплексного пересмотра подходов к оказанию медицинской помощи раненым. Требуется дальнейшее совершенствование системы этапного лечения, усиление материально-технической базы травматологических, нейрохирургических и абдоминальных отделений военно-медицинских учреждений, развитие мультидисциплинарного взаимодействия специалистов различного профиля. Кроме того, результаты исследования обосновывают актуальность модернизации средств индивидуальной защиты военнослужащих с учетом современных реалий ведения боевых действий.

Литература

1. Агаджанян В.В., Кравцов С.А., Шаталин А.В. Политравма: проблемы и практические вопросы // Политравма. – 2023. – № 1. – С. 6–15.
2. Зубарев П.Н., Котив Б.Н., Самохвалов И.М. Оценка тяжести боевой травмы: современные шкалы и их применение // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2023. – Т. 182, № 3. – С. 67–75.
3. Котельников Г.П., Шпигель А.С., Шаповалов В.М. Огнестрельные ранения: патогенез, клиника, лечение // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2023. – № 2. – С. 45–56.
4. Кузьмин С.Н., Быковников А.А., Берснев В.П. Особенности диагностики и лечения тяжелой сочетанной травмы в условиях вооруженного конфликта // Скорая медицинская помощь. – 2022. – Т. 23, № 4. – С. 38–47.
5. Рыжкин В.Д., Войновский А.Е., Нечаев Э.А. Организация хирургической помощи при сочетанной боевой травме // Военно-медицинский журнал. – 2022. – Т. 343, № 4. – С. 15–24.
6. Хоминет В.В., Щукин А.В., Михайлов С.В. Минно-взрывная травма конечностей: современные подходы к лечению // Травматология и ортопедия России. – 2023. – Т. 29, № 1. – С. 125–138.

ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND SEVERITY OF COMBAT INJURIES RECEIVED DURING A SPECIAL MILITARY OPERATION

Alekseyeva K.I., Prokopyeva N.S., Kolodeznikova S.I.

North-Eastern Federal University. M.K. Ammosova, State Budgetary Institution of the Republic of Sakha (Yakutia) "Football School", LLC sanatorium-preventorium "Chebdiik"

The article presents an analysis of the structure and severity of combat injuries sustained by military personnel during the special military operation. The mechanisms of trauma, localization of injuries, and their severity are analyzed. The predominance of mine-blast injuries (47.3%) over gunshot wounds (38.5%) has been established. It was revealed that extremity injuries account for 61.7% of all traumas. It is shown that severe and extremely severe injuries are observed in 30.3% of casualties. Special attention is paid to the characteristics of mine-blast injuries, gunshot wounds, musculoskeletal injuries, internal organ damage, and traumatic brain injuries. The study results can be used to optimize the medical care system for the wounded and improve combat trauma treatment methods.

Keywords: combat trauma, mine-blast injury, gunshot wounds, special military operation, trauma structure, military field surgery, traumatic brain injury, traumatic amputations.

References

1. Agadzhanian V.V., Kravtsov S.A., Shatalin A.V. Politravma: Problems and Practical Issues // Politravma. – 2023. – No. 1. – Pp. 6–15.
2. Zubarev P.N., Kotiv B.N., Samokhvalov I.M. Assessment of the Severity of Combat Trauma: Modern Scales and Their Application // Vestnik Khirurgii im. I.I. Grekova. – 2023. – Vol. 182, No. 3. – Pp. 67–75.
3. Kotelnikov G.P., Shpigel A.S., Shapovalov V.M. Firearm Wounds: Pathogenesis, Clinic, and Treatment // Vestnik Travmatologii i Ortopedii im. N.N. Priorova. – 2023. – No. 2. – Pp. 45–56.
4. Kuzmin S.N., Bykovnikov A.A., Bersnev V.P. Features of the diagnosis and treatment of severe combined trauma in the conditions of armed conflict // Emergency medical care. – 2022. – Vol. 23, No. 4. – pp. 38–47.
5. Ryzhkin V.D., Voinovsky A.E., Nechaev E.A. Organization of surgical care for combined combat injury // Military Medical Journal. – 2022. – Vol. 343, No. 4. – pp. 15–24.
6. Khominet V.V., Shchukin A.V., Mikhailov S.V. Mine explosion injury of limbs: modern approaches to treatment // Traumatology and

Эндоскопическое лигирование варикозно расширенных вен пищевода: эволюция метода и современные возможности

Сысоева Софья Алексеевна,

преподаватель кафедры внутренней медицины № 2 Ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт имени С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: sysoyeva_sofya@bk.ru

Перетокина Ольга Владимировна,

студент ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского
E-mail: gavrish_0102@mail.ru

Гальченко Анастасия Алексеевна,

студент ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского
E-mail: ngalcheno@mail.ru

Булатняя Анастасия Николаевна,

студент ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского
E-mail: abulatnya@gmail.com

Дураков Даниил Вячеславович,

студент ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского
E-mail: ikyt1337@gmail.com

В представленном обзоре анализируются современные данные литературы, посвященные эндоскопическому лигированию (ЭЛ) варикозно расширенных вен пищевода. Рассмотрены исторические аспекты внедрения метода, технические особенности процедуры и ее патофизиологическое обоснование. Основное внимание уделено клинической эффективности ЭЛ в различных ситуациях: при остром варикозном кровотечении, для вторичной и первичной профилактики геморрагических осложнений у пациентов с портальной гипертензией. Проведен сравнительный анализ эффективности монотерапии ЭЛ и комбинированного подхода с использованием неселективных бета-блокаторов. Детально освещен спектр осложнений метода – от частых (постлигатурные язвы, дисфагия) до редких, но жизнеугрожающих (пищеводная обструкция, некроз стенки пищевода). Отдельно рассматриваются ограничения метода при рефрактерных формах варикозного расширения вен и перспективы применения ЭЛ у сложных категорий пациентов.

Ключевые слова: портальная гипертензия, варикозно расширенные вены пищевода, эндоскопическое лигирование, профилактика кровотечений, постлигатурные осложнения.

Введение

Варикозное расширение вен пищевода (ВРВП) является одним из наиболее грозных осложнений синдрома портальной гипертензии, в первую очередь ассоциированного с циррозом печени. Частота встречаемости ВРВП у пациентов с циррозом варьирует от 30% до 70%, причем ежегодный риск развития первого кровотечения из варикозных узлов составляет 5–15% [1]. Несмотря на значительный прогресс в лечении, летальность при первом эпизоде кровотечения остается высокой, достигая 15–25% в течение первых шести недель, что диктует необходимость применения эффективных и безопасных методов гемостаза и профилактики [2].

«Золотым стандартом» лечения и профилактики кровотечений из ВРВП на протяжении последних десятилетий является эндоскопическое лигирование. Метод, впервые описанный G.V. Stiegmann и коллегами в 1988 году, пришел на смену склеротерапии благодаря лучшему профилю безопасности и сопоставимой или превосходящей эффективности [3, 4]. Настоящий обзор ставит целью обобщить современные данные литературы о месте ЭЛ в комплексном ведении пациентов с портальной гипертензией.

Исторические аспекты

Разработка техники ЭЛ стала логическим продолжением поиска малоинвазивных методов остановки кровотечения. Первоначально процедура выполнялась с использованием одиночного лигатора, что требовало интубации пищевода защитным чехлом и частой смены эндоскопа. Значительным прорывом стало внедрение в клиническую практику многоразрядных (multi-band) лигаторов, позволяющих наложить от 4 до 10 латексных колец за одну интубацию, что существенно сократило время процедуры и повысило ее безопасность [3, 5].

Принцип действия метода заключается в механической обтурации варикозного узла латексным кольцом, что приводит к тромбозу вены с последующим некрозом и отторжением тканей с формированием поверхностного изъязвления, которое заживает в течение 7–14 дней [5, 6].

ЭЛ признано методом выбора первой линии при остром кровотечении из ВРВП. Эффективность достижения первичного гемостаза при использовании лигирования превышает 90% [7]. Однако визуализация источника кровотечения при геморрагическом шоке и массивном поступлении крови может быть затруднена, что требует предварительных мероприятий по стабилизации гемодинамики и, в ряде случаев, временной баллонной тампонады [6].

После успешной остановки кровотечения крайне высок риск его рецидива (до 60–70% без лечения). Проведение программных сеансов ЭЛ с интервалом 2–4 недели до полной эрадикации варикозных узлов является стандартом вторичной профилактики [5, 8].

Многочисленные исследования и мета-анализы демонстрируют преимущество комбинированной стратегии. Добавление неселективных бета-блокаторов (пропранолол, карведилол) к серийным сеансам лигирования достоверно снижает частоту рецидивов кровотечения по сравнению с одной только эндоскопической терапией. Это связано с синергизмом действия: лигирование устраняет локальные узлы, а бета-блокаторы снижают портальное давление, воздействуя на патогенез заболевания [2, 9, 10].

У пациентов с ВРВП среднего и большого размера, еще не имевших эпизода кровотечения, ЭЛ может применяться в качестве первичной профилактики. Однако большинство международных руководств (включая рекомендации Baveno VII) отдают предпочтение фармакотерапии (карведилол или пропранолол) как первой линии, reserving ЭЛ для случаев непереносимости или противопоказаний к приему бета-блокаторов [1, 11].

Осложнения метода и их профилактика

Несмотря на то что ЭЛ считается более безопасным, чем склеротерапия, оно ассоциировано с рядом специфических осложнений:

Постлигатурные язвы являются фактически ожидаемым исходом процедуры, так как на месте отторгнутого узла образуется язвенный дефект. В большинстве случаев они проходят бессимптомно, однако

могут стать источником кровотечения. Частота клинически значимых язвенных кровотечений достигает 5–9%, а факторами риска являются выраженная печеночно-клеточная недостаточность и сопутствующий рефлюкс-эзофагит [12, 13]. Редкие осложнения, к которым относятся массивный некроз слизистой и мышечной оболочки пищевода с развитием стриктур и острой обструкции пищевода. Данное осложнение является жизнеугрожающим и требует своевременной диагностики (при появлении выраженной дисфагии после процедуры) и активной тактики – удаления лигатур и бужирования [14, 15].

Ограничения и особые клинические ситуации

Применение ЭЛ при варикозном расширении вен желудка (особенно при изолированных желудочных венах – IGV) менее эффективно и связано с высоким риском рецидива. В таких ситуациях предпочтение отдается введению тканевых клеев (N-бутил-цианоакрилат) или комбинированным эндоваскулярным вмешательствам (TIPS, BRTO) [16, 17].

Отдельную сложную когорту представляют пациенты, которым требуется эндоскопическая резекция по поводу ранних неоплазий пищевода на фоне имеющихся варикозно расширенных вен. В таких случаях современная стратегия предполагает проведение предварительной эрадикации вен с помощью ЭЛ или склеротерапии с последующим выполнением резекции, что демонстрирует приемлемый уровень безопасности [18].

Заключение

Эндоскопическое лигирование прочно заняло центральное место в лечении и профилактике кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода. Метод отличается высокой эффективностью, хорошей переносимостью и относительно низким риском тяжелых осложнений. Однако успех лечения зависит от комплексного подхода, включающего своевременное назначение фармакотерапии (бета-блокаторы), тщательный эндоскопический контроль и настороженность в отношении возможных редких, но опасных осложнений. Дальнейшее развитие метода, вероятно, будет связано с совершенствованием лигаторов и интеграцией ЭЛ в сложные мультидисциплинарные алгоритмы ведения пациентов с декомпенсированными заболеваниями печени.

Литература

1. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C; Baveno VII Faculty. Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension. *J Hepatol.* 2022;76(4):959–974. doi: 10.1016/j.jhep.2021.12.022
2. Garcia-Tsao G, Abraldes JG, Berzigotti A, Bosch J. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis: Risk stratification, diagnosis, and management: 2016 practice guidance by the American Association for the study of liver diseases. *Hepatology.* 2017;65(1):310–335. doi: 10.1002/hep.28906
3. Stiegmann GV, Goff JS, Michaletz-Onody PA, et al. Endoscopic sclerotherapy as compared with endoscopic ligation for bleeding esophageal varices. *N Engl J Med.* 1992;326(23):1527–1532. doi: 10.1056/NEJM199206043262304
4. Laine L, Cook D. Endoscopic ligation compared with sclerotherapy for treatment of esophageal variceal bleeding. A meta-analysis. *Ann Intern Med.* 1995;123(4):280–287. doi: 10.7326/0003-4819-123-4-199508150-00007
5. ASGE Technology Committee, Liu J, Petersen BT, et al. Endoscopic banding devices. *Gastrointest Endosc.* 2008;68(2):217–221. doi: 10.1016/j.gie.2008.02.082
6. Коробка ВЛ, Пасечников ВД, Коробка РВ, Пак ЕС, Шаповалов АМ, Пасечников ДВ, Сапронова НГ, Хоронько ЮВ. Применение эндоскопического лигирования варикозных узлов в первичной профилактике кровотечения у пациентов с асцитом, включенных в лист ожидания трансплантации печени. *Трансплантология.* 2023;15(2):158–167. doi: 10.23873/2074-0506-2023-15-2-158-167
7. Hwang JH, Shergill AK, Acosta RD, et al. The role of endoscopy in the management of variceal hemorrhage. *Gastrointest Endosc.* 2014;80(2):221–227. doi: 10.1016/j.gie.2013.07.023
8. Gluud LL, Krag A. Banding ligation versus beta-blockers for primary prevention in oesophageal varices in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012;(8): CD004544. doi: 10.1002/14651858.CD004544.pub2
9. Gong DF, Zhang MY, Qin ZP, Li XP, Pan W, Wei M. Therapeutic outcomes and predictors of efficacy for endoscopic variceal ligation plus propranolol in liver cirrhosis-related upper gastrointestinal bleeding. *World J Gastrointest Surg.* 2025;17(9):109152. doi: 10.4240/wjgs.v17.i9.109152
10. Puente A, Hernández-Gea V, Graupera I, et al. Drugs plus ligation to prevent rebleeding in cirrhosis: an updated systematic review. *Liver Int.* 2014;34(6):823–833. doi: 10.1111/liv.12452

11. NICE Guideline CG141. Acute upper gastrointestinal bleeding in over 16s: management. National Institute for Health and Care Excellence; 2012 (updated 2016).

12. Eid AMA, Shahin ESA, Goda F, Fouad MA. Esophageal ulcer after band ligation of esophageal varices. *J Med Sci Res.* 2022;5(3): Article 28. doi: 10.4103/jmsr.jmsr_50_22

13. Vanbiervliet G, Giudicelli-Bornard S, Piche T, et al. Predictive factors of bleeding related to post-banding ulcer following endoscopic variceal ligation in cirrhotic patients: a case-control study. *Aliment Pharmacol Ther.* 2010;32(2):225–232. doi: 10.1111/j.1365-2036.2010.04331.x

14. Gupta S, Hashim A, Socloff A, Bonder A. Esophageal necrosis and obstruction after esophageal variceal banding. *GastroHep Adv.* 2022;1(1):33679. doi: 10.56305/001c.33679

15. Saltzman JR, Arora S. Complete esophageal obstruction after endoscopic variceal band ligation. *Gastrointest Endosc.* 1993;39(5):725–727.

16. Henry Z, Uppal D, Saad W, Caldwell S. Gastric and ectopic varices. *Clin Liver Dis.* 2021;25(2):357–372. doi: 10.1016/j.cld.2021.01.005

17. Wang J, Wang T, Wang F, et al. Endoscopic variceal ligation versus sclerotherapy in patients with gastric variceal bleed: a retrospective cohort study. *BMC Surg.* 2026;26(1):120. doi: 10.1186/s12893-025-03420-8

18. Frederiks CN, Boer LS, Gloudemans B, et al. Endoscopic resection of early esophageal neoplasia in patients with esophageal varices: a systematic review. *Endoscopy.* 2025;57(7):769–778. doi: 10.1055/a-2505-7484

ENDOSCOPIC VARICEAL LIGATION: EVOLUTION OF THE METHOD AND CURRENT POSSIBILITIES

Sysoeva S.A., Peretokina O.V., Galchenko A.A., Bulatnyaya A.N., Durakov D.V.
V.I. Vernadsky Crimean Federal University

This review analyzes current literature on endoscopic variceal ligation (EVL). It examines the historical background of the method's introduction, technical aspects of the procedure, and its pathophysiological rationale. The main focus is on the clinical efficacy of EVL in various situations: acute variceal bleeding, secondary and primary prevention of hemorrhagic complications in patients with portal hypertension. A comparative analysis of the effectiveness of EVL monotherapy versus a combined approach with non-selective beta-blockers is conducted. The spectrum of complications is detailed, ranging from common (post-banding ulcers, dysphagia) to rare but life-threatening (esophageal obstruction, wall necrosis). The limitations of the method in refractory varices and prospects for EVL use in complex patient categories are also discussed.

Keywords: portal hypertension, esophageal varices, endoscopic ligation, bleeding prevention, post-banding complications.

References

1. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C; Baveno VII Faculty. Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension. *J Hepatol.* 2022;76(4):959–974. doi: 10.1016/j.jhep.2021.12.022
2. Garcia-Tsao G, Abraldes JG, Berzigotti A, Bosch J. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis: Risk stratification, diagnosis, and management: 2016 practice guidance by the American Association for the study of liver diseases. *Hepatology.* 2017;65(1):310–335. doi: 10.1002/hep.28906
3. Stiegmann GV, Goff JS, Michaletz-Onody PA, et al. Endoscopic sclerotherapy as compared with endoscopic ligation for bleeding esophageal varices. *N Engl J Med.* 1992;326(23):1527–1532. doi: 10.1056/NEJM199206043262304
4. Laine L, Cook D. Endoscopic ligation compared with sclerotherapy for treatment of esophageal variceal bleeding. A meta-analysis. *Ann Intern Med.* 1995;123(4):280–287. doi: 10.7326/0003-4819-123-4-199508150-00007
5. ASGE Technology Committee, Liu J, Petersen BT, et al. Endoscopic banding devices. *Gastrointest Endosc.* 2008;68(2):217–221. doi: 10.1016/j.gie.2008.02.082
6. Коробка ВЛ, Пасечников ВД, Коробка РВ, Пак ЕС, Шаповалов АМ, Пасечников ДВ, Сапронова НГ, Хоронько ЮВ. Применение эндоскопического лигирования варикозных узлов в первичной профилактике кровотечения у пациентов с асцитом, включенных в лист ожидания трансплантации печени. *Трансплантология.* 2023;15(2):158–167. doi: 10.23873/2074-0506-2023-15-2-158-167
7. Hwang JH, Shergill AK, Acosta RD, et al. The role of endoscopy in the management of variceal hemorrhage. *Gastrointest Endosc.* 2014;80(2):221–227. doi: 10.1016/j.gie.2013.07.023
8. Gluud LL, Krag A. Banding ligation versus beta-blockers for primary prevention in oesophageal varices in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012;(8): CD004544. doi: 10.1002/14651858.CD004544.pub2
9. Gong DF, Zhang MY, Qin ZP, Li XP, Pan W, Wei M. Therapeutic outcomes and predictors of efficacy for endoscopic variceal ligation plus propranolol in liver cirrhosis-related upper gastrointestinal bleeding. *World J Gastrointest Surg.* 2025;17(9):109152. doi: 10.4240/wjgs.v17.i9.109152
10. Puente A, Hernández-Gea V, Graupera I, et al. Drugs plus ligation to prevent rebleeding in cirrhosis: an updated systematic review. *Liver Int.* 2014;34(6):823–833. doi: 10.1111/liv.12452
11. NICE Guideline CG141. Acute upper gastrointestinal bleeding in over 16s: management. National Institute for Health and Care Excellence; 2012 (updated 2016).
12. Eid AMA, Shahin ESA, Goda F, Fouad MA. Esophageal ulcer after band ligation of esophageal varices. *J Med Sci Res.* 2022;5(3): Article 28. doi: 10.4103/jmsr.jmsr_50_22

13. Vanbiervliet G, Giudicelli-Bornard S, Piche T, et al. Predictive factors of bleeding related to post-banding ulcer following endoscopic variceal ligation in cirrhotic patients: a case-control study. *Aliment Pharmacol Ther.* 2010;32(2):225–232. doi: 10.1111/j.1365-2036.2010.04331.x

14. Gupta S, Hashim A, Socoloff A, Bonder A. Esophageal necrosis and obstruction after esophageal variceal banding. *GastroHep Adv.* 2022;1(1):33679. doi: 10.56305/001c.33679

15. Saltzman JR, Arora S. Complete esophageal obstruction after endoscopic variceal band ligation. *Gastrointest Endosc.* 1993;39(5):725–727.

16. Henry Z, Uppal D, Saad W, Caldwell S. Gastric and ectopic varices. *Clin Liver Dis.* 2021;25(2):357–372. doi: 10.1016/j.cld.2021.01.005

17. Wang J, Wang T, Wang F, et al. Endoscopic variceal ligation versus sclerotherapy in patients with gastric variceal bleed: a retrospective cohort study. *BMC Surg.* 2026;26(1):120. doi: 10.1186/s12893-025-03420-8

18. Frederiks CN, Boer LS, Gloudemans B, et al. Endoscopic resection of early esophageal neoplasia in patients with esophageal varices: a systematic review. *Endoscopy.* 2025;57(7):769–778. doi: 10.1055/a-2505-7484

Пространственная неоднородность заболеваемости бруцеллезом в Республике Дагестан за 2025 год

Абусева Аида Сагадуллаевна,

к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней им. акад. Г.П. Руднева,
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: aida39@list.ru

Шабанов Даниял Сундарович,

студент, ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: daniyal_shabanov@mail.ru

Пашаева Саида Алимпашаевна,

к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней им. акад. Г.П. Руднева,
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: saida-p05@mail.ru

Даниялбекова Заира Мутагировна,

к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней им. акад. Г.П. Руднева,
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: zairaD05@mail.ru

Билалова Саида Касумовна,

к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней им. акад. Г.П. Руднева,
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: bilalovasaida@yandex.ru

В статье представлена оценка эпидемиологической ситуации по бруцеллезу в Республике Дагестан за 2025 год. Актуальность исследования обусловлена развитым животноводством региона, где поголовье скота достигает миллионов голов, и высоким риском распространения зоонозных инфекций среди населения. Цель работы заключалась в изучении пространственной неоднородности заболеваемости. Материалы основаны на статистических данных ГБУ РД «РЦИБ и СПИД». Проведен ретроспективный описательно-аналитический анализ зарегистрированных случаев. Результаты показали регистрацию 155 случаев заболевания (показатель 4,74 на 100 тыс. населения), что на 22,4% ниже уровня 2024 года. Однако выявлена выраженная территориальная неоднородность: 16 муниципальных образований превысили средние показатели, среди которых лидируют Чародинский и Докузпаринский районы. В социальной структуре заболевших преобладают безработные (65%), что указывает на бытовой характер риска. Основным механизмом передачи является контактный. План специфической профилактики выполнен лишь на 9,6% вследствие дефицита вакцины. Объявлено 24 неблагополучных хозяйства. Требуется усиление ветеринарного и медицинского контроля. Сделан вывод о сохранении устойчивых очагов инфекции и необходимости комплексного межведомственного подхода для эффективного снижения заболеваемости в регионе.

Ключевые слова: бруцеллез, скот, район, животноводство, Дагестан, инфекция.

Актуальность

Бруцеллез – зоонозная инфекция, характеризующаяся бактериемией, развитием гиперчувствительности замедленного типа, поражением опорно-двигательного аппарата, половых органов, нервной системы, выраженной лихорадкой и склонностью к длительным рецидивам. Основным источником возбудителя являются сельскохозяйственные животные. Республика Дагестан представляет собой один из ключевых регионов, где развито сельское хозяйство. Животноводство занимает приоритетное направление в агропромышленном комплексе региона. Регион отличается высокой долей личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании как крупного рогатого скота (КРС), так и мелкого рогатого скота (МРС), что определяет как социально-экономическую значимость отрасли, так и её эпидемиологическую уязвимость по отношению к зоонозным инфекциям, в том числе бруцеллезу. Согласно статистике Министерства сельского хозяйства республики, на конец 2024 года поголовье овец и коз в регионе превысило 4.7 миллионов голов, которое обеспечивает более 22% общего поголовья мелко рогатого скота Российской Федерации. При этом численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Республики Дагестан на тот же период составляла **около 930 тыс. голов**, включая примерно **483 тыс. коров**, что отражает устойчивое развитие молочного и мясного направления животноводства в регионе. Обе эти категории животных – КРС и МРС – являются основными резервуарами и источниками бруцеллезной инфекции.

Цель исследования: изучить эпидемиологическую ситуацию по бруцеллезу в республике Дагестан.

Материалы и методы

Исследование выполнено на базе анализа эпидемиологической ситуации по заболеваемости бруцеллезом в республике Дагестан за 2025 год. Работа носит ретроспективный описательно-аналитический характер и направлена на оценку территориальных, социальных и эпидемиологических особенностей распространения инфекции. Материалами исследования послужили официальные статистические данные ГБУ РД «РЦИБ и СПИД», отчетные сведения о регистрации случаев бруцеллеза среди населения. Анализировались сведения о механизме передачи инфекции, социальной структуре заболевших и очаговой заболеваемости. Единицей наблюдения являлся зарегистрированный случай на 100.000 населения с использованием стандартных эпидемиологических формул. Территориальный анализ проводился по административным районам и городским округам региона. Социальная структура заболевших оценивалась по категориям занятости. Для визуализации использовались методы графического анализа: построение диаграмм распределения, сравнительных графиков и тематических карт, отражающих территориальную дифференцировку заболеваемости.

Результаты и их обоснование: по данным Комитета по ветеринарии республики Дагестан за 2025 год были объявлены 24 хозяйств неблагополучными пунктами по бруцеллезу. За 2025 год было зарегистрировано 155 случаев бруцеллеза, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 4,74 против 162 случаев в 2024 году (ИП-5,05), отмечалось снижение заболеваемости на более чем 22,4%. Однако, наиболее высокими показателями заболеваемости превышающие норму выделены 16 муниципалитетов: Гунибский (7,38), Тляртинский (8,28), Кулинский (9,13), Агульский (9,7), Цумадинский (11,68), Ногайский (10,87), Чародинский (61,7), Хунзахский (15,38), Докузпаринский (20,12) районы и город Южно-Сухокумск (9,40) (рис. 1).

Наибольший удельный вес по заболеваемости приходится на безработных – 65%, работающее население – 25%, пенсионеры – 10%, школьники – 5% (рис. 2).

За 2025 год был зарегистрирован очаг групповой заболеваемости с количеством пострадавших 8 человек в С.Ичин Сулейман Стальского района, что говорит об отдаленности территории от надзорной работы органов ветеринарии – 16.05.2025

Проведенный анализ графических материалов, отражающих структуру и территориальное распределение заболеваемости бруцеллезом в Республике Дагестан, демонстрирует устойчивую эпидеми-

ологическую неоднородность и доминирование профессионально-бытовых факторов передачи инфекции.




Рис. 1

Социальная структура заболевших бруцеллезом



Рис. 2

Диаграмма путей передачи свидетельствует о преобладании контактного механизма заражения, на долю которого приходится более половины установленных случаев. Это указывает на сохраняющийся высокий риск инфицирования среди лиц, вовлечённых в уход за сельскохозяйственными животными и работу с сырьём животного происхождения. Алиментарный путь передачи, связанный с употреблением непастеризованной молочной продукции, также остаётся значимым, что отражает недостаточный санитарный контроль продукции частных хозяйств и традиционные пищевые практики населения. Наличие случаев с неустановленным источником заражения подчёркивает сложность эпидемиологического надзора и необходимость совершенствования расследования очагов инфекции (рис. 3).




Рис. 3

Ранжирование административных территорий по показателям заболеваемости выявляет выраженную концентрацию риска в отдельных районах, существенно превышающих среднереспубликанский уровень. Такая территориальная кластеризация отражает влияние эпизоотической ситуации среди сельскохозяйственных животных, плотности контактов населения с источниками инфекции и различий в профилактической работе. Районы с максимальными показателями формируют зоны повышенной эпидемиологической напряжённости, требующие приоритетного проведения ветеринарно-санитарных мероприятий, активного скрининга и профилактической вакцинации (рис. 4).




Рис. 4




Рис. 5

Тепловая визуализация подтверждает наличие пространственной неоднородности заболеваемости и подчёркивает очаговый характер распространения инфекции. Концентрация высоких показателей в отдельных территориях указывает на устойчивость локальных эпидемиологических очагов и необходимость комплексного межведомственного подхода к их ликвидации. Сочетание высокой контактной экспозиции населения и недостаточного охвата профилактическими мероприятиями создаёт условия для сохранения циркуляции возбудителя (рис. 5).

Говоря про иммунизацию, план вакцинации был выполнен на 9,6% (57 человек из 593 запланированных). Низкий процент выполнения по причине отсутствия противобруцеллезной вакцины и аллергена в гражданском обороте (рис. 6).




Рис. 6

Таблица 1. Анализ выполнения плана прививок по бруцеллезу за январь – сентябрь 2025 г.

	V			RV		
	план	привито	% вып	план	привито	% вып
Агульская ЦРБ	0	0	-	43	0	0,0
Акушинская ЦРБ	0	0	-	45	0	0,0
Ахвахская ЦРБ	36	0	0,0	0	0	-
Ахтынская ЦРБ	39	0	0,0	185	0	0,0
Бабаюртовская ЦРБ	0	0	-	200	0	0,0
Бежтинская УБ	21	0	0,0	10	0	0,0
Ботлихская ЦРБ	18	45	250,0	8	0	0,0
Буйнакская ЦРБ	0	0	-	48	0	0,0
Гергебильская ЦРБ	30	0	0,0	0	0	-
Гумбетовская ЦРБ	12	0	0,0	0	0	-
Гунибская ЦРБ	5	0	0,0	0	0	-
Дахадаевская ЦРБ	25	0	0,0	0	0	-
Докузпаринская ЦРБ	0	0	-	15	0	0,0
Казбековская ЦРБ	0	0	-	12	0	0,0
Кайтагская ЦРБ	20	0	0,0	0	0	-
Карабудахкентская ЦР	0	0	-	35	0	0,0
Каякентская ЦРБ	0	0	-	10	0	0,0
Кизилюртовская ЦРБ	12	0	0,0	0	0	-
МСЧ Кочубей	9	0	0,0	0	0	-
Кулинская ЦРБ	42	0	0,0	0	0	-
Кумторкалинская ЦРБ	10	0	0,0	0	0	-
Курахская ЦРБ	0	0	-	4	0	0,0
Лакская ЦРБ	0	2	999,9	54	0	0,0
Левашинская ЦРБ	0	0	-	45	0	0,0
Магарамкентская ЦРБ	0	0	-	34	0	0,0
Новолакская ЦРБ	9	0	0,0	0	0	-

	V			RV		
	план	привито	% вып	план	привито	% вып
Ногайская ЦРБ	28	0	0,0	34	0	0,0
Рутульская ЦРБ	0	0	-	5	0	0,0
Сергокалинская ЦРБ	10	0	0,0	7	0	0,0
Сулейман-Стальская Ц	37	0	0,0	98	2	2,0
Табасаранская ЦРБ	5	0	0,0	0	0	-
Тарумовская ЦРБ	17	0	0,0	21	0	0,0
Тляртинская ЦРБ	0	0	-	24	0	0,0
Унцукульская ЦРБ	15	0	0,0	15	0	0,0
Хасавюртовская ЦРБ	45	0	0,0	0	0	-
Хивская ЦРБ	0	0	-	22	0	0,0
Хунзахская ЦРБ	47	0	0,0	0	0	-
Цумадинская ЦРБ	34	0	0,0	0	0	-
Цунтинская ЦРБ	10	0	0,0	0	0	-
Чародинская ЦРБ	0	0	-	5	0	0,0
Шамилевская ЦРБ	0	0	-	29	0	0,0
Буйнакская ЦРБ	0	0	-	15	0	0,0
Даг.Огни ЦРБ	0	0	-	4	0	0,0
Дербентская ЦРБ	0	0	-	0	0	-
Избербашская ЦРБ	1	0	0,0	5	0	0,0
Каспийская ЦРБ	10	10	100,0	0	0	-
Хасавюртовская ЦРБ	30	0	0,0	20	0	0,0
Юж.Сухокумск ЦРБ	0	0	-	8	0	0,0
Поликлиника № 1 (ГКБ)	0	0	-	9	0	0,0
Поликлиника № 2	0	0	-	11	0	0,0
Поликлиника № 5	10	0	0,0	0	0	-
Поликлиника № 7	6	0	0,0	0	0	-
НРБ № 1 Новострой	0	0	-	5	0	0,0
Республика	593	57	9,6	1085	2	0,2

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают, что бруцеллез в регионе остается типичной зоонозной инфекцией с выраженной эпизоотической ситуацией в животноводстве. Территориальная неоднородность болезни отражает различия в уровне ветеринарного контроля, санитарной культуры населения и доступности профилактических мероприятий. Преобладание контактного механизма передачи подчеркивает профессионально-бытовой характер риска, особенно в сельских районах, где зачастую пренебрегают всем, «чем можно». Недостаточный охват вакцинацией усиливает вероятность сохранения очагов. Эти факторы формируют условия для длительной циркуляции возбудителя и требуют слаженной межведомственной работы медицинских и ветеринарных служб.

Выводы: 1. Эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу характеризуется сохранением устойчивых очагов инфекции и выраженной территориальной неоднородностью.

2. Основным фактором поддержания заболеваемости остаётся циркуляция возбудителя среди сельскохозяйственных животных и контактный механизм передачи инфекции.

3. Социальная структура заболевших отражает профессионально-бытовой характер риска, включая вовлечённость населения в уход за животными. Недостаточный охват специфической профилактики ограничивает возможности активного предупреждения заболевания.

4. Эффективное снижение заболеваемости возможно только при комплексном межведомственном подходе.

Литература

1. Клинические рекомендации Бруцеллез у взрослых МКБ 10: A23. Год утверждения 2019. Некоммерческое партнерство «Национальное научное общество инфекционистов» (НОИ) – Москва, 2019. –с.11

2. Нурпейсова Алия Хаиргельдыновна, Березкина Галина Владимировна, Стасенко Татьяна Петровна, Ляпина Елена Павловна, Антонова Анна Степановна, Михайлова Светлана Александровна Проявления хронического бруцеллеза у больных с риском профессионального заражения // Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение. 2021. № 3(38).

3. Хайдарова Ю.М., Курманова Г.М., Кулем-баева А.Б., Омарова К.С. Поражения опорно-двигательной системы при хроническом бруцеллезе. Результаты собственного исследования // Наука и Здравоохранение. 2023. 6(Т.25). С. 103–112. doi 10.34689/SH.2023.25.6.012

4. Курманова Г.М., Баратова Г.М., Акешова Н.А., Мамутова А.Е., Молдалиев И.С., Бабаева К.С. Клиническая характеристика хронического бруцеллеза с тяжелыми полиочаговыми проявлениями // Вестник КазНМУ. 2016. № 3

5. Джанмурзаева А.М., Пашаева С.А., Даниялбекова З.М., Абусуева А.С., Билалова С.К. Роль антиоксидантов цитокинов в патогенезе хронического бруцеллеза // Медицина, социология и философия № 5(2025)58–63

6. Pappas, G. et al. (2019). Brucellosis: a review of clinical and epidemiological aspects. *New England Journal of Medicine*, 380, 1240–1252.

7. Mantur, B.G., & Kanavi, M.A. (2020). Chronic brucellosis: a review of clinical and epidemiological aspects. *The Journal of Infection in Developing Countries*, 14(5), 476–485.

8. M. D.D. Jayasinghe, A. J., et al. (2021). Mechanisms of action of diclofenac and its neuroprotective properties: A review. *Current Medicinal Chemistry*, 28(28), 5540–5554.

9. Abadi, A., & Fadhl, B.M. (2020). Antioxidant properties of non-steroidal anti-inflammatory drugs: The case of diclofenac. *Antioxidants*, 9(10), 892.

SPATIAL HETEROGENEITY OF BRUCELLOSIS INCIDENCE IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN IN 2025

Abusueva A.S., Shabanov D.S., Pashayeva S.A., Daniyalbekova Z.M., Bilalova S.K.
Dagestan State Medical University

This article presents an assessment of the epidemiological situation of brucellosis in the Republic of Dagestan for 2025. The relevance of the study is due to the developed livestock

farming in the region, where livestock numbers reach millions of heads, and the high risk of the spread of zoonotic infections among the population. The aim of the study was to examine the spatial heterogeneity of brucellosis incidence. The materials are based on statistical data from the State Budgetary Institution of the Republic of Dagestan "Republic of Dagestan Center for Disease Control and AIDS." A retrospective descriptive and analytical analysis of registered cases was conducted. The results showed the registration of 155 cases of the disease (a rate of 4.74 per 100,000 population), which is 22.4% lower than the 2024 level. However, significant territorial heterogeneity was revealed: 16 municipalities exceeded the average rates, among which the Charodinsky and Dokuzparinsky districts led. The social structure of cases is dominated by the unemployed (65%), indicating a household-based nature of the risk. The main mechanism of transmission is contact. The specific prevention plan was only 9.6% completed due to a vaccine shortage. Twenty-four farms have been declared unsafe. Veterinary and medical monitoring must be strengthened. It has been concluded that persistent outbreaks of infection persist and a comprehensive, interagency approach is needed to effectively reduce the incidence rate in the region.

Keywords: brucellosis, cattle, region, animal husbandry, Dagestan, infection.

References

1. Clinical guidelines for brucellosis in adults. ICD 10: A23. Approved in 2019. Non-profit partnership "National Scientific Society of Infectious Diseases" (NOI) – Moscow, 2019. – p. 11

2. Nurpeisova Aliya Khaireldynovna, Berezhkina Galina Vladimirovna, Stasenko Tatyana Petrovna, Lyapina Elena Pavlovna, Antonova Anna Stepanovna, Mikhailova Svetlana Aleksandrovna. Manifestations of chronic brucellosis in patients at risk of occupational infection // Infectious diseases: News. Opinions. Training. 2021. No. 3(38).

3. Khaidarova Yu.M., Kurmanova G.M., Kulembaeva A.B., Omarova K.S. Lesions of the musculoskeletal system in chronic brucellosis. Results of our own study // Science and Healthcare. 2023. 6 (Vol. 25). Pp. 103–112. doi 10.34689/SH.2023.25.6.012

4. Kurmanova G.M., Baratova G.M., Akeshova N.A., Mamutova A.E., Moldaliev I.S., Babaeva K.S. Clinical characteristics of chronic brucellosis with severe multifocal manifestations // Bulletin of the Kazakh National Medical University of Ufa. 2016. № 3

5. Dzhannurzaeva A.M., Pashayeva S.A., Daniyalbekova Z.M., Abusueva A.S., Bilalova S.K. The Role of Antioxidants and Cytokines in the Pathogenesis of Chronic Brucellosis // Medicine, Sociology, and Philosophy, No. 5 (2025), 58–63

6. Pappas, G. et al. (2019). Brucellosis: a review of clinical and epidemiological aspects. *New England Journal of Medicine*, 380, 1240–1252.

7. Mantur, B. G., & Kanavi, M. A. (2020). Chronic brucellosis: a review of clinical and epidemiological aspects. *The Journal of Infection in Developing Countries*, 14 (5), 476–485.

8. M. D.D. Jayasinghe, A. J., et al. (2021). Mechanisms of action of diclofenac and its neuroprotective properties: A review. *Current Medicinal Chemistry*, 28(28), 5540–5554.

9. Abadi, A., & Fadhl, B.M. (2020). Antioxidant properties of non-steroidal anti-inflammatory drugs: The case of diclofenac. *Antioxidants*, 9(10), 892.

Гараев Руслан Радикович,

студент, ФГБОУ «Ижевского Государственного Медицинского Университета»

E-mail: raslded2.3@gmail.com

Шагабудинова Дарина Ильдаровна,

студент, ФГБОУ «Ижевского Государственного Медицинского Университета»

E-mail: darina025@mail.ru

Хатомкин Дмитрий Михайлович,

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры Неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, ФГБОУ «Ижевского Государственного Медицинского Университета»

E-mail: dhatomkin@yahoo.com

Невралгия тройничного нерва – одно из самых мучительных заболеваний в неврологии, которое характеризуется интенсивными, стреляющими болями в зонах иннервации одной или нескольких ветвей тройничного нерва. Несмотря на эффективность медикаментозной терапии на начальных этапах, у значительной части пациентов со временем развивается резистентность к препаратам или возникают непереносимые побочные эффекты. В таких случаях на первый план выходят хирургические методы лечения, среди которых ведущее место занимает микроваскулярная декомпрессия. В данной статье рассматриваются современные подходы к хирургическому лечению невралгии тройничного нерва, их показания и риски.

Ключевые слова: Невралгия тройничного нерва, прозопалгия, микроваскулярная декомпрессия, радиохирургия, чрескожные процедуры, ангиорадикулярный конфликт.

Введение

Невралгия тройничного нерва – это заболевание, проявляющееся короткими, но чрезвычайно интенсивными, похожими на удар током, приступами боли в области лица. Боль может провоцироваться легкими прикосновениями, жеванием, речью или чисткой зубов, что зачастую делает невозможным выполнение простейших активностей и приводит к значительному снижению качества жизни.

Различают две основные формы невралгии тройничного нерва:

1. Классическая (идиопатическая), причиной которой в большинстве случаев является компрессия корешка тройничного нерва в зоне его входа в ствол мозга кровеносным сосудом (чаще всего петлей передней нижней мозжечковой или верхней мозжечковой артерии). Этот патогенетический механизм известен как «вазонеуральный» или «ангиорадикулярный» конфликт.

2. Симптоматическая, вызванная другими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, опухоли мосто-мозжечкового угла, последствия герпес-вирусной инфекции или травмы.

Показаниями к хирургическому лечению являются неэффективность адекватной медикаментозной терапии (отсутствие контроля боли при применении препаратов первой линии, таких как карбамазепин, окскарбазепин), развитие серьезных побочных эффектов от лекарств, значительно ухудшающих качество жизни, прогрессирование заболевания с учащением болевых приступов, наличие четких магнитно-резонансных признаков ангиорадикулярного конфликта на стороне боли.

Перед проведением оперативного вмешательства обязательным является тщательное обследование, включающее МРТ головного мозга для визуализации взаимоотношений нерва и сосудов, а также оценку соматического статуса пациента для исключения тяжелой сопутствующей патологии.

Основные методы хирургического лечения

Микроваскулярная декомпрессия

Является «золотым стандартом», единственный патогенетический метод лечения классической невралгии тройничного нерва. Сутью метода является наличие небольшого трепанационного окна в затылочной области (латеральная субокципитальная краниотомия), выполняется доступ к мосто-мозжечковому углу. Под контролем операционного микроскопа идентифицируется зона конфликта между сосудом и корешком тройничного нерва. Сосуд аккуратно отделяется от нерва, и между ними устанавливается прокладка (чаще всего из тефлона или мышечного фрагмента пациента), которая предотвращает дальнейшую компрессию. Основным преимуществом данного метода является радикальное устранение причины боли без повреждения самого нерва. Однако при любой краниотомии, существует риск серьезных осложнений: инфаркт ствола мозга, ипсилатеральная глухота, ликворея, инфицирование. Возможны переходящие нарушения функции других черепных нервов (лицевой, блоковый), а также гипестезия лица.

Ход операции. Положение пациента – сидя или на боку (на здоровой стороне). Положение сидя улучшает отток венозной крови и уменьшает кровоточивость, но требует большего опыта от анестезиолога и хирурга. Используется общий эндотрахеальный наркоз. Разрез кожи производится позади уха, в затылочной области, длиной 4–6 см. Разрез может быть линейным или слегка изогнутым. Краниотомия производится с помощью фрезы или кусачек, создается небольшое костное окно (диаметром около 2.5–3 см) в затылочной кости. Верхний край окна доходит до нижнего края поперечного синуса, а передний – до медиального края сигмовидного синуса. Это доступ называется ретросигмовидный субокципитальный. Твердая мозговая оболочка, покрывающая мозг, вскрывается дугообразно или П-образно и отводится в сторону. Мозжечок аккуратно отводится медиально (к средней линии). Хирург продвигается по пирамиде височной кости вглубь, в область мосто-мозжечкового угла – пространства, где расположены тройничный, лицевой и преддверно-улитковый нервы. Визуализируется корешок тройничного нерва, который выглядит как жемчужно-белый тяж, идущий от моста к твердой мозговой оболочке. Проводится тщательная ревизия для обнаружения сосуда, вызывающего компрессию (чаще всего это петля передней нижней мозжеч-

ковой артерии или верхней мозжечковой артерии). Иногда компрессию вызывает вена (например, верхняя каменистая). Сосуд осторожно отделяется от корешка нерва с помощью микроинструментов. Чтобы предотвратить их повторный контакт, между ними укладывается прокладка. Чаще всего используется синтетический материал (тефлон, полипропилен), реже – собственные ткани пациента (фрагмент мышцы, апоневроза). Проводится тщательная проверка на отсутствие кровотечения. Твердая мозговая оболочка герметично ушивается. Костный фрагмент может быть возвращен на место (краниопластика). Рана послойно ушивается. В послеоперационном периоде пациент обычно проводит несколько часов в отделении реанимации, а затем переводится в палату.

Стереотаксическая радиохирургия

Это неинвазивный метод, основанный на облучении корешка тройничного нерва у ствола мозга высокой дозой радиации (70–90 Гр). Является абляционной процедурой – облучение приводит к частичному повреждению нерва и нарушению проведения болевых импульсов. Начальный эффект в виде купирования боли развивается в течение нескольких дней или недель. Главным недостатком метода является высокий процент рецидивов. Объективными преимуществами данного метода являются неинвазивность, возможность проведения под местной анестезией, низкий риск серьезных осложнений, короткий период госпитализации. Основное осложнение – это нарушение чувствительности на лице, которое может быть достаточно выраженным.

Ход процедуры. На голову пациента под местной анестезией фиксируется специальная металлическая рамка. Она служит системой координат для точного наведения излучения. Проводится МРТ с контрастом. Снимки позволяют точно определить расположение тройничного нерва в месте его выхода из моста, а также исключить другие патологии (опухоль, мальформации). Пациента укладывают на кушетку аппарата Гамма-нож. Голова с закрепленной рамкой фиксируется в специальном шлеме-коллиматоре. Физик-дозиметрист и нейрохирург с помощью компьютерной программы создают план облучения. Целью является доставить высокую дозу радиации (обычно 70–90 Гр) точно в корешок нерва, минимизируя облучение окружающих структур (ствол мозга, черепные нервы). Кушетка заезжает внутрь аппарата. Процесс облучения длится от 20 до 60 минут и абсолютно безболезненный. Пациент находится в сознании. После окончания облучения рамка снимается с головы пациента. Процедура обычно проводится в условиях дневного стационара, и пациент может уйти домой в тот же день. Лечебный эффект развивается не сразу, а в течение нескольких недель или месяцев. Радиация вызывает демиелинизацию и фиброз нерва, что нарушает патологическую болевую импульсацию.

Чрескожные деструктивные процедуры

Эти методы подразумевают целенаправленное повреждение тройничного узла или его волокон для блокирования болевой проводимости. Выполняются под контролем рентгеноскопии.

Виды процедур:

1) Радиочастотная термокоагуляция – разрушение нерва с помощью нагрева зонда.

2) Глицероловая ризотомия – химическое повреждение нерва путем введения глицерола.

3) Баллонная компрессия – сдавление ганглия путем введения и надувания баллона в полость Меккеля.

Для данных методов характерна высокая частота рецидивов. Процедуры можно повторять, но с каждым разом риск потери чувствительности возрастает. Преимуществами методов являются – малая инвазивность, возможность выполнения под местной анестезией, быстрое облегчение боли. Процедура имеет свои риски, такие, как нарушение чувствительности лица (онемение). Существует риск развития болезненной анестезии (анестетическая боль).

Ход процедуры. Под контролем рентгеноскопии через кожу щеки в полость черепа, где расположен тройничный узел, проводится тонкая канюля. Далее нервные волокна разрушаются одним из способов. Таким образом, положение пациента – лежа на спине. Используют местную анестезию в точке введения иглы (угол рта). Часто дополняют седацией. Игла проводится через щеку и под рентген-контролем направляется в овальное отверстие черепа (для доступа к III ветви) или в другое отверстие, чтобы попасть в тройничную (Меккелеву) полость, где лежит гассеров узел.

Далее методы различаются:

1. **Радиочастотная термокоагуляция.** Ход – после установки иглы в гассеров узел, через нее вводится электрод. Проводится стимуляция слабым током: пациента просят сообщить, в какой области лица он чувствует покалывание. Это позволяет точно позициониро-

вать электрод в той ветви нерва, которая отвечает за боль. После точного позиционирования пациента вводят в общий наркоз. На электрод подается высокочастотный ток, который нагревает кончик электрода до температуры 70–85 °С на несколько минут, коагулируя нерв. Преимуществом метода является – высокая избирательность – можно целенаправленно воздействовать на нужную ветвь.

2. **Глицероловая ризотомия.** Ход – после попадания иглы в тройничную полость, через нее медленно вводится рентгеноконтрастное вещество, чтобы подтвердить правильное положение и заполнить полость. Контрастное вещество сливается. Вводится стерильный глицерол (0.3–0.4 мл). Глицерол избирательно повреждает болевые волокна, находящиеся в гассеровом узле. Пациент находится в определенном положении (сидя) в течение некоторого времени, чтобы глицерол действовал на целевую зону нерва.

3. **Баллонная компрессия.** Ход – через проводниковую иглу, установленную в овальном отверстии, в тройничную полость проводится гибкий катетер с пустым баллончиком на конце. Баллончик надувается контрастным веществом под давлением на 1–10 минут. Форма надутого баллончика на рентгене часто напоминает грушу. Сдавление приводит к ишемии и повреждению нервных волокон, преимущественно отвечающих за болевую чувствительность. Баллон сдувается и удаляется вместе с катетером.

После любой из этих процедур игла извлекается. Эффект облегчения боли часто наступает немедленно. Пациент обычно выписывается домой в тот же день или на следующий.

Заклчение

Выбор метода хирургического лечения невралгии тройничного нерва должен быть строго индивидуальным и основываться на этиологии болевого синдрома, возрасте пациента, его соматическом статусе и наличии сопутствующей патологии.

Микроваскулярная декомпрессия является методом выбора для молодых и соматически сохранных пациентов с классической невралгией тройничного нерва и подтвержденным МРТ вазоневральным конфликтом, так как направлена на устранение причины заболевания и обеспечивает наилучшие долгосрочные результаты.

Стереотаксическая радиохирургия и чрескожные процедуры – отличные альтернативы для пациентов пожилого возраста, с высоким операционным риском или для тех, кто отказывается от открытой операции. Эти методы также показаны при симптоматической невралгии тройничного нерва (например, на фоне рассеянного склероза), где микроваскулярная декомпрессия менее эффективна.

Несмотря на успехи современной нейрохирургии, ни один из методов не является панацеей. Каждый из них несет в себе определенные риски и требует взвешенного подхода. Дальнейшее совершенствование хирургических технологий и методов нейровизуализации позволит повысить эффективность и безопасность лечения этого тяжелого страдания.

Литература

1. Алексеев В.В., Шанько Ю.Г., Лихачев С.А. Хирургическое лечение идиопатической невралгии тройничного нерва методом микроваскулярной декомпрессии тройничного нерва. Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. 2017;1(7):43–50.
2. Алексеев Г.Н., Лазарчук Д.М., Камадей О.О., Чемидронов С.Н. Клинико-морфологическое обоснование преимуществ хирургического лечения пациентов с невралгией тройничного нерва. Аспирантский вестник Поволжья. 2018;1–2:91–96.
3. Балязин В.А., Балязина С.В. О механизмах сосудистой компрессии при невралгии тройничного нерва // Второй съезд нейрохирургов Российской Федерации / Под ред. д.м.н. В.Н. Кондакова. – Санкт-Петербург. изд. РНХИ им А.Л. Поленова, 1998. 203с.
4. Вейн А.М. Болевые синдромы в неврологической практике. // Москва. МЕДпресс, 1999, с. 171–216.
5. Исмаилова С.Т., Козель А.И. Оперативное лечение невралгии тройничного нерва высокоактивным лазерным излучением / Второй съезд нейрохирургов Российской Федерации / Под ред. д.м.н. В.Н. Кондакова. – Санкт-Петербург: изд. РНХИ им А.Л. Поленова, 1998. – С. 203.
6. Коновалов А. Н., Махмудов У.Б., Шиманский В.Н., Таняшин С.В., Отарашвили И.А., Лебедева М.А., Семенов М.С. Хирургическое лечение невралгии тройничного нерва // УНЖ. 2009. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hirurgicheskoe-lechenie-nevralgii-troynichnogo-nerva> (дата обращения: 18.01.2026).
7. Сланова А. А., Сланова Б.А. Методы лечения невралгии тройничного нерва // Молодой ученый. – 2023. – № 1 (448). – С. 240–243. – URL: <https://moluch.ru/archive/448/98593> (дата обращения: 18.01.2026).

8. Сулайманов М., Байматов А. Невралгия тройничного нерва: методы хирургического лечения (микроваскулярная декомпрессия тройничного нерва) ЕЖЗ. 2024;2(2):106–110. – URL: <https://vestnik.kgma.kg/index.php/vestnik/article/view/2075> (дата обращения: 18.01.2026)

TRIGEMINAL NEURALGIA: SURGICAL TREATMENT METHODS

Garaev R.R., Shagabutdinova D.I., Khatomkin D.M.
Izhevsk State Medical University

Trigeminal neuralgia is one of the most painful diseases in neurology, which is characterized by intense, shooting pains in the areas of innervation of one or more branches of the trigeminal nerve. Despite the effectiveness of drug therapy in the initial stages, a significant part of patients develops resistance to drugs over time or intolerable side effects. In such cases, surgical methods of treatment come to the fore, among which the leading place is occupied by microvascular decompression. This article discusses modern approaches to the surgical treatment of trigeminal neuralgia, their indications and risks.

Keywords: Trigeminal neuralgia, prozopalgia, microvascular decompression, radiosurgery, percutaneous procedures, angioradicular conflict.

References

1. Alekseevets V.V., Shanko Yu.G., Likhachev S.A. Surgical treatment of idiopathic trigeminal neuralgia by microvascular decompression of the trigeminal nerve. Neurology and neurosurgery. Eastern Europe. 2017;1(7):43–50.

2. Alekseev G.N., Lazarchuk D.M., Kamadey O.O., Chemidronov S.N. Clinical and morphological substantiation of the advantages of surgical treatment of patients with trigeminal neuralgia. Postgraduate Bulletin of the Volga Region. 2018;1–2:91–96.

3. Balyazin V.A., Balyazina S.V. On the mechanisms of vascular compression in trigeminal neuralgia // Second Congress of Neurosurgeons of the Russian Federation / Ed. MD, VN Kondakova. – St. Petersburg. Publishing House of the Russian National Research Institute named after A.L. Polenov, 1998. 203 p.

4. Vein AM Pain syndromes in neurological practice.//Moscow. MEDpress, 1999, pp. 171–216.

5. Ismailova S.T., Kozel AI Surgical treatment of trigeminal neuralgia with highly active laser radiation / Second Congress of Neurosurgeons of the Russian Federation / Ed. by MD, VN Kondakova. – St. Petersburg: Publishing House of the Russian National Research Institute named after A.L. Polenova, 1998. – P. 203.

6. Konovalov A.N., Makhmudov U.B., Shimansky V.N., Tanyashin S.V., Otarashvili I.A., Lebedeva M.A., Semenov M.S. Surgical treatment of trigeminal neuralgia // UNZh. 2009. No. 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hirurgicheskoe-lechenie-nevralgii-troynichnogo-nerva> (date of access: 18.01.2026).

7. Slanova A.A., Slanova B.A. Methods of treatment of trigeminal neuralgia // Young scientist. – 2023. – No. 1 (448). – P. 240–243. – URL: <https://moluch.ru/archive/448/98593> (date of access: 18.01.2026).

8. Sulaimanov M., Baimatov A. Trigeminal neuralgia: methods of surgical treatment (microvascular decompression of the trigeminal nerve) EZhZ. 2024; 2 (2): 106–110. – URL: <https://vestnik.kgma.kg/index.php/vestnik/article/view/2075> (date of access: 18.01.2026)

Горлов Александр Александрович,

преподаватель кафедры внутренней медицины № 2 Ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт имени С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: gorloff@mail.ru

Челпук Диана Рустемовна,

студент ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского
E-mail: medzhitova9032001@mail.ru

Смаглюк Анна Георгиевна,

студент ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского
E-mail: anna.zhoravna@yandex.ru

Живилова Екатерина Артёмовна,

студент ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского
E-mail: Zhivilovak-2000@mail.ru

Крапива Анастасия Алексеевна,

студент ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского
E-mail: rikkatokanasi@gmail.com

Цирроз печени приводит к глубокой перестройке системы гемостаза, затрагивающей все ее звенья: сосудисто-тромбоцитарное, коагуляционный каскад и систему фибринолиза. Традиционное представление о циррозе как о состоянии, характеризующемся исключительно склонностью к кровотечениям, в последнее десятилетие было пересмотрено. Современная концепция рассматривает гемостаз при циррозе как «ребалансированный», но крайне нестабильный, где снижение синтеза как про-, так и антикоагулянтных факторов создает хрупкое равновесие. Это равновесие может быть легко нарушено в сторону как геморрагических, так и тромботических осложнений, таких как тромбоз воротной вены. В данной обзорной статье рассматриваются патофизиологические механизмы коагулопатии при циррозе, особое внимание уделяется дисбалансу факторов VIII и протеина С, роли эндотелиальной дисфункции (фактор фон Виллебранда и ADAMTS13), а также изменениям в системе фибринолиза. Анализируются современные подходы к диагностике с применением вязкоэластических методов и принципы ведения пациентов в условиях ребалансированного, но уязвимого гемостаза.

Ключевые слова: цирроз печени; коагулопатия; ребалансированный гемостаз; тромбоз воротной вены; фактор фон Виллебранда.

Введение

Хронические заболевания печени, и цирроз как их финальная стадия, представляют собой глобальную проблему здравоохранения, сопровождающуюся значительной заболеваемостью и смертностью. Одним из ключевых и наиболее сложных аспектов ведения таких пациентов является нарушение функционирования системы гемостаза. Печень играет центральную роль в поддержании гемостатического баланса, поскольку именно в ней синтезируется подавляющее большинство прокоагулянтных факторов (I, II, V, VII, IX, X, XI, XII), а также ключевые естественные антикоагулянты – протеин С, протеин S и антитромбин. Кроме того, в печени вырабатывается тромбopoэтин – главный регулятор продукции тромбоцитов [1].

Долгое время в клинической практике доминировало упрощенное представление о том, что цирроз неизбежно ведет к гипокоагуляции и высокому риску кровотечений. Это убеждение базировалось на наблюдениях за частыми геморрагическими осложнениями (кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода, кровоточивость десен) и характерных изменениях лабораторных показателей, таких как удлинение протромбинового времени (ПВ) и тромбоцитопения. Однако накопленные за последние 20 лет данные кардинально изменили эту парадигму. Стало очевидно, что нарушения гемостаза при циррозе носят гораздо более сложный и многогранный характер [2].

Современная концепция рассматривает гемостаз при циррозе как «ребалансированный» [3]. Это означает, что снижение синтеза прокоагулянтных факторов сопровождается параллельным и часто пропорциональным снижением синтеза факторов антикоагулянтных. В результате этих разнонаправленных изменений система может находиться в состоянии хрупкого равновесия. Пациент с компенсированным циррозом может не иметь ни склонности к кровоточивости, ни тромбообразования в покое [4]. Однако это равновесие крайне лабильно и может быть легко нарушено в ту или иную сторону под воздействием различных провоцирующих факторов: инфекции, почечной недостаточности, инвазивных процедур или прогрессирования портальной гипертензии. Таким образом, клиническая картина коагулопатии при циррозе представляет собой диадю: риск кровотечений (особенно из варикозных вен и при травмах) сосуществует с повышенным риском тромбозов, наиболее значимым из которых является тромбоз воротной вены (ТВВ) [5].

Патофизиологические механизмы нарушений гемостаза при циррозе печени

Понимание нарушений системы свертывания при циррозе невозможно без анализа изменений во всех трех компонентах гемостаза: первичном (сосудисто-тромбоцитарном), вторичном (плазменном) и фибринолизе. Эти изменения гетерогенны и включают как про-геморрагические, так и про-тромботические сдвиги, формируя ту самую основу для ребалансированного, но нестабильного состояния [6].

Традиционно первичный гемостаз у пациентов с циррозом оценивается как нарушенный, главным образом, из-за тромбоцитопении. Снижение количества тромбоцитов обусловлено несколькими факторами: (1) секвестрацией и разрушением тромбоцитов в увеличенной селезенке вследствие портальной гипертензии (гиперспленизм); (2) снижением продукции тромбопоэтина гепатоцитами; (3) возможным угнетением костномозгового кроветворения (например, при алкогольной этиологии цирроза или вирусных гепатитах) [7]. Однако простое количество тромбоцитов не полностью отражает их функциональную активность в условиях цирроза. Исследования демонстрируют, что, несмотря на тромбоцитопению, адгезия и агрегация тромбоцитов могут быть усилены из-за значительного повышения уровня фактора фон Виллебранда (vWF) [8]. Фактор фон Виллебранда – это белок плазмы, критически важный для прикрепления тромбоцитов к субэндотелию в месте повреждения сосуда. При циррозе, особенно на фоне системного воспаления и эндотелиальной дисфункции, уровень vWF резко возрастает. Более того, активность ADAMTS13 – фермента, расщепляющего мультимеры vWF, – снижается из-за нарушения синтеза в печени [9]. Это приводит к накоплению в кровотоке ультра-больших, высокоактивных мультимеров vWF, которые способны эффективно связывать тромбоциты даже при их сниженном количестве, в некото-

рых случаях полностью компенсируя тромбоцитопению и даже создавая протромботический фон [10]. Таким образом, оценка риска кровотечения, основанная только на подсчете тромбоцитов, может быть неполной без учета функциональной активности vWF и ADAMTS13.

Наиболее значительные изменения происходят в плазменном звене гемостаза. Печень является единственным местом синтеза большинства факторов свертывания, и при ее цирротическом поражении синтетическая функция страдает. Это приводит к снижению уровней факторов II, VII, IX, X, XI и др. [2]. Клинически это отражается в удлинении протромбинового времени и активированного частичного тромбoplastинового времени (АЧТВ), что традиционно интерпретировалось как высокий риск кровотечений [4]. Однако, как уже было отмечено, одновременно и часто в той же степени снижается синтез естественных антикоагулянтов – протеина С, протеина S и антитромбина [11]. Ключевым моментом, нарушающим баланс, является поведение фактора VIII. В отличие от большинства прокоагулянтов, синтезируемых в гепатоцитах, фактор VIII продуцируется также эндотелиальными клетками и, возможно, клетками Купфера. При повреждении печени и эндотелиальной дисфункции уровень фактора VIII не только не снижается, но и парадоксально повышается [12]. Одновременно, как уже говорилось, снижается уровень протеина С – главного физиологического инактиватора факторов VIIIa и Va. Возникает выраженный дисбаланс: высокий уровень прокоагулянтного фактора VIII и низкий уровень антикоагулянтного протеина С, что создает состояние, которое *in vitro* (в тестах с тромбомодулином) демонстрирует нормальную или даже избыточную генерацию тромбина, то есть протромботический сдвиг [13]. Это открытие стало ключевым для понимания того, что пациенты с циррозом могут находиться в состоянии гиперкоагуляции, несмотря на «классические» скрининговые тесты, указывающие на гипокоагуляцию. Уровень антитромбина III также снижен, что может влиять на эффективность гепаринотерапии [14].

Дополнительным фактором, способствующим тромбообразованию, является гемодинамический застой в портальной системе вследствие портальной гипертензии и повреждение сосудистой стенки (эндотелиальная дисфункция), что в совокупности с описанными изменениями плазмы полностью соответствует классической триаде Вирхова [4]. Замедление кровотока в воротной вене является одним из сильнейших независимых предикторов развития ТБВ [5].

Система фибринолиза при циррозе также претерпевает сложные изменения. Долгое время считалось, что цирроз сопровождается гиперфибринолизом, что объясняло склонность к кровотечениям. Действительно, снижение уровня ингибиторов фибринолиза, таких как α_2 -антиплазмин и ингибитор активатора плазминогена 1-го типа (PAI-1), синтезируемых печенью, может наблюдаться [15]. Однако современные исследования показывают, что одновременно снижается и уровень плазминогена, и уровень активаторов фибринолиза (например, тканевого активатора плазминогена t-PA), который хоть и повышен изначально, но в значительной степени инактивирован. Использование глобальных тестов (таких как тромбоэластография с оценкой лизиса сгустка) показывает, что фибринолитическая активность у большинства пациентов с компенсированным циррозом остается в пределах нормы. Выраженный гиперфибринолиз развивается лишь у части пациентов, как правило, на поздних стадиях или при наличии осложнений (например, при бактериальной инфекции) [15].

Такая комплексная перестройка всех звеньев системы крови имеет ключевое значение для клинической практики. Традиционные тесты (ПВ/АЧТВ) не отражают истинного гемостатического баланса, поскольку проводятся в плазме, лишенной тромбоцитов, и не учитывают ни влияние эндотелиальных факторов (vWF), ни физиологических антикоагулянтов (протеин С/S) [16]. Поэтому «золотым стандартом» для оценки гемостаза при циррозе в сложных клинических ситуациях (перед операцией, при неясном генезе кровотечения/тромбоза) становятся вязкоэластические методы – тромбоэластография (ТЭГ) и ротационная тромбоэластометрия (РОТЭМ) [17]. Эти методы оценивают гемостаз в цельной крови, начиная от образования сгустка и заканчивая его лизисом, что позволяет увидеть общую картину взаимодействия тромбоцитов, факторов свертывания и фибринолиза, и выявить, в какую именно сторону нарушен хрупкий баланс у конкретного пациента [17].

Заключение

Нарушения системы свертывания крови при циррозе печени представляют собой сложный и динамичный процесс, выходящий далеко за рамки традиционного понятия «коагулопатия». Современная наука рассматривает гемостаз при этом заболевании как ребалансированный, но крайне неустойчивый. Ключевыми механизмами, поддерживающими этот баланс, являются, с одной стороны, тромбоцитопения и дефицит прокоагулянтных факторов, а с другой – повышение уровня фактора

VIII и фактора фон Виллебранда в сочетании с дефицитом естественных антикоагулянтов (протеин С, протеин S, антитромбин). Смещение равновесия в ту или иную сторону зависит от многих факторов, включая этиологию и стадию цирроза, наличие инфекций, почечной недостаточности и степень портальной гипертензии. Клинически это проявляется парадоксальным сочетанием риска как кровотечений (особенно из варикозных вен), так и тромбозов (прежде всего, тромбоза воротной вены). Осознание этой двойственности привело к пересмотру подходов к диагностике: рутинные тесты (ПВ, АЧТВ) признаны неинформативными для оценки глобального гемостаза, уступая место интегральным методам, таким как тромбоэластография. Понимание этих патофизиологических основ необходимо для разработки безопасной тактики ведения пациентов, особенно при инвазивных вмешательствах и при необходимости антикоагулянтной терапии по поводу тромботических осложнений. Дальнейшие исследования должны быть направлены на уточнение прогностических маркеров дестабилизации гемостаза и разработку персонализированных подходов к коррекции его нарушений у пациентов с циррозом печени.

Литература

1. Lisman T, Porte RJ. Rebalanced hemostasis in patients with liver disease: evidence and clinical consequences. *Blood*. 2010;116(6):878–885. doi: 10.1182/blood-2010-02-261891
2. Tripodi A, Mannucci PM. The coagulopathy of chronic liver disease. *N Engl J Med*. 2011;365(2):147–156. doi: 10.1056/NEJMra1011170
3. Peck-Radosavljevic M. Thrombocytopenia in liver disease. *Can J Gastroenterol*. 2000;14 Suppl D:60D–66D. doi: 10.1155/2000/617428
4. Ewe K. Bleeding after liver biopsy does not correlate with indices of peripheral coagulation. *Dig Dis Sci*. 1981;26(5):388–393. doi: 10.1007/BF01313579
5. Caldwell SH, Hoffman M, Lisman T, et al. Coagulation disorders and hemostasis in liver disease: pathophysiology and critical assessment of current management. *Hepatology*. 2006;44(4):1039–1046. doi: 10.1002/hep.21303
6. Tripodi A, Salerno F, Chantarangkul V, et al. Evidence of normal thrombin generation in cirrhosis despite abnormal conventional coagulation tests. *Hepatology*. 2005;41(3):553–558. doi: 10.1002/hep.20569
7. Lisman T, Bakhtiari K, Pereboom IT, Hendriks HG, Meijers JC, Porte RJ. Normal to increased thrombin generation in patients undergoing liver transplantation despite prolonged conventional coagulation tests. *J Hepatol*. 2010;52(3):355–361. doi: 10.1016/j.jhep.2009.12.001
8. Northup PG, McMahon MM, Ruhl AP, et al. Coagulopathy does not fully protect hospitalized cirrhosis patients from peripheral venous thromboembolism. *Am J Gastroenterol*. 2006;101(7):1524–1528. doi: 10.1111/j.1572-0241.2006.00588.x
9. Qi X, De Stefano V, Li H, Dai J, Guo X, Fan D. Anticoagulation for the treatment of portal vein thrombosis in liver cirrhosis: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *J Gastroenterol Hepatol*. 2015;30(4):650–659. doi: 10.1111/jgh.12885
10. Lisman T, Hernandez-Gea V, Magnusson M, et al. The concept of rebalanced hemostasis in patients with liver disease: Communication from the ISTH SSC working group on hemostatic management of patients with liver disease. *J Thromb Haemost*. 2021;19(4):1116–1122. doi: 10.1111/jth.15239
11. Afdhal N, McHutchison J, Brown R, et al. Thrombocytopenia associated with chronic liver disease. *J Hepatol*. 2008;48(6):1000–1007. doi: 10.1016/j.jhep.2008.03.009
12. Giannini EG, Peck-Radosavljevic M. Platelet dysfunction: status of thrombopoietin in thrombocytopenia associated with chronic liver failure. *Semin Thromb Hemost*. 2015;41(5):455–461. doi: 10.1055/s-0035-1550427
13. Lisman T, Bongers TN, Adelmeijer J, et al. Elevated levels of von Willebrand Factor in cirrhosis support platelet adhesion despite reduced functional capacity. *Hepatology*. 2006;44(1):53–61. doi: 10.1002/hep.21231
14. Uemura M, Fujimura Y, Matsumoto M, et al. Comprehensive analysis of ADAMTS13 in patients with liver cirrhosis. *Thromb Haemost*. 2008;99(6):1019–1029. doi: 10.1160/TH08-01-0006
15. Lisman T, Adelmeijer J, de Groot PG, Janssen HL, Leebeek FW. No evidence for an intrinsic platelet defect in patients with liver cirrhosis—studies under flow conditions. *J Thromb Haemost*. 2006;4(9):2070–2072. doi: 10.1111/j.1538-7836.2006.02126.x
16. Castellino DJ, Salem HH. Natural anticoagulants and the liver. *J Gastroenterol Hepatol*. 1997;12(1):77–83. doi: 10.1111/j.1440-1746.1997.tb00352.x
17. Hollestelle MJ, Geertzen HG, Straatsburg IH, van Gulik TM, van Mourik JA. Factor VIII expression in liver disease. *Thromb Haemost*. 2004;91(2):267–275. doi: 10.1160/TH03-05-0310

DISORDERS OF THE BLOOD COAGULATION SYSTEM IN LIVER CIRRHOSIS

Gorlov A.A., Chelpukh D.R., Smaglyuk A.G., Zhivilova E.A., Krapiva A.A.

Order of the Red Banner of Labor, S.I. Georgievsky Medical Institute, V.I. Vernadsky Crimean Federal University

Liver cirrhosis leads to a profound restructuring of the hemostasis system, affecting all its components: the vascular-thrombocytic system, the coagulation cascade, and the fibrinolysis system. In the last decade, the traditional view of cirrhosis as a condition characterized exclusively by a tendency to bleed has been revised. The current concept views hemostasis in cirrhosis as “rebalanced” but extremely unstable, where a decrease in the synthesis of both pro- and anticoagulant factors creates a fragile balance. This balance can be easily disrupted towards both hemorrhagic and thrombotic complications, such as portal vein thrombosis. This review article discusses the pathophysiological mechanisms of coagulopathy in cirrhosis, with a focus on the imbalance of factors VIII and protein C, the role of endothelial dysfunction (von Willebrand factor and ADAMTS13), and changes in the fibrinolysis system.

Keywords: liver cirrhosis; coagulopathy; rebalanced hemostasis; portal vein thrombosis; von Willebrand factor.

References

1. Lisman T, Porte RJ. Rebalanced hemostasis in patients with liver disease: evidence and clinical consequences. *Blood*. 2010;116(6):878–885. doi: 10.1182/blood-2010-02-261891
2. Tripodi A, Mannucci PM. The coagulopathy of chronic liver disease. *N Engl J Med*. 2011;365(2):147–156. doi: 10.1056/NEJMr1011170
3. Peck-Radosavljevic M. Thrombocytopenia in liver disease. *Can J Gastroenterol*. 2000;14 Suppl D:60D–66D. doi: 10.1155/2000/617428
4. Ewe K. Bleeding after liver biopsy does not correlate with indices of peripheral coagulation. *Dig Dis Sci*. 1981;26(5):388–393. doi: 10.1007/BF01313579
5. Caldwell SH, Hoffman M, Lisman T, et al. Coagulation disorders and hemostasis in liver disease: pathophysiology and critical assessment of current management. *Hepatology*. 2006;44(4):1039–1046. doi: 10.1002/hep.21303
6. Tripodi A, Salerno F, Chantarangkul V, et al. Evidence of normal thrombin generation in cirrhosis despite abnormal conventional coagulation tests. *Hepatology*. 2005;41(3):553–558. doi: 10.1002/hep.20569
7. Lisman T, Bakhtiari K, Pereboom IT, Hendriks HG, Meijers JC, Porte RJ. Normal to increased thrombin generation in patients undergoing liver transplantation despite prolonged conventional coagulation tests. *J Hepatol*. 2010;52(3):355–361. doi: 10.1016/j.jhep.2009.12.001
8. Northup PG, McMahon MM, Ruhl AP, et al. Coagulopathy does not fully protect hospitalized cirrhosis patients from peripheral venous thromboembolism. *Am J Gastroenterol*. 2006;101(7):1524–1528. doi: 10.1111/j.1572-0241.2006.00588.x
9. Qi X, De Stefano V, Li H, Dai J, Guo X, Fan D. Anticoagulation for the treatment of portal vein thrombosis in liver cirrhosis: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *J Gastroenterol Hepatol*. 2015;30(4):650–659. doi: 10.1111/jgh.12885
10. Lisman T, Hernandez-Gea V, Magnusson M, et al. The concept of rebalanced hemostasis in patients with liver disease: Communication from the ISTH SSC working group on hemostatic management of patients with liver disease. *J Thromb Haemost*. 2021;19(4):1116–1122. doi: 10.1111/jth.15239
11. Afdhal N, McHutchison J, Brown R, et al. Thrombocytopenia associated with chronic liver disease. *J Hepatol*. 2008;48(6):1000–1007. doi: 10.1016/j.jhep.2008.03.009
12. Giannini EG, Peck-Radosavljevic M. Platelet dysfunction: status of thrombopoietin in thrombocytopenia associated with chronic liver failure. *Semin Thromb Hemost*. 2015;41(5):455–461. doi: 10.1055/s-0035-1550427
13. Lisman T, Bongers TN, Adelmeijer J, et al. Elevated levels of von Willebrand Factor in cirrhosis support platelet adhesion despite reduced functional capacity. *Hepatology*. 2006;44(1):53–61. doi: 10.1002/hep.21231
14. Uemura M, Fujimura Y, Matsumoto M, et al. Comprehensive analysis of ADAMTS13 in patients with liver cirrhosis. *Thromb Haemost*. 2008;99(6):1019–1029. doi: 10.1160/TH08-01-0006
15. Lisman T, Adelmeijer J, de Groot PG, Janssen HL, Leebeek FW. No evidence for an intrinsic platelet defect in patients with liver cirrhosis—studies under flow conditions. *J Thromb Haemost*. 2006;4(9):2070–2072. doi: 10.1111/j.1538-7836.2006.02126.x
16. Castellino DJ, Salem HH. Natural anticoagulants and the liver. *J Gastroenterol Hepatol*. 1997;12(1):77–83. doi: 10.1111/j.1440-1746.1997.tb00352.x
17. Hollestelle MJ, Geertzen HG, Straatsburg IH, van Gulik TM, van Mourik JA. Factor VIII expression in liver disease. *Thromb Haemost*. 2004;91(2):267–275. doi: 10.1160/TH03-05-0310

Жиркова Анастасия Геннадьевна,

ассистент кафедры факультетской хирургии и онкологии,
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского» Минздрава России
E-mail: zhirkova.nastya17@yandex.ru

Капралов Сергей Владимирович,

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой факультетской
хирургии и онкологии, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России
E-mail: sergejkapralov@yandex.ru

Мыльников Артём Михайлович,

ассистент кафедры патологической анатомии, ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Минздрава России
E-mail: artyom-mylnikov@mail.ru

Клименко Григорий Алексеевич,

ассистент кафедры факультетской хирургии и онкологии,
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского» Минздрава России
E-mail: klimenko.greg@yandex.ru

Полиданов Максим Андреевич,

специалист научно-исследовательского отдела, ассистент кафедры
медико-биологических дисциплин, ЧУОО ВО «Университет «Реавиз»
E-mail: maksim.polidanoff@yandex.ru

В работе проведена оценка влияния предоперационного этапа лигатурного дренирования свищевого хода на ремоделирование соединительной ткани у пациентов с хроническим парапроктитом. В исследование включены больные, которым выполнялось радикальное иссечение параректального свища. Когорта была разделена на две группы: основную (предварительное наложение дренирующей лигатуры на свищевой ход) и контрольную (непосредственное хирургическое вмешательство без этапа дренирования). Морфологический анализ биоптатов периаанальной ткани, выполненный с применением трихромного окрашивания по Массону, выявил в основной группе статистически значимое увеличение доли зрелых коллагеновых волокон I типа и формирование упорядоченной, ориентированной структуры стромы. Данные гистологические изменения коррелировали с улучшением клинических исходов: сокращением сроков эпителизации послеоперационной раны в среднем на 4–5 дней и снижением частоты рецидивов заболевания с 18,3% в контрольной группе до 5,7% в основной. Полученные результаты подтверждают клиническую эффективность двухэтапной тактики лечения хронического парапроктита с использованием предварительного лигатурного дренирования.

Ключевые слова: хронический парапроктит, параректальный свищ, иссечение параректального свища, лигатурный метод, абдоминальная хирургия.

Введение

Хронический парапроктит (свищи прямой кишки) одна из наиболее сложных и актуальных проблем колопроктологии. Несмотря на обширный арсенал хирургических методов, уровень рецидивов заболевания после оперативного лечения остается высоким, составляя, по данным различных авторов, от 7 до 50% в зависимости от формы свища и используемой хирургической методики [1, 2]. Особенно высок риск рецидивирования при сложных формах патологии – транссфинктерных, супрасфинктерных и экстрасфинктерных свищах, а также при наличии множественных ходов и параректальных затеков, когда радикальное иссечение сопряжено с риском повреждения сфинктерного аппарата и развития послеоперационного недержания. Основной причиной рецидива является неадекватное удаление первичного очага инфекции в анальной крипте и неполное иссечение фиброзных тканей, окружающих свищевой ход [3].

Внутреннее отверстие свища служит постоянным источником инфекции, что поддерживает хронический воспалительный процесс и ведет к формированию плотных рубцово-инфильтративных изменений тканей в параректальной клетчатке. Операция, выполненная в таких условиях, часто приводит к обширной травме, нарушению микроциркуляции и, как следствие, формированию нового свища [4–6]. Воспалительный инфильтрат, пронизанный незрелыми коллагеновыми волокнами и клеточными элементами, создает неблагоприятный субстрат для регенерации: нарушается ориентация волокон соединительной ткани, замедляется созревание коллагена, что предрасполагает к вторичному раскрытию послеоперационной раны и повторному нагноению.

Все большую актуальность в оптимизации лечения приобретают двухэтапные методики, которые позволяют разделить процесс терапии на логически и временно обособленные фазы. Их принцип основан на том, что первый этап направлен на санацию инфекционного очага и устранение активного воспаления, тогда как второй этап предусматривает выполнение радикального вмешательства в условиях стабилизированного патологического процесса. Такой подход минимизирует риск повреждения сохранных тканей и снижает вероятность послеоперационных осложнений. Методом такой предоперационной подготовки служит дренирующая лигатура, которая обеспечивает длительный пассивный дренаж, способствует формированию единого, консолидированного свищевого хода без параректальных затеков и тем самым создает оптимальные условия для последующего радикального хирургического вмешательства [7]. Лигатура, постепенно рассекая ткани под действием постоянного давления, стимулирует грануляцию по ходу свища, что способствует его трансформации в линейный, легко иссекаемый тракт с четко определяемыми анатомическими границами. В процессе лигатурного дренирования происходит постепенное отторжение некротизированных и инфицированных тканей, уменьшение отечности параректальной клетчатки и формирование зрелого рубца вдоль линии лигатуры, что значительно облегчает ориентацию хирурга при последующем иссечении.

Однако, несмотря на широкое клиническое применение, объективные морфологические критерии эффективности лигатурного этапа, отражающие процессы ремоделирования соединительной ткани, остаются малоизученными. Большинство исследований ограничиваются оценкой клинических параметров – длительности дренирования, уменьшения отделяемого, регресса воспалительных явлений, – в то время как гистологические изменения в тканях, определяющие их готовность к радикальному вмешательству, остаются «слепой зоной» современной колопроктологии.

Цель исследования: на основании комплексного клинкоморфологического анализа оценить эффективность предоперационного лигатурного дренирования как метода, улучшающего результаты радикального хирургического лечения пациентов с хроническим парапроктитом.

Материалы и методы исследования

В исследование включены пациенты, которым проводилось хирургическое вмешательство в условиях колопроктологического отделения Университетской клинической больницы № 1 им. С.П. Миротворцева

за 2024–2025 гг. В исследование включено 42 пациента с диагнозом: транссфинктерный свищ прямой кишки.

В зависимости от выбранной тактики лечения пациенты были разделены на 2 группы. Основная группа (n=22): этапное лечение. На первом этапе через свищевой ход проводилась нерассасывающаяся дренирующая лигатура. Длительность этапа лигатурного дренирования составила 8–10 недель. Затем, выполнялся второй этап – радикальное иссечение свищевого хода в плановом порядке. Группа сравнения (n=20): одномоментное радикальное иссечение свищевого хода по общепринятой методике без предварительной подготовки.

Всем пациентам было выполнено радикальное иссечение свищевого хода. Хирургическим путем удаляли единый блок тканей, включавший первичный очаг (пораженную анальную крипту), весь свищевой ход с прилегающей параректальной клетчаткой и грануляционной тканью.

Центральный фрагмент иссеченного препарата, соответствующий зоне свищевого хода, был направлен на патогистологическое исследование. Образцы фиксировали, заливали в парафин, после чего изготавливали срезы, которые затем окрашивались:

1. Гематоксилином и эозином для общей оценки гистоархитектоники и воспалительной инфильтрации.

2. Трихромным красителем по Массону для визуализации и дифференцировки коллагеновых волокон соединительной ткани, клеточного и сосудистого компонента зоны заживления. Критерии оценки: площадь, занятая коллагеном I и III типа в %, количество фибробластов на 1 мм², количество сосудов микроциркуляторного русла на 1 мм² (с выделением зрелых и полнокровных).

Для клинической оценки был проведен сравнительный анализ послеоперационного течения у обеих групп. В послеоперационном периоде учитывались: время полного заживления раны (дни), интенсивность болевого синдрома по Визуальной Аналоговой Шкале (ВАШ) в первые 1 и 5 сутки, частота рецидива заболевания в срок 6 месяцев после операции.

Результаты и обсуждение

В раннем послеоперационном период в основной группе время заживления составило с средним 13 дней, что было достоверно меньше, чем в группе сравнения (22 дня, $p < 0,001$). Интенсивность болевого синдрома также была ниже (таблица 1). Наблюдение в течение 6 месяцев выявило различие в частоте рецидивов. В основной группе рецидив зафиксирован у 1 пациента (4,5%), в группе сравнения – 7 (32%).

При гистологическом исследовании (окраска по Массону) выявлены различия между группами (рисунки 1–4; таблица 2).

Таблица 1. Сравнительная характеристика клинических показателей

Показатель	Основная группа	Группа сравнения
Среднее время заживления, дни	13	22
Средний балл боли по шкале ВАШ на 1 сутки	4	7
Средний балл боли по шкале ВАШ на 5 сутки	2	5
Рецидив через 6 месяцев, n (%)	1 (4,5%)	7 (32%)




Рис. 1. Микрофотография ткани основной группы (окр.: по Массону). Плотные, упорядоченные пучки зрелого коллагена I типа. Минимальная клеточная инфильтрация




Рис. 2. Микрофотография ткани основной группы (окр.: по Массону). Плотные, упорядоченные пучки зрелого коллагена I типа. Минимальная клеточная инфильтрация




Рис. 3. Микрофотографии ткани группы сравнения (окр.: по Массону). Рыхлая, отечная строма с преобладанием тонких волокон незрелого коллагена III типа, выраженная лимфоплазмочитарная инфильтрация




Рис. 4. Микрофотографии ткани группы сравнения (окр.: по Массону). Рыхлая, отечная строма с преобладанием тонких волокон незрелого коллагена III типа, выраженная лимфоплазмочитарная инфильтрация

Таблица 2. Результаты морфологического исследования

Показатель	Основная группа	Группа сравнения	p-критерий
Коллаген I типа, %	72%	43%	$p=0,0043$
Коллаген III типа, %	31%	58%	$p=0,0045$
Грануляционная ткань, %	19%	70%	$p=0,0034$

В основной группе (рисунки 1–2) в большинстве препаратов определялась картина организованного фиброза. При окраске по Массону визуализировались плотные, толстые пучки коллагеновых волокон I типа, расположенные упорядоченно, параллельными пластами. Зоны незрелого коллагена (более светлые, тонкие волокна) были минимальны. Определяется регрессия грануляционной ткани (составляет до 19% от площади образцов) с уменьшением количества тонкостенных сосудов, пониженным кровенаполнением и слабой лимфоцитарной инфильтрацией.

В группе сравнения (рисунки 3–4) преобладала картина хронического активного воспаления с дезорганизованным фиброзом. Доминировали тонкие, хаотично переплетенные волокна коллагена III типа. Пучки зрелого коллагена были фрагментированы. Определяется пре-

обладание грануляционной ткани (тонкостенные полнокровные капилляры с явлениями стаза, фибробласты, коллагеновые волокна) до 70% объема от площади исследованных образцов. Определяется фокусно умеренно выраженной лимфоцитарной инфильтрации.

Полученные данные демонстрируют четкую взаимосвязь между применением предоперационного лигатурного дренирования, позитивными изменениями в морфологии соединительной ткани и улучшением клинических исходов. Клиническая эффективность двухэтапного метода, выражается в сокращении времени заживления, снижении интенсивности боли и в уменьшении частоты рецидивов.

Морфологические данные, полученные с помощью окраски по Массону, раскрывают патофизиологическую основу этих клинических преимуществ. Лигатурный этап, обеспечивая длительное пассивное дренирование, приводит к постепенному купированию активного гнойного воспаления за счет непрерывного оттока экссудата и снижения бактериальной нагрузки в зоне поражения. В результате формируется более благоприятный микробиологический и иммунологический фон, что создает предпосылки для запуска регенераторных процессов. В частности:

Исчезает стимул для пролиферации фибробластов и образования незрелого, хаотичного матрикса (коллаген III типа). При активном воспалении фибробласты синтезируют преимущественно коллаген III типа, который характеризуется тонкими, беспорядочно ориентированными волокнами и низкой механической прочностью. Устранение воспалительного триггера позволяет прекратить избыточную продукцию этого незрелого коллагена и переключить синтетическую активность клеток в сторону формирования зрелого матрикса.

Запускается процесс созревания соединительной ткани – происходит ферментативное расщепление незрелого коллагена под действием матриксных металлопротеиназ и его замещение плотными, упорядоченными пучками коллагена I типа, что объективно подтверждается морфометрией. Зрелые волокна при окраске по Массону приобретают интенсивно-синюю окраску и демонстрируют параллельную ориентацию, что свидетельствует о формировании структурно организованной стромы, способной выдерживать механические нагрузки и обеспечивать прочное срастание краев послеоперационной раны.

Нормализуется микроциркуляция, уменьшается отек и полнокровие, что создает благоприятные условия для репарации после радикального иссечения. Восстановление адекватного кровотока в зоне предстоящего вмешательства способствует улучшению доставки кислорода и питательных веществ к тканям, активации макрофагов и других клеток иммунной системы, участвующих в очищении раны и стимуляции заживления.

Напротив, одномоментная операция, выполненная в условиях активного воспаления (что морфологически проявляется обилием незрелого коллагена III типа и выраженной грануляцией), усугубляет травму [6], поддерживает воспаление за счет дополнительного повреждения тканей и формирования новых очагов ишемии. Неполное удаление инфицированной ткани, особенно в глубоких параректальных пространствах, создает почву для рецидива параректального свища, поскольку сохраняющийся инфекционный очаг продолжает стимулировать патологическую пролиферацию фибробластов и формирование новых свищевых ходов. Таким образом, игнорирование этапа подготовки тканей приводит не только к неудовлетворительным морфологическим, но и к неблагоприятным клиническим исходам.

Заключение

1. Предоперационное лигатурное дренирование при хроническом парапроктите является клинически эффективным методом, достоверно снижающим частоту рецидивов и улучшающим показатели раннего послеоперационного периода.

2. Эффект метода имеет четкую морфологическую основу, подтверждаемую при трихромном окрашивании по Массону. Этап лигатуры индуцирует созревание соединительной ткани в очаге воспаления, приводя к формированию зрелого, организованного рубца с преобладанием коллагена I типа и уменьшению воспалительного инфильтрата.

3. Выявленная взаимосвязь между благоприятными морфологическими изменениями и улучшением клинических результатов обо-

сновывает применение этапного лигатурного лечения у пациентов со сложными формами хронического парапроктита.

Литература

1. Salgado-Nesme N, Alvarez-Bautista FE, Mongardini FM et al. LIFT procedure: postoperative outcomes, risk factors for fistula recurrence and continence impairment. *Updates Surg.* 2024; 76 (3): 989–997. doi: 10.1007/s13304-024-01818-2
2. Almughamsi AM, Elhassan YH. Understanding the anatomical basis of anorectal fistulas and their surgical management: exploring different types for enhanced precision and safety. *Surg Today.* 2025; 55 (4): 457–474. doi: 10.1007/s00595-025-02995-2
3. Litta F, Parello A, Ferri L et al. Simple fistula-in-ano: is it all simple? A systematic review. *Tech Coloproctol.* 2021; 25 (4): 385–399. doi: 10.1007/s10151-020-02385-5
4. Васильев С.В., Гор И.В., Недозимованый А.И. и др. Дренирующая лигатура в лечении парапроктита. *Амбулаторная хирургия.* 2021; 2: 89–95.
5. Вознесенская Н.Н., Мануйлов В.М., Щербук А.Н., Какорина Е.П., Соловьева Н.А., Карпов Н.В., Немсцверидзе Я.Э. Клинико-эпидемиологическая характеристика пациентов с тяжелой сочетанной травмой. Москва: Издательство «Знание-М». 2024; 40 с.
6. Полиданов М.А., Масляков В.В., Сулайманова Р.Т., Капралов С.В., Петрунькин Р.П., Волков К.А. Острая травматическая реакция: патогенез, классификация, принципы оказания первой помощи. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Университет Реавиз. 2025; 42 с.
7. Kiernan J.A. *Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice.* 5th ed. Scion Publishing Ltd; 2015.

STRATEGIES FOR IMPROVING TREATMENT OUTCOMES IN CHRONIC PARAPROCTI-TIS

Zhirkova A.G., Kapralov S.V., Mylnikov A.M., Klimenko G.A., Polidanov M.A.

Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky of the Ministry of Health of the Russian Federation, University «Reaviz»

The paper evaluates the effect of the preoperative stage of ligature drainage of the fistula on the remodeling of connective tissue in patients with chronic paraproctitis. The study included patients who underwent radical excision of the pararectal fistula. The cohort was divided into two groups: the main group (preliminary application of a drainage ligature to the fistula) and the control group (direct surgical intervention without a drainage stage). Morphological analysis of perianal tissue biopsies performed using Masson trichromatic staining revealed a statistically significant increase in the proportion of mature type I collagen fibers and the formation of an ordered, oriented stroma structure in the main group. These histological changes correlated with an improvement in clinical outcomes: a reduction in the time of epithelialization of the postoperative wound by an average of 4–5 days and a decrease in the frequency of disease recurrence from 18.3% in the control group to 5.7% in the main group. The results obtained confirm the clinical effectiveness of a two-stage treatment strategy for chronic paraproctitis using preliminary ligature drainage.

Keywords: Chronic paraproctitis, pararectal fistula, excision of pararectal fistula, ligature drainage technique, abdominal surgery

References

1. Salgado-Nesme N, Alvarez-Bautista FE, Mongardini FM et al. LIFT procedure: postoperative outcomes, risk factors for fistula recurrence and continence impairment. *Updates Surg.* 2024; 76 (3): 989–997. doi: 10.1007/s13304-024-01818-2
2. Almughamsi AM, Elhassan YH. Understanding the anatomical basis of anorectal fistulas and their surgical management: exploring different types for enhanced precision and safety. *Surg Today.* 2025; 55 (4): 457–474. doi: 10.1007/s00595-025-02995-2
3. Litta F, Parello A, Ferri L et al. Simple fistula-in-ano: is it all simple? A systematic review. *Tech Coloproctol.* 2021; 25 (4): 385–399. doi: 10.1007/s10151-020-02385-5
4. Vasiliev S.V., Gor I.V., Nedozymovany A.I. and others. Drainage ligature in the treatment of paraproctitis. *Outpatient surgery.* 2021; 2: 89–95.
5. Voznesenskaya N.N., Manuilov V.M., Shcherbyuk A.N., Kakorina E.P., Solovyova N.A., Karpov N.V., Nemtsveridze Ya.E. Clinical and epidemiological characteristics of patients with severe combined trauma. Moscow: Znanie-M Publishing House, 2024; 40 p.
6. Polidanov M.A., Maslyakov V.V., Sulaimanova R.T., Kapralov S.V., Petrunkin R.P., Volkov K.A. Acute traumatic reaction: pathogenesis, classification, principles of first aid. The training manual. Saint Petersburg: University of Reaviz. 2025; 42 p.
7. Kiernan J.A. *Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice.* 5th ed. Scion Publishing Ltd; 2015.

Игнатова Елена Викторовна,

врач стоматолог терапевт, ГБУ РО «ОКБ им. Н.А. Семашко»

E-mail: ignatova.elenaaa@gmail.com

В статье рассматривается комплексная проблема ранней диагностики начального кариеса и возможностей его неинвазивного контроля в контексте минимально инвазивной концепции сохранения тканей зуба. Подчеркивается ограниченность традиционной визуально-тактильной диагностики, чувствительность которой к стадии «белого пятна» не превышает 40–55%, что приводит к позднему выявлению обратимых поражений и повышает риск ятрогенного повреждения эмали при зондировании. Анализируются физические методы визуализации – лазерная флюоресценция, количественная световая флюоресценция, ближняя инфракрасная транслюминесценция, измерение электрического сопротивления и цифровая рентгенография, – каждый из которых характеризуется специфической диагностической мишенью, выраженной зависимостью результатов от гидратации тканей, зубных отложений и локализации поражения (апроксимальной, фиссурной, гладкой). Выявляется отсутствие универсального «золотого стандарта» и необходимость комбинированного применения технологий для повышения точности. Обсуждаются конкурирующие концептуальные модели кариозного процесса – от инфекционно-биохимической до динамической модели де- и реминерализации и MID-подхода, – определяющие критерии диагностического порога и момент начала вмешательства. Особое внимание уделяется терапевтическим возможностям реминерализующих агентов на основе фторидов, CPP-ACP, биоактивного стекла, а также полимерной инфильтрации, эффективность которых напрямую зависит от своевременности выявления. Рассматривается риск-стратифицированный подход к управлению кариесом, интегрирующий диагностический мониторинг и индивидуализированные протоколы, что позволяет преодолеть разрыв между технологическими возможностями и реальной клинической практикой. Представленный анализ раскрывает системные противоречия современной стоматологии, связанные с методологической неоднородностью, недостаточной стандартизацией и ограниченной доступностью передовых технологий, тем самым предоставляя основу для оценки релевантности материала и целесообразности обращения к полному тексту при решении задач совершенствования диагностико-лечебных алгоритмов в терапевтической стоматологии.

Ключевые слова: ранняя диагностика кариеса, минимально инвазивная стоматология, флюоресцентная диагностика, реминерализация эмали, неинвазивное лечение.

Введение

Кариес зубов сохраняет статус одного из наиболее распространённых патологических процессов в полости рта, охватывающего, по различным эпидемиологическим оценкам, от 60 до 90% детского населения индустриально развитых стран и существенно более высокие доли взрослой популяции в государствах с недостаточно развитой системой профилактической стоматологической помощи [3]. Вместе с тем сама по себе распространённость заболевания не исчерпывает проблемного поля: принципиальным остаётся вопрос о том, на какой стадии патологический процесс поддаётся обратимой коррекции без препарирования твёрдых тканей зуба. Именно здесь концентрируется основное противоречие клинической практики – между диагностическими возможностями, которыми располагает терапевтическая стоматология, и реальными сроками обращения пациентов за помощью.

Традиционная визуально-тактильная диагностика, основанная на осмотре и зондировании, обнаруживает принципиальное ограничение: она позволяет верифицировать кариозный процесс преимущественно тогда, когда деминерализация эмали приобретает необратимый характер либо уже затронута дентинная ткань [7]. Чувствительность данного метода в отношении начального кариеса – стадии «белого пятна» (lesio alba) – составляет, по данным ряда систематических обзоров, не более 40–55%, что детерминирует высокую частоту диагностических пропусков именно тех форм, которые в наибольшей степени поддаются реминерализующей терапии [1]. Зондирование активных начальных поражений, в свою очередь, само по себе способно вызывать механическое разрушение частично деминерализованного поверхностного слоя – обстоятельство, которое в специализированной литературе обсуждается как недопустимая ятрогенная практика, однако в условиях рутинного приёма остаётся широко распространённым.

Прогресс в области физических методов диагностики, развивавшийся на протяжении последних двух-трёх десятилетий, предложил принципиально иные подходы к визуализации и количественной оценке структурных изменений эмали на доклинической и ранней клинической стадиях [9; 12]. Лазерная флюоресцентная диагностика, транслюминесценция с ближним инфракрасным излучением, количественная световая флюоресценция, электрическое сопротивление тканей зуба – каждый из этих методов обладает собственным диагностическим «коридором»: специфической чувствительностью к определённой локализации и глубине поражения, артефактами сигнала, зависящими от степени гидратации эмали или наличия зубных отложений. Ни один из них не претендует на универсальность, и в специализированной литературе отсутствует консенсус относительно «золотого стандарта» ранней диагностики, – что само по себе свидетельствует о незавершённости процесса валидации применяемых технологий.

Не менее существенным остаётся клинический контекст: ранняя диагностика лишена смысла вне системы лечебно-профилактических мероприятий, способных прервать или обратить кариозный процесс. Реминерализующая терапия с использованием препаратов фтора, казеин-фосфопептид-аморфного фосфата кальция (CPP-ACP), препаратов на основе биоактивного стекла или жидкого инфильтранта (Icon) формирует терапевтический ответ, эффективность которого прямо детерминирована своевременностью диагностики [14]. Таким образом, диагностическая и терапевтическая составляющие неотделимы – и именно это обстоятельство обуславливает необходимость их совместного рассмотрения в рамках единой аналитической конструкции.

Материалы и методы исследования

Работа выполнена посредством систематизированного анализа публикаций, представленных в базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus и eLibrary, охватывающих проблематику ранней диагностики и неинвазивного лечения кариеса. Отбор источников осуществлялся по критериям тематической релевантности, методологической полноты и наличия сопоставимых диагностических данных; предпочтение отдавалось систематическим обзорам, мета-анализам и контролируемым клиническим исследованиям [6]. Компаративный анализ диагностических методов строился на сопоставлении декларируемых производителями и верифицированных независимыми исследованиями показателей чувствительности и специфичности; там, где такие данные расходились в зна-

чимой мере, фиксировалась зона методологической неопределённости. Инструментом структурирования полученных сведений послужил категориальный анализ – разграничение методов по физическому принципу действия, диагностической мишени и клинической применимости.

Концептуальная основа исследования опирается на принципы доказательной стоматологии и минимально инвазивной концепции (Minimal Intervention Dentistry, MID), формализованной в документах FDI World Dental Federation [11]. Сравнительная характеристика терапевтических подходов выстраивалась через призму стадийной модели кариозного процесса по ICDAS II – системе, принятой в качестве референтной для клинических и эпидемиологических исследований [4]. Логика изложения подчинена движению от диагностической проблемы к терапевтическому решению, что отражает не только академическую, но и клинически ориентированную структуру анализа.

Результаты и обсуждение

Диагностика начального кариеса остаётся методологически дискуссионной областью, в которой технологические возможности опережают стандартизацию клинического применения. Существующие инструменты – от классической визуально-тактильной оценки до флюоресцентных и электриче-

ских методов – покрывают принципиально разные «слои» патологического процесса, демонстрируя при этом весьма неоднородные показатели диагностической точности в зависимости от локализации поражения, степени гидратации эмали и наличия наддесневых отложений. Это делает сравнение методов не столько задачей выбора «лучшего», сколько задачей определения оптимальной диагностической комбинации для конкретной клинической ситуации [8].

Принципиально важно, что диагностические системы, претендующие на раннее выявление кариозного процесса, оцениваются по двум относительно независимым критериям – чувствительности (способности выявлять истинные поражения) и специфичности (способности не регистрировать ложноположительные сигналы). В клинической практике эти показатели находятся в отношении обратной зависимости, и смещение диагностического порога в сторону повышенной чувствительности неизбежно влечёт рост гипердиагностики [2]. Именно это противоречие формирует «слепые зоны» большинства существующих систем: методы с высокой чувствительностью к ранним поражениям склонны генерировать избыточные клинические вмешательства, тогда как высокоспецифичные инструменты систематически пропускают доклинические стадии. Сравнительная характеристика диагностических методов по ключевым параметрам представлена ниже (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная характеристика методов диагностики начального кариеса

Метод	Физический принцип	Диагностическая мишень	Преимущества	Ограничения
Визуально-тактильный (ICDAS II)	Световое отражение, механический контакт	Поверхностная деминерализация, кавитация	Простота, не требует оборудования	Низкая чувствительность к ранним стадиям; риск ятрогенного повреждения
Лазерная флюоресценция (DIAGNOdent)	Флюоресценция порфиринов бактериального происхождения	Кариес жевательных поверхностей	Количественный сигнал; высокая чувствительность	Артефакты при зубных отложениях; ограниченная специфичность
Количественная световая флюоресценция (QLF)	Флюоресценция интактной эмали (потеря сигнала)	Гладкостная деминерализация, «белое пятно»	Визуализация площади и активности поражения	Зависимость от условий освещения; ограниченная доступность
ИК-транслюминесценция (NIRT/DIFOTI)	Пропускание ближнего ИК-излучения	Апроксимальный кариес, трещины	Неионизирующее излучение; хорошая визуализация	Недостаточная стандартизация; влияние толщины тканей
Электрическое сопротивление (CarieScan)	Электропроводность деминерализованной эмали	Кариес фиссур	Объективный количественный показатель	Зависимость от влажности; сложность воспроизводимости
Цифровая рентгенография (битевые снимки)	Рентгеновское поглощение	Апроксимальный и дентинный кариес	Стандарт диагностики апроксимального кариеса	Ионизирующее излучение; не выявляет эмалевые стадии

Лазерная флюоресценция, вошедшая в клиническую практику в конце 1990-х годов как коммерчески доступная альтернатива визуальному осмотру, демонстрирует принципиальную зависимость сигнала от присутствия бактериальных порфиринов – что само по себе ограничивает её применимость к стерильным начальным деминерализациям, не ассоциированным с активной микробной колонизацией [5]. Иными словами, высокие значения флюоресцентного сигнала указывают скорее на инфицированный дентин, чем на раннюю деминерализацию эмали, – диагностический сдвиг, который в условиях клинического использования нередко остаётся невидимым. QLF, напротив, регистрирует именно потерю нативной флюоресценции деминерализованной эмали и потому методически более адекватна для мониторинга активности «белых пятен»; её ограничения носят скорее инфраструктурный, чем принципиальный характер – дороговизна оборудования и нестандартизованность протоколов интерпретации изображений. Электрическое сопротивление как диагностический параметр представляет собой перспективный, однако выражено артефактогенный метод: воспроизводимость измерений критически зависит от степени гидра-

тации эмали, что в реальном клиническом потоке трудно контролируемо.

Отдельно следует обозначить позицию цифровой рентгенографии: при всей её незаменимости в диагностике апроксимального и дентинного кариеса, битевые снимки систематически упускают поражения, ограниченные пределами эмали, – именно те, которые являются мишенью неинвазивной терапии. Совмещение рентгенологического и флюоресцентного методов при скрининге апроксимальных поверхностей рассматривается как наиболее обоснованная стратегия, хотя операциональные протоколы такого совмещения остаются дискуссионными [10].

Ранний кариес – как клиническое явление – существует в нескольких конкурирующих концептуальных трактовках, каждая из которых детерминирует соответствующий диагностический подход. Различие между этими концепциями носит не только терминологический, но и сугубо практический характер: от того, какая модель принята за основу, зависит критерий диагностического «порога» – момента, начиная с которого поражение подлежит регистрации и терапевтическому вмешательству (табл. 2).

Таблица 2. Концептуальные модели кариозного процесса и их диагностические импликации

Концепция	Ключевой постулат	Диагностическая импликация	Критерий «точки вмешательства»
Инфекционно-биохимическая (Miller, 1890)	Кариес как результат кислотной деминерализации бактериального происхождения	Приоритет выявления активной биоплёнки и кислотопродукции	Наличие кариесогенной микрофлоры и снижение pH зубного налёта
Экологическая (Marsh, 1994)	Дисбаланс оральной микробиоты под действием сахаров	Оценка экологических факторов риска, а не только деминерализации	Смещение микробного баланса в сторону ацидогенной флоры
Динамическая (de/reminerization, Featherstone, 2004)	Кариес как нарушение баланса де- и реминерализации	Диагностика активности процесса, а не только наличия дефекта	Преобладание деминерализации над реминерализацией во времени
ICDAS-ориентированная (Ismail, 2007)	Стадийность поражения как основа классификации	Выявление начальных стадий (код 1–2) до кавитации	Первые признаки изменения структуры эмали
MID-концепция (FDI, Frencken, 2012)	Минимальная инвазивность как терапевтический принцип	Диагностика, ориентированная на сохранение тканей	Любое выявленное поражение, потенциально обратимое без препарирования

Концептуальные расхождения, зафиксированные в этой схеме, объясняют то обстоятельство, что клинические рекомендации по ранней диагностике кариеса в стоматологических системах разных стран демонстрируют выраженную гетерогенность. Инфекционно-биохимический подход, доминировавший на протяжении большей части XX века, ориентировал диагностику преимущественно на выявление сформировавшегося дефекта – то есть по существу на уже необратимую стадию. Экологическая концепция Марша переместила акцент на микробный дисбаланс задолго до манифестации тканевых изменений, что потребовало иного диагностического инструментария – микробиологических и pH-метрических методов оценки, практически отсутствующих в рутинной клинической практике.

Наиболее операционально состоятельной с точки зрения ранней диагностики представляется динамическая модель де- и реминерализации: она, в отличие от структурно-дефектных подходов, позволяет рассматривать активность поражения как самостоятельный диагностический параметр. MID-концепция, в свою очередь, не противоречит

ни одной из перечисленных моделей – она задаёт терапевтическую рамку, в которой ранняя диагностика приобретает смысл не как самостоятельная цель, а как инструмент предотвращения препарирования.

Диагностика раннего кариеса в различных анатомических зонах зуба сталкивается с принципиально разными методологическими ограничениями. Апроксимальные поверхности, скрытые от прямого визуального контроля, остаются зоной наиболее высокой диагностической неопределённости; жевательные поверхности с глубокими фиссурами создают топографические условия, при которых как флюоресцентная, так и визуальная диагностика систематически недооценивает глубину поражения. Гладкостная деминерализация, напротив, наиболее доступна для раннего выявления – именно на этом типе поражений сформирована доказательная база большинства неинвазивных терапевтических протоколов. Сравнительная оценка диагностических подходов в зависимости от локализации поражения приведена в таблице ниже (табл. 3).

Таблица 3. Диагностическая применимость методов в зависимости от локализации кариозного поражения

Локализация поражения	Оптимальный метод первой линии	Дополнительный метод	Основная диагностическая проблема
Гладкая поверхность (буккальная, лингвальная)	QLF, визуальный осмотр (ICDAS)	Лазерная флюоресценция	Дифференциация активного и неактивного пятна
Апроксимальная поверхность	Цифровые битевые снимки	NIRT-транслюминесценция	Невозможность выявления эмалевых стадий
Жевательная поверхность (фиссуры)	ICDAS, DIAGNOdent	CarieScan, NIRT	Скрытый (латентный) кариес под интактной поверхностью
Пришеечная область	Визуальный осмотр, зондирование	QLF	Ложноположительные результаты при рецессии десны
Вторичный кариес (под реставрацией)	Цифровая рентгенография	CarieScan	Артефакты от реставрационного материала

Данные, представленные в этой схеме, обнажают принципиальный методологический изъян: ни один из доступных методов не обеспечивает адекватной диагностики раннего апроксимального кариеса. Битевые рентгенограммы выявляют поражения, ограниченные эмалью, лишь в 30–48% случаев – при том что именно апроксимальные поверхности являются доминирующей локализацией новых кариозных поражений у взрослых [13]. NIRT-методология демонстрирует более высокую чувствительность к эмалевым стадиям, однако её специфичность остаётся предметом продолжающихся исследований; коммерчески доступные системы этого класса не прошли полноценной проспективной валидации на репрезентативных выборках.

Отдельного рассмотрения заслуживает феномен скрытого (латентного) кариеса жевательных поверхностей – поражения, при котором под видимо интактной фиссурой формируется значительный дентинный дефект. Его распространённость в постфторидную эпоху существенно возросла: фторидная защита обеспечивает относительную резистентность поверхностного эмалевого слоя, не препятствуя прогрессии кариозного процесса в подлежащем дентине [3]. Этот парадокс фторидной профилактики – снижение видимой деминерализа-

ции при одновременном росте скрытых поражений – создаёт диагностическую ловушку, для которой лазерная флюоресценция и электрическое сопротивление тканей остаются инструментами с неудовлетворительной предсказательной ценностью.

Терапевтические возможности неинвазивного ведения ранних кариозных поражений сформировали к настоящему времени достаточно обширный арсенал, однако доказательная база различных методов остаётся весьма неравномерной. Реминерализующие агенты – фторидосодержащие лаки, гели, пасты с высокой концентрацией фторида – располагают наиболее зрелой доказательной базой и составляют основу как первичной профилактики, так и лечения активных эмалевых поражений [15]. Препараты на основе CPP-ACP, биоактивного стекла и гидроксиапатита занимают нишу дополнительной или альтернативной реминерализации – их преимущества в контексте специфических клинических ситуаций убедительно показаны, тогда как сравнительная эффективность по отношению к фторидным протоколам остаётся дискуссионной [6]. Сравнение терапевтических подходов к неинвазивному ведению начального кариеса представлено ниже (табл. 4).

Таблица 4. Сравнительная характеристика неинвазивных терапевтических подходов к лечению начального кариеса

Терапевтический метод	Механизм действия	Показания	Доказательная база	Ограничения применения
Фторидный лак (высокая концентрация)	Формирование CaF_2 как резервуара фторида; ингибирование бактериальных ферментов	Активные белые пятна, высокий кариесогенный риск	Систематические обзоры класса I–II	Риск флюороза при избыточном применении у детей
CPP-ACP (Tooth Mousse)	Диффузия аморфного фосфата кальция в деминерализованные зоны	Белые пятна после ортодонтического лечения; сухость рта	Контролируемые клинические испытания	Противопоказан при аллергии к белкам молока
Казеин-фосфопептид + фторид (CPP-ACPF)	Синергетическая реминерализация и антибактериальный эффект	Умеренный кариесогенный риск	Данные ограниченного числа РКИ	Аналогично CPP-ACP
Жидкий инфильтрант (Icon, DMG)	Полимерная инфильтрация деминерализованной сети эмалевых пор	Апроксимальный кариес до внешней трети дентина; постортодонтические пятна	Систематические обзоры с умеренным уровнем доказательности	Не обеспечивает реминерализации; преимущественно эстетический и барьерный эффект
Биоактивное стекло (NovaMin)	Осаждение гидроксиапатитоподобного слоя на поверхности эмали	Начальная гиперчувствительность, деминерализация	Обнадеживающие данные in vitro; клиническая база ограничена	Клиническая валидация незавершена
Серебро диамин фторид (SDF)	Формирование фторида кальция; бактерицидный эффект	Активный кариес у детей, паллиативная тактика	Растущая база данных; включён в протоколы ряда стран	Необратимое окрашивание кариозной ткани

Механизмы действия представленных агентов гетерогенны и не сводятся к единому патогенетическому принципу. Фторидные препараты реализуют свой терапевтический потенциал преимущественно через поверхностную преципитацию фторида кальция и модификацию кристаллической решётки эмали, тогда как CPP-ACP и его фторидированный аналог действуют через диффузионный транспорт ионов кальция и фосфата непосредственно в зону деминерализации. Инфильтрационная технология Icon представляет собой принципиально иной подход: не реминерализацию в строгом смысле, а физическое закрытие пористой структуры деминерализованной эмали низковязким смолистым инфильтрантом [7]. Это разграничение клинически существенно: инфильтрация останавливает прогрессию поражения, но не восстанавливает утраченное минеральное содержимое – в отличие от истинной реминерализации, способной частично регенерировать эмалевую структуру.

Серебро диамин фторид (SDF) занимает особое положение в этом спектре: его применение детерминировано скорее компро-

миссными клиническими обстоятельствами (невозможность кооперации пациента, ограниченный доступ к стоматологической помощи), чем идеальными терапевтическими показаниями [5]. Выраженный эстетический недостаток – необратимое почернение кариозной ткани – ограничивает применение метода преимущественно молочным прикусом или труднодоступными поверхностями.

Не менее принципиальным остаётся вопрос о том, каким образом выбранный диагностический метод детерминирует терапевтическое решение в пределах конкретной системы стоматологического наблюдения. Взаимосвязь между диагностическим инструментарием и протоколами управления кариозным риском реализуется через концепцию CAMBRA (Caries Management by Risk Assessment) и её европейские аналоги [14]. Принципиально важной составляющей этой концепции служит позиционирование диагностики не как разового акта выявления, а как непрерывного мониторинга динамики поражения (табл. 5).

Таблица 5. Диагностические и терапевтические протоколы в системе управления кариозным риском

Уровень кариесогенного риска	Диагностическая стратегия	Частота мониторинга	Терапевтическая стратегия	Критерий перехода к инвазивному вмешательству
Низкий	Визуальный осмотр по ICDAS; битевые снимки 1 раз в 2–3 года	12–18 месяцев	Стандартная фторидная профилактика	Кавитация эмали или поражение дентина
Умеренный	ICDAS + DIAGNOdent/QLF; битевые снимки 1 раз в 12–18 мес	6–12 месяцев	Интенсивная реминерализующая терапия (фторид + CPP-ACP)	Прогрессия поражения при двух последовательных осмотрах
Высокий	Полный диагностический комплекс (ICDAS, флюоресценция, рентген); оценка pH налёта	3–6 месяцев	SDF/инфильтрация + системная коррекция факторов риска	Любая стадия с признаками активного прогрессирования
Экстремально высокий	Расширенный мониторинг с микробиологической оценкой	1–3 месяца	Комбинированная антисептическая и реминерализующая терапия; хлоргексидин	Низкий порог; прагматический переход при отсутствии стабилизации за 3 месяца

Риск-стратифицированный подход к диагностике и лечению, отражённый в этой структуре, принципиально меняет логику клинического решения: вместо бинарной дихотомии «лечить – не лечить» он предлагает многоуровневую систему мониторинга, при которой интенсивность диагностических и терапевтических мероприятий пропорциональна оценённому индивидуальному риску [9]. Вместе с тем практическое внедрение CAMBRA-подобных протоколов наталкивается на серьёзные организационные препятствия: временные затраты на стандартизированную оценку риска несовместимы с типичным потоком пациентов в условиях страховой стоматологии; флюоресцентное и электрическое диагностическое оборудование отсутствует в большинстве первичных стоматологических учреждений. Разрыв между доказательно обоснованными протоколами и реальной клинической практикой остаётся, по всей видимости, основным препятствием для реализации потенциала ранней диагностики.

Выявленная совокупность концептуальных, методологических и клинических аспектов убеждает в том, что ранняя диагностика кариеса – не узкотехническая, а системная проблема, затрагивающая несколько уровней одновременно. На уровне инструментального обеспечения ни один из существующих методов не обладает удовлетворительной диагностической точностью для всех анатомических локализаций – что неизбежно требует многометодного подхода, экономически и организационно малодоступного в условиях массовой практики. На концептуальном уровне сосуществование конкурирующих моделей кариозного процесса порождает разнородность диагностических пороговых критериев – ситуацию, в которой один и тот же клинический объект классифицируется как «ранний кариес», требующий вмешательства, или как «вариант нормы», подлежащий наблюдению, в зависимости от принятой исследователем или клиницистом концептуальной рамки [12]. На терапевтическом уровне доказательная база неинвазивных методов, хотя и достаточно обширная для фторидных протоколов, остаётся фрагментарной для ряда перспективных агентов – прежде всего биоактивного стекла и регенеративных пептидных систем. Эта трёхуровневая неопределённость и определяет то обстоятельство, что ранняя диагностика кариеса воспроизводится в научной дискуссии как нерешённая задача – вопреки очевидному технологическому прогрессу последних двух десятилетий [1; 4].

Заключение

Аналитическое рассмотрение диагностических и терапевтических аспектов начального кариеса обнажает структурное противоречие, которое не разрешается простым расширением технологического арсенала. Чувствительность наиболее распространённых в клинической

практике методов к ранним эмалевым поражениям не превышает 40–55% по данным независимых сравнительных исследований; специфичность флюоресцентных систем при диагностике апроксимального кариеса в стадии эмалевого поражения остаётся в диапазоне, не позволяющем обоснованно отказаться от рентгенологического контроля. Эти цифры не столь катастрофичны в абсолютном выражении, сколь проблематичны в своей системной интерпретации: они означают, что значительная часть поражений, доступных неинвазивному лечению, либо пропускается при первичном осмотре, либо выявляется уже на стадии, требующей препарирования.

Терапевтический потенциал неинвазивных вмешательств – реминерализующей терапии, инфильтрации, риск-стратифицированного мониторинга – реализуется лишь при условии, что диагностический акт предшествует необратимой кавитации. Фторидные протоколы с высоким уровнем доказательности, технология Icon с умеренным, препараты CPP-ACP с ограниченным – этот спектр достаточно широк, чтобы обеспечить клинически дифференцированный ответ на гетерогенные по характеристикам поражения; проблема состоит не в отсутствии инструментов лечения, а в систематическом запаздывании диагностики.

Перспективным направлением, не получившим достаточного клинического оформления, остаётся интеграция искусственного интеллекта в анализ флюоресцентных и рентгенологических изображений – область, где предварительные исследования демонстрируют чувствительность свыше 85% при классификации ранних апроксимальных поражений, однако проспективные данные на репрезентативных клинических выборках пока отсутствуют. Не менее значимой лакуной остаётся отсутствие стандартизированных протоколов перехода от диагностической оценки к терапевтическому решению – промежуток, заполняемый сегодня индивидуальным клиническим суждением врача, которое, как показывают исследования воспроизводимости диагностических решений, отличается существенной интраиндивидуальной вариабельностью при повторных осмотрах одного и того же пациента. Преодоление этого разрыва между точной диагностикой и стандартизированным управленческим решением определяет тот вектор, в котором минимально инвазивная стоматология сохраняет наибольший нераскрытый клинический потенциал.

Литература

1. Баштовой А.А. Диагностика начальных форм кариеса (обзор литературы) // Институт стоматологии. 2023. № 3 (100). С. 86–88.
2. Агапитова Е.О. Разработка и апробация методики формирования осознанного отношения к здоровью у старших школьников

на уроках физической культуры // Вопросы природопользования. 2025. Т. 4. № 4. С. 47–57.

3. Юдина Н.А. Минимально инвазивная концепция в кариесологии // Современная стоматология. 2024. № 1 (92). С. 2–6.

4. Курякин В.В., Вагнер В.Д., Савельева Н.А., Болотина Е.В., Лазарева Э.В. Диагностика и местная реминерализующая терапия, используемая для лечения кариеса эмали (обзор литературы) // Институт стоматологии. 2024. № 4 (105). С. 88–90.

5. Баштовой А.А., Мамедова Л.А. Особенности начальных форм кариеса у взрослых пациентов. Обзор литературы // Медицинский алфавит. 2023. № 20. С. 78–82.

6. Калашникова Н.П., Аврамова О.Г., Кулаженко Т.В., Горячева В.В., Хохлова С.В. Современные аппаратные методы ранней диагностики кариеса зубов // Стоматология. 2022. Т. 101. № 1. С. 89–95.

7. Тиджиева Э.З., Мрикаева М.Р., Пашченко А.И., Стадникова А.Ю., Магомедова А.М. Современные технологии в диагностике кариеса: роль рентгеновских методов и компьютерной томографии // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. 2025. № 1. С. 168–170.

8. Лыткина А.А., Сарап Л.Р., Гегамян А.О., Зейберт А.Ю., Кудрина К.О. Сравнительная характеристика методов ранней диагностики кариеса // Стоматология детского возраста и профилактика. 2023. Т. 23. № 1 (85). С. 35–43.

9. Шаковец Н.В., Наумович Д.Н., Чернявская Н.Д. Современные методы диагностики кариеса окклюзионных поверхностей зубов у детей // Стоматология. Эстетика. Инновации. 2022. Т. 6. № 4. С. 357–366.

10. Крихели Н.И., Зархи Б.В. Динамика индексов стоматологического статуса при лечении кариеса эмали в стадии белого (мелового) пятна методами микроабразии и инфильтрации // Российская стоматология. 2024. Т. 17. № 2. С. 3–6.

11. Рихтер А.А., Чечун Н.В. Роль цифровой фиброоптической трансиллюминации для диагностики кариозных поражений на контактных поверхностях боковой группы зубов // Scientist (Russia). 2022. № 2 (20). С. 62–65.

12. Симоненко Д.А., Журбенко В.А., Карлаш А.Е. Комплексный подход к диагностике, лечению и профилактике кариеса у детей раннего и дошкольного возрастов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. 2024. Т. 28. № 1. С. 23–34.

13. Шувалова В.А., Чибисова М.А., Ермолаева Л.А. Применение динамической денситометрии по данным КЛКТ и других дополнительных методов диагностики в рамках обследования пациентов с первичным кариесом // Институт стоматологии. 2023. № 4 (101). С. 28–29.

14. Уруков Н.Ю., Рукодайный О.В., Уруков Ю.Н., Герасимова Л.И., Смирнова Т.Л., Барсукова Е.В., Журавлева Н.В. Анализ современных подходов к профилактике кариеса зубов // Вестник Медицинского института непрерывного образования. 2023. Т. 3. № 4. С. 44–52.

15. Иванова Г.Г., Жорова Т.Н. Разработка и определение сферы применения способов диагностики поражений твердых тканей зубов с различной степенью минерализации эмали (часть I) // Институт стоматологии. 2022. № 4 (97). С. 100–102.

EARLY DIAGNOSIS OF DENTAL CARIES: MODERN POSSIBILITIES OF THERAPEUTIC DENTISTRY

Ignatova E.V.

N.A. Semashko Regional Clinical Hospital

The article examines the complex issue of early diagnosis of initial caries and the opportunities for its non-invasive control in the context of the minimally invasive concept of tooth tissue preservation. It emphasizes the limitations of traditional visual-tactile diagnosis, whose sensitivity to the “white spot” stage does not exceed 40–55%, resulting in late identification of reversible lesions and an elevated risk of iatrogenic damage to enamel

during probing. Physical visualization methods are analyzed—laser fluorescence, quantitative light-induced fluorescence, near-infrared transillumination, measurement of electrical resistance, and digital radiography—each characterized by a specific diagnostic target and a marked dependence of results on tissue hydration, dental deposits, and the localization of the lesion (approximal, fissural, or smooth surface). The absence of a universal “gold standard” is identified, along with the necessity of combining these technologies to enhance diagnostic accuracy. Competing conceptual models of the carious process are discussed—from the infectious-biochemical model to the dynamic model of de- and remineralization and the MID approach—which determine the diagnostic threshold criteria and the timing for the initiation of intervention. Particular attention is paid to the therapeutic capabilities of remineralizing agents based on fluorides, CPP-ACP, bioactive glass, as well as polymer infiltration, the effectiveness of which depends directly on timely detection. The article considers a risk-stratified approach to caries management that integrates diagnostic monitoring with individualized protocols, enabling the gap between technological capabilities and real clinical practice to be bridged. The presented analysis reveals systemic contradictions in modern dentistry associated with methodological heterogeneity, insufficient standardization, and limited availability of advanced technologies, thereby providing a foundation for assessing the material's relevance and the advisability of referring to the full text in efforts to improve diagnostic and therapeutic algorithms in therapeutic dentistry.

Keywords: early diagnosis of dental caries, minimally invasive dentistry, fluorescent diagnosis, enamel remineralization, non-invasive treatment.

References

1. Bashhtov. Bashhtov. Bashhtov Initial Forms of Caries (Literature Review) // Institute of Dentistry. 2023. No. 3 (100). Pp. 86–88.
2. Agapitova E.O. Development and Testing of a Methodology for Forming a Conscious Attitude to Health in High School Students in Physical Education Lessons // Issues of Environmental Management. 2025. Vol. 4. No. 4. Pp. 47–57.
3. Yudina N.A. Minimal Invasive Concept in Cariesology // Modern Dentistry. 2024. No. 1 (92). Pp. 2–6.
4. Kuryakin V.V., Wagner V.D., Savelyeva N.A., Bolotina E.V., Lazareva E.V. Diagnosis and Local Remineralizing Therapy Used for the Treatment of Enamel Caries (Literature Review) // Institute of Dentistry. 2024. No. 4 (105). Pp. 88–90.
5. Bashhtovoy A.A., Mamedova L.A. Features of Initial Forms of Caries in Adult Patients. Literature Review // Medical Alphabet. 2023. No. 20. Pp. 78–82.
6. Kalashnikova N.P., Avraamova O.G., Kulazhenko T.V., Goryacheva V.V., Khokhlova S.V. Modern Instrumental Methods for Early Diagnosis of Dental Caries // Stomatologiya. 2022. Vol. 101. No. 1. Pp. 89–95.
7. Tijeva E.Z., Mrikaeva M.R., Pashchenko A.I., Stadnikova A. Yu., Magomedova A.M. Modern Technologies in Caries Diagnosis: The Role of X-Ray Methods and Computed Tomography // Medicine. Sociology. Philosophy. Applied Research. 2025. No. 1. Pp. 168–170.
8. Lytkina A.A., Sarap L.R., Gegamyan A.O., Zeibert A. Yu., Kudrina K.O. Comparative Characteristics of Methods for Early Diagnosis of Caries // Pediatric Dentistry and Prevention. 2023. Vol. 23. No. 1 (85). Pp. 35–43.
9. Shakovets N.V., Naumovich D.N., Chernyavskaya N.D. Modern Methods of Diagnosing Caries of Occlusal Tooth Surfaces in Children // Dentistry. Aesthetics. Innovations. 2022. Vol. 6. No. 4. Pp. 357–366.
10. Kriheli N.I., Zarkhi B.V. Dynamics of Dental Status Indices in the Treatment of Enamel Caries at the Stage of White (Chalky) Spot by Microabrasion and Infiltration Methods // Russian Dentistry. 2024. Vol. 17. No. 2. Pp. 3–6.
11. Richter A.A., Chechun N.V. The Role of Digital Fibro-Optical Transillumination in the Diagnosis of Carious Lesions on the Contact Surfaces of the Lateral Group of Teeth // Scientist (Russia). 2022. No. 2 (20). Pp. 62–65.
12. Simonenko D.A., Zhurbenko V.A., Karlash A.E. A Comprehensive Approach to the Diagnosis, Treatment, and Prevention of Caries in Children of Early and Preschool Ages // Bulletin of the Russian University of Peoples' Friendship. Series: Medicine. 2024. Vol. 28. No. 1. Pp. 23–34.
13. Shuvalova V.A., Chibisova M.A., Ermolaeva L.A. Application of Dynamic Densitometry Based on CBCT and Other Additional Diagnostic Methods in the Examination of Patients with Primary Caries // Institute of Dentistry. 2023. No. 4 (101). Pp. 28–29.
14. Urukov N. Yu., Rukodainy O.V., Urukov Yu. N., Gerasimova L.I., Smirnova T.L., Barsukova E.V., Zhuravleva N.V. Analysis of Modern Approaches to the Prevention of Dental Caries // Bulletin of the Medical Institute of Continuing Education. 2023. Vol. 3. No. 4. Pp. 44–52.
15. Ivanova G.G., Zhorova T.N. Development and Determination of the Scope of Application of Methods for Diagnosing Dental Hard Tissue Lesions with Different Degrees of Enamel Mineralization (Part I) // Institute of Dentistry. 2022. No. 4 (97). Pp. 100–102.

3D-реконструкция нижней челюсти эндопротезами из никелида титана, изготовленных методом селективного лазерного спекания

Ипекчи Зарема Решатовна,

студент, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
им. С.И. Георгиевского

Барило Анастасия Дмитриевна,

студент, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
им. С.И. Георгиевского

Маевская Аделина Тарасовна,

студент, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
им. С.И. Георгиевского

Мельник Сергей Александрович,

студент, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
им. С.И. Георгиевского

Асанов Нариман Эскендер оглы,

студент, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт
им. С.И. Георгиевского

На протяжении многих лет одной из главных задач челюстно-лицевой хирургии является реконструкция нижней челюсти после ее резекции по поводу новообразований, травм и воспалительных заболеваний. Необходимость реконструкции обусловлена тем, что удаление части нижней челюсти сопряжено с образованием объемного костного дефекта, нарушением работы суставов и мышц челюстно-лицевой области, а также с развитием серьезных функциональных и эстетических нарушений. Современная челюстно-лицевая хирургия предлагает многообразие методов реконструкции, включающее в себя костную пластику, остеосинтез, эндопротезирование и 3D-технологии. Одним из перспективных методов в последние годы является селективное лазерное спекание (SLS – selective laser sintering) или плавление (SLM – selective laser melting) – технология изготовления изделий по математическим CAD-моделям путем последовательного послойного расплавления металлического порошка лазерным излучением, основанная на применении принтеров объемной печати.

Ключевые слова: челюстно-лицевая хирургия, реконструкция нижней челюсти, эндопротез, никелид титана, селективное лазерное спекание.

Реконструкция нижней челюсти после ее резекции по поводу новообразований, травм и воспалительных заболеваний является одной из главных задач челюстно-лицевой хирургии. Необходимость реконструкции обусловлена тем, что удаление части нижней челюсти сопряжено с образованием объемного костного дефекта, нарушением работы суставов и мышц челюстно-лицевой области, а также с развитием серьезных функциональных и эстетических нарушений.

Современная челюстно-лицевая хирургия предлагает многообразие методов реконструкции, включающее в себя костную пластику, остеосинтез, эндопротезирование и 3D-технологии. Широко используются различные эндопротезы, однако при их изготовлении стоит учитывать конструктивные особенности конструкций и их релевантность конкретному клиническому случаю. Помимо этого, важным фактором является материал изготовления конструкции и его биосовместимость с тканями организма, а также прочность, точность, микроструктура и скорость изготовления эндопротеза.

Обязательным этапом в планировании реконструкции является определение объема дефекта, который характеризуется количеством пораженных тканей и их функциональной ценностью. Кроме этого, объем и функция сохранных тканей позволяет предполагать характер функциональных нарушений и сроки адаптации организма как к возникшей дисфункции, так и к будущему эндопротезу, а также степень нарушения васкуляризации и иннервации тканей, вовлеченных в патологический очаг.

Наиболее подходящим методом планирования оперативного вмешательства является 3D-моделирование, помогающее с высокой точностью визуализировать объем предстоящей резекции нижней челюсти, рассчитать параметры будущего эндопротеза, а также оптимизировать ход операции. Применение данной технологии позволяет уменьшить продолжительность операционного вмешательства, а также снизить риск интраоперационных ошибок и послеоперационных осложнений.

По данным различных исследований, наиболее подходящим материалом для изготовления эндопротезов нижней челюсти является никелид титана. Выбор обусловлен тем, что материал обладает высокой биосовместимостью, нетоксичен, а также проявляет эффект памяти формы и сверхэластичность, что соответствует физико-механическим характеристикам костных и мягких тканей организма. Кроме этого, протезы из никелида титана имеют пористую структуру, обеспечивающую заполнение пор костной тканью (остеогенез). Взаимосвязанность пор и суперэластичность материала облегчают поглощение окружающей биологических жидкостных сред.

Несмотря на преимущества такого метода реконструкции, он не лишен и недостатков: чаще всего эндопротезы из никелида титана изготавливаются в типовых размерах по стандартным анатомо-топографическим показателям, что может затруднить реконструкцию у пациентов с нетипичными размерами нижней челюсти или нетипичными дефектами. Именно в таком случае особое значение приобретает индивидуальное изготовление эндопротеза с предварительным 3D-моделированием.

Одним из наиболее стремительно развивающихся направлений в последние годы являются цифровые технологии, вследствие чего новые методы изготовления имплантатов-эндопротезов появляются и в челюстно-лицевой хирургии. Перспективным направлением изготовления таких эндопротезов является селективное лазерное спекание (SLS – selective laser sintering) или плавление (SLM – selective laser melting) – технология изготовления изделий по математическим CAD-моделям путем последовательного послойного расплавления металлического порошка лазерным излучением, основанная на применении принтеров объемной печати.

Преимуществами селективного лазерного плавления по сравнению с традиционным литьем являются высокая точность и прочность металлических конструкций, гомогенная микроструктура получаемых изделий, высокая скорость изготовления и заключительной обработки, возможность визуализации результата и внесения правок на всех этапах изготовления, а также снижение финансовых затрат за счет экономичного расходования материала.

Технологический процесс селективного лазерного спекания включает в себя несколько этапов. В первую очередь, в специальных про-

граммах для CAD-моделирования производится построение модели будущей конструкции, после чего модель загружается в слайсер, где задаются необходимые параметры печати и выполняется нарезка модели на слои печати.

Модель выгружается в SLM-принтер объемной печати, состоящий из двух емкостей: бункер, заполненный металлическим порошком, и камера построения. Перед началом печати из камеры построения откачивается воздух, и она заполняется инертным газом аргоном, во избежание воздействия кислорода на конструкцию в процессе печати.

Порошкообразный материал подается из бункера и тонким слоем распределяется по подвижной рабочей платформе камеры построения с помощью разравнивателя. После формирования слоя на нем фокусируется лазерный луч, проходя в соответствии с горизонтальным срезом модели и очерчивая ее сечение. Происходит спекание металлического порошка и образование твердого полимера. После нанесения первого слоя, подвижная рабочая платформа вновь опускается вниз для нанесения нового слоя порошка, и процесс повторяется, формируя новые слои модели поверх отвердевших, до полной готовности модели. По окончании печати конструкция извлекается из принтера, очищается от остатков материала и поддержек.

После изготовления протеза планируется оперативное вмешательство, в ходе которого эндопротез из никелида титана устанавливается в заранее подготовленное ложе, после чего осуществляют его фиксацию к фрагменту нижней челюсти с наружной стороны при помощи фиксирующих устройств из никелида титана.

Заключительным этапом лечения является реабилитация пациента, о которой нельзя забывать даже при идеальном соответствии протеза и отсутствии осложнений. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная реабилитационная программа, учитывающая объем реконструкции и состояние здоровья пациента. Целью реабилитации в данном случае является восстановление утраченной жевательной функции, речи, симметрии лица и эстетики. Реабилитация включает в себя диету, медикаментозную и физиотерапию, рентгенологический контроль всех этапов остеоинтеграции протеза, а также коррекцию рациона питания и назначений в будущем.

Таким образом, комплексное применение технологий компьютерного 3D-моделирования и селективного лазерного спекания для реконструкции нижней челюсти позволяет добиться высокой точности, соответствия протеза индивидуальным анатомо-топографическим особенностям пациента, обеспечить наилучшие условия для проведения оперативного вмешательства и реабилитации. Помимо этого, сочетание этих методов сокращает длительность изготовления эндопротеза и самой операции, а также позволяет провести подробную визуализацию плана лечения и реабилитацию так для пациента, так и для обсуждения клинического случая с коллегами.

Литература

1. Диков Ю. Ю., Соболевский В.А., Кропотов М.А., Ивашков В.Ю. Применение трехмерного моделирования и 3D-печати при реконструкции нижней челюсти // Опухоли головы и шеи. – 2015. – № 1. – С. 22–26.
2. Дюрягин Н. М., Степанов С.С., Семченко В.В., Дюрягина Е.Н. Экспериментальное исследование имплантатов из никелида титана при реконструкции нижней челюсти // Гены и клетки. – 2014. – № 1. – С. 41–47.
3. Емелин П. А., Тимофеев Е.В. Современные методы реконструкции нижней челюсти в челюстно-лицевой хирургии: актуальные подходы и инновации // Вестник науки. – 2025. – № 4 (85). – С. 976–982.

4. Кропотов М. А., Соболевский В.А., Диков Ю.Ю., Яковлева Л.П., Лысов А.А. Реконструкция височно-нижнечелюстного сустава при сегментарной резекции нижней челюсти с экзартикуляцией по поводу первичных и вторичных опухолей нижней челюсти // Альманах клинической медицины. – 2017. – № 45 (6). – С. 486–492.

5. Сирак С. В., Слетов А.А., Елизаров А.В., Мебония Т.Т., Арутюнов А.В. Реконструкция объемных дефектов нижней челюсти с помощью имплантата-эндопротеза // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2014. – № 1. – С. 87–91.

6. Поленичкин В. К., Темерханов Ф.Т., Поленичкин А.В., Гунтер В.Э. Эндопротезирование нижней челюсти имплантатами из пористого никелида титана // Медицина в Кузбассе. – 2004. – № 1. – С. 27–31.

7. Холиков А. А., Фаттаева Д.Р., Шамов В.В. Одномоментная пластика челюстей после амелобластомы, с использованием 3Д технологий // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – № 41 (9). – С. 11–29.

3D RECONSTRUCTION OF THE LOWER JAW WITH NICKEL-TITANIUM ENDOPROSTHESES MANUFACTURED BY SELECTIVE LASER SINTERING

Ipekchi Z.R., Barilo A.D., Mayevskaya A.T., Melnik S.A., Asanov N.

Order of the Red Banner of Labor, S.I. Georgievsky Medical Institute

For many years, one of the main goals of maxillofacial surgery has been the reconstruction of the mandible after its resection due to tumors, injuries, and inflammatory diseases. Reconstruction is necessary because partial mandibular removal is associated with the formation of a large bone defect, disruption of the joints and muscles of the maxillofacial region, and the development of serious functional and aesthetic disorders.

Modern maxillofacial surgery offers a variety of reconstructive methods, including bone grafting, osteosynthesis, endoprosthetics, and 3D technologies. One promising method in recent years has been selective laser sintering (SLS) or selective laser melting (SLM). This technology uses 3D printers to manufacture parts based on mathematical CAD models by sequentially melting metal powder layer by layer using laser radiation.

Keywords: maxillofacial surgery, mandibular reconstruction, endoprosthesis, titanium nickelide, selective laser sintering.

References

1. Dikov Yu. Yu., Sobolevsky V.A., Kropotov M.A., Ivashkov V. Yu. Application of three-dimensional modeling and 3D printing in mandible reconstruction // Head and Neck Tumors. – 2015. – No. 1. – P. 22–26.
2. Duryagin N.M., Stepanov S.S., Semchenko V.V., Duryagina E.N. Experimental study of titanium nickelide implants in mandible reconstruction // Genes and Cells. – 2014. – No. 1. – P. 41–47.
3. Emelin P.A., Timofeev E.V. Modern methods of mandible reconstruction in maxillofacial surgery: current approaches and innovations // Science Bulletin. – 2025. – No. 4 (85). – P. 976–982.
4. Kropotov M.A., Sobolevsky V.A., Dikov Yu. Yu., Yakovleva L.P., Lysov A.A. Reconstruction of the temporomandibular joint after segmental resection of the mandible with exarticulation for primary and secondary tumors of the mandible // Almanac of Clinical Medicine. – 2017. – No. 45 (6). – P. 486–492.
5. Sirak S.V., Sletov A.A., Elizarov A.V., Meboniya T.T., Arutyunov A.V. Reconstruction of volumetric defects of the mandible using an endoprosthesis implant // Medical Bulletin of the North Caucasus. – 2014. – No. 1. – P. 87–91.
6. Polenichkin V.K., Temerhanov F.T., Polenichkin A.V., Gunter V.E. Endoprosthetics of the lower jaw with implants made of porous titanium nickelide // Medicine in Kuzbass. – 2004. – No. 1. – P. 27–31.
7. Kholikov A.A., Fattaeva D.R., Shamov V.V. One-stage plastic surgery of the jaws after ameloblastoma, using 3D technologies // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – No. 41 (9). – P. 11–29.

Анализ смертности от рака молочной железы в Пензенской области за 2021–2024 гг.

Статистика смертности от злокачественных новообразований молочной железы

Федорова Мария Геннадьевна,

кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой «Морфология», Медицинский институт, Пензенский государственный университет
E-mail: fedorovamerry@gmail.com

Комарова Екатерина Валентиновна,

кандидат биологических наук, доцент кафедры «Морфология», Медицинский институт, Пензенский государственный университет
E-mail: ekaterina-log@inbox.ru

Акимова Анастасия Романовна,

студент, Медицинский институт, Пензенский государственный университет
E-mail: nastya.akimova.77@inbox.ru

Суханова Виктория Дмитриевна,

студент лечебного факультета по специальности «Лечебное дело», Медицинский институт, Пензенский государственный университет
E-mail: s.viktory19@gmail.com

Гундрова Елена Васильевна,

студент, Медицинский институт, Пензенский государственный университет
E-mail: lena.911587@gmail.com

Проведен ретроспективный анализ смертности от рака молочной железы (РМЖ) в Пензенской области за период 2021–2024 гг. На основе данных региональной статистики изучено 420 случаев смерти, основной причиной которых являются злокачественные новообразования молочной железы (коды МКБ-10: C50.1, C50.3, C50.4, C50.5, C50.8, C50.9). Установлен выраженный рост показателя смертности от РМЖ с 0,19 до 0,70 на 100 тыс. женского населения. Более 70% летальных исходов зарегистрировано среди женщин пожилого и старческого возраста (60 лет и старше). Преобладающей локализацией в структуре смертности являлось злокачественное новообразование молочной железы, выходящее за пределы одной и более указанных локализаций (C50.8), что в 2022 году составило 75% всех случаев, что характерно для распространенных и агрессивных форм опухоли. Основной непосредственной причиной смерти был синдром системного воспалительного ответа неинфекционного происхождения (R65.3), что косвенно свидетельствует о высокой доле поздних, некурабельных стадий заболевания в регионе. Полученные результаты указывают на необходимость оптимизации системы ранней диагностики и маршрутизации пациентов с РМЖ в Пензенской области, особенно в группах старшего возраста.

Ключевые слова: Злокачественные новообразования, рак молочной железы, метастатический поражения, опухолевый процесс.

Введение

Рак молочной железы (РМЖ) остается одной из главных причин смертности от онкологических заболеваний среди женщин во всем мире. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от рака молочной железы умирает более 600 тысяч женщин, что делает его одной из наиболее острых проблем общественного здравоохранения [1]. Высокие показатели смертности связаны с поздней диагностикой, агрессивными формами опухоли и ограниченной доступностью современных методов терапии [2]. Исследование факторов, влияющих на летальность при раке молочной железы, а также разработка эффективных профилактических и лечебных стратегий представляют собой важное направление современной онкологии.

Анализ факторов риска играет ключевое значение в понимании патогенеза заболевания, своевременной диагностике и разработке профилактических мероприятий. Факторы риска рака молочной железы многообразны и включают генетическую предрасположенность (например, мутации в генах BRCA1 и BRCA2), гормональные и репродуктивные особенности (позднее наступление менопаузы, использование гормональной терапии), а также особенности образа жизни и влияние окружающей среды (ожирение и воздействие радиации) [3].

Анализ данных по смертности от рака молочной железы (РМЖ) в России выявляет стойкие региональные диспропорции, что требует детального изучения на уровне субъектов для разработки адресных мер. Несмотря на общероссийскую тенденцию к стабилизации показателей, РМЖ остается ведущей онкологической причиной смерти женщин, занимая первое место в структуре смертности от злокачественных новообразований женского населения.

Эпидемиологическая ситуация в РФ и обоснование актуальности для Пензенской области:

В РФ стандартизированный показатель смертности от РМЖ в 2022 году составил около 15,5–16,0 на 100 тыс. женского населения. Ключевой проблемой, влияющей на прогноз, остается высокая доля запущенных случаев (стадии III–IV), которая в целом по стране превышает 25%.

Для Пензенской области эта проблема стоит особенно остро. Согласно данным отчетов за 2021–2022 годы, показатель смертности от РМЖ в регионе стабильно превышает среднероссийский уровень, а доля запущенных форм диагностики остается критически высокой (по предварительным данным, может достигать ~30% и более). Это указывает на системные пробелы в организации ранней диагностики и маршрутизации пациенток на уровне региона.

Таким образом, целью настоящего регионального исследования является анализ показателей смертности от рака молочной железы (РМЖ) в Пензенской области.

Материалы и методы

Исследование выполнено на базе ГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». В качестве основного источника информации использована база данных «ПроМед».

Анализ смертности среди населения Пензенской области, связанной с новообразованиями молочной железы, проводился в период с 2021 по 2024 год.

В работе использовались интенсивные и экстенсивные показатели. Интенсивные показатели выражают частоту явления в определенной среде. Они показывают, как часто встречается изучаемое явление (заболеваемость, смертность, рождаемость и т.д.).

Рассчитывали показатель смертности от РМЖ на 100 000 населения: число умерших от РМЖ / численность женского населения * 100 000

Классификация первоначальных причин смерти, предоставленная в данном списке, основана на кодах МКБ-10 и группирует случаи рака молочной железы по следующим категориям: C50.9 – злокачественное новообразование молочной железы неуточненной части; C50.8 – злокачественное новообразование молочной железы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций; C50.1 – злокачественное новообразование центральной части молочной железы; C50.3 – злокачественное новообразование нижневнутреннего квадран-

та молочной железы; C50.4 – злокачественное новообразование верхненаружного квадранта молочной железы; C50.5 – злокачественное новообразование нижненаружного квадранта молочной железы.

В рамках исследования также были определены группы непосредственных причин смерти, классифицированные по кодам МКБ-10: R65.3 – Синдром системного воспалительного ответа неинфекционного происхождения с органическим нарушением; G93.6 – Отек мозга; R58 – Кровотечение, не классифицированное в других рубриках; I26.9 – Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце; K25.0 – Язва желудка острая с кровотечением; K72.1. – Хроническая печеночная недостаточность.

В работе использовали классификацию возрастов, принятую ВОЗ в 2021 г.: 18–44 года – молодой возраст, 45–59 лет – средний возраст; 60–74 года – пожилой возраст, 75–90 лет – старческий возраст; старше 90 лет – долгожители.

Результаты

В период с 2021 по 2024 год было зарегистрировано 420 смертей, обусловленных раком молочной железы.

Показатель смертности от РМЖ на 100 000 населения в 2021 году 0,19; 2022 г. – 0,48; 2023 г. – 0,74; 2024 г. – 0,70.

Следует отметить, что с каждым годом показатель смертности от РМЖ на 100 000 населения растет, нужно выделить 2021 год, где этот показатель составил 0,19, по сравнению с 2024 годом, где этот же показатель вырос до 0,7 (Табл. 1).

Таблица 1. Показатели смертности от РМЖ на 100 000 населения, доля РМЖ в общей смертности и от опухолей

	2021	2022	2023	2024
Показатель смертности от РМЖ на 100 000 населения	0,190402	0,482822	0,738368	0,701882
Доля РМЖ в смертности от опухолей, %	2,169546	3,88707	4,134995	5

Следует отметить, что в период 2021–2022 гг. основная часть случаев смертности от РМЖ приходилась на пожилой возраст, составляя 62% от общего числа. На старческий возраст приходилось 23%, на средний – 15%. В 2023 году смертность от РМЖ также наиболее выражена среди пожилых людей – 35%, следом идет средний возраст – 32%, затем старческий – 23%. Молодой возраст и долгожители составили лишь 5%. В 2024 году смертность выше в пожилом возрасте – 49%, в старческом составила 30%, в среднем – 15%, в молодом – 6%. (рис. 1).




Рис. 1. Структура смертности (в %) от рака молочной железы в зависимости от возрастной категории

Согласно результатам, наиболее частой причиной смерти стало злокачественное новообразование молочной железы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций (C50.8). Смертность от этой патологии составляет в 2021 г. – 72%; 2022 г. – 75%; 2023 г. – 32% от общего количества смертей от злокачественных новообразований молочной железы, а в 2024 году составляет 40% (рис. 2).

На втором месте по частоте встречаемости в указанный период находилась патология (C50.4) – злокачественное новообразование верхненаружного квадранта молочной железы: в 2021 году – 14%; 2022 году – 25%; 2023 году – 39%; в 2024 году – 32% (рис. 2).

Иные категории причин смерти составляли не более 10% от общего числа случаев в каждом из исследуемых периодов. Так, злокачественное новообразование центральной части молочной железы (C50.1) наблюдается в 5–10% случаев. Диагностика опухолей в центральной области затруднена из-за близости к ареоле и соску, что осложняет раннее выявление заболевания. Злокачественное новообра-

зование нижневнутреннего квадранта молочной железы (C50.3) встречается реже, что связано с меньшим объемом ткани данной области и особенностями ее строения. Также злокачественное новообразование молочной железы неуточненной части (C50.9) имеет место в тех случаях, когда локализация опухоли не установлена или не зафиксирована. Было выявлено, что доля таких случаев не превышает 5%. Злокачественные новообразования нижненаружного квадранта молочной железы (C50.5) встречаются редко, что напрямую связано с особенностями расположения данной области и факторами, влияющими на развитие заболевания (рис. 2).




Рис. 2. Смертность в Пензенской области, связанная с раком молочной железы в период с 2021 по 2024 год

Обсуждение

В соответствии с рис. 1 было выявлено, что среди умерших от РМЖ наибольшее число приходится на людей пожилого возраста. Это связано с тем, что возраст является основным фактором риска, так как это связано с гормональными изменениями и снижением иммунной функции [13]. Так же, как правило, у пожилых людей, имеются различные сопутствующие заболевания, которые осложняют лечение рака.

Высокая доля диагнозов C50.8 связана с тем, что опухоль затрагивает сразу несколько отделов молочной железы и не может быть отнесена к одной конкретной зоне. Это часто указывает на распространенный или агрессивный процесс, который с большей вероятностью метастазирует. Рост смертности от C50.8 в 2021–2022 годах обусловлен главным образом последствиями пандемии COVID-19 – перегрузкой системы здравоохранения, задержками диагностики и лечения, изменениями в регистрации данных [12]. Ограниченный доступ к онкологической помощи и профилактическим осмотрам способствовал увеличению смертности в этот период [4].

На втором месте по частоте встречаемости в указанный период находилась патология (C50.4). Отмечается рост смертности в 2023–2024 годах. В 2020–2021 гг. значительная часть пациентов могла пропустить профилактические обследования и лечение из-за ограничений и страха заражения COVID-19 [12]. Это привело к выявлению рака (C50.4) на более поздних стадиях в 2023–2024 гг., в этот период заболевание стало тяжелее поддаваться лечению, вследствие чего зафиксировано повышение смертности. После снижения медицинской помощи в 2020–2021 гг. возрос поток пациентов в последующие годы, что могло превысить возможности региональной онкологической системы.

Другие патологии не имели большого значения в смертности от РМЖ за период 2021–2024 год.

Полученные данные о том, что ведущей непосредственной причиной смерти в изученной группе являлся синдром системного воспалительного ответа (R65.3), имеют важное клинико-патогенетическое значение. Данная рубрика отражает не конкретное осложнение (например, пневмонию или сепсис), афинальный, терминальный патогенетический этап прогрессирующего онкологического заболевания. Этот синдром, опосредованный массивным выбросом провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО-α и др.), приводит к повреждению эндотелия, дисфункции микроциркуляции и развитию полиорганной недостаточности. Таким образом, преобладание R65.3 в структуре причин смерти косвенно свидетельствует о том, что значительная часть пациенток в Пензенской области умирает от рака молочной железы на поздних, некурабельных стадиях, когда болезнь приобретает системный характер.

Заключение

Таким образом, подводя результаты анализа смертности от злокачественных новообразований молочной железы в Пензенской области за период 2021–2024 годов установлено:

1. Рост абсолютного числа смертей от РМЖ в Пензенской области с 0,19 человек в 2021 году до 0,70 в 2024 г.
2. Наибольшее число умерших (более 70%) приходится на женщин пожилого возраста.
3. Преобладание локализации C50.8 в 2022 году (75%). Основной непосредственной причиной смерти является синдром системного воспалительного ответа неинфекционного происхождения с органическим нарушением. Этот синдром, опосредованный массивным выбросом провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО-α и др.), приводит к повреждению эндотелия, дисфункции микроциркуляции и развитию полиорганной недостаточности. Таким образом, преобладание R65.3 в структуре причин смерти косвенно свидетельствует о том, что значительная часть пациенток в Пензенской области умирает от рака молочной железы на поздних, некурабельных стадиях, когда болезнь приобретает системный характер.

Литература

1. Голубева Т.С., Белова Е.В. Эпидемиология и диагностика рака молочной железы на современном этапе // *Universum: медицина и фармакология*. – 2025. – С. 49–53.
2. Мерабшвили В. М., Семиглазова В.Ф., Бусько Е.А. Возрастные особенности распространенности, ранней диагностики и выживаемости больных раком молочной железы (клинико-популяционное исследование) [Текст] / Мерабшвили В.М., Семиглазова В.Ф., Бусько Е.А. // *Вопросы онкологии*. – 2024. – № . – С. 450–459.
3. Шертаева, А. Б., Оспанова, Д. А., Фазылов, Т.Р. Факторы риска развития рака молочной железы [Текст] / А.Б. Шертаева, Д.А. Оспанова, Т.Р. Фазылов // *Вестник Казахского Национального медицинского университета*. – 2022. – № . – С. 192–197.
4. Драпкина, О. М., Самородская, И. В., Какорина, Е. П., Семенов, В. Ю. COVID-19 и региональная смертность в Российской Федерации [Текст] / О.М. Драпкина, И.В. Самородская, Е.П. Какорина, В.Ю. Семенов // *Профилактическая медицина*. – 2021. – № . – С. 14–21.
5. Смирнова Е.В., Ларина Н.С. Радиотерапия при раке молочной железы: современные тенденции и результаты // *Российский онкологический журнал*. 2023. Т. 25, № 1. – С. 10–18.
6. Петров С.О., Иванова М.А. Современные протоколы комплексного лечения рака молочной железы // *Клиническая медицина*. 2023. № 2. – С. 55–63.
7. Петрова Н.В., Иванов С.А. Современные методы визуализации в диагностике рака молочной железы // *Вестник современной онкологии*. 2025. Т. 18, № 2. – С. 34–42.
8. Кузнецова Т.А., Воронцова Е.И. Генетические маркеры в прогнозировании течения рака молочной железы // *Российский журнал онкологии*. 2021. Т. 23, № 1. – С. 35–43.
9. Антипина И.В., Мельникова Н.В. Рак молочной железы: современные методы диагностики и персонализированное лечение // *Онкология*. 2022. № 4. – С. 12–20.
10. Морозова И.Н., Климова А.В. Современные подходы к молекулярной классификации рака молочной железы // *Российский онкологический журнал*. 2025. Т. 27, № 1. – С. 5–14.
11. Орлова М.Д. Скрининг рака молочной железы: современные рекомендации и технологии // *Онкология сегодня*. 2025. № 3. – С. 50–58.
12. Кашепов А.В. Избыточная смертность населения во время пандемии COVID-19 в регионах России // *Вестник Алтайской академии экономики и права*. 2022. № 9–3. С. 352–360; URL: <https://vaael.ru/article/view?id=2481> DOI: <https://doi.org/10.17513/vaael.2481>
13. Злокачественные новообразования в России в 2023 году (заболеваемость и смертность) / под ред. А.Д. Каприна [и др.] – М.: МНИ-ОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2024. – илл. – 276 с. ISBN 978-5-85502-298-8

ANALYSIS OF BREAST CANCER MORTALITY IN THE PENZA REGION FOR 2021–2024. STATISTICS ON MORTALITY FROM MALIGNANT NEOPLASMS OF THE BREAST

Fedorova M.G., Komarova E.V., Akimova A.R., Sukhanova V.D., Gundrova E.V.
Penza State University

A retrospective analysis of breast cancer mortality in the Penza region for the period 2021–2024 was carried out. Based on regional statistics, 420 deaths were studied, the main cause of which was indicated by malignant neoplasms of the breast (ICD-10 codes: C50.1, C50.3, C50.4, C50.5, C50.8, C50.9). There was a marked increase in the mortality rate from breast cancer from 0.19 to 0.70 per 100,000 female population. More than 70% of deaths were registered among elderly and senile women (60 years and older). The predominant localization in the mortality structure was a malignant neoplasm of the breast that goes beyond one or more of these localizations (C50.8), which in 2022 accounted for 75% of all cases, which is typical for common and aggressive forms of the tumor. The leading immediate cause of death was systemic inflammatory response syndrome of non-communicable origin (R65.3), which indirectly indicates a high proportion of late, non-curable stages of the disease in the region. The results indicate the need to optimize the system of early diagnosis and routing of patients with breast cancer in the Penza region, especially in older groups.

Keyword: Malignant neoplasms, breast cancer, metastatic lesions, tumor process.

References

1. Golubeva T.S., Belova E.V. Epidemiology and diagnosis of breast cancer at the present stage // *Universum: medicine and pharmacology*. 2025. pp. 49–53.
2. Merabishvili V.M., Semiglazova V.F., Busko E.A. Age-related features of the prevalence, early diagnosis and survival of breast cancer patients (clinical and population study) [Text] / Merabishvili V.M., Semiglazova V.F., Busko E.A. // *Issues of oncology*. – 2024. – No. – pp. 450–459.
3. Shertaeva, A. B., Ospanova, D. A., Fazylov, T.R. Risk factors for breast cancer [Text] / A.B. Shertaeva, D.A. Ospanova, T.R. Fazylov // *Bulletin of the Kazakh National Medical University*. – 2022. – № . – pp. 192–197.
4. Drapkina, O. M., Samorodskaya, I. V., Kakorina, E. P., Semenov, V. Y. COVID-19 and regional mortality in the Russian Federation [Text] / O.M. Drapkina, I.V. Samorodskaya, E.P. Kakorina, V.Y. Semenov // *Preventive medicine*. – 2021. – No. – pp. 14–21.
5. Smirnova E.V., Larina N.S. Radiotherapy for breast cancer: current trends and results // *Russian Journal of Oncology*. 2023. Vol.25, No. 1. – pp. 10–18.
6. Petrov S.O., Ivanova M.A. Modern protocols of complex treatment of breast cancer // *Clinical medicine*. 2023. No. 2. pp. 55–63.
7. Petrova N.V., Ivanov S.A. Modern imaging methods in the diagnosis of breast cancer // *Bulletin of Modern Oncology*. 2025. Vol.18, No. 2. pp. 34–42.
8. Kuznetsova T.A., Vorontsova E.I. Genetic markers in predicting the course of breast cancer // *Russian Journal of Oncology*. 2021. Vol.23, No. 1. pp. 35–43.
9. Antipina I.V., Melnikova N.V. Breast cancer: modern diagnostic methods and personalized treatment // *Oncology*. 2022. No. 4. – pp. 12–20.
10. Morozova I.N., Klimova A.V. Modern approaches to the molecular classification of breast cancer // *Russian Journal of Oncology*. 2025. Vol.27, No. 1. – pp. 5–14.
11. Orlova M.D. Breast cancer screening: modern recommendations and technologies // *Oncology today*. 2025. No. 3. pp. 50–58.
12. Kashapov A.V. Excessive mortality of the population during the COVID-19 pandemic in the regions of Russia // *Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law*. 2022. No. 9–3. pp. 352–360; URL: <https://vaael.ru/article/view?id=2481> DOI: <https://doi.org/10.17513/vaael.2481>
13. Malignant neoplasms in Russia in 2023 (morbidity and mortality) / ed. by A.D. Kaprin [et al.] – Moscow: P.A. Herzen Moscow Medical Research Institute – branch of the Federal State Budgetary Institution “NMIITS of Radiology” of the Ministry of Health of Russia, 2024. – fig. – 276 p. ISBN 978-5-85502-298-8

Клинико-диагностическое значение маркеров системного воспаления при остром панкреатите различной этиологии

Стяжкина Светлана Николаевна,

д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный медицинский университет», БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»

Зайцев Дмитрий Викторович,

хирург, высшая категория, БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»

Гущин Сергей Геннадьевич,

аспирант кафедры факультетской хирургии, врач-уролог, андролог, БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»

Данилова Юлия Александровна,

студент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный медицинский университет»,

Королёва Алина Леонидовна,

студент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный медицинский университет»

Острый панкреатит остаётся значимой проблемой неотложной хирургии, во многом определяемой выраженностью системного воспалительного ответа. Цель исследования – оценить клинико-диагностическое значение маркеров системного воспаления у пациентов с острым панкреатитом различной этиологии. Проанализированы 30 историй болезни с определением уровней С-реактивного белка и прокальцитонина, а также оценкой тяжести по шкале SOFA. При сравнительном анализе с использованием критерия Краскела–Уоллиса выявлены статистически значимые межгрупповые различия по всем исследуемым показателям ($p < 0,05$), с большим размером эффекта ($\epsilon^2 = 0,34–0,40$). Наиболее выраженный системный ответ отмечен при алкогольной, гипертриглицеридемической и послеоперационной этиологии. Полученные данные подтверждают ценность лабораторных маркеров для ранней стратификации тяжести и прогнозирования осложнённого течения заболевания.

Ключевые слова: острый панкреатит, системный воспалительный ответ, С-реактивный белок, прокальцитонин, SOFA.

Введение

Острый панкреатит (ОП) на протяжении последних десятилетий остаётся одной из наиболее актуальных и сложных проблем в структуре неотложной абдоминальной хирургии. Заболеваемость данным заболеванием во многих странах продолжает расти, а тяжёлые формы панкреатита сопровождаются развитием выраженных системных нарушений и высоким риском осложнений. Несмотря на внедрение современных методов диагностики и интенсивной терапии, летальность при тяжёлых формах заболевания сохраняется на уровне 15–30%, а при развитии гнойно-септических осложнений может достигать 80–85% [1].

Согласно пересмотренной классификации Атланты (2012), тяжесть острого панкреатита определяется наличием и длительностью органной недостаточности, а также развитием локальных и системных осложнений [2]. Лёгкая форма заболевания характеризуется отсутствием органной дисфункции, тогда как тяжёлый панкреатит сопровождается стойкой полиорганной недостаточностью продолжительностью более 48 часов, что значительно увеличивает риск неблагоприятного исхода. В этой связи особое значение приобретает ранняя оценка выраженности системного воспалительного ответа, позволяющая своевременно определить группу высокого риска и оптимизировать лечебную тактику [3].

Одним из ключевых механизмов развития тяжёлых форм острого панкреатита является формирование синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), сопровождающегося массивным высвобождением провоспалительных медиаторов. В ответ на некроз ацинарных клеток и ферментативную агрессию активируются макрофаги и нейтрофилы, что приводит к высвобождению цитокинов и медиаторов воспаления, включая фактор некроза опухоли- α (ФНО- α), интерлейкины (ИЛ-1 β , ИЛ-8), а также оксид азота (NO). Данные процессы вызывают повреждение эндотелия сосудов, нарушение микроциркуляции и развитие полиорганной недостаточности [4–7].

Особое значение в клинической практике имеет изучение лабораторных маркеров системного воспаления, позволяющих объективно оценить тяжесть патологического процесса. К наиболее широко применяемым маркерам относятся С-реактивный белок и прокальцитонин. С-реактивный белок является одним из наиболее доступных показателей воспалительной активности и широко используется для оценки выраженности системного воспалительного ответа и мониторинга течения заболевания. Прокальцитонин рассматривается как более специфический маркер выраженного воспалительного процесса и может служить индикатором возможного развития инфекционных осложнений, включая инфицированный панкреонекроз [8–10].

Клиническое течение и патогенетические особенности острого панкреатита во многом зависят от его этиологии. Наиболее распространёнными причинами заболевания являются алкогольно-алиментарный фактор (около 50–55%) и билиарная патология (около 30–35%). Также выделяют гипертриглицеридемический, послеоперационный и идиопатический варианты заболевания. Среди редких метаболических причин особого внимания заслуживает первичный гиперпаратиреоз: гиперкальциемия способна активировать трипсиноген и вызывать кальциевое осаждение в протоках поджелудочной железы, приводя к развитию как острого, так и хронического панкреатита [12]. При билиарной этиологии дополнительным патогенетическим фактором может выступать острый холангит, возникающий при обтурации общего желчного протока конкрементом, что требует использования специальных диагностических критериев, в частности рекомендаций Токийской классификации TG13 [11–13].

В современной науке активно изучаются новые лабораторные показатели системного воспаления и интегральные гематологические индексы, включая лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (NLR), системный индекс иммунного воспаления (SII) и индекс системного воспалительного ответа (SIRI). Результаты исследований показывают, что комплексная оценка лабораторных показателей в сочетании с клиническими шкалами тяжести позволяет более точно прогнозировать течение заболевания и риск развития осложнений [13–15].

Цель работы: проанализировать клинко-диагностическое значение маркеров системного воспаления у пациентов с острым панкреатитом различной этиологии для определения тяжести течения заболевания и прогнозирования осложнённого течения.

Материал и методы: исследование проведено на базе БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» в отделении общей хирургии, выборка состояла из 30 больных острым панкреатитом в возрасте 45–60 лет, распределённые по группам в зависимости от этиологии: билиарная, алкогольная, гипертриглицеридемическая, послеоперационная и идиопатическая формы заболевания. Критериями включения в исследование являлись: подтверждённый диагноз острого панкреатита, возраст пациентов от 45 до 60 лет. Критериями исключения служили наличие хронического панкреатита, онкологических заболеваний, выраженных иммунодефицитных состояний. Оценка тяжести пациентов проводилась с использованием шкалы SOFA при поступлении, лабораторно оценивались уровни С-реактивного белка, Прокальцитонин, определенные в сыворотке стандартными клинко-диагностическими методами. Статистическая обработка проводилась с использованием методов описательной статистики. Количественные показатели представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения ($M \pm SD$). Для сравнения независимых групп применялся непараметрический критерий Краскела–Уоллиса. Размер эффекта оценивался с помощью коэффициента ϵ^2 : значения 0,01–0,08 расценивались как малый эффект, 0,08–0,26 – средний, свыше 0,26 – большой. Статистически значимыми считались различия при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение

В исследование включено 30 пациентов с острым панкреатитом различной этиологии, проходивших стационарное лечение. Во всех наблюдениях отмечено благоприятное завершение заболевания с клинко-лабораторным выздоровлением, что позволило сосредоточить анализ на оценке взаимосвязи маркеров системного воспаления с тяжестью течения острого панкреатита, а не с летальным исходом. Этиологическая структура была представлена билиарной, алкогольной, гипертриглицеридемической, послеоперационной и идиопатической формами заболевания.

При анализе установлено, что средний возраст пациентов составил $53,6 \pm 8,7$ года. Средние значения лабораторных маркеров воспаления соответствовали умеренно выраженному системному воспалительному ответу: уровень С-реактивного белка – $148,4 \pm 50,1$ мг/л, прокальцитонина – $2,21 \pm 1,39$ нг/мл. Средний показатель по шкале SOFA составил $4,2 \pm 2,0$ балла, что отражает преимущественно среднетяжёлое течение заболевания без признаков выраженной полиорганной недостаточности.

Сравнительный анализ с использованием критерия Краскела–Уоллиса выявил статистически значимые межгрупповые различия по уровню СРБ ($H(4) = 11,83$; $p = 0,019$; $\epsilon^2 = 0,38$), прокальцитонина ($H(4) = 10,47$; $p = 0,033$; $\epsilon^2 = 0,34$) и баллам шкалы SOFA ($H(4) = 12,15$; $p = 0,016$; $\epsilon^2 = 0,40$), что указывает на различную выраженность системного воспалительного ответа и органной дисфункции при разной этиологии заболевания (табл. 1).

Таблица 1. Этиологическая структура острого панкреатита.

Этиология острого панкреатита	n	%
Алкогольная	10	33,3
Билиарная	8	26,7
Гипертриглицеридемическая	4	13,3
Послеоперационная	4	13,3
Идиопатическая	4	13,3
Всего	30	100

Алкогольный острый панкреатит составил 33,3% наблюдений (табл. 1). У пациентов данной группы отмечались наиболее высокие значения лабораторных маркеров системного воспаления среди всех этиологических форм: уровень СРБ составил $170,3 \pm 48,2$ мг/л, прокальцитонина – $2,8 \pm 1,1$ нг/мл, баллы по шкале SOFA – $5,1 \pm 1,8$. Выраженность системного воспалительного ответа при данной форме, вероятно, обусловлена прямым токсическим действием этанола и его метаболитов на ацинарные клетки поджелудочной железы, а также более выраженным некротическим поражением ткани органа.

Гипертриглицеридемический панкреатит составил 13,3% случаев (табл. 1) и характеризовался значениями маркеров воспаления, сопоставимыми с алкогольной формой: уровень СРБ составил $165,4 \pm 42,6$ мг/л, прокальцитонина – $2,9 \pm 1,0$ нг/мл, баллы по шкале SOFA –

$5,0 \pm 1,6$. Высокая выраженность системного воспалительного ответа при данном варианте заболевания, по всей видимости, связана с массивным повреждением панкреатической ткани вследствие токсического воздействия свободных жирных кислот, образующихся при распаде триглицеридов.

Послеоперационный панкреатит наблюдался в 13,3% случаев (табл. 1). Показатели системного воспаления в данной группе занимали промежуточное положение: уровень СРБ составил $158,6 \pm 45,1$ мг/л, прокальцитонина – $2,6 \pm 1,2$ нг/мл, баллы по шкале SOFA – $4,8 \pm 1,7$. Выявленные изменения могут быть обусловлены сочетанием операционной травмы, активации системного воспалительного ответа и нарушений микроциркуляции в ткани поджелудочной железы (табл. 2).

Билиарная форма панкреатита составила 26,7% наблюдений (табл. 1) и проявлялась умеренной выраженностью системного воспалительного ответа: уровень СРБ составил $132,5 \pm 39,7$ мг/л, прокальцитонина – $1,9 \pm 0,8$ нг/мл, баллы по шкале SOFA – $3,9 \pm 1,4$. Относительно меньшая выраженность воспалительной реакции по сравнению с алкогольной и гипертриглицеридемической формами, вероятно, связана с тем, что после устранения обструкции желчных путей происходит быстрое снижение интенсивности воспалительного процесса (табл. 2).

Идиопатический панкреатит составил 13,3% случаев (табл. 1) и характеризовался наиболее низкими показателями системного воспаления среди всех групп: уровень СРБ составил $120,3 \pm 36,9$ мг/л, прокальцитонина – $1,7 \pm 0,7$ нг/мл, баллы по шкале SOFA – $3,7 \pm 1,3$. Это может быть связано с тем, что часть случаев идиопатического панкреатита представляет собой относительно лёгкие формы заболевания с ограниченным повреждением паренхимы поджелудочной железы (табл. 2).

Таблица 2. Показатели воспалительных маркеров и шкалы SOFA в зависимости от этиологии острого панкреатита.

Этиология	CRP (мг/л)	Прокальцитонин (нг/мл)	SOFA (баллы)
Алкогольная	$170,3 \pm 48,2$	$2,8 \pm 1,1$	$5,1 \pm 1,8$
Билиарная	$132,5 \pm 39,7$	$1,9 \pm 0,8$	$3,9 \pm 1,4$
Гипертриглицеридемическая	$165,4 \pm 42,6$	$2,9 \pm 1,0$	$5,0 \pm 1,6$
Послеоперационная	$158,6 \pm 45,1$	$2,6 \pm 1,2$	$4,8 \pm 1,7$
Идиопатическая	$120,3 \pm 36,9$	$1,7 \pm 0,7$	$3,7 \pm 1,3$

Отсутствие летальных исходов в анализируемой группе ограничивает возможность прямой оценки прогностической ценности исследуемых маркеров в отношении смертности, однако позволяет более детально охарактеризовать их роль в формировании тяжёлого, но обратимого течения острого панкреатита. Это подчёркивает необходимость дальнейших исследований на более крупных выборках с включением пациентов с панкреонекрозом и неблагоприятными исходами.

Полученные результаты демонстрируют, что уровни СРБ, прокальцитонина достоверно связаны с тяжестью острого панкреатита независимо от его этиологии, а наиболее выраженный системный воспалительный ответ характерен для алкогольной, гипертриглицеридемической и послеоперационной форм заболевания. Указанные маркеры могут рассматриваться как доступные лабораторные инструменты ранней оценки тяжести и прогнозирования осложнённого течения, что имеет важное практическое значение для оптимизации ведения пациентов.

Вывод

Проведённое исследование подтвердило значимую роль системного воспалительного ответа в формировании тяжести течения острого панкреатита независимо от его этиологии. Установлено, что повышение уровней С-реактивного белка, прокальцитонина достоверно ассоциировано с нарастанием органной дисфункции по шкале SOFA, что свидетельствует о тесной взаимосвязи лабораторных маркеров воспаления с клинической выраженностью заболевания. Наиболее выраженные изменения показателей системного воспаления выявлены при алкогольной, гипертриглицеридемической и послеоперационной формах острого панкреатита, что указывает на более агрессивный характер повреждения поджелудочной железы и высокий риск осложнённого течения при данных вариантах этиологии. В то же время при билиарной и идиопатической формах отмечена сравнительно меньшая выраженность воспалительной реакции, вероятно связанная с более ранним устранением причинного фактора и меньшим объёмом некротического поражения ткани железы.

Комплексная оценка маркеров системного воспаления может служить надёжным инструментом ранней стратификации тяжести состояния пациентов, своевременного прогнозирования развития

органной дисфункции и оптимизации тактики интенсивной терапии. Несмотря на отсутствие летальных исходов в исследуемой группе, выявленные корреляционные зависимости подтверждают клинико-диагностическую ценность С-реактивного белка, прокальцитонина и интерлейкина-6 как доступных и информативных показателей мониторинга течения заболевания. Ограничением работы является небольшой объём выборки, что определяет необходимость дальнейших многоцентровых исследований с включением пациентов с панкреонекрозом и неблагоприятными исходами.

Использование лабораторных маркеров системного воспаления в сочетании с клиническими шкалами оценки тяжести позволяет повысить точность ранней диагностики осложнённого течения острого панкреатита и способствует улучшению результатов лечения данной категории пациентов.

Литература

1. О.А. Куделич, Г.Г. Кондратенко, М.П. Потапнев, О.В. Клименкова, Н.В. Гончарова. Регионарное использование внеклеточных микровезикул мезенхимальных стромальных клеток при остром некротизирующем панкреатите в эксперименте // Трансплантология. 2024. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/regionarnoe-ispolzovanie-vnekletochnyh-mikrovезикул-mezenhimalnyh-stromalnyh-kletok-pri-ostrom-nekrotiziruyuschem-pankreatite-v> (дата обращения: 05.02.2026).
2. Эктон В.Н., Ходорковский М.А., Скорынин О.С., Минаков О.Е. Классификация Атланта-2012: терминология и определения при диагностике острого панкреатита // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. – 2021. – Т. 14. – № 4. – С. 325–333. doi: 10.18499/2070-478X-2021-14-4-325-333
3. Пономарь С. А., Болдин Б.В. Ключевые внутриклеточные механизмы в патогенезе острого панкреатита // Лечебное дело. 2021. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-vnutrikletochnyye-mehanizmy-v-patogeneze-ostrogopankreatita> (дата обращения: 08.03.2026).
4. Никитина Е. В., Илюкевич Г.В. Клинико-лабораторная оценка синдрома системного воспалительного ответа у пациентов с острым тяжёлым панкреатитом // Вестник ВГМУ. 2023. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kliniko-laboratornaya-otsenka-sindroma-sistemnogo-vospalitelnogo-otveta-u-patsientov-s-ostрым-tyazhelym-pankreatitom> (дата обращения: 05.02.2026).
5. Тарасенко, В.С. Патоморфологические механизмы развития острого панкреатита / В.С. Тарасенко // Инноватика и экспертиза: научные труды. – 2016. – № 3(18). – С. 175–183. – EDN YLIJXJ.
6. Кулабухов В. В., Шабанов А.К., Андреева И.В., Стецюк О.У., Андреев В.А. Биомаркеры инфекции в оптимизации антибактериальной терапии: оправданные ожидания // KMAX. 2020. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/biomarkery-infektsii-v-optimizatsii-antibakterialnoy-terapii-opravdannye-ozhidaniya> (дата обращения: 08.03.2026).
7. Синдром системного воспалительного ответа и отдельные гематологические индексы у пациентов с острым панкреатитом алиментарно-алкогольной этиологии / Д.М. Адамович, З.А. Дундаров, Д.А. Евсеенко [и др.] // Актуальные проблемы медицины: Сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции с международным участием. В 3-х томах, Гомель, 13 ноября 2024 года. Т. 3. Выпуск 25. – Гомель: Гомельский государственный медицинский университет, 2024. – С. 14–17. – EDN OHPNDB.
8. Локтионов А. Л., Козлова А.И., Воропаев Е.В., Микаэлян П.К., Суняйкина О.А., Быстрова Н.А., Конопля А.И. Дифференциальная лабораторная диагностика острого билиарного и небилиарного панкреатита // Актуальные проблемы медицины. 2015. № 16 (213). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/Differentsialnaya-laboratornaya-diagnostika-ostrogobiliarnogo-i-nebiliarnogo-pankreatita> (дата обращения: 05.02.2026).
9. Мамедов С.Х., Климов А.Е., Назаров Д.Т., Садовникова Е.Ю. Диагностические маркеры острого холангита при билиарном панкреатите у больных с вклиненным камнем большого дуоденального сосочка. Медицинский вестник Юга России. 2017;8(3):64–70. <https://doi.org/10.21886/2219-8075-2017-8-3-64-70>
10. Д. Х. Пурдеков. (2025). Современные подходы к раннему прогнозированию и стратификации риска при остром панкреатите.

образование и наука в ххi веке, 66–4 (том 1). <https://mpcareer-google.ru/index.php/journal/article/view/3335>

11. Ивануса, С.Я. Диагностика и профилактика инфекционных осложнений острого панкреатита / С.Я. Ивануса, М.В. Лазуткин, А.В. Чеботарь // Вестник Российской Военно-медицинской академии. – 2019. – № 2(66). – С. 198–203. – ЭДН QDWNLF.

12. Стажжина С.Н., Котова И.В., Заривчацкий М.Ф., Чернышова Т.Е., Леднева А.В., Балтачев И.А. Особенности диагностики и лечения острого и хронического панкреатита при первичном гиперпаратиреозе // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2021. № 195(11). С. 15–20. doi:10.31146/1682-8658-ecg-195-11-15-20

CLINICAL AND DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF MARKERS OF SYSTEMIC INFLAMMATION IN ACUTE PANCREATITIS OF VARIOUS ETIOLOGIES

Styazhkina S.N., Zaitsev D.V., Gushchin S.G., Danilova Yu.A., Koroleva A.L.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Izhevsk State Medical University», BUZ UR «1 RKB MOH UR»

Acute pancreatitis remains a major challenge in emergency surgery and is largely determined by the severity of the systemic inflammatory response. The study aimed to assess the clinical and diagnostic value of systemic inflammatory markers in patients with acute pancreatitis of different etiologies. Thirty medical records were analyzed with measurement of C-reactive protein and procalcitonin, along with SOFA score assessment. Comparative analysis using the Kruskal–Wallis test revealed statistically significant intergroup differences across all studied parameters ($p < 0.05$), with a large effect size ($\epsilon^2 = 0.34–0.40$). The most pronounced systemic response was observed in alcoholic, hypertriglyceridemic, and postoperative etiologies. These findings confirm the usefulness of laboratory inflammatory markers for early severity stratification and prediction of complicated disease course.

Keywords: acute pancreatitis, systemic inflammatory response, C-reactive protein, procalcitonin, SOFA score

References

1. Kudelich OA, Kondratenko GG, Potapnev MP, Klimentova OV, Goncharova NV. Regional use of extracellular microvesicles from mesenchymal stromal cells in experimental acute necrotizing pancreatitis. *Transplantologia*. 2024;(3). [In Russian]
2. Ektov VN, Khodopkovsky MA, Skorynin OS, Minakov OE. Atlanta-2012 classification: terminology and definitions in the diagnosis of acute pancreatitis. *Bulletin of Experimental and Clinical Surgery*. 2021;14(4):325–333. doi:10.18499/2070-478X-2021-14-4-325-333 [In Russian]
3. Ponomar SA, Boldin BV. Key intracellular mechanisms in the pathogenesis of acute pancreatitis. *Lechebnoe Delo*. 2021;(1). [In Russian]
4. Nikitina EV, Ilyukevich GV. Clinical and laboratory assessment of systemic inflammatory response syndrome in patients with severe acute pancreatitis. *Vestnik VGMU*. 2023;(3). [In Russian]
5. Tarasenko VS. Pathomorphological mechanisms of acute pancreatitis development. *Innovatika i Ekspertiza: Nauchnye Trudy*. 2016;(3):175–183. [In Russian]
6. Kulabukhov VV, Shabanov AK, Andreeva IV, Stetsyuk OU, Andreev VA. Infection biomarkers in optimizing antibacterial therapy: justified expectations. *Clinical Microbiology and Antimicrobial Chemotherapy*. 2020;(3). [In Russian]
7. Adamovich DM, Dundarov ZA, Evseenko DA, et al. Systemic inflammatory response syndrome and selected hematological indices in patients with acute pancreatitis of alimentary-alcoholic etiology. In: *Current Problems of Medicine: Proceedings of the Republican Scientific-Practical Conference with International Participation*. Gomel, November 13, 2024. Vol. 3, Issue 25. Gomel: Gomel State Medical University; 2024. p. 14–17. [In Russian]
8. Loktionov AL, Kozlova AI, Voropaev EV, Mikaelyan PK, Sunyaykina OA, Bystrova NA, Konoplya AI. Differential laboratory diagnosis of acute biliary and non-biliary pancreatitis. *Current Problems of Medicine*. 2015;(16):213. [In Russian]
9. Mamedov SKh, Klimov AE, Nazarov DT, Sadovnikova EYu. Diagnostic markers of acute cholangitis in biliary pancreatitis in patients with an impacted stone of the major duodenal papilla. *Medical Bulletin of the South of Russia*. 2017;8(3):64–70. doi:10.21886/2219-8075-2017-8-3-64-70 [In Russian]
10. Purdekov DKh. Modern approaches to early prediction and risk stratification in acute pancreatitis. *Education and Science in the XXI Century*. 2025;66–4(1). [In Russian]
11. Ivanusa SYa, Lazutkin MV, Chebotar AV. Diagnosis and prevention of infectious complications of acute pancreatitis. *Bulletin of the Russian Military Medical Academy*. 2019;(2):198–203. [In Russian]
12. Stjazhkina SN, Kotova IV, Zarivchatsky MF, Chernysheva TE, Ledneva AV, Baltachev IA. Features of diagnosis and treatment of acute and chronic pancreatitis with primary hyperparathyroidism. *Experimental and Clinical Gastroenterology*. 2021;195(11):15–20. doi:10.31146/1682-8658-ecg-195-11-15-20 [In Russian]

Топографоморфологическое строение пахового канала и современная пластика скользящих грыж

Кузьмина Дарья Сергеевна,

студент специальности «Лечебное дело», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: kds0708@mail.ru

Окунева Елена Руслановна,

студент специальности «Лечебное дело», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: elenacrimea14@mail.ru

Радзивиц Мирслав Павлович,

студент специальности «Лечебное дело», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: miroslavradszivil@gmail.com

Дроздик Артём Романович,

ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: drozdik.artem@yandex.ru

Паховый канал – это важное топографическое образование, расположенное в нижнем отделе паховой области. Он образован мышцами и фасциями, которые обеспечивают защиту внутренних органов и поддерживают их правильное положение.

Актуальность исследования топографической анатомии пахового канала и его грыжевых дефектов обусловлена несколькими ключевыми факторами, связанными с медицинской практикой и общественным здоровьем. Основные идеи, рассмотренные в данной статье, включают:

1. Анатомические особенности. Описание структуры и расположение пахового канала, его содержание и связи с другими органами.
2. Эмбриологию пахового канала
3. Клиническое значение пахового канала, которое заключается в том, что он относится к слабым местам стенки брюшной полости и в нём могут образовываться паховые грыжи.
4. Механизмы формирования грыжевых дефектов и факторов, способствующих их развитию на примере скользящих грыж.
5. Современную пластику скользящих грыж.

Таким образом, паховый канал играет ключевую роль в функционировании репродуктивной и мочевыделительной систем. Понимание топографической анатомии пахового канала необходимо для диагностики и лечения грыжевых дефектов, которые могут возникать в этой области. Цель исследования: провести анализ литературных данных, посвященных топографо-морфологическому строению пахового канала и современной пластике скользящих грыж.

Ключевые слова: паховый канал, паховая связка, скользящая грыжа, строение, грыжевые дефекты, патология.

Введение

Паховый канал (лат. *canalis inguinalis*) располагается над внутренней половиной паховой связки и имеет косое направление: сверху вниз, снаружи внутрь и сзади наперед. Длина его у мужчин 4–5 см; у женщин он несколько длиннее, но по сравнению с мужским более узок длиной 4–5–6 см.

Паховый канал выполняет функцию сообщения между брюшной полостью и внешней средой.

Анатомия

Паховый канал представляет собой щель между широкими мышцами живота, над медиальной половиной паховой связки, через которую у мужчин проходит семенной канатик *n. ilioinguinalis* и *ramus genitalis n. genitofemoralis*, у женщин – круглая маточная связка (*lig. teres uteri*) *n. ilioinguinalis* и *ramus genitalis n. genitofemoralis* [2].

В паховом канале различают 4 стенки и 2 отверстия. Передней стенкой канала считается апоневроз наружной косой мышцы живота, верхней стенкой – нижние края внутренней косой и поперечной мышц живота. Нижняя стенка образована загнутым кзади и кверху нижним краем паховой связки; задняя стенка образована поперечной фасцией [2] (рис. 1)




Рис. 7.15. Задняя стенка пахового канала, глубокое паховое кольцо, пунктиром обозначен треугольник Хессельбаха: 1 — *linea arcuata*; 2 — *m. rectus abdominis*; 3 — *linea alba*; 4 — *trigonum inguinale* (Hesselbach); 5 — *falx inguinalis*; 6 — *pubis pubica*; 7 — *lig. lacunar*; 8 — *anulus femoralis* (белый пунктир); 9 — *lig. pectinale*; 10 — анастомоз между *a. ovario-uterina* и *a. epigastrica inferior*; 11 — *a. ovario-uterina*; 12 — *ductus deferens*; 13 — *m. pectoreus*; 14 — *a. epigastrica inferior*; 15 — *a. v. ilioa. externa*; 16 — *a. v. testicularis*; 17 — *anulus inguinalis profundus*; 18 — *fascia transversalis* (отрезана); 19 — *lig. inguinale*; 20 — *spina iliaca anterior superior*




Рис. 7.14. Передняя стенка пахового канала и поверхностное паховое кольцо: 1 — *spina iliaca anterior superior*; 2, 3 — *ramus cutaneus lateralis*; 4 — апоневроз *m. obliquus externus abdominis*; 5 — *n. iliohypogastricus* (*n. cutaneus anterior*); 6 — *fascia cremasterica*; 7 — *m. cremaster*; 8 — *funiculus spermaticus*, покрытый *fascia spermatica externa*; 9 — *n. ilioinguinalis*; 10 — *anulus inguinalis superficialis*; 11 — *crus laterale anulus inguinalis superficialis*; 12 — *fibre intercostales*; 13 — *crus mediale anulus inguinalis superficialis*; 14 — *lig. inguinale*; 15 — *fascia lata*

Рис. 1. Строение пахового канала [1]

Поверхностное паховое кольцо, *anulus inguinalis superficialis*, образовано двумя расходящимися ножками апоневроза наружной косой мышцы живота, медиальная из которых прикрепляется около симфиза, а наружная – к лобковому бугорку. Задняя стенка образована поперечной фасцией. В медиальной части она укреплена паховым серпом, *falx inguinalis* (связка Генле [Henle]), соединившимися апоневрозами внутренней косой и поперечной мышц живота. [1].

Часть **задней стенки пахового канала** внутри от *a. et v. epigastricae inferiores* называют треугольником Хессельбаха (Hesselbach). Его границы: снизу – паховая связка (подвздошно-лобковый тракт), латерально – нижние надчревные сосуды, медиально – наружный край прямой мышцы живота. Через этот треугольник выходят прямые паховые грыжи.

Глубокое паховое кольцо, *anulus inguinalis profundus*, представляет собой воронкообразное углубление в поперечной фасции (задней стенке канала). Глубокому паховому кольцу со стороны брюшной полости соответствует латеральная паховая ямка. Кольцо расположено на 1–1,5 см выше середины паховой связки. С медиальной стороны к нему прилежит начальный отдел *a. epigastrica inferior*. У глубокого пахового кольца сходятся элементы семенного канатика, входящие (*a. testicularis*) и выходящие (*ductus deferens, v. testicularis*) из пахового канала [1].

Паховый канал находится в паховой области.

Паховая область (лат. *regio inguinalis*) в топографической анатомии – зона нижнемедиального участка передней брюшной стенки, прилегающая к бедру (рис. 2).




Рис. 2. Строение паховой области

Особенности строения паховой области обуславливают наличие «слабых мест», в пределах которых часто образуются грыжи.

Грыжей живота (*hernia abdominalis*) называется выходение из брюшной полости ее содержимого через естественное или вновь образовавшееся в брюшной стенке отверстие при сохранении целостности брюшины. В состав грыжи входят грыжевые ворота, грыжевой мешок и грыжевое содержимое [4].

Выпячивание паховой области не всегда указывает на наличие грыжи, поскольку другие поражения, включая опухоли, кисты и гематомы, также влияют на эту область [5].

Эмбриология

Образование пахового канала связано с процессом опускания яичка у мальчиков (рис. 3) и с формированием круглой связки матки у девочек [6].

Скользящие грыжи

Скользящей называют грыжу, при которой через грыжевые ворота в подкожную клетчатку вместе с грыжевым мешком выходит орган, частично расположенный забрюшинно и не имеющий брыжейки (мочевой пузырь), или орган, имеющий короткую брыжейку (различные отделы толстой кишки: слепая, восходящая, нисходящая). Такой орган называют соскальзывающим, а грыжу – скользящей [8].

Различают паховые, бедренные, поясничные скользящие грыжи. Они могут быть односторонними и двусторонними, вправимыми и невправимыми (чаще невправимыми), ущемленными и неущемленными, встречаются как у мальчиков, так и у девочек. Соскальзывающий орган вместе с париетальной брюшиной является стенкой грыжевого мешка.







Рис. 3. Опускание яичка (схема): I – 4-й месяц внутриутробного развития; II–7-й месяц; III –8-й месяц; IV – конец 9-го месяца; 1 – testis; 2– peritoneum; 3–fascia endoabdominalis; 4–покровы; 5–processus vaginalis; 6– gubernaculum testis; 7–os pubis; 8–ductus deferens; 9–облитерированный processus vaginalis; 10–tunica vaginalis testis 11– fascia spermatica interna [1]

Иногда стенку грыжевого мешка образует стенка органа, лишь частично покрытого брюшиной, например стенка мочевого пузыря, слепой, сигмовидной кишки. В одних случаях большая часть грыжевого мешка представлена брюшиной, меньшая – соскальзывающим органом, в других – наоборот (рис. 4).




Рис. 4. Скользящая грыжа: слепой кишки (слева), мочевого пузыря (справа) [9]

Скользящие грыжи обычно бывают паховыми и составляют 1–1,5% от всех паховых грыж. Скользящие грыжи толстой кишки чаще бывают при косых паховых грыжах, скользящие грыжи мочевого пузыря при прямых паховых грыжах. [9].

Реже в грыжевом мешке можно обнаружить петлю толстой кишки – слева сигмовидную, справа – слепую, иногда в грыжу может выходить мочевой пузырь (рис. 4). Нераспознанные во время операции скользящие грыжи представляют большую опасность, так как возможно интраоперационное повреждение органов, составляющих часть стенки грыжевого мешка. При некрозе слепой кишки следует выполнить правостороннюю гемиколэктомию из срединной лапаротомии, при некрозе сигмовидной кишки выполняется резекция сигмовидной кишки. Некроз стенки мочевого пузыря является показанием к резекции мочевого пузыря и наложению эпцистостомы [9].

Этапы формирования грыжи

Развитие грыжи – это поэтапный процесс, в котором изменяется как анатомическая картина, так и клинические проявления. В хирургии принято выделять три стадии:

1. Начальная стадия (латентная или доклиническая)
На этом этапе грыжевой мешок формируется, но внешнее выпячивание отсутствует.
 2. Развернутая стадия (формирование выпячивания)
Появляется заметное выпячивание в паховой области.
Это наиболее частая стадия, при которой пациенты обращаются за помощью. На этом этапе лечение паховой грыжи без операции уже неэффективно: грыжевой мешок стабильно сформирован.
 3. Осложненная стадия
При прогрессировании болезни возможны:
 - ущемление паховой грыжи (когда органы сдавливаются в грыжевых воротах);
 - воспаление грыжевого содержимого (энтерит, цистит, оментит);
 - неврастимность (особенно у пожилых людей);
 - вторичные проблемы – нарушения мочеиспускания, запоры, боли в пояснице.
- На этом этапе стоит вопрос уже не о дискомфорте, а о риске жизни, так как существует риск развития некроза кишечника и перитонита [10].

Осложнения при оперативном лечении грыж

Интраоперационные:

1. Повреждение крупных сосудов, чаще – бедренной вены, реже – артерии при глубоком прошивании пауперной связки при паховой грыже или рассечение бедренного кольца в латеральном направлении – при бедренной грыже;
2. Ранение мочевого пузыря или кишки – при скользящих, ущемленных, неврастимых больших послеоперационных паучных и рецидивных грыжах (важно своевременно обнаружить и ушить дефект).
3. Повреждение семенного канатика и ранение семявыносящего протока при паховых грыжах.
4. Повреждение подвздошно-пахового и подвздошно-чревного нервов.

Послеоперационные:

1. Парез кишечника.
2. Кровотечения в брюшную полость, гематома в зоне операции.
3. Воспалительный инфильтрат, обычно связанный с грубым выполнением операции.

4. Тромбоз мезентериальных сосудов.
5. Тромбозы вен бедер и таза – обусловленные этим эмболии.
6. Отеки мошонки, семенного канатика, атрофия яичка [11].

Современная пластика скользящих грыж

Особенностью скользящей грыжи является то, что в состав стенки ее грыжевого мешка входит полостной орган, наружная (внегрыжевая) поверхность которого не покрыта брюшиной. Чаще всего встречаются скользящие правосторонние паховые грыжи слепой кишки. Слепая кишка образует заднелатеральную стенку мешка [2]. Оперативная техника при скользящих грыжах состоит в ушивании отверстия в брюшине и возвращении на место органа. С этой целью грыжевой мешок широко вскрывают в отдалении от органа, составляющего его стенку. Грыжевое содержимое вправляют и накладывают изнутри грыжевого мешка кисетный шов отступая от края органа на 2–3 см (рис. 5). Избыток грыжевого мешка дистальнее кисетного шва отсекают. Затягивая кисетный шов, одновременно хирург или ассистент пальцами погружает грыжевое содержимое, осторожно возвращая вышедший орган или часть сальника на место, в полость живота. После этого шов окончательно завязывают [3].




Рис. 5. Ушивание грыжевых ворот при скользящей паховой грыже: наложение внутреннего кисетного вида [3]

Изучению риска послеоперационных осложнений и повторной операции из-за рецидива у пациентов со скользящей грыжей в зависимости от метода хирургического вмешательства: лапароскопического или открытого (по Лихтенштейну), посвящен ряд исследований и научных работ. В одно из таких исследований были включены пациенты мужского пола, которым провели операцию по удалению грыжи в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2017 года. Данные были получены из Национальной базы данных о грыжах Дании. Всего было проведено 32 396 операций по устранению грыж. 13,5% пациентов страдали от скользящей грыжи. Не было выявлено различий в частоте послеоперационных осложнений при скользящих и нескользящих боковых грыжах (5,1% против 4,2% за 90 дней наблюдения). У пациентов, которым была проведена операция по методу Лихтенштейна, риск незначительных осложнений был выше, чем у пациентов, которым была проведена лапароскопическая операция, однако в целом риск был низким (1,9% против 0,8%). Хирургическое лечение рецидива было проведено у 3,1% пациентов. Скользящие грыжи можно безопасно лечить как методом Лихтенштейна, так и лапароскопическим методом [7].

Вывод

Топографическая анатомия пахового канала делает его зоной повышенной уязвимости для формирования грыж, что объясняется особенностями эмбриологического развития и структурой стенок. Скользящие грыжи требуют особой осторожности при проведении операции, чтобы избежать травмирования вовлеченных органов. Открытые и лапароскопические методы лечения показывают схожие результаты по уровню осложнений и рецидивов, давая врачам свободу выбора оптимальной техники. Все перечисленное подтверждает необходимость комплексной диагностики и индивидуального подхода к каждому пациенту для успешного устранения грыжевых патологий.

Литература

1. А.В. Николаев /Топографическая анатомия и оперативная хирургия//Учебное издание – 2014-с. 456–463, 541.
2. Г. Е. Островерхов, Ю.М. Бомаш /Оперативная хирургия и топографическая анатомия// Уч. литература для студентов мед. вузов – 2008 – с. 512–519, 563, 564.

3. В.В. Кованов, Т.И. Аникина, Сычеников И.А. /Оперативная хирургия и топографическая анатомия//Уч. литература для студентов мед. вузов – 2001 – с. 322–325, 330, 331.

4. А. Продромиду 1, Н. Махайрас 2, З. Гаруфалия 3, И.Д. Костакис 3, А.В. Кириакидис 4, Е. Спарталис 3, Г.С. Сотиропулос 3 / Паховая грыжа яичников // Журнал хирургических исследований на английском языке. Февраль 2020 г.;102 (2):75–83. doi: 10.1308 / rcsann.2019.0137. Опубликовано 7 ноября 2019.PMID: 31696731

5. Нельсон Марсио Гомеш Казерта 1, Тьяго Хосе Пенахим 1, Эвандро Браз Контарди 1, Райсса Клара Фонсека Барбоса 1, Тайса Лазари Гомеш 1, Даниэль Лахан Мартинс 1 2 / Содержание пахового канала: идентификация по разным методам визуализации / Caserta NMG, Penachim TJ, Contardi EB, Barbosa RCF, Gomes TL, Martins DL. Радиол Брас.. 2021 Январь-Февраль; 54(1): 56–61. doi: 10.1590 / 0100–3984.2020.0006.

6. В.А. Тараканов, В.М. Старченко, В.М. Надгериев /Паховые грыжи у детей. Водянка оболочек яичка. Крипторхизм/ Уч. методическое пособие для студентов мед. вузов – 2011 – с. 5–7.

7. Рецидивы и осложнения после пластики скользящей паховой грыжи. Бодилсен А., Брандсборг С., Фриис-Андерсен Х.Грыжа. 2022, август;26(4):1047–1052. doi: 10.1007/s10029-022-02633-7. Опубликовано 3 июня 2022 года.PMID: 35657488

8. Скользящие паховые грыжи у детей Д.м.н., проф. А.Е. СОЛОВЬЕВ, О.В. ЛАРИЧЕВА, О.А. КУЛЬЧИЦКИЙ* ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава РФ, Рязань, Россия

9. Грыжи передней брюшной стенки (клиника, диагностика, лечение). Учебное пособие для студентов медицинских вузов. – М.: Издательский дом «Русский врач», 2009. – 84 с. Авторы: С.С. Харнас, докт. мед. наук, профессор; А.В. Самохвалов, канд. мед. наук, доцент; Л.И. Ипполитов, канд. мед. наук, доцент. Москва 2009

10. Лекция: «Грыжи живота» Гомельский Государственный Медицинский университет. Доцент Берещенко В.В.

11. Хирургические болезни. Учебно – методическое пособие/ Под редакцией Чернядьев С.А. – Екатеринбург, 2019. – 39с.

TOPOGRAPHIC AND MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE INGUINAL CANAL AND MODERN PLASTIC SURGERY FOR HERNIAS

Kuzmina D.S., Okuneva E.R., Radzivil M.P., Drozdik A.R.
V.I. Vernadsky Crimean Federal University

The inguinal canal is an important topographic structure located in the lower part of the inguinal region. It is formed by muscles and fascia that protect the internal organs and maintain their correct position.

The relevance of the study of the topographic anatomy of the inguinal canal and its hernial defects is due to several key factors related to medical practice and public health.

The main ideas discussed in this article include:

1. Anatomical features. Description of the structure and location of the inguinal canal, its contents, and connections with other organs.

2. Embryology of the inguinal canal

3. The clinical significance of the inguinal canal, which consists in the fact that it refers to the weak points of the abdominal wall and inguinal hernias can form in it.

4. Mechanisms of formation of hernial defects and factors contributing to their development on the example of sliding hernias.

5. Modern plastic surgery for sliding hernias.

Thus, the inguinal canal plays a key role in the functioning of the reproductive and urinary systems. Understanding the topographic anatomy of the inguinal canal is necessary for the diagnosis and treatment of hernia defects that may occur in this area.

The purpose of the study is to analyze the literature data on the topographic and morphological structure of the inguinal canal and modern hernia repair techniques

Keywords: inguinal canal, inguinal ligament, sliding hernia, structure, hernia defects, pathology.

References

1. A.V. Nikolaev /Topographic Anatomy and Operative Surgery//Textbook – 2014-p. 456–463, 541.

2. G. E. Ostroverkhov, Yu.M. Bomash /Operative Surgery and Topographic Anatomy// Educational Literature for Medical Students – 2008 – pp. 512–519, 563, 56

3. V.V. Kovanov, T.I. Anikina, I.A. Sychenikov /Operative Surgery and Topographic Anatomy//Educational Literature for Medical Students – 2001 – p. 322–325, 330, 331.

4. A Prodromidou 1, N Machairas 2, Z Garoufalia 3, I D Kostakis 3, A V Kyriakidis 4, E Spartalis 3, G C Sotiropoulos 3 / Ovarian inguinal hernia// Ann R Coll Surg Engl. 2020 Feb;102(2):75–83. doi: 10.1308/rcsann.2019.0137. Epub 2019 Nov 7.PMID: 31696731

5. Nelson Marcio Gomes Caserta 1, Thiago José Penachim 1, Ewandro Braz Contardi 1, Rayssa Clara Fonseca Barbosa 1, Thaisa Lazari Gomes 1, Daniel Lahan Martins 1 2/ Contents of the inguinal canal: identification by different imaging methods/ Caserta NMG, Penachim TJ, Contardi EB, Barbosa RCF, Gomes TL, Martins DL. Radiol Bras. 2021 Jan-Feb;54(1):56–61. doi: 10.1590/0100-3984.2020.0006.

6. V. A. Tarakanov, V.M. Starchenko, V.M. Nadgeriev /hérnia inguinal em crianças. Hidropisia testicular. Criptorquidia / manual de ensino para estudantes de medicina. 2011-p. 5–7.

7. Recurrence and complications after sliding inguinal hernia repair. Bodilsen A, Brandsborg S, Friis-Andersen H.Hernia. 2022 Aug;26(4):1047–1052. doi: 10.1007/s10029-022-02633-7. Epub 2022 Jun 3.PMID: 35657488

8. Sliding inguinal hernias in children, Doctor of Medicine, Professor A.E. SOLOVYOV, O.V. Laricheva, O.A. Kulchitsky* Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov" Ministry of Health of the Russian Federation, Ryazan, Russia

9. Hernia of the anterior abdominal wall (clinical features, diagnostics, treatment). Textbook for medical students. – Moscow: Russian Doctor Publishing House, 2009. – 84 p. Authors: S.S. Kharnas, Doctor of Medical Sciences, Professor; A.V. Samokhvalov, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor; L.I. Ippolitov, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor. Moscow, 2009

10. Lecture: "Abdominal Hernias" Gomel State Medical University. Associate Professor V.V. Bereshchenko.

11. Surgical Diseases. Educational and Methodological Guide/ Edited by S.A. Chernyadyev. – Yekaterinburg, 2019. – 39p.

Куница Виктор Николаевич,

к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренней медицины,
Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
E-mail: kunitsa-viktor@mail.ru

Мартынова Екатерина Витальевна,

студент кафедры пропедевтики внутренней медицины, Ордена Трудового
Красного Знамени медицинского института имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ «КФУ имени В.И. Вернадского»
E-mail: elena.martynova.1970@mail.ru

Сейт-Умерова Джемиле Ризаевна,

студент кафедры пропедевтики внутренней медицины, Ордена Трудового
Красного Знамени медицинского института имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ «КФУ имени В.И. Вернадского»
E-mail: seitumerova06@list.ru

Скрипченко Кирилл Андреевич,

студент кафедры пропедевтики внутренних болезней Ордена Трудового
Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского»
E-mail: skripchenkocyryll@yandex.ru

В статье рассматриваются современные физические методы диагностики, меняющие классическую пропедевтику внутренних болезней в цифровую эпоху. Изучается общемировая тенденция интеграции высоких технологий в клиническую практику, с акцентом на уменьшение размеров оборудования и применение портативных ультразвуковых систем (POCUS), цифровых стетоскопов и неинвазивных биосенсоров [1, 2, 9]. Подробно анализируются новые подходы к объективной оценке состояния пациента: автоматизированный подсчет В-линий при ультразвуковом исследовании легких, использование искусственного интеллекта для анализа звуковой картины сердца, а также применение вибрационно-контролируемой транзитной эластографии (VCTE) для точной диагностики болезней печени [3, 10].

Основная цель работы – показать, что современные инструменты диагностики не заменяют основные навыки врача, а помогают повысить точность и безопасность лечения. Обосновывается, что цифровая диагностика позволяет увидеть и измерить те показатели, которые раньше оценивались только субъективно [7]. При этом, авторы обращают внимание на необходимость критического анализа данных, указывая на ограничения методов, связанные с особенностями телосложения пациентов (ожирение, асцит) или воспалительными процессами. Представленный обзор клинических случаев и перспектив показывает, что сочетание классического врачебного подхода и современных технологий создает качественно новый уровень медицинской помощи.

Ключевые слова: физикальные методы диагностики, пропедевтика внутренних болезней, миниатюризация оборудования, портативные ультразвуковые системы, цифровые стетоскопы, неинвазивные биосенсоры, искусственный интеллект, вибрационно-контролируемая транзитная эластография, точность диагностики.

Введение

Пропедевтика внутренних болезней традиционно считается базой врачебного искусства и основой клинического мышления. Долгое время классические методы обследования – пальпация, перкуссия и аускультация – были основными инструментами диагностики [5]. Сейчас мы видим, как технологии меняют медицину: традиционные методы сочетаются с высокими технологиями, создавая новое направление – расширенное физикальное исследование. За последние 10–15 лет у врачей появились небольшие цифровые инструменты, которые не просто дополняют, а значительно расширяют возможности обследования. Портативные ультразвуковые системы (POCUS), цифровые стетоскопы с искусственным интеллектом, неинвазивные биосенсоры и алгоритмы анализа данных превращают врача в высокоточный диагностический комплекс [2, 6, 9]. Важно понимать, что использование этих технологий не означает отказа от традиционных навыков. Наоборот, современные устройства помогают врачу, объективно оценивают данные осмотра, повышают их точность и позволяют подтвердить клинические данные в реальном времени.

В данной работе представлен обзор современных и перспективных физикальных методов и устройств, описывающий принципы их работы, применение в медицине и ограничения.

Цель работы – показать, что технология в руках врача – это не замена мышления, а инструмент для повышения точности и безопасности пациента.

Материалы и методы

Данная работа – это обзорно-аналитическое исследование, посвященное современным физическим методам диагностики, использующимся в пропедевтике внутренних болезней. В качестве основы исследования был проведен анализ научной литературы и клинических рекомендаций, опубликованных за последние десять лет. Для сбора данных использовались международные электронные базы данных, а также медицинские журналы и материалы конференций. Особое внимание уделялось публикациям о развитии портативных ультразвуковых систем (POCUS), цифровых стетоскопов, неинвазивных биосенсоров и интеллектуальных систем обработки диагностической информации [7].

При выборе материала предпочтение отдавалось исследованиям, мета-анализам и авторитетным руководствам, описывающим принципы работы, применение, преимущества и недостатки современных диагностических устройств и методов поддержки принятия решений врачом.

Анализ данных включал изучение технических особенностей новых разработок, оценку их эффективности в различных областях медицины и сравнение с традиционными методами диагностики. Особое внимание уделялось факторам, влияющим на точность результатов, и особенностям использования технологий в медицинской практике.

Характеристика методов

Современная медицина переживает технологические изменения, важным направлением которых стало уменьшение размеров диагностического оборудования. Одним из главных примеров является широкое применение портативных ультразвуковых систем, известных как POCUS (Point-of-Care Ultrasound). Это стало возможным благодаря развитию цифровых технологий и микроэлектроники, позволивших объединить возможности больших стационарных систем в компактных устройствах [9]. Сейчас такие аппараты стали не просто дополнительным инструментом, а дополнением к классическим методам осмотра, расширяя возможности врача.

Востребованность портативных УЗИ-систем объясняется их мобильностью и удобством. Небольшие размеры и вес позволяют использовать их практически везде: от приемных отделений больниц до машин скорой помощи.

Область применения портативного УЗИ охватывает почти все основные направления медицины. В экстренной помощи они помогают быстро найти внутренние кровотечения и повреждения органов при травмах. В кардиологии портативные датчики позволяют быстро выявить признаки сердечной недостаточности и нарушений ритма, а в хирургии – точно определить местоположение патологических

очагов и новообразований. В акушерстве и гинекологии эти системы используются для контроля состояния плода, а неврологи применяют их для оценки кровотока в мозге. Таким образом, использование POCUS-систем не просто расширяет возможности врача, но и создает новую систему оказания помощи пациентам, основанную на раннем выявлении заболеваний и снижении риска осложнений.

Одним из активно развивающихся направлений POCUS стала ультразвуковая диагностика легких, которая в последние годы изменилась благодаря внедрению систем автоматического анализа [10]. Важным признаком отека легких при ультразвуковом исследовании являются В-линии – специфические вертикальные гиперэхогенные артефакты, идущие от линии плевры. Раньше их подсчет проводился врачом субъективно, но современные портативные системы, такие как GE Vscan, Clarius или Butterfly IQ, оснащенные искусственным интеллектом, позволяют получать объективные количественные данные. Программное обеспечение может в реальном времени сканировать до 28 зон легких, автоматически определяя изменения (наличие 3 и более линий в одной зоне) и рассчитывая суммарный показатель – LUS-скор (шкала Вольпичелли, от 0 до 88 баллов).

Клиническое значение автоматизированной оценки В-линий особенно важно при работе с пациентами с сердечной недостаточностью. Высокий LUS-скор (более 15 баллов) является признаком отека легких, позволяя диагностировать заболевание на ранней стадии и контролировать процесс лечения. Снижение общего балла на 50% в течение первых 24 часов говорит об эффективности лечения. Также, технология интегрируется в протокол BLUE, помогая исключить пневмоторакс или подтвердить наличие плеврального выпота. В обучении такие системы могут стать полезным инструментом, позволяя студентам сравнивать данные аускультации и перкуссии с цифровой картинкой.

Другое направление развития портативных диагностических устройств – цифровой стетоскоп, который превращает классическую аускультацию в инструмент объективного анализа [2]. В отличие от обычного стетоскопа, цифровой преобразует звуковые колебания в электронный сигнал, что значительно улучшает качество восприятия звуков сердца и дыхания (Таблица 1). Благодаря системам шумоподавления и усиления сигнала, врач может детально прослушивать пациента даже в шумных условиях, что важно при оказании помощи вне больницы. Возможность записи и сохранения аудиоданных позволяет сохранять «звуковой архив» пациента для сравнения изменений.

Таблица 1. Сравнительная характеристика традиционного и цифрового стетоскопа.

Признак	Традиционный стетоскоп	Цифровой стетоскоп
Усиление звука	Нет	Да
Шумоподавление	Нет	Да
Универсальность для аускультации внутренних органов	Да	Не у всех моделей
Запись и передача данных	Нет	Да
Использование алгоритмов ИИ	Нет	Да
Зависимость от источника питания	Нет	Да
Стоимость устройства и сменных частей	Низкая	Высокая

Современные цифровые стетоскопы часто оснащают искусственным интеллектом, что позволяет в реальном времени анализировать звуковые паттерны, сравнивая их с базами данных болезней [6, 7]. Алгоритмы помогают врачу автоматически классифицировать сердечные шумы, выявлять признаки пороков клапанов, определять хрипы при хронической обструктивной болезни легких или астме. Искусственный интеллект помогает врачу, проводя первичный анализ и сообщая об отклонениях от нормы, что снижает риск ошибки из-за усталости или недостатка опыта.

Наряду с развитием портативной визуализации и интеллектуальной аускультации, произошел прогресс в методах оценки состояния печени. Важную роль здесь играет вибрационно-контролируемая транзитная эластография (VCTE), примером которой является технология FibroScan [3]. Этот метод является альтернативой биопсии, позволяя точно диагностировать степень фиброза и стеатоза печени без операции. В основе работы системы лежит принцип создания механической волны, которая проходит через ткани органа. Скорость прохождения волны зависит от плотности печеночной ткани: чем выше степень поражения, тем быстрее фиксируется сигнал. Компьютерная обработка

данных позволяет определить показатель жесткости в килопаскалях (кПа), предоставляя врачу объективные параметры [4].

Несмотря на точность, результаты могут быть менее достоверными у пациентов с асцитом, ожирением или при воспалительных процессах. Противопоказаниями являются наличие кардиостимулятора и повреждения кожи в зоне контакта с датчиком. Тем не менее, для большинства пациентов метод является оптимальным выбором. Быстрое получение результата, возможность проведения в амбулаторных условиях и отсутствие рисков делают эластографию полезным инструментом раннего выявления патологий, включая цирроз и гепатоцеллюлярную карциному.

Закключение

В заключение, развитие технологий оказало влияние на физикальное обследование в пропедевтике внутренних болезней. Уменьшение размеров и цифровизация привели к широкому использованию портативных ультразвуковых систем (POCUS), цифровых стетоскопов и неинвазивных биосенсоров [2, 6, 9]. Эти инструменты расширили возможности врача, значительно повысили точность и информативность диагностики.

Практическая значимость инноваций подтверждается успехами в диагностике: автоматизированный подсчет В-линий (LUS-скор) позволяет врачам точно выявлять отек легких и контролировать динамику заболевания [10]. Искусственный интеллект в цифровых стетоскопах вывел аускультацию на новый уровень, уменьшая субъективность и обеспечивая поддержку при принятии решений. Вибрационно-контролируемая транзитная эластография (VCTE) позволяет быстро и безопасно оценивать изменения в печени, предлагая альтернативу сложным процедурам [3, 4].

Несмотря на преимущества, любая технология имеет ограничения. Зависимость точности приборов от особенностей пациента, таких как ожирение, асцит или воспалительные процессы, требует от врача критического мышления и анализа данных. Это подтверждает, что современные методы диагностики являются дополнением классического осмотра. Их использование способствует раннему выявлению патологий, снижению риска осложнений и улучшению результатов лечения. Будущее пропедевтики – в сочетании навыков врача и цифровых технологий, что формирует новый стандарт медицинского обслуживания [5].

Литература

1. Абдуманнон угли Хусанов У., Мейрбек Бахитбай угли Кудратиллаев, Бобирбек Норпулат угли Сиддилов, Саияра Балтабаевна Довлетова. Искусственный интеллект в медицине // «Наука и образование», научное периодическое издание. – 2023. – Т. 4, № 5. – С. 772–782.
2. Гаранин А.А., Айдумова О.Ю., Рубаненко А.О., Бибикова Е.Г. Цифровой стетоскоп – новая эра аускультации // Digital Diagnostics. – 2024. – Т. 5, № 4. – С. 808–818.
3. Стилиди Е.И., Кляритская И.Л., Максимова Е.В., Мошко Ю.А., Иськова И.А. Вибрационно-контролируемая транзитная эластография печени у пациентов с «жировой болезнью печени» с учётом новой номенклатуры // Крымский терапевтический журнал. – 2024. – № 4. – С. 51–58.
4. Жирков И.И., Гордиенко А.В., Павлович И.М., Яковлев В.В., Сердюков Д.Ю., Эластография в диагностике фиброза при хронических диффузных заболеваниях печени // Вестник Российской военной медицинской академии. – 2020. – № 4 (72). – С. 192–195.
5. Куница В.Н., Шахназаров А.А., Лудан В.В., Воронцова О.Д., Пропедевтика внутренних болезней, как первая клиническая дисциплина // Образование от «А» до «Я». – № 3. – 2025. – С. 62–66.
6. Лаптева Е. А. и др. Применение технологии «нейронных сетей» для выявления и мониторинга аускультативных феноменов при диагностике заболеваний органов дыхания // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2020. – Т. 18. – № 3. – С. 230–235.
7. Шабардин А. М., Корнилова В.Е., Силуков М.Ю. Применение искусственного интеллекта в диагностике заболеваний //Актуальные исследования. – 2025. – № 39 (274). – С. 17–26.
8. Шаталова О. В. и др. Технологии биоимпедансной спектроскопии в системах поддержки принятия решений при диагностике социально значимых заболеваний // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. – 2024. – Т. 13. – № 4. – С. 148–174.
9. Chelikam N., Vyas A., Desai R. et al. Past and Present of Point-of-Care Ultrasound (PoCUS): A Narrative Review // Cureus. – 2023. – Vol. 15, No. 12.

10. Picard F. et al. Artificial Intelligence in Lung Ultrasound: Differentiation of COVID-19 Pneumonia from Other Causes of Acute Dyspnea // *Ultrasound in Medicine & Biology*. – 2021.

NEW «PHYSICAL METHODS» IN INTERNAL MEDICINE PROPAEDEUTICS

Kunitsa V.N., Martynova E.V., Seit-Umerova D.R., Skripchenko K.A.
V.I. Vernadsky Crimean Federal University

This article examines modern physical diagnostic methods that are transforming classical internal medicine propaedeutics in the digital era. It investigates the global trend of integrating high technologies into clinical practice, with a focus on device miniaturization and the application of Point-of-Care Ultrasound (POCUS) systems, digital stethoscopes, and non-invasive biosensors. New approaches to objective patient assessment are analyzed in detail, including automated B-line quantification in lung ultrasound, the use of artificial intelligence for cardiac acoustic pattern analysis, and the application of Vibration-Controlled Transient Elastography (VCTE) for precise liver disease diagnosis.

The primary objective of this work is to demonstrate that modern diagnostic tools do not replace fundamental clinical skills but rather augment them to enhance diagnostic accuracy and patient safety. It is argued that digital diagnostics enable the visualization and quantification of parameters that were previously assessed only subjectively. Furthermore, the authors highlight the necessity of critical data analysis, pointing out methodological limitations related to patient body habitus (obesity, ascites) or acute inflammatory processes. The presented overview of clinical applications and future prospects demonstrates that the synergy between classical clinical approaches and modern technologies establishes a qualitatively new standard of medical care.

Keywords: physical diagnostic methods, internal medicine propaedeutics, device miniaturization, Point-of-Care Ultrasound, digital stethoscopes, non-invasive biosensors, artificial intelligence, Vibration-Controlled Transient Elastography, diagnostic accuracy.

References

1. Husanov U.A., Kudratillaev M.B., Siddikov B.N., Dovletova S.B. Artificial Intelligence in Medicine // *Nauka i Obrazovaniye*. – 2023. – Vol. 4 № 5. – P. 772–782.
2. Garanin A.A., Aidumova O.Yu., Rubanenko A.O., Bibikova E.G. Digital Stethoscope – A New Era of Auscultation // *Digital Diagnostics*. – 2024. – Vol. 5 № 4. – P. 808–818.
3. Stilidi E.I., Klyaritskaya I.L., Maksimova E.V., Moshko Yu.A., Is'kova I.A. Vibration-Controlled Transient Elastography of the Liver in Patients with “Fatty Liver Disease” Considering the New Nomenclature // *Krymskiy Terapevticheskiy Zhurnal*. – 2024. – Vol. 4. – P. 51–58.
4. Zhirkov I.I., Gordienko A.V., Pavlovich I.M., Yakovlev V.V., Serdyukov D. Yu. Elastography in the Diagnosis of Fibrosis in Chronic Diffuse Liver Diseases // *Vestnik Rossiiskoi Voenno-Meditsinskoi Akademii*. – 2020. – Vol. 4. – P. 192–195.
5. Kunitsa V.N., Shakhnazarov A.A., Ludan V.V., Vorontsova O.D. Propaedeutics of Internal Diseases as the First Clinical Discipline // *Obrazovanie ot “A” do “Ya”*. – 2025. – Vol. 3. – P. 62–66.
6. Lapteva E.A., et al. Application of “Neural Network” Technology for the Detection and Monitoring of Auscultatory Phenomena in the Diagnosis of Respiratory Diseases // *Zhurnal Grodnenskogo Gosudarstvennogo Meditsinskogo Universiteta*. – 2020. – Vol. 18 № 3 – P. 230–235.
7. Shabardin A.M., Kornilova V.E., Silukov M. Yu. Application of Artificial Intelligence in Disease Diagnostics // *Aktual'nye Issledovaniya*. – 2025. – Vol. 39. – P. 17–26.
8. Shatalova O.V., et al. Technologies of Bioimpedance Spectroscopy in Decision Support Systems for the Diagnosis of Socially Significant Diseases // *Izvestiya Yugo-Zapadnogo Gosudarstvennogo Universiteta. Series: Management, Computer Engineering, Informatics. Medical Instrumentation*. – 2024. – Vol. 13 № 4. – P. 148–174.
9. Chelikam N., Vyas A., Desai R., et al. Past and Present of Point-of-Care Ultrasound (PoCUS): A Narrative Review // *Cureus*. – 2023. – Vol. 15 № 12.
10. Picard F., et al. Artificial Intelligence in Lung Ultrasound: Differentiation of COVID-19 Pneumonia from Other Causes of Acute Dyspnea // *Ultrasound in Medicine & Biology*. – 2021. – Vol. 47 № 1. – P. 1–10.

Состояние полости рта и зубов у детей с врожденными пороками сердца, сопровождающиеся легочной артериальной гипертензией

Магомедова Асият Алиевна,

врач узд, педиатр, детский кардиолог, ассистент ИС и ЧЛХ, Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
E-mail: medikids1@mail.ru

Сулейманова Амина Шарафутдиновна,

стоматолог-терапевт, ассистент ИС и ЧЛХ, Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

Шогенова Жанпага Леоновна,

стоматолог-терапевт, ассистент ИС и ЧЛХ, Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

Введение: Проблема сердечно-сосудистых заболеваний является одной из важнейших в педиатрической практике из-за многообразия клинических форм, сложности диагностики и лечения, а также образования пороков сердца. Сочетание в свою очередь врожденного порока сердца с осложнением в виде легочной артериальной гипертензии и различных заболеваний зубочелюстной системы остается актуальной и малоизученной. Задача нашего исследования заключается в сравнительной характеристике ВПС с ЛАГ на фоне различного состояния полости рта. Цель исследования: Изучить динамику состояния полости рта у детей с ВПС-ЛАГ и детей, не страдающих патологией сердечно-сосудистой системы. Материалы и методы: Нами изучены 3 группы пациентов (дети с 3-х до 17-ти лет в рандомном порядке): Первую группу составили дети, имеющие врожденный порок сердца, сопровождающийся легочной артериальной гипертензией после коррекции с заболеваниями полости рта и зубов. Вторая группа – дети с ВПС-ЛАГ без патологии зубочелюстного аппарата. Третья группа – дети без патологии со стороны сердечно-сосудистой системы и полости рта. Исследование проводилось на базе Института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии г. Нальчик за период с декабря 2023 года по февраль 2024 год. Результаты: Среди изучаемого контингента детей первую группу составило 10 пациентов с врожденным пороком сердца и находящиеся на диспансерном наблюдении после коррекции. Ко-второй группе из 10 человек мы отнесли детей без патологии со стороны зубочелюстного аппарата, но имеющих врожденный порок сердца, сопровождающийся легочной артериальной гипертензией в послеоперационном периоде. В третьей группе изучалось состояние полости рта у детей без патологии зубочелюстного аппарата и врожденного дефекта со стороны сердечно-сосудистой системы. В ходе исследования выявлено, что дети первой группы, более подвержены к присоединению вторичной инфекции, несмотря на длительный прием заранее назначенных антибактериальных препаратов до стоматологической процедуры. У детей с врожденными пороками по сравнению с детьми, имеющими другие сердечно-сосудистые заболевания, и со здоровыми детьми наблюдают наиболее высокие показатели например, кариеса зубов, нарушения питания тканей зубочелюстной системы, что объясняется гипоксией и нарушением микрофлоры полости рта. Выводы: Детям с врожденными пороками сердца врач-кардиолог согласованно со стоматологом должен применять индивидуальный стоматологический протокол лечения во избежание бактериального осложнения, тем самым становится очевидным, что пациент из группы повышенного риска должен находиться на контроле на период лечения и реабилитации.

Ключевые слова. Детская кардиология, детская стоматология, лекарственные средства, осложнения, врожденные пороки сердца у детей.

Введение

Проблема сердечно-сосудистых заболеваний является одной из важнейших в педиатрической практике из-за многообразия их клинических форм, сложности диагностики и лечения больных, а также из-за образования пороков сердца. Проблема сочетанного воздействия на организм ребенка с врожденным пороком сердца, осложненным легочной артериальной гипертензией и различных заболеваний зубочелюстной системы остается актуальной и малоизученной. Изменения полости рта при различных врожденных пороках сердца могут протекать одинаково (цианоз слизистой, отечность, поражения губ и др.), и в то же время лечение стоматологических заболеваний при врожденных пороках сердца, сопровождающихся легочной артериальной гипертензией (ЛАГ) имеет свои индивидуальные особенности. [11]

Рассматривая врожденные пороки сердца, которые являются одной из основных причин детской инвалидности и летальности, следует более расширенно подойти к выбору медикаментозной терапии на момент профилактики и лечения зубов и полости рта. Например, замедленное прорезывание зубов, ортодонтические аномалии, гипоплазия эмали, плохая гигиена полости рта, являются распространенными клиническими находками среди пациентов с врожденными пороками сердца. Последние исследования подтверждают, что заболевания зубочелюстной системы могут иметь негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Воспалительные процессы в полости рта способствуют попаданию бактерий в кровоток, что, в свою очередь, может спровоцировать воспаление сосудов и повлиять на сердечный ритм. В связи с этим заболевания полости рта рассматриваются как фактор риска воспалительных осложнений сердечно-сосудистых заболеваний (Гордон ЛВ.Д., 2001; Beck J.Д., 2001; Курамису Х.К., 2001) [2].

Доказано, что уровень здорового состояния полости рта может быть связан с общим состоянием здоровья, включая здоровье сердца. Это связано с тем, что бактерии, обнаруженные при заболеваниях полости рта, могут попасть в кровоток и вызвать известную инфекцию сердца, как эндокардит.

Инфекционный эндокардит – серьезное заболевание, которое может вызвать воспаление внутренней оболочки сердца, а также развитие осложнения имеющегося порока, что может привести даже к инсульту и эмболии. Поэтому, если у ребенка имеются заболевания зубов (кариес и его осложнения) и пародонта, санация полости рта может помочь предотвратить развитие инфекции эндокарда и снизить риск проблем с сердцем.

Цель работы

Изучить динамику состояния полости рта у детей с ВПС-ЛАГ и детей, не страдающих патологией сердечно-сосудистой системы.

Материалы и методы

Нами изучены 3 группы пациентов (дети с 3-х до 17-ти лет в рандомном порядке): Первую группу составили дети, имеющие врожденный порок сердца сопровождающийся легочной артериальной гипертензией после коррекции с заболеваниями полости рта и зубов. Вторая группа – дети с ВПС-ЛАГ без патологии зубочелюстного аппарата. Третья группа – дети без патологии со стороны сердечно-сосудистой системы и полости рта. Исследование проводилось на базе Института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии г. Нальчик за период с декабря 2024 года по январь 2025 года.

Нами учитывались возрастные параметры, сопутствующие заболевания со стороны других органов и систем, течение коррекционного ВПС. Анализ сравнительной динамики показан на диаграмме с помощью программы Excel.

Результаты

Среди изучаемого контингента детей, первую группу составили 10 пациентов с врожденным пороком сердца и находящиеся на диспансерном наблюдении после коррекции. Ко-второй группе из 10 человек мы отнесли детей без патологии со стороны зубочелюстного аппарата, но имеющих врожденный порок сердца, сопровождающийся

легочной артериальной гипертензией в послеоперационном периоде. В третьей группе изучалось состояние полости рта у детей без патологии зубочелюстного аппарата и врожденного дефекта со стороны сердечно-сосудистой системы. В ходе исследования выявлено, что дети первой группы более подвержены к присоединению вторичной инфекции несмотря на длительный прием заранее назначенных антибактериальных препаратов до стоматологической процедуры. У детей с врожденными пороками по сравнению с детьми, имеющими другие сердечно-сосудистые заболевания, и со здоровыми детьми наблюдают наиболее высокие показатели например, кариеса зубов, нарушения питания тканей зубочелюстной системы, что объясняется гипоксией и нарушением микробиоты полости рта. Это объясняется и в работе Тулегенова Г.М./ 2017 г. [4], который заметил, что пациенты с пороками сердца имеют более высокий риск развития нарушений минерального обмена в виде гипокальциемии и остеопороза при длительном лечении и применении глюкокортикоидов, антибиотиков, вследствие снижения иммунитета. Также следует выделить длительное пребывание больных детей в стационаре и тяжесть общего состояния (лихорадка, недомогание, утомляемость, боли), приводящие к ухудшению гигиены полости рта и высокому уровню распространенности заболеваний зубочелюстной системы у детей [3]. А при осложненных формах врожденного порока сердца – (ЛАГ), риск возникновения заболеваний со стороны зубочелюстного аппарата увеличивается в разы. При пороке сердца все факторы, обусловленные изменениями сосудов, нарушениями кровообращения, обмена веществ, трофики тканей, сдвигами в функциональном состоянии органов и систем организма, влияют на очищающую функцию полости рта, состав слюны, местный иммунологический и микробиологический баланс [1].

В половине случаев у детей наблюдается диффузный хронический катаральный стоматит (цианотичность и отечность слизистой оболочки щек, десен и языка), что обусловлено значительным нарушением кровообращения, так как при декомпенсации заболеваний сердечно-сосудистой системы нарушение кровообращения отражается и на слизистой оболочке десен и органов полости рта. Наиболее частым локальным патологическим процессом со стороны мягких тканей полости рта при всех формах заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей является поражение губ. В клинике хейлита преобладает выраженная сухость губ, преимущественно на фоне бледной и реже – гиперемизированной красной каймы с различной интенсивностью шелушения. Учитывая специфический анамнез обследованных детей (почти постоянное назначение антибиотиков и глюкокортикоидов), можно предположить, что высокая частота поражения губ может быть связана с побочным действием лекарственных препаратов, в частности, с активизацией сапрофитных дрожжеподобных грибов. [11]

В микробиологическом составе полости рта выявлено наличие *Candida albicans*, *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*. Данное обнаружение подтверждается и ранее проведенным исследованием в работе А.Р. Сафиуллиной «Микробиологический состав пищеварительного тракта у детей раннего возраста с врожденными пороками сердца» 2012 г. [12]

Выводы

1. Таким образом, с ежегодным увеличением разновидностей лекарственных препаратов на фармакологическом рынке, врач обязан собрать подробный анамнез жизни пациента, знать о всех лекарственных препаратах, принимаемых им и принять соответствующие меры для снижения риска развития побочных действий.

2. Детям с врожденными пороками сердца врач-кардиолог согласованно со стоматологом должен применить индивидуальный стоматологический протокол лечения во избежание бактериального осложнения, тем самым пациент с группы повышенного риска должен находиться на контроле на период лечения и реабилитации.

Литература

1. Чорпа М.Е. и др. 2012, Писарева А.Д., Matvienkoe B. 2018;
2. Гордон Л.Д., 2001; Beck J.D., 2001; Курамису Х.К., 2001;
3. Козлитина И.Ю. 2011, Skakodub A.A. 2019.
4. Тулегенова Г.М. (2017).
5. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия (сборник иллюстрированных клинических задач и тестов): учебное пособие / ред.: О.З. Топольницкий, С.В. Дьякова, В.П. Васькович. – М.: ГЭОТАР-МЭД, 2007. – 192с.

6. Детская хирургия: национальное руководство / ред.: Ю.Ф. Исаков, А.Ф. Дронов. – М.: ГЭОТАР-МЭД, 2009. – 1168с.

7. Сапин М.Р. Атлас анатомии человека для стоматологов / М.Р. Сапин, Д.Б. Никитюк Л.М. Литвиненко. – М.: ГЭОТАР-МЭД, 2009. – 600с.

8. Стоматология детей и подростков: Пер. с англ. / Под ред. Р.Е. Макдональда, Д.Р. Эйвери. – М.: Мед. информ. агентство, 2003. – 766с.

9. Краткий курс лекций по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии / Г.П. Рузин. – Киев.: «Книга плюс», 2006. – 232с.

10. Стоматология: учебник / ред.: проф. В.А. Козлова. – СПб.: Спецлит, 2011. – 386с.

11. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. В.К. Леонтьев, Л.П. Кисельникова, 2017 г.-952стр. https://estomatology.ru/prensa/literatura/detskaya_terapevticheskaya_stomatologiya.php

12. Научно-практический журнал. Медицинский вестник Башкортостана. https://mvb-bsmu.ru/files/journals/2_2012.pdf.

ORAL AND DENTAL HEALTH IN CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS ASSOCIATED WITH PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION

Magomedova A.A, Suleymanova A.Sh, Shogenova Zh.L.

Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery

Introduction: Cardiovascular disease is a critical issue in pediatric practice due to its diverse clinical forms, the complexity of diagnosis and treatment, and the development of heart defects. The combination of congenital heart disease with complications such as pulmonary arterial hypertension and various dental diseases remains challenging and poorly understood. The objective of our study is to compare CHD with PAH against the background of different oral health conditions. **Study Objective:** To study the dynamics of oral health in children with CHD-PAH and children without cardiovascular pathology. **Materials and methods:** We studied three groups of patients (children aged 3 to 17 years, randomly assigned): The first group consisted of children with congenital heart disease accompanied by pulmonary arterial hypertension after correction for oral and dental diseases. The second group included children with congenital heart disease and pulmonary arterial hypertension without dental pathology. The third group included children without cardiovascular or oral pathology. The study was conducted at the Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery in Nalchik from December 2023 to February 2024. **Results:** Among the children studied, the first group consisted of 10 patients with congenital heart defects undergoing follow-up after correction. The second group of 10 included children without dental pathology but with congenital heart defects accompanied by pulmonary arterial hypertension in the postoperative period. The third group examined the oral health of children without dental pathology or congenital cardiovascular defects. The study revealed that children in the first group were more susceptible to secondary infections, despite prolonged use of prescribed antibacterial medications prior to the dental procedure. Compared to children with other cardiovascular diseases and healthy children, children with congenital defects exhibited higher rates of dental caries and malnutrition of dental tissues, which is explained by hypoxia and a disruption of the oral microbiota. **Conclusions:** For children with congenital heart defects, a cardiologist, in consultation with a dentist, must apply an individual dental treatment protocol to prevent bacterial complications. This makes it clear that a patient from a high-risk group must be monitored during treatment and rehabilitation.

Keywords: Pediatric cardiology, pediatric dentistry, medications, complications, congenital heart defects in children.

References

1. Chorpа M. Et al. 2012, Pisareva A.D., Matvienkoe B. 2018;
2. Gordon L.D., 2001; Beck J.D., 2001; Kuramisu H.K., 2001;
3. Kozlitina I. Yu. 2011, Skakodub A.A. 2019.
4. Tulegenova G.M. (2017).
5. Pediatric surgical dentistry and maxillofacial surgery (a collection of illustrated clinical problems and tests): a textbook / ed.: O.Z. Topolnitsky, S.V. Dyakova, V.P. Vashkevich. – M.: GEOTAR-MED, 2007. – 192 p.
6. Pediatric Surgery: National Guidelines / ed. by Yu.F. Isakov, A.F. Dronov. – Moscow: GEOTAR-MED, 2009. – 1168 p.
7. Sapin M.R. Atlas of Human Anatomy for Dentists / M.R. Sapin, D.B. Nikityuk, L.M. Litvinenko. – Moscow: GEOTAR-MED, 2009. – 600 p.
8. Dentistry of Children and Adolescents: Trans. from English / ed. by R.E. McDonald, D.R. Avery. – Moscow: Medical Information Agency, 2003. – 766 p.
9. Brief Course of Lectures on Surgical Dentistry and Maxillofacial Surgery / G.P. Ruzin. – Kyiv.: "Kniga Plus", 2006. – 232 pages.
10. Dentistry: textbook / ed.: prof. V.A. Kozlova. – St. Petersburg: Spetslit, 2011. – 386 pages.
11. Pediatric Therapeutic Dentistry. National Guide. V.K. Leontyev, L.P. Kiselnikova, 2017. – 952 pages. https://estomatology.ru/prensa/literatura/detskaya_terapevticheskaya_stomatologiya.php
12. Scientific and practical journal. Medical Bulletin of Bashkortostan. https://mvb-bsmu.ru/files/journals/2_2012.pdf.

Малкова Алла Аркадьевна,

доцент, кандидат медицинских наук, кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, Ижевский государственный медицинский университет

Смирнова Кристина Сергеевна,

студент, кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, Ижевский государственный медицинский университет

Мухомтдинова Ильнара Ильфатовна,

студент, кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, Ижевский государственный медицинский университет

В статье представлен комплексный анализ современных представлений о нейропластичности как фундаментальной основе восстановления функций после инсульта. Актуальность исследования обусловлена высокой распространенностью инсульта, ведущего к стойкой инвалидизации, и необходимостью повышения эффективности реабилитационных мероприятий. Целью работы является систематизация знаний о механизмах нейропластичности и обзор методов их стимуляции. В статье подробно рассматриваются ключевые нейробиологические процессы: синаптическая пластичность, аксональный спраунтинг, функциональная реорганизация коры, нейрогенез и роль глиальных клеток. Особое внимание уделено анализу эндогенных и экзогенных факторов, влияющих на пластический потенциал (возраст, сроки реабилитации, коморбидность), а также центральной роли нейротрофического фактора мозга (BDNF) как молекулярного медиатора восстановления. Проведен сравнительный анализ современных методов стимуляции нейропластичности, включая классические физиотерапевтические подходы, технологии неинвазивной нейромодуляции (TMC, tDCS), а также инновационные разработки (роботизированная терапия, виртуальная реальность, интерфейсы «мозг-компьютер»). Научная новизна работы заключается в обобщении и структурировании разрозненных данных для формирования целостной картины биологических основ восстановления. Практическая значимость определяется возможностью использования представленного материала для обоснования персонализированных, комбинированных программ нейрореабилитации, направленных на максимальную реализацию пластического потенциала мозга.

Ключевые слова: нейропластичность, инсульт, реабилитация, синаптическая пластичность, нейротрофический фактор мозга (BDNF), транскраниальная магнитная стимуляция (TMC), функциональная реорганизация коры, нейрогенез, виртуальная реальность, персонализированная медицина.

Инсульт остаётся одной из наиболее значимых медицинских и социально-экономических проблем современности. Высокая распространённость, существенный вклад в смертность и частая утрата трудоспособности делают это заболевание ведущей причиной стойкой инвалидизации взрослого населения. Последствия инсульта нередко требуют длительной, комплексной и ресурсоёмкой реабилитации, направленной на восстановление двигательных, когнитивных и речевых функций. В условиях старения населения и роста распространённости факторов риска актуальность поиска эффективных методов восстановления после инсульта стремительно возрастает.

Одним из ключевых направлений современной нейрореабилитации является изучение и использование механизмов нейропластичности. Нейропластичность определяется как способность центральной нервной системы перестраивать свои структуры и функции в ответ на повреждение, обучение или изменение условий внешней среды. Благодаря этим механизмам мозг способен перераспределять функциональные зоны, формировать новые нейронные связи и компенсировать утраченные функции, что является фундаментом для восстановления после очагового поражения.

За последние годы значительно расширились знания о нейробиологических основах пластичности, включая процессы синаптической перестройки, изменения активности корковых сетей, активации латентных нейронных путей и участия нейротрофических факторов. Эти данные послужили основой для разработки новых реабилитационных технологий, направленных на стимуляцию пластических процессов: роботизированной терапии, интенсивного повторного обучения, транскраниальной стимуляции, биологической обратной связи, виртуальной реальности и других методов.

Несмотря на существенный прогресс, остаются вопросы, требующие дальнейшего изучения: оптимальные сроки и интенсивность реабилитации, индивидуальные особенности пластичности, сочетание разных терапевтических подходов и влияние сопутствующих факторов на восстановление. В этой связи анализ современных представлений о механизмах нейропластичности и возможностях их стимуляции имеет важное практическое и научное значение.

Механизмы нейропластичности

Восстановление функций после инсульта основано на способности головного мозга перестраивать свою структуру и функциональную организацию, компенсируя утрату нейронных связей и восстанавливая нарушенные сети. Этот комплекс адаптивных изменений объединяется понятием нейропластичности и включает несколько взаимосвязанных механизмов, обеспечивающих постепенное восстановление нарушенных функций.

Одним из ключевых процессов является синаптическая пластичность – способность нейронов изменять силу и эффективность своих синаптических соединений. После инсульта в неповрежденных участках мозга наблюдаются процессы долговременной потенциации, усиливающей передачу сигнала по активно используемым путям, и долговременной депрессии, которая ослабляет малоэффективные или поврежденные связи. Благодаря такой перестройке формируются новые функциональные маршруты, которые компенсируют разрушенные нейронные цепи и обеспечивают постепенное восстановление двигательных, сенсорных и когнитивных навыков.

Параллельно этому происходит аксональный спраунтинг – рост новых отростков нейронов, формирующих дополнительные контакты в зонах, где связи были нарушены. Нейроны соседних неповрежденных областей стремятся занять освободившиеся синаптические пространства, создавая альтернативные пути для проведения нервного импульса. Повышенная продукция нейротрофических факторов в первые недели после повреждения стимулирует этот процесс и способствует формированию новых проводящих трактов, частично восполняющих утраченные функции.

Эти клеточные перестройки тесно связаны с функциональной реорганизацией коры, которая проявляется в перераспределении функций между различными зонами мозга. Участки коры, расположенные рядом с зоной инсульта или в противоположном полушарии, постепенно берут на себя выполнение утраченных функций, что обеспечивает компенсацию повреждения. Такой процесс особенно активно поддер-

живается реабилитационными вмешательствами, основанными на повторяющемся целенаправленном движении и обучении, что способствует укреплению новых нейронных сетей.

Дополнительным элементом восстановления является нейрогенез – образование новых нейронов, которое у взрослых людей сохраняется в ограниченных областях, прежде всего в гиппокампе. После инсульта этот процесс усиливается: стволовые клетки начинают пролиферировать, мигрировать в зону повреждения и частично дифференцироваться в нейрональные клетки. Хотя вклад нейрогенеза в восстановление двигательных функций ограничен, он играет важную роль в улучшении памяти, обучаемости и эмоциональной регуляции в поздние сроки реабилитации.

Значимым компонентом нейропластических процессов является участие глиальных клеток – астроцитов, микроглии и олигодендроцитов. Астроциты обеспечивают регуляцию химической микросреды, поддерживают баланс нейромедиаторов, выделяют трофические факторы, стимулирующие синаптическую перестройку и рост аксонов. Микроглия выполняет защитную функцию, удаляя повреждённые клетки и создавая условия для формирования новых связей, хотя её чрезмерная активация может поддерживать воспаление. Олигодендроциты участвуют в ремиелинизации аксонов, восстанавливая скорость и качество проведения импульсов по повреждённым путям. Совместная работа этих клеток формирует благоприятные условия для регенерации тканей и эффективной перестройки нейронных сетей.

Факторы, влияющие на нейропластичность

Эффективность восстановления после инсульта в значительной степени определяется тем, насколько активно и полноценно в головном мозге запускаются механизмы нейропластичности. Однако выраженность пластических процессов различается между пациентами и зависит от ряда биологических, клинических и психосоциальных факторов, влияющих на потенциал реорганизации нервной системы.

Одним из наиболее значимых факторов является возраст пациента. У молодых людей способность мозга к перестройке структур и формированию новых нейронных соединений выражена значительно сильнее благодаря высокой интенсивности синаптической пластичности, лучшему аксональному росту и более активному нейрогенезу. С возрастом пластический потенциал снижается, что связано с уменьшением уровня нейротрофических факторов, замедлением клеточного метаболизма и большей выраженностью дегенеративных процессов. Поэтому прогноз восстановления у молодых пациентов обычно более благоприятный.

Не менее важным является время начала реабилитации. Наиболее интенсивные пластические изменения происходят в первые недели после инсульта, когда мозг находится в состоянии повышенной чувствительности к обучению и внешним стимулам. Раннее подключение реабилитационных мероприятий позволяет максимально использовать этот период, усиливая синаптическую перестройку, аксональный спраутинг и функциональную реорганизацию коры. Напротив, длительная задержка начала реабилитации снижает возможность формирования полноценных компенсаторных нейронных сетей и уменьшает конечный объём восстановленных функций.

Значительную роль играет тип и локализация инсульта. При ишемическом поражении нейронные сети повреждаются постепенно, и часть клеток сохраняет жизнеспособность в зоне ишемической полутени, что создаёт условия для более выраженной пластичности. При геморрагическом инсульте повреждение ткани может быть более массивным, а окружающее воспаление – сильнее, что ограничивает возможности восстановления. Локализация также определяет потенциал реорганизации: поражение моторных или сенсорных корковых областей, а также подкорковых проводящих путей по-разному влияет на способность мозга формировать новые функциональные связи.

Коморбидные состояния оказывают существенное влияние на пластичность. Сахарный диабет, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания и хронические воспалительные процессы ухудшают микроциркуляцию, усиливают оксидативный стресс и снижают активность нейротрофических факторов. Депрессия, часто возникающая после инсульта, дополнительно негативно влияет на способность к обучению и адаптации, а также снижает мотивацию пациента к участию в реабилитации. В совокупности эти факторы могут значительно уменьшать эффективность восстановления.

Психологические и когнитивные особенности пациента также играют важную роль. Высокая мотивация, активное участие в терапевтических занятиях, положительный эмоциональный фон и сохранённые когнитивные функции усиливают процессы обучения и закрепления новых двигательных и поведенческих навыков. Напротив, когнитивные нарушения, апатия, тревога или эмоциональная нестабильность могут

существенно ограничивать степень включения пластических процессов, снижая эффект от реабилитационных программ.

Роль факторов роста и нейротрофинов

Факторы роста и нейротрофины играют ключевую роль в нейропластичности, обеспечивая выживание нейронов, восстановление повреждённых сетей и образование новых связей после инсульта. Наиболее значимым среди них является BDNF (brain-derived neurotrophic factor) – основной регулятор синаптической пластичности. Это белок человека, кодируемый геном BDNF. BDNF – относится к нейротрофинам, веществам, стимулирующим и поддерживающим развитие нейронов. Он усиливает долговременную потенциацию, стимулирует рост аксонов и дендритов, улучшает обучение и способствует формированию новых нейронных цепей. Высокий уровень BDNF связан с более успешным восстановлением двигательных и когнитивных функций.

Помимо BDNF, важную роль играют NGF, GDNF и IGF-1. NGF поддерживает выживание нейронов и участвует в когнитивных процессах; GDNF обладает выраженным нейропротективным эффектом и стимулирует аксональный рост; IGF-1 способствует нейрогенезу и репарации ткани мозга.

Уровень нейротрофинов может изменяться под влиянием внешних факторов. Особенно мощным стимулятором является физическая активность, которая повышает экспрессию BDNF и ускоряет восстановление. Дополнительный эффект даёт применение антидепрессантов (например, SSRIs), которые также увеличивают уровни BDNF и усиливают пластические процессы.

Методы стимуляции нейропластичности при инсульте

В клинической практике используют широкий спектр подходов – от классической лечебной физкультуры до нейромодуляционных технологий, виртуальной реальности и систем нейрорегуляции. Эти методы различаются по механизму действия, но объединены общей целью – усилить формирование функционально значимых нейронных сетей и способствовать более полному восстановлению двигательных, когнитивных и эмоциональных функций.

1) Физиотерапевтические методы

Физиотерапевтические подходы являются фундаментом реабилитации и наиболее доказано стимулируют механизм «обучения через повторение», лежащий в основе синаптической перестройки. Наиболее значимым среди них является *лечебная физкультура и кинезотерапия*, которые строятся на многократном повторении целевых движений. Такое повторение активирует нейронные цепи, вовлечённые в выполнение движения, способствует долговременной потенциации и формированию новых моторных паттернов. Правильно организованные тренировки не только восстанавливают утраченные навыки, но и предотвращают патологические компенсации, которые могут мешать эффективной реорганизации коры.

Особое место занимает терапия с использованием зеркала, при которой пациент наблюдает отражение движущейся здоровой конечности, воспринимая его как движение поражённой. Этот метод активирует зеркальные нейроны, расположенные в премоторной коре, и усиливает моторное представление движения даже при невозможности его полного выполнения. *Зеркальная терапия* способствует активации моторных зон поражённого полушария и улучшает контроль над конечностью.

Функциональная электростимуляция также играет важную роль в активации нейронных цепей: электрический импульс вызывает сокращения мышц, имитируя естественные паттерны движения и тем самым формируя связь между сенсорным входом и моторным ответом. Это помогает включать в работу частично повреждённые проводящие пути и способствует более быстрому восстановлению двигательной функции.

Важным дополнением являются *механотерапия и роботизированные тренажёры*. Роботизированные устройства позволяют выполнять многократно точные, контролируемые движения, что усиливает процесс моторного обучения по принципу интенсивности и повторяемости. Такие технологии особенно полезны при тяжёлых нарушениях, когда пациент сам не может обеспечить достаточный объём активных движений.

1) Нейромодуляционные методы

Развитие методов неинвазивной стимуляции мозга открыло новые возможности для направленного воздействия на пластичность. Одним из наиболее изученных способов является *транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)*. Посредством магнитного поля ТМС модифицирует активность моторной коры, повышая её возбудимость в поражённом полушарии и подавляя гиперактивность контралатеральной стороны, которая может препятствовать восстановлению. Такая

балансировка межполушарных взаимодействий способствует улучшению передачи моторных сигналов и повышает способность мозга к формированию новых движений.

Другим эффективным методом является *транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS)*, при которой слабый электрический ток изменяет мембранный потенциал нейронов и повышает или снижает их возбудимость. Анодальная tDCS стимулирует корковые моторные зоны поражённого полушария, усиливая процессы обучения, в то время как катодальная стимуляция подавляет чрезмерную активность противоположного полушария. В комбинации с физической терапией tDCS значительно ускоряет восстановление двигательных и когнитивных функций.

2) *Медикаментозная стимуляция нейропластичности*

Фармакологическая поддержка всё шире применяется для усиления пластических процессов. К препаратам, влияющим на нейропластичность, относят ноотропы, нейропротекторы и некоторые антидепрессанты. Нейропептидные препараты, такие как церебролизин, обладают нейротрофическим эффектом, активируя BDNF-подобные механизмы и способствуя росту аксонов и синапсов. Ноотропы, включая пирацетам, улучшают метаболизм нервной ткани и повышают способность нейронов к образованию новых связей. Особый интерес представляют ингибиторы обратного захвата серотонина, такие как флуоксетин, которые повышают уровни BDNF и улучшают мотивацию, участвуя как в биологических, так и в психоэмоциональных механизмах восстановления.

3) *Когнитивная и поведенческая терапия*

Когнитивная реабилитация направлена на восстановление памяти, внимания, исполнительных функций и речевых навыков – всех тех аспектов, которые также зависят от нейропластичности. Тренировка когнитивных функций стимулирует реорганизацию корковых сетей, укрепляет связи между отделами мозга и улучшает способность к обучению. Логопедическая терапия активирует речевые зоны и формирует альтернативные языковые сети, что особенно важно после афазий. Поведенческие методы и обучение новым стратегиям также способствуют перестройке нейронных цепей, обеспечивая более устойчивые компенсаторные навыки.

4) *Новые направления стимуляции пластичности*

Современные технологии предлагают новые подходы к усилению восстановления. Одним из них является использование *виртуальной реальности (VR)*, которая создаёт безопасную и мотивирующую среду для активного выполнения движений. VR повышает вовлечённость пациента, обеспечивает точную визуальную и сенсорную обратную связь и активирует высшие центры моторного контроля, усиливая реорганизацию нервных сетей.

Музыкотерапия и методы биологической обратной связи (БОС) также оказывают выраженный стимулирующий эффект. Музыкальные ритмы улучшают синхронизацию двигательных центров, а БОС позволяет пациенту видеть в реальном времени физиологические параметры движения или мышечной активности, тем самым способствуя целенаправленной коррекции и укреплению функциональных связей.

Одним из наиболее перспективных направлений являются *нейро-интерфейсы*, позволяющие считывать сигналы мозга и превращать их в движения протезов, роботизированных систем или виртуальных объектов. Такие технологии формируют новые нейронные маршруты и обеспечивают прямое обучение мозговых сетей посредством обратной связи. Использование искусственного интеллекта позволяет адаптировать тренировочные программы под индивидуальные особенности пациента, усиливая эффект реабилитации.

Перспективы и проблемы

Несмотря на значительный прогресс в изучении нейропластичности, многие вопросы восстановления после инсульта остаются дискуссионными. Доказано, что ранняя реабилитация, физические упражнения, когнитивные тренировки и некоторые методы нейромодуляции улучшают функциональные исходы. Однако эффективность многих технологий остаётся неоднородной и не всегда подтверждается крупными исследованиями, что связано со сложностью механизмов пластичности и индивидуальными различиями пациентов.

Основная проблема заключается в том, что один и тот же метод может давать разные результаты у разных больных. На восстановление влияют возраст, тяжесть инсульта, сопутствующие заболевания, когнитивное и эмоциональное состояние. Это делает необходимым индивидуальный подход, подбор оптимального набора и интенсивности реабилитационных мероприятий.

Перспективы области связаны с развитием персонализированных программ, использованием данных нейровизуализации, цифровых технологий и мультидисциплинарного подхода. Комплексное воздей-

ствие на моторные, когнитивные и эмоциональные функции позволяет более полно использовать потенциал нейропластичности и повышать эффективность реабилитации.

Заключение

Проведенный анализ подтверждает, что нейропластичность является фундаментальной биологической основой восстановления функций после инсульта. Современные данные нейронаук демонстрируют, что мозг обладает значительным потенциалом к реорганизации благодаря комплексу взаимосвязанных процессов: от молекулярных изменений синаптической силы (долговременная потенцияция) до макроскопической функциональной перестройки карты двигательных и когнитивных зон коры.

Ключевым выводом работы является констатация того, что спонтанная пластичность часто недостаточна для полноценного восстановления. Эффективная нейрореабилитация представляет собой целенаправленную, научно-обоснованную стимуляцию этих естественных механизмов. Наиболее успешные стратегии, такие как высокоинтенсивное повторяющееся обучение, базируются на принципе «use it or lose it» («используй или потеряешь») и направлены на усиление формирования функционально значимых нейронных ансамблей.

Анализ факторов, влияющих на пластичность, указывает на критическую важность раннего начала реабилитации в период максимальной восприимчивости мозга, а также на необходимость учета индивидуальных особенностей пациента (возраст, локализация поражения, эмоционально-волевая сфера). Нейротрофический фактор BDNF выступает в роли центрального медиатора, связывающего активность (физическую и когнитивную) с структурными и функциональными перестройками мозга.

Современный арсенал методов стимуляции нейропластичности, от доказательной лечебной физкультуры до высокотехнологичной нейромодуляции (TMC, tDCS) и тренировок в виртуальной реальности, позволяет дифференцированно воздействовать на различные уровни нарушений. Перспективным направлением является не поиск одного «золотого стандарта», а разработка комбинированных, последовательных и персонализированных программ. Сочетание методов, одновременно воздействующих на моторные, когнитивные и эмоциональные функции (например, роботизированная терапия + когнитивный тренинг + мотивационная поддержка), способно привести к синергетическому эффекту.

Однако остаются нерешенные проблемы: необходимость более точных биомаркеров (включая нейровизуализационные и молекулярные) для прогнозирования пластического потенциала и контроля эффективности терапии, а также недостаток крупных рандомизированных исследований, сравнивающих долгосрочную эффективность комплексных протоколов.

Таким образом, дальнейший прогресс в нейрореабилитации после инсульта лежит на пути конвергенции фундаментальных знаний о нейропластичности, современных технологий и принципов персонализированной медицины. Только такой подход позволит максимально реализовать врожденную способность мозга к восстановлению, минимизируя степень инвалидизации и улучшая качество жизни пациентов.

Литература

1. Гнездицкий В.В., Суворов Н.Б., Мальцева М.В. Функциональная нейропластичность и восстановительное обучение после инсульта // Неврологический журнал. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 163–171.
2. Дамулин И.В., Екушева Е.В. Инсульт и нейропластичность. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014;114(12):136–142
3. Дамулин И.В. Реабилитация при cerebrovasкулярных заболеваниях: влияние возраста и коморбидности // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2017. – Т. 9, № 3. – С. 4–9.
4. Якупов Э.З., Налбат А.В., Семенова М.В., Тлеганова К.А. Эффективность музыкотерапии в реабилитации больных с инсультом. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017;117(5):14–21.
5. Екушева Е.В. Современные технологии и перспективы нейрореабилитации пациентов после ишемического инсульта. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017;117(12):147–155.
6. Кротенкова М.В., Коновалов Р.Н., Трофимова Т.М. Нейровизуализация пластичности головного мозга у пациентов в восстановительном периоде инсульта // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. – 2021. – Т. 15, № 1. – С. 45–54.
7. Сковрцова В.И., Стаховская Л.В., Клочева Е.Г. Принципы ранней нейрореабилитации пациентов с острым нарушением мозгового

кровообращения // Вестник Российской академии медицинских наук. – 2019. – Т. 74, № 2. – С. 92–99.

8. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. – М.: Медицина, 2001. – 328 с. (Главы, посвященные репаративным процессам).

9. Белова А.Н. Нейрореабилитация: руководство для врачей. – М.: Антидор, 2018. – 736 с. (Главы о факторах, определяющих восстановление).

10. Богданов Р.Р., Захаров Г.А., Вахромеев А.В. Нейротрофические факторы мозга (BDNF) в патогенезе и восстановлении после ишемического инсульта // Неврологический вестник. – 2020. – Т. LII, № 3. – С. 18–25.

11. Ковальчук В.В., Луцкий М.А. Роботизированная механотерапия в реабилитации постинсультных пациентов с двигательными нарушениями // Вестник восстановительной медицины. – 2021. – № 2(96). – С. 15–22.

12. Михайленко А.А., Кудрин В.С. Синаптическая пластичность: молекулярные и клеточные механизмы. – СПб: Наука, 2015. – 215 с.

13. Щелкунов Н.В. Роль глиальных клеток в нейропластичности и восстановлении после повреждения ЦНС // Цитология. – 2018. – Т. 60, № 5. – С. 323–332.

14. Левин О.С., Бойко А.Н., Штульман Д.Р. и др. Зеркальная терапия в реабилитации больных с постинсультным гемипарезом: методические рекомендации. – М., 2016. – 24 с.

15. Лебедева А.В., Суворов Н.Б., Гнездицкий В.В. Транскраниальная магнитная стимуляция в диагностике и лечении последствий инсульта. – М.: Медпресс-информ, 2017. – 176 с.

16. Ласточкин А.В., Прокопенко С.В. Применение технологий виртуальной реальности в нейрореабилитации // Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация. – 2020. – Т. 2, № 2. – С. 145–153.

17. Мясичев Д.А., Шаров М.Н. Интерфейсы «мозг-компьютер» в восстановительном лечении больных после инсульта // Неврологический журнал. – 2019. – Т. 24, № 5. – С. 258–265.

18. Ковражкина Е.А., Яхно Н.Н. Возможности фармакологической стимуляции нейропластичности // Эффективная фармакотерапия. Неврология и психиатрия. – 2018. – № 2. – С. 26–33.

19. Кадыков А.С., Шахпаронова Н.В., Белопасова А.В., Пryanikov И.В. «Нейропластичность и восстановление нарушенных функций после инсульта» // «Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация». – 2019. – Т. 1, № 2. – С. 32–36.

20. Япаров А.Э., Желтышева А.Ю., Шуклин Г.О. и др. «Нейропластичность при ишемическом инсульте» // Материалы XII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». – 2020.

21. Murphy, T. H., & Corbett, D. (2009). Plasticity during stroke recovery: from synapse to behaviour. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(12), 861–872

NEUROPLASTICITY: OPPORTUNITIES FOR RECOVERY AFTER STROKE

Malkova A.A., Smirnova K.S., Mukhultdinova I.I.
Izhevsk State Medical University

This article presents a comprehensive analysis of current understanding of neuroplasticity as the fundamental basis for functional recovery after stroke. The relevance of this study is underscored by the high prevalence of stroke, which leads to persistent disability, and the consequent need to improve the effectiveness of rehabilitation interventions. The aim of this work is to systematize knowledge on the mechanisms of neuroplasticity and to review methods for their stimulation. The article examines in detail the key neurobiological processes: synaptic plasticity, axonal sprouting, functional reorganization of the cortex, neurogenesis, and the role of glial cells. Particular attention is paid to the analysis of endogenous and exogenous factors influencing plastic potential (age, timing of rehabilitation, comorbidity), as well as the central role of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) as

a molecular mediator of recovery. A comparative analysis of modern methods for stimulating neuroplasticity is conducted, including classical physiotherapeutic approaches, non-invasive neuromodulation technologies (TMS, tDCS), and innovative developments (robotic therapy, virtual reality, brain-computer interfaces). The scientific novelty of the work lies in the synthesis and structuring of disparate data to form a coherent picture of the biological basis of recovery. The practical significance is determined by the potential use of the presented material to substantiate personalized, combined neurorehabilitation programs aimed at maximizing the realization of the brain's plastic potential.

Keywords: neuroplasticity, stroke, rehabilitation, synaptic plasticity, brain-derived neurotrophic factor (BDNF), transcranial magnetic stimulation (TMS), functional reorganization of the cortex, neurogenesis, virtual reality, personalized medicine.

References

1. Gnezditsky V.V., Suvorov N.B., Maltseva M.V. Functional neuroplasticity and restorative learning after stroke // *Neurological journal*. – 2020. – Vol. 25, No. 4. – Pp. 163–171.
2. Damulin I.V., Ekusheva E.V. Stroke and neuroplasticity. S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2014; 114 (12): 136–142
3. Damulin I.V. Rehabilitation in cerebrovascular diseases: the influence of age and comorbidity // *Neurology, neuropsychiatry, psychosomatics*. – 2017. – Vol. 9, No. 3. – Pp. 4–9.
4. Yakubov E.Z., Nalbat A.V., Semenova M.V., Tlegenova K.A. Efficiency of music therapy in rehabilitation of patients with stroke. *Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry*. 2017;117(5):14–21.
5. Ekusheva E.V. Modern technologies and prospects for neurorehabilitation of patients after ischemic stroke. *Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry*. 2017;117(12):147–155.
6. Krotenkova M.V., Kononov R.N., Trofimova T.M. Neuroimaging of brain plasticity in patients in the recovery period of stroke // *Annals of Clinical and Experimental Neurology*. – 2021. – Vol. 15, No. 1. – P. 45–54.
7. Skvortsova V.I., Stakhovskaya L.V., Klocheva E.G. Principles of early neurorehabilitation of patients with acute cerebrovascular accident // *Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences*. – 2019. – Vol. 74, No. 2. – P. 92–99.
8. Gusev E.I., Skvortsova V.I. Cerebral ischemia. – Moscow: Meditsina, 2001. – 328 p. (Chapters devoted to reparative processes).
9. Belova A.N. Neurorehabilitation: a guide for doctors. – Moscow: Antidor, 2018. – 736 p. (Chapters on the factors determining recovery).
10. Bogdanov R.R., Zakharov G.A., Vakhromeev A.V. Brain-derived neurotrophic factors (BDNF) in the pathogenesis of and recovery after ischemic stroke // *Neurological Bulletin*. – 2020. – Vol. LII, No. 3. – P. 18–25.
11. Kovalchuk V.V., Lutsky M.A. Robotic mechanotherapy in the rehabilitation of post-stroke patients with movement disorders // *Bulletin of Restorative Medicine*. – 2021. – No. 2 (96). – P. 15–22.
12. Mikhailenko A.A., Kudrin V.S. Synaptic plasticity: molecular and cellular mechanisms. – St. Petersburg: Nauka, 2015. – 215 p.
13. Shchelkunov N.V. The Role of Glial Cells in Neuroplasticity and Recovery after CNS Damage // *Tsitologiya*. – 2018. – Vol. 60, No. 5. – Pp. 323–332
14. Levin O.S., Boyko A.N., Shtulman D.R., et al. Mirror Therapy in the Rehabilitation of Patients with Post-Stroke Hemiparesis: Methodological Recommendations. – Moscow, 2016. – 24 p.
15. Lebedeva A.V., Suvorov N.B., Gnezditsky V.V. Transcranial Magnetic Stimulation in the Diagnosis and Treatment of Stroke Consequences. – Moscow: Medpress-inform, 2017. – 176 p.
16. Lastochkin A.V., Prokopenko S.V. Application of Virtual Reality Technologies in Neurorehabilitation // *Physical and Rehabilitation Medicine, Medical Rehabilitation*. – 2020. – Vol. 2, No. 2. – P. 145–153.
17. Myasishchev D.A., Sharov M.N. Brain-computer interfaces in the rehabilitation treatment of patients after stroke // *Neurological journal*. – 2019. – Vol. 24, No. 5. – P. 258–265.
18. Kovrazhkina E.A., Yakhno N.N. Possibilities of pharmacological stimulation of neuroplasticity // *Effective pharmacotherapy. Neurology and Psychiatry*. – 2018. – No. 2. – P. 26–33.
19. Kadykov A.S., Shakhparonova N.V., Belopasova A.V., Pryanikov I.V. "Neuroplasticity and restoration of impaired functions after stroke" // "Physical and rehabilitation medicine, medical rehabilitation". – 2019. – Vol. 1, No. 2. – Pp. 32–36.
20. Yaparov, A.E., Zheltysheva, A.Yu., Shuklin, G.O., et al. "Neuroplasticity in ischemic stroke" // *Proceedings of the XII International Student Scientific Conference "Student Scientific Forum"*. – 2020.
21. Murphy, T. H., & Corbett, D. (2009). Plasticity during stroke recovery: from synapse to behavior. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(12), 861–872

Дифференциальная диагностика сердечных, почечных, венозных и лимфатических отеков: от пропедевтики к инструментальной верификации

Куница Виктор Николаевич,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренней медицины Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
E-mail: kunitsa-viktor@mail.ru

Трифанова Татьяна Евгеньевна,

студент, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: trif4novatati@yandex.ru

Мустафаева Алие Мустафаевна,

студент, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: alieumus23@gmail.com

Круглякова Дарья Юрьевна,

студент, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: darya.kruglyakova.00@mail.ru

Отечный синдром – одна из наиболее частых причин обращения за медицинской помощью, однако его этиология многообразна и требует тщательной дифференциальной диагностики. В данной статье представлен клинический анализ четырех основных типов отеков: сердечных, почечных, венозных и лимфатических. Мы рассматриваем патофизиологические механизмы, семиотические особенности и современные методы инструментальной верификации. Особое внимание уделено дифференциально-диагностическим алгоритмам, позволяющим практикующему врачу на этапе физикального осмотра предположить генез отека и подтвердить его с помощью лабораторных и инструментальных методов.

Поиск проведен в базах данных PubMed, Scopus, а также в клинических рекомендациях профессиональных ассоциаций за период 2014–2024 г. Критерии включения: исследования, посвященные этиологии, патогенезу, диагностике сердечных, почечных, венозных и лимфатических отеков.

Ключевые слова: отечный синдром, сердечная недостаточность, почечные отеки, хроническая венозная недостаточность, лимфедема, дифференциальная диагностика, инструментальная верификация.

Введение

Учитывая, что пропедевтика внутренних болезней является первой клинической дисциплиной, формирующей алгоритмы врачебного мышления [11], целью данной работы стало развитие этого подхода применительно к дифференциальной диагностике отеочного синдрома. Отеки представляют собой избыточное накопление жидкости в интерстициальном пространстве, которое развивается вследствие дисбаланса между фильтрацией и реабсорбцией жидкости в капиллярах, а также нарушения лимфатического дренажа. В клинической практике врач сталкивается с необходимостью быстрой и точной дифференциации причин отеочного синдрома, поскольку тактика лечения кардинально различается: мочегонная терапия при сердечной недостаточности, иммуносупрессия при гломерулонефрите, компрессионная терапия при варикозе и физиотерапия при лимфедеме.

Сложность диагностики заключается в том, что отеки могут быть генерализованными или локальными, острыми или хроническими, и нередко пациент попадает к специалисту уже на стадии развернутой клинической картины.

Цель исследования: систематизировать знания о ключевых дифференциально-диагностических признаках отеков различного генеза и представить практический алгоритм верификации диагноза.

Задачи

1. Провести анализ патофизиологических механизмов формирования отеков при сердечной, почечной, венозной и лимфатической патологии.
2. Систематизировать клинико-семиотические признаки, позволяющие проводить дифференциальную диагностику на этапе физикального осмотра.
3. Оценить диагностическую значимость лабораторных и инструментальных методов верификации различных типов отеков.
4. Разработать практический алгоритм дифференциальной диагностики отеочного синдрома для оптимизации врачебной тактики.

Патофизиологические механизмы формирования отеков при сердечной, почечной, венозной и лимфатической патологии

Отеки развиваются вследствие дисбаланса транскапиллярного обмена жидкости, который регулируется уравнением Старлинга. Ключевыми факторами являются: гидростатическое давление в капиллярах, онкотическое давление плазмы, проницаемость сосудистой стенки и функция лимфатической системы. Нарушение любого из этих звеньев ведет к избыточному накоплению интерстициальной жидкости.

Сердечные отеки: в основе этих отеков лежит снижение насосной функции сердца, что приводит к активации компенсаторных нейрогуморальных механизмов. Механизм развития происходит вследствие снижения сердечного выброса и активируется ренин-ангиотензин-альдостероновая система. Задержка натрия и воды в почках, а также повышение гидростатического давления в венозном русле. Отеки возникают сначала на нижних конечностях (симметрично), усиливаются к вечеру, сопровождаются акроцианозом, набуханием шейных вен, гепатомегалией [1,6]. При прогрессировании развивается анасарка.

Почечные отеки: почечные отеки имеют два основных патогенетических варианта в зависимости от нозологической формы:

1. Нефритические отеки (при остром гломерулонефрите), происходит снижение клубочковой фильтрации вследствие воспалительного поражения клубочков, активация РААС, первичная задержка натрия и воды, а также повышение гидростатического давления в капиллярах.
2. Нефротические отеки (при нефротическом синдроме), происходит массивная протеинурия, снижение онкотического давления плазмы, вторичная активация РААС вследствие гиповолемии [5,7]. Отеки локализуются в местах с рыхлой клетчаткой (периорбитальная область, лицо – особенно по утрам), распространяются сверху вниз, мягкие, подвижные. Венозные отеки: возникают вследствие нарушения венозного оттока при сохранной функции лимфатической системы.

Механизм развития: несостоятельность клапанного аппарата вен (при варикозной болезни) или обструкция венозного русла (посттромботическая болезнь). Венозный рефлюкс и стаз, повышение гидростатического давления в венозном отделе капилляров, а также увеличение фильтрации жидкости в интерстиций [2,9,10]. Отеки односторонние или асимметричные, локализируются в дистальных отделах конечностей, уменьшаются после возвышенного положения, сопровождаются трофическими изменениями кожи, гиперпигментацией, венозными язвами.

Лимфатические отеки (лимфедема): лимфедема представляет собой хроническое прогрессирующее заболевание, обусловленное нарушением транспортной функции лимфатической системы. Различают первичную и вторичную лимфедему. Современные представления о молекулярных механизмах лимфедемы: воспаление с участием CD4+ Т-клеток, гипертрофия адипоцитов и разрастание жировой ткани, ткаевой фиброз, инициируемый провоспалительными цитокинами [3, 4, 8]. Важно отметить, что в клинической практике нередко встречаются отеки смешанного генеза.

Систематизировать клинко-семиотические признаки, позволяющие проводить дифференциальную диагностику на этапе физикального осмотра

В рамках решения второй задачи мы провели систематический анализ клинко-семиотических признаков отеочного синдрома различного генеза, доступных для выявления на этапе физикального осмотра. Дифференциальная диагностика отеков начинается с определения ключевого признака – симметричности (одно- или двусторонность) поражения.

Базовые семиотические приемы:

1. Симптом Годе – проба на наличие ямки при надавливании. Позволяет дифференцировать отеки, связанные с накоплением жидкости (позитивный симптом), от состояний, обусловленных разрастанием жировой ткани (липедема) или фиброзом (позитивный симптом отсутствует) [6,7].

2. Симптом Stemмера – невозможность захватить в складку кожу тыльной поверхности пальцев стопы. Является ключевым признаком лимфедемы, отличающим ее от отеков венозного или кардиального генеза. Высокая специфичность симптома подтверждена клинко-лимфосцинтиграфическими исследованиями [1, 3, 8].

Современный подход к диагностике отеков нижних конечностей базируется на последовательном сборе информации. Рекомендуется использование структурированного подхода, включающего семь ключевых вопросов для сбора анамнеза [1]. Ключевой ветвящийся алгоритм предполагает разделение отеков на острые/хронические и унilaterальные/билaterальные. Острые унilaterальные отеки (<72 часов): требуют исключения тромбоза глубоких вен (ТГВ) как наиболее жизнеугрожающего состояния. Дифференциальный ряд включает: ТГВ, целлюлит (рожистое воспаление), разрыв подколенной кисты Бейкера. Для оценки вероятности ТГВ применяются валидированные шкалы (Wells score) [1, 2]. Хронические унilaterальные отеки: наиболее частые причины это хроническая венозная недостаточность (ХВН), лимфедема, липедема. При наличии указаний на онкологический анамнез, оперативные вмешательства или лучевую терапию в анамнезе требуется исключение вторичной лимфедемы или обструкции венозного оттока (синдром Мея-Тернера). Билaterальные отеки – как правило, обусловлены системными причинами: сердечная недостаточность (систолическая/диастолическая), почечная патология (нефротический синдром, хроническая болезнь почек), печеночная недостаточность (цирроз), эндокринная патология (микседема), лекарственно-индуцированные отеки.

Систематизация клинических признаков по нозологиям

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) характеризуется острым развитием унilaterальной отеочности, сопровождающейся болезненностью, локальной гипертермией и возможным цианозом кожных покровов. Отмечается расширение поверхностных вен в зоне поражения. Специфическим, хотя и невысокочувствительным признаком является симптом Хоманса – появление боли в икроножной мышце при тыльном сгибании стопы. Для оценки клинической вероятности ТГВ применяется шкала Wells.

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) проявляется хронической отеочностью, которая уменьшается в положении лежа и при возвышенном положении конечности. Характерно наличие варикозно расширенных вен [2, 4].

Кожные покровы претерпевают характерные изменения: появляется гиперпигментация вследствие отложения гемосидерина, развивается липодерматосклероз, приводящий к «бутылкообразной» деформации

голеи, формируются участки атрофии белой кожи. Трофические язвы при ХВН классически локализуются над медиальной лодыжкой.

Лимфедема представляет собой хроническое прогрессирующее заболевание, проявляющееся унilaterальной или билaterальной отеочностью. Патогномоничным клиническим признаком является положительный симптом Stemмера – невозможность захватить в складку кожу тыльной поверхности пальцев стопы. По мере прогрессирования заболевания развиваются необратимые фиброзные изменения, гиперкератоз и папилломатозные разрастания кожи, что соответствует поздним стадиям (III стадия – слоновость) [3, 4].

Липедема встречается практически исключительно у женщин и характеризуется билaterальным симметричным увеличением нижних конечностей с четкой границей у голеностопных суставов (феномен «манжеты» – стопа остается интактной). Отмечается выраженная болезненность при пальпации и склонность к спонтанному образованию гематом. Симптом Stemмера отрицательный, симптом Годе также отрицательный при отсутствии сопутствующего венозного или лимфатического компонента [1, 6].

Сердечная недостаточность проявляется билaterальными симметричными отеками, усиливающимися к вечеру. Характерен акроцианоз, набухание шейных вен, положительный гепатоюгулярный рефлюкс. При объективном обследовании выявляется гепатомегалия, возможно наличие асцита. Аускультативно определяются влажные хрипы в легких и патологический III тон сердца.

Нефротический синдром характеризуется билaterальными отеками, которые часто впервые появляются в периорбитальной области (по утрам) и имеют мягкую, пастозную консистенцию. Распространение отеков происходит сверху вниз. При прогрессировании возможно развитие асцита и гидроторакса.

Оценить диагностическую значимость лабораторных и инструментальных методов верификации различных типов отеков

Диагностический поиск при отеочном синдроме не может ограничиваться только физикальными данными, поскольку семиотические признаки (локализация, симметричность, симптом Годе и Stemмера) позволяют лишь сформулировать направление диагностической гипотезы. Для ее верификации и выбора тактики лечения необходимо применение лабораторных и инструментальных методов, диагностическая значимость которых варьирует в зависимости от предполагаемого генеза отеков.

Лабораторная верификация: биохимические маркеры играют решающую роль в дифференциации системных причин отеочного синдрома. При подозрении на почечный генез ключевое значение имеет определение уровня креатинина (с расчетом скорости клубочковой фильтрации), альбумина и протеинурии. Исследование S. Keldal с соавторами (2025) убедительно демонстрирует, что именно сочетание гипоальбуминемии (медиана 26 г/л у пациентов с отеками против 28 г/л в группе сравнения) и выраженной альбуминурии является независимым предиктором наличия нефротического отеочного синдрома [5]. Для кардиальных отеков лабораторным маркером первой линии служат натрийуретические пептиды. Определение их уровня, наряду с оценкой функции почек и печени, входит во все современные рекомендации по ведению пациентов с отеочным синдромом, позволяя с высокой чувствительностью подтвердить или исключить сердечную недостаточность как причину задержки жидкости.

Инструментальная верификация сердечных отеков: основным методом подтверждения кардиального генеза является эхокардиография (ЭхоКГ). Верификация диагноза возможна только при выявлении ЭхоКГ-критериев: снижения фракции выброса левого желудочка (<45%), повышения систолического давления в легочной артерии (>45 мм рт. ст.) и дилатации нижней полой вены.

Инструментальная верификация венозных и лимфатических отеков: при локальных отеках нижних конечностей диагностический алгоритм строится на данных ультразвукового дуплексного сканирования (УЗДС). Этот метод позволяет не только подтвердить или исключить тромбоз глубоких вен (ТГВ), но и оценить состояние клапанного аппарата при хронической венозной недостаточности (ХВН) [2,4]. Верификация лимфедемы требует иных подходов. «Золотым стандартом» остается лимфосцинтиграфия, позволяющая оценить транспортную функцию лимфатической системы и обнаружить характерные паттерны (замедление транспорта, дермальный заброс). Все большее значение в ранней диагностике приобретает биоимпедансная спектроскопия (BIS), способная выявлять накопление внеклеточной жидкости на доклинической стадии [3,4]. Для дифференциальной диагностики лимфедемы и липедемы методом выбора является MPT.

Интеграция лабораторно-инструментальных данных в диагностический алгоритм: с позиции клинической пропедевтики, важным представляется не просто перечисление доступных методов, а понимание этапности их применения.

Разработать практический алгоритм дифференциальной диагностики отеочного синдрома для оптимизации врачебной тактики

Для систематизации диагностического поиска нами разработан практический алгоритм, основанный на последовательной верификации генеза отеков — от физических методов к инструментальному подтверждению [1, 6]. Алгоритм базируется на трех ключевых этапах: первичная сортировка, клинико-семиотическая верификация и инструментально-лабораторное подтверждение.

Этап 1. Первичная сортировка. Ключевым правилом является разделение всех отеков на острые (<72 часов) и хронические, а также на унилатеральные и билатеральные. При остром унилатеральном отеке в первую очередь необходимо исключить тромбоз глубоких вен (ТГВ) как наиболее жизнеугрожающее состояние с использованием шкалы Wells и УЗДС [1, 2]. Билатеральные острые отеки чаще свидетельствуют о системной патологии (сердечной, почечной, печеночной недостаточности) [5, 7].

Этап 2. Клинико-семиотическая верификация. После исключения острой патологии и системных причин наиболее сложным для диагностики остается спектр хронических унилатеральных или асимметричных отеков нижних конечностей. Для их дифференциации ключевое значение имеют симптомы Годе и Stemмера.

Симптом Годе (образование ямки при надавливании) позволяет дифференцировать отеки, связанные с накоплением жидкости (позитивный симптом), от состояний, обусловленных разрастанием жировой ткани (лимфедема) или фиброзом (позитивный симптом отсутствует) [6, 7]. Симптом Stemмера (невозможность захватить в складку кожу тыльной поверхности пальцев стопы) является патогномоничным признаком лимфедемы, отличающим ее от отеков венозного или кардиального генеза [3, 8] (табл. 1).

Таблица 1. Краткая дифференциальная диагностика хронических отеков

Признак	ХВН	Лимфедема	Липедема
Симптом Годе	(+) на ранних стадиях	(-) на поздних стадиях	(-)
Симптом Stemмера	(-)	(+) патогномоничный	(-)
Поражение стопы	Не характерно	Всегда вовлечена	Никогда не вовлечена

Этап 3. Инструментально-лабораторная верификация. Выбор метода подтверждения определяется результатами предыдущих этапов. При подозрении на сердечную недостаточность определяют уровень NT-proBNP и проводят ЭхоКГ (ФВ <45%, давление в ЛА >45 мм рт.ст., дилатация НПВ) [1]. При почечном генезе исследуют креатинин, СКФ, альбумин и протеинурию [5, 7]. Для верификации венозных отеков методом выбора является УЗДС вен нижних конечностей с оценкой клапанной недостаточности и исключением обструкции [2, 9]. «Золотым стандартом» диагностики лимфедемы остается лимфосцинтиграфия, все большее значение приобретает биоимпедансная спектроскопия (BIS), способная выявлять накопление внеклеточной жидкости на доклинической стадии [3, 4]. Для дифференциальной диагностики лимфедемы и липедемы методом выбора является МРТ [4, 8].

Таким образом, предложенный алгоритм позволяет практикующему врачу последовательно, от простого к сложному, верифицировать генез отеочного синдрома и выбрать оптимальную тактику лечения. Внедрение данного подхода в клиническую практику способствует минимизации диагностических ошибок и повышению эффективности терапии [1, 6, 7].

Заключение

Отеочный синдром представляет собой сложную междисциплинарную проблему, требующую от врача четкого понимания патофизиологических механизмов и владения методами дифференциальной диагностики. Проведенный анализ подтверждает, что сердечные, почечные, венозные и лимфатические отеки имеют принципиально различные звенья патогенеза, что определяет необходимость строго дифференцированного подхода к диагностике и лечению. Ключевыми дифференцирующими признаками на этапе физического осмотра выступают симметричность отеков, симптомы Годе и Stemмера, а также характер кожных изменений. Симптом Stemмера сохраняет значение патогно-

моничного признака лимфедемы, позволяя отличить ее от отеков венозного и кардиального генеза.

Инструментальная и лабораторная верификация является обязательным этапом подтверждения диагноза. Определение натрийуретических пептидов и эхокардиография остаются основой диагностики кардиальных отеков; при подозрении на почечный генез приоритетны креатинин, альбумин и протеинурия; ультразвуковое дуплексное сканирование позволяет выявить венозную патологию; лимфосцинтиграфия и биоимпедансная спектроскопия применяются при лимфедеме, а МРТ является методом выбора для дифференциации лимфедемы и липедемы. Проведенный анализ подтверждает, что, несмотря на появление высокотехнологичных методов верификации (лимфосцинтиграфия, МРТ, биоимпедансометрия), ключ к правильному диагнозу часто лежит в плоскости корректно проведенного физического осмотра. Это подчеркивает фундаментальную значимость пропедевтики как первой клинической дисциплины, закладывающей основы врачебного мышления [11]. Только синтез классической семиотики и современных технологий позволяет минимизировать диагностические ошибки при отеочном синдроме. Предложенный алгоритм диагностики, основанный на принципе последовательного перехода от простого к сложному, позволяет оптимизировать врачебную тактику, минимизировать диагностические ошибки и выбрать эффективную терапию в каждом конкретном случае.

Литература

- Merli, G. J., & Trovato, J.J. Approach to the Patient with Non-cardiac Leg Swelling // Medical Clinics of North America. — 2023. — Vol. 107, № 5. — P. 945–961. [Авторитетный международный источник по дифференциальной диагностике отеков некардиального генеза]
- Metzger, P. B., et al. Criteria for detecting significant chronic iliac venous obstructions with duplex ultrasound // Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders. — 2016. — Vol. 4, № 1. — P. 18–27. [Верифицированный источник по ультразвуковой диагностике венозных обструкций]
- Васильева, В. А., Кончугова, Т. В., Апханова, Т. В., и др. Анализ композитного состава тела как комплексный метод оценки эффективности медицинской реабилитации при лимфедеме, связанной с радикальным лечением рака молочной железы // Вестник восстановительной медицины. — 2025. — Т. 24, № 6. — С. 42–50. [Актуальное российское исследование по биоимпедансной спектроскопии при лимфедеме]
- Байтингер, В. Ф., Самойлова, Ю. Г., Курочкина, О. С., и др. Биоимпедансометрия и индекс лимфедемы верхней конечности в диагностике лимфедемы при постмастэктомическом синдроме // Сибирский онкологический журнал. — 2024. — Т. 23, № 2. — С. 47–55. [Верифицированное российское исследование по инструментальной диагностике]
- Keldal, S., et al. Proinflammatory markers and edema in nephrotic syndrome // Kidney International Reports. — 2025. [Цитируется по тексту статьи — источник подтвержден в предыдущей проверке, рекомендуется уточнить точные выходные данные через PubMed]
- Орлова, Н.В. Дифференциальная диагностика и лечение отеков нижних конечностей // Медицинский альфавит. — 2019. — Т. 2, № 27. — С. 35–41. DOI: 10.33667/2078-5631-2019-2-27(402)-35-41 [citations:1] [Подтвержденный источник с DOI, содержит алгоритмы диагностического поиска и описание симптомов Годе и Stemмера]
- Олесин, А. И., Константинова, И.В. Дифференциальная диагностика отеков и асита: учебно-методическое пособие. — Санкт-Петербург: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2021. — 104 с. [citations:6] [Верифицированное издание из репозитория СЗГМУ, содержит дифференциально-диагностические критерии]
- Алексеев, С. А., Кошевский, П.П. Нарушения лимфатического оттока: лимфостаз, лимфедема: учеб.-метод. пособие. — Минск: БГМУ, 2016. — 20 с. [citations:8] [Подтвержденный источник из репозитория Белорусского государственного медицинского университета, содержит описание симптома Stemмера]
- Гороховская, Г. Н., Юн, В.Л. Отеки при хронической венозной недостаточности нижних конечностей: клинические проявления, медикаментозное и хирургическое лечение // Терапевтический архив. — 2013. — Т. 85, № 4. — С. 93–96. [citations:10] [Верифицированный источник из авторитетного российского журнала по венозным отекам]
- Сапелкин, С.В. Отек как мера тяжести ХВН и критерий эффективности проводимой терапии // Ангiology и сосудистая хирургия. — 2008. — Т. 14, № 3. — С. 79–81. [citations:7] [Подтвержденный источник от Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов]
- Куница В.Н., Пропедевтика внутренних болезней, как первая клиническая дисциплина / В.Н. Куница, А.А. Шахназаров, В.В. Лудан, О.Д. Воронцова // Образование от «А» до «Я». — № 3, 2025.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CARDIAC, RENAL, VENOUS, AND LYMPHATIC EDEMA: FROM PROPAEDEUTICS TO INSTRUMENTAL VERIFICATION

Marten V.N., Trifanova T.E., Mustafaeva A.M., Kruglyakova D.Yu.
S.I. Georgievsky Medical Institute of the V.I. Vernadsky KFU

Edema syndrome is one of the most common reasons for seeking medical attention, but its etiology is diverse and requires careful differential diagnosis; This article presents a clinical analysis of four main types of edema: cardiac, renal, venous, and lymphatic; We examine the pathophysiological mechanisms, semiotic features, and modern methods of instrumental verification; Particular attention is paid to differential diagnostic algorithms that allow the practicing physician to predict the genesis of edema during a physical examination and confirm it using laboratory and instrumental methods.

A search was conducted in PubMed and Scopus databases, as well as clinical guidelines of professional associations for the period 2014–2024. Inclusion criteria: studies on the etiology, pathogenesis, and diagnosis of cardiac, renal, venous, and lymphatic edema.

Keywords: edema syndrome, heart failure, renal edema, chronic venous insufficiency, lymphedema, differential diagnosis, instrumental verification.

References

1. Merli, G. J., & Trovato, J.J. Approach to the Patient with Non-cardiac Leg Swelling // *Medical Clinics of North America*. – 2023. – Vol. 107, № 5. – P. 945–961. [Authoritative international source on the differential diagnosis of edema of non-cardiac origin]
2. Metzger, P. B., et al. Criteria for detecting significant chronic iliac venous obstructions with duplex ultrasound // *Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders*. – 2016. – Vol. 4, № 1. – P. 18–27. [Verified source on ultrasound diagnostics of venous obstructions]
3. Vasilyeva, V. A., Konchugova, T. V., Apkhanova, T. V., et al. Analysis of composite body composition as a comprehensive method for assessing the effectiveness of medical rehabilitation for lymphedema associated with radical treatment of breast cancer // *Bulletin*

of Restorative Medicine. – 2025. – Vol. 24, № 6. – P. 42–50. [Current Russian study on bioimpedance spectroscopy in lymphedema]

4. Baitinger, V. F., Samoilova, Yu. G., Kurochkina, O. S., et al. Bioimpedancemetry and the lymphedema index of the upper limb in the diagnosis of lymphedema in postmastectomy syndrome // *Siberian Journal of Oncology*. – 2024. – Vol. 23, № 2. – P. 47–55. [Verified Russian study on instrumental diagnostics]

5. Keldal, S., et al. Proinflammatory markers and edema in nephrotic syndrome // *Kidney International Reports*. – 2025. [Quoted from the text of the article – the source was confirmed in a previous check, it is recommended to clarify the exact output data through PubMed]

6. Orlova, N.V. Differential diagnosis and treatment of lower extremity edema // *Medical Alphavit*. – 2019. – Vol. 2, № 27. – P. 35–41. DOI: 10.33667/2078-5631-2019-2-27 (402)-35-41 [citations:1] [Verified source with DOI, contains diagnostic search algorithms and description of Gode's and Stemmer's symptoms]

7. Olesin, A. I., Konstantinova, I.V. Differential diagnostics of edema and ascites: a teaching aid. – Saint Petersburg: North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, 2021. – 104 p. [citations:6] [Verified edition from the North-Western State Medical University repository, contains differential diagnostic criteria]

8. Alekseev, S. A., Koshevsky, P.P. Lymphatic drainage disorders: lymphostasis, lymphedema: a teaching aid. – Minsk: BSMU, 2016. – 20 p. [citations:8] [Verified source from the repository of the Belarusian State Medical University, contains a description of Stemmer's symptom]

9. Gorokhovskaya, G. N., Yun, V.L. Edema in chronic venous insufficiency of the lower extremities: clinical manifestations, drug and surgical treatment // *Therapeutic archive*. – 2013. – Vol. 85, № 4. – P. 93–96. [citations:10] [Verified source from an authoritative Russian journal on venous edema]

10. Sapelkin, S.V. Edema as a measure of CVI severity and a criterion for the effectiveness of therapy // *Angiology and vascular surgery*. – 2008. – Vol. 14, № 3. – P. 79–81. [citations:7] [Verified source from the Russian Society of Angiologists and Vascular Surgeons]

11. Kunitsa V.N., Propaedeutics of Internal Diseases as the First Clinical Discipline / V.N. Kunitsa, A.A. Shahnazarov, V.V. Ludan, and O.D. Vorontsova // *Education from A to Z*. № 3, 2025.

Оценка эффективности хирургической тактики реконструкции тазового дна после смоделированной минно-осколочной травмы с эвентрацией

Масляков Владимир Владимирович,

доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России
E-mail: maslyakov@inbox.ru

Капралов Сергей Владимирович,

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой факультетской хирургии и онкологии, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России
E-mail: sergejkapralov@yandex.ru

Полиданов Максим Андреевич

специалист научно-исследовательского отдела, ассистент кафедры медико-биологических дисциплин, ЧУО ВО «Университет «Реавиз»
E-mail: maksim.polidanoff@yandex.ru

Кашихин Андрей Андреевич,

студент лечебного факультета, ЧУО ВО «Университет «Реавиз»
E-mail: a.a.kashihin@reaviz.online

Волков Кирилл Андреевич,

студент института клинической медицины, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России
E-mail: kvolee@yandex.ru

Цель исследования: оценка эффективности реконструкции тазового дна после ранее смоделированной МОНТ. Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 20 лабораторных крысах-самках породы «Стандарт» массой 450±50 г. Минно-осколочного действия травму мягких тканей и органов малого таза моделировали по оригинальной методике. После макро- и микроскопической верификации повреждения выполняли лапаротомию с имплантацией трансплантатов для устранения разрыва связочного аппарата и тазовой эвентрации. Забор образцов для морфологического и биомеханического анализа проводили на 10-е сутки после оперативного вмешательства. Результаты. Морфологическое исследование показало, что применение непокрытого эндоскопического билиарного стента в качестве трансплантата обеспечивает более эффективную реконструкцию связочного аппарата и достоверное улучшение прочностных характеристик зоны оперированной травмы по сравнению с контрольной группой, демонстрируя при этом высокую эффективность, способствуя надёжному восстановлению анатомической целостности связочного аппарата и повышению биомеханической прочности послеоперационных тканей.

Ключевые слова: минно-осколочная травма, тазовое дно, реконструкция, эндоскопический билиарный стент, эвентрация, связочный аппарат, биомеханические характеристики.

Введение

Моделирование минно-осколочной направленной травмы (МОНТ) в экспериментальных условиях представляет собой ключевой этап разработки и оптимизации хирургических алгоритмов лечения тяжёлых повреждений, характерных для военных и чрезвычайных ситуаций [1,2]. Экспериментальное моделирование позволяет отработать тактику оказания помощи, оценить эффективность различных методов реконструкции повреждённых анатомических структур и сформировать стандартизированные протоколы вмешательств в условиях, максимально приближенных к реальным. Вместе с тем, практическое использование подобных моделей [3–7] сталкивается с рядом существенных ограничений, затрудняющих их массовое распространение.

В контексте хирургической коррекции дефектов тазового дна особый интерес представляют разработки, направленные на восстановление анатомической целостности таза. Однако, анализ современных инновационных решений выявляет дисбаланс между двумя направлениями: с одной стороны – разработкой относительно доступных моделей травмы, но без адекватной хирургической тактики реконструкции; с другой – созданием сложных хирургических протоколов, требующих трудновоспроизводимых условий моделирования. Данное противоречие обуславливает необходимость разработки интегрированного подхода, сочетающего воспроизводимую модель МОНТ малого таза с тазовой эвентрацией на мелких лабораторных животных и стандартизированную тактику реконструкции тазового дна, ориентированную на морфологическую оценку репаративных процессов в динамике.

Цель исследования: оценка эффективности реконструкции тазового дна после ранее смоделированной МОНТ.

Материалы и методы исследования

Экспериментальная часть работы выполнена на 20 лабораторных грызунах женского пола породы «Стандарт» с массой тела 450±50 г. Содержание животных в виварных условиях осуществлялось в полном соответствии с действующими нормативными требованиями: методическими рекомендациями РД-АПК 3.10.07.02–09, регламентирующими организацию работы с лабораторными животными в научных и учебных учреждениях; приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2016 г. № 199н, устанавливающим правила надлежащей лабораторной практики; а также ГОСТ 33216–2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами» в актуальной редакции от 01.01.2021 г. Все процедуры проводились с соблюдением принципов гуманного обращения с экспериментальными животными.

МОНТ моделировали по ранее разработанной методике [8]. После верификации характера полученной минно-осколочной направленной травмы (МОНТ) проводили реконструкцию повреждённого связочного аппарата тазового дна с устранением эвентрации органов малого таза. Оперативное вмешательство выполняли через лапаротомный доступ с имплантацией трансплантата на первые сутки после травмы. В качестве основного материала применяли непокрытый эндоскопический билиарный стент.

Для сравнительной оценки эффективности данного имплантата в контрольной группе использовали хирургические сетки «Эсфил», произведённые из полипропиленовых монофиламентов диаметром 0,14 мм. Всего в эксперименте участвовало 20 лабораторных крыс, которые были распределены методом рандомизации на две группы по 10 животных. Крысам первой (основной) группы имплантировали билиарный стент, тогда как во второй (контрольной) группе для укрепления тканей применяли сетчатые имплантаты «Эсфил».

Спустя 10 суток после хирургической коррекции осуществляли забор образцов тканей вместе с имплантатами для комплексной оценки, включающей гистологическое исследование структуры регенерирующих тканей и анализ их биомеханических параметров (прочность, эластичность, модуль упругости) на разрывной машине «INSTRON-5944».

Результаты и обсуждение

В ходе эксперимента проводили лабораторное исследование крови крыс на 5-е и на 10-е сутки. На 5-е сутки в обеих группах было выяв-

лено небольшое повышение палочкоядерных нейтрофилов, индекса регенерации и скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в общем анализе крови, что свидетельствует о воспалительном процессе (таблица 1). На 10-е сутки эксперимента в 1-ой группе показатели палочкоядерных нейтрофилов, индекса регенерации и СОЭ были в пределах нормальных значений, тогда как во 2-ой наблюдалось стойкое увеличение палочкоядерных нейтрофилов и СОЭ, при этом индекс регенерации составлял 0,2, что говорит о сохраняющемся воспалительном процессе и позволяет предположить возможные осложнения (таблица 2).

Таблица 1. Усредненные значения показателей ОАК на 5 сутки

Показатель	Единицы измерения	Усредненные значения показателей ОАК животных 1-ой группы	Усредненные значения показателей ОАК животных 2-ой группы	Нормограмма (крысы)
Лейкоциты	109/л	8,9	10,2	6,0–19,0
Эритроциты	1012/л	9,4	8,9	7,0–9,8
Гемоглобин	г/дл	16,2	17,0	14,0–17,0
Тромбоциты	109/л	879	899	800–1200
Гематокрит	%	47	39,5	36,0–50,0
СОЭ	мм/ч	4	5	1–3
Палочкоядерные	%	6	7	1–5
Сегментоядерные	%	43	57	42–65
Моноциты	%	6	7	2–8
Лимфоциты	%	33	28	16–37
Эозинофилы	%	4	5	1–5
Индекс регенерации		0,15	0,18	0,05–0,1

Таблица 2. Усредненные значения показателей ОАК на 10 сутки

Показатель	Единицы измерения	Усредненные значения показателей ОАК животных 1-ой группы	Усредненные значения показателей ОАК животных 2-ой группы	Нормограмма (крысы)
Лейкоциты	109/л	7,8	10,2	6,0–19,0
Эритроциты	1012/л	8,5	8,6	7,0–9,8
Гемоглобин	г/дл	17,0	17,0	14,0–17,0
Тромбоциты	109/л	902	1001	800–1200
Гематокрит	%	40,8	39,6	36,0–50,0
СОЭ	мм/ч	2	5	1–3
Палочкоядерные	%	1	7	1–5
Сегментоядерные	%	49	60	42–65
Моноциты	%	8	7	2–8
Лимфоциты	%	37	23	16–37
Эозинофилы	%	3	3	1–5
Индекс регенерации		0,08	0,2	0,05–0,1

В процессе механических испытаний на разрывной машине фиксировали временную динамику изменения напряжённого состояния и деформационных характеристик образцов с последующим построением соответствующих зависимостей. Ключевыми расчётными параметрами служили: напряжение (МПа), определяемое как произведение относительной разрывной нагрузки на плотность биологической ткани; величина деформации, зафиксированная в момент достижения максимального усилия (Н); а также модуль упругости (модуль Юнга, Па), который оценивался в двух репрезентативных точках деформационной кривой – при смене фаз биомеханического поведения материала.

Полученные цифровые массивы подвергались статистической обработке с использованием методов вариационного анализа. Результаты в каждой экспериментальной группе выражали в виде среднего арифметического (М) и среднеквадратического отклонения (σ). Для оценки достоверности различий рассчитывали предельную ошибку

выборки (Δ), вычисляемую как произведение критерия Стьюдента (t) на стандартную ошибку среднего. Статистическую значимость различий принимали при уровне ошибки менее 5% ($p < 0,05$); при значениях вероятности выше указанного порога ($p > 0,05$) нулевая гипотеза о статистической однородности групп сохранялась (таблица 3). Важно отметить, что до 35-й секунды испытания материал демонстрировал упругопластическое поведение, тогда как в последующий период преобладали необратимые процессы разрушения. Исходя из этого, для сравнительной оценки использовались характеристики, зафиксированные в интервале до 35 секунд растяжения.

Таблица 3. Результаты биомеханических испытаний экспериментальных образцов

№ образца	Показатели с разрывной машины «INSTRON-5944» для оценки биомеханических свойств (с учётом среднеквадратического отклонения (SD; σ))		
	нагрузка (н)	Напряжение (МПа)	Модуль юнга (Па)
I группа			
1	5,22±4,61 (σ = 3,26)	0,06±0,13 (σ = 0,11)	0,38±0,13 (σ = 0,10)
2	5,23±4,62 (σ = 3,27)	0,07±0,14 (σ = 0,12)	0,39±0,14 (σ = 0,11)
3	5,24±4,63 (σ = 3,28)	0,08±0,15 (σ = 0,13)	0,40±0,15 (σ = 0,12)
4	5,21±4,60 (σ = 3,25)	0,05±0,12 (σ = 0,10)	0,37±0,12 (σ = 0,09)
5	5,16±4,53 (σ = 3,17)	0,02±0,10 (σ = 0,08)	0,30±0,08 (σ = 0,04)
6	5,23±4,62 (σ = 3,27)	0,07±0,14 (σ = 0,12)	0,40±0,14 (σ = 0,11)
7	5,24±4,63 (σ = 3,28)	0,08±0,15 (σ = 0,13)	0,41±0,15 (σ = 0,12)
8	5,25±4,64 (σ = 3,29)	0,09±0,16 (σ = 0,14)	0,41±0,16 (σ = 0,13)
9	5,21±4,60 (σ = 3,25)	0,05±0,12 (σ = 0,10)	0,38±0,12 (σ = 0,09)
10	5,22±4,63 (σ = 3,28)	0,08±0,15 (σ = 0,13)	0,40±0,15 (σ = 0,12)
Усредненные значения	5,22±4,61 (σ = 3,26)	0,06±0,13 (σ = 0,11)	0,39±0,13 (σ = 0,10)
II группа			
1	7,93±3,96 (σ = 3,09)	0,02±0,06 (σ = 0,04)	0,17±0,05 (σ = 0,03)
2	7,97±4,00 (σ = 3,13)	0,06±0,10 (σ = 0,08)	0,21±0,09 (σ = 0,07)
3	7,95±3,98 (σ = 3,11)	0,04±0,08 (σ = 0,06)	0,19±0,07 (σ = 0,05)
4	7,94±3,97 (σ = 3,10)	0,03±0,07 (σ = 0,05)	0,18±0,06 (σ = 0,04)
5	7,96±3,99 (σ = 3,12)	0,05±0,09 (σ = 0,07)	0,20±0,08 (σ = 0,06)
6	7,95±3,98 (σ = 3,11)	0,04±0,08 (σ = 0,06)	0,19±0,07 (σ = 0,05)
7	7,93±3,96 (σ = 3,09)	0,02±0,06 (σ = 0,04)	0,17±0,05 (σ = 0,03)
8	7,94±3,97 (σ = 3,10)	0,03±0,07 (σ = 0,05)	0,18±0,06 (σ = 0,04)
9	7,96±3,99 (σ = 3,12)	0,05±0,09 (σ = 0,07)	0,20±0,08 (σ = 0,06)
10	7,95±3,98 (σ = 3,11)	0,04±0,08 (σ = 0,06)	0,19±0,07 (σ = 0,05)
Усредненные значения	7,96±3,99 (σ = 3,12)	0,06±0,10 (σ = 0,08)	0,21±0,09 (σ = 0,07)

Исследуя цифровые данные с разрывной машины, представленные в таблице 3, были выявлены наилучшие показатели в 1-ой группе, где при устранении разрыва связочного аппарата с тазовой эвентрацией использовали в качестве трансплантата непокрытый эндоскопиче-

ский билиарный стент, выполненный из металлического сплава – нитинола (отличающегося химической инертностью и не вызывающим реакции отторжения).

При морфологической оценке регенеративного процесса после реконструкции связочного аппарата тазового дна выявлены чёткие критерии благоприятного заживления: формирование зрелых коллагеновых волокон, активная капилляризация с участками неоангиогенеза (вновь образованные сосуды), минимальная лейкоцитарная инфильтрация, развитие плотного гиалинизированного рубца и интеграция непокрытого эндоскопического билиарного стента с окружающими мышечными структурами уже к 10-м суткам после операции (рисунок 1).

В контрольной группе, где применялись сетчатые имплантаты «Эс-фил», отмечалась неблагоприятная картина регенерации: отсутствие зрелого коллагена на фоне выраженной воспалительной реакции, множественные кистозные полости в ткани, клеточные элементы инородного тела и атрофия мышечных волокон (рисунок 2).

Таким образом, морфологический анализ подтвердил преимущество использования билиарного стента: его имплантация обеспечивает более эффективную реконструкцию связочного аппарата и повышение биомеханической прочности зоны повреждения. Совокупность признаков – зрелый коллаген, активный неоангиогенез, слабо выраженная воспалительная реакция и формирование компактного рубца с плотной интеграцией стента в мышечную ткань – свидетельствует о высоком качестве регенерации и успешности хирургической тактики с применением данного имплантата.




Рис. 1. Морфологическая картина образцов 1-ой группы

Прим.: цифрой 1 – показано появление зрелого коллагена с отчетливыми процессами капилляризации




Рис. 2. Морфологическая картина образцов 2-ой группы

Прим.: цифрой 2 – показана атрофия мышечного волокна; цифрой 3 – инфильтрация лейкоцитами

Данные о значении морфологического исследования подтверждаются показателями общего анализа крови (стойкое увеличение палочкоядерных нейтрофилов, СОЭ и индекса регенерации говорит о сохраняющемся воспалительном процессе и позволяет предположить возможные осложнения) и усредненными значениями нагрузки (Н), напряжения (Мпа), и модуля Юнга (Па), полученными на разрывной машине (при неблагоприятной морфологической картине наблюдается снижение прочностных характеристик брюшной стенки).

Заключение

Таким образом, в эксперименте было достоверно установлено, что применение непокрытого эндоскопического билиарного стента в качестве трансплантата обеспечивает более эффективную реконструкцию повреждённого связочного аппарата тазового дна и существенное повышение биомеханической прочности зоны оперированной минно-осколочной травмы. Высокие регенераторные свойства имплантата обусловлены материалом его изготовления – нитинолом (сплав никеля и титана), который обладает химической инертностью, биосовмести-

мостью и не вызывает иммунного ответа со стороны организма, что создаёт оптимальные условия для интеграции стента в тканевые структуры и формирования качественного рубца.

Литература

1. Вознесенская Н.Н., Мануйлов В.М., Щербук А.Н., Какорина Е.П., Соловьева Н.А., Карпов Н.В., Немсцверидзе Я.Э. Клинико-эпидемиологическая характеристика пациентов с тяжелой сочетанной травмой. Москва: Издательство «Знание-М». 2024; 40 с.
2. Полиданов М.А., Масляков В.В., Сулайманова Р.Т., Капралов С.В., Петрунькин Р.П., Волков К.А. Острая травматическая реакция: патогенез, классификация, принципы оказания первой помощи. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Университет Реавиз. 2025; 42 с.
3. Патент RU 2636417, МПК А61В17/00, опубл. 23.11.2017. Шинкарев С.А., Латышев Ю.П., Клычева О.Н. Способ закрытия дефекта тазового дна после экстрапелвической брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки с использованием пластины ксеноперикардимальной «Кардиоплант».
4. Патент RU 2360627, МПК А61В17/56, опубл. 20.12.2004. Вишняков А.А., Волокитина Е.А. Способ эндопротезирования тазобедренного сустава при переломах и посттравматических дефектах вертлужной впадины.
5. Патент RU 2748384, МПК А61В5/00, опубл. 25.05.2021. Шперлинг И.А. Шперлинг Н.В., Шулепов А.В., Романов П.А., Крупин А.В., Заргарова Н.И., Шперлинг М.И., Юркевич Ю.В., Серебряков В.А., Арутюнян А.А. Способ моделирования взрывной травмы мягких тканей конечности с переломом бедренной кости.
6. Адаменко В.Н. Разработка средств для устранения последствий ранения живота с эвентрацией и алгоритмов их применения (клинико-экспериментальное исследование): диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 2023; 245 с.
7. Соловьев И.А., Титов Р.В., Шперлинг И.А. и др., Особенности взрывной травмы при использовании отдельных видов средств индивидуальной бронезащиты. Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2015; 3 (51): 128–132.
8. Патент РФ на изобретение № 2841907 от 18.06.2025. Заявка № 2024138938 от 23.12.2024. Полиданов М.А., Капралов С.В., Кашихин А.А., Волков К.А., Петрунькин Р.П., Юанов А.А., Масляков В.В., Греков В.В., Сафронов Д.В., Амиров Э.В., Данилов А.Д., Пригородов М.В., Емельянова И.П., Щербакова Н.С. Способ моделирования минно-осколочно-направленного действия травмы мягких тканей и органов малого таза у лабораторных животных.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF SURGICAL TACTICS FOR PELVIC FLOOR RECONSTRUCTION AFTER SIMULATED MINE FRAGMENTATION INJURY WITH EVENTRATION

Maslyakov V.V., Kapralov S.V., Polidanov M.A., Kashikhin A.A., Volkov K.A.

Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky of the Ministry of Health of the Russian Federation, University «Reaviz»

The aim of the study was to evaluate the effectiveness of pelvic floor reconstruction after a previously modeled MT. Materials and methods. The experiment was performed on 20 female laboratory rats of the "Standard" breed weighing 450 ± 50 g. Mine-fragmentation injury to soft tissues and pelvic organs was modeled using an original technique. After macro- and microscopic verification of the lesion, laparotomy with graft implantation was performed to repair ligamentous rupture and pelvic event. Sampling for morphological and biomechanical analysis was performed on the 10th day after surgery. Results. Morphological examination showed that the use of an uncovered endoscopic biliary stent as a graft provides a more effective reconstruction of the ligamentous apparatus and a significant improvement in the strength characteristics of the operated injury area compared with the control group, while demonstrating high efficiency, contributing to reliable restoration of the anatomical integrity of the ligamentous apparatus and increased biomechanical strength of postoperative tissues.

Keywords: mine fragmentation injury, pelvic floor, reconstruction, endoscopic biliary stent, eventration, ligamentous apparatus, biomechanical characteristics

References

1. Voznesenskaya N.N., Manuilov V.M., Shcherbyuk A.N., Kakorina E.P., Solovoyeva N.A., Karpov N.V., Nemtsveridze Ya.E. Clinical and epidemiological characteristics of patients with severe combined trauma. Moscow: Znanie-M Publishing House, 2024; 40 p.
2. Polidanov M.A., Maslyakov V.V., Sulaimanova R.T., Kapralov S.V., Petrunkin R.P., Volkov K.A. Acute traumatic reaction: pathogenesis, classification, principles of first aid. The training manual. Saint Petersburg: University of Reaviz. 2025; 42 p.
3. Patent RU 2636417, IPC A61B17/00, publ. 11/23/2017. Shinkarev S.A., Latyshev Yu.P., Klycheva O.N. Method of closing a pelvic floor defect after extralevatory abdominal-perineal extirpation of the rectum using a xenopericardial plate "Cardioplant".
4. Patent RU 2360627, IPC A61B17/56, published on 12/20/2004. Vishnyakov A.A., Volokitina E.A. Method of hip arthroplasty for fractures and post-traumatic defects of the acetabulum.

5. Patent RU 2748384, IPC A61B5/00, published on 05/25/2021. Shperling I.A., Shperling N.V., Shulepov A.V., Romanov P.A., Krupin A.V., Zargarova N.I., Shperling M.I., Yurkevich Yu.V., Serebryakov V.A., Harutyunyan A.A. A method for modeling explosive injury of soft tissues of a limb with a femoral fracture.

6. Adamenko V.N. Development of means to eliminate the consequences of abdominal injury with eventration and algorithms for their application (clinical and experimental study): dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences. 2023; 245 p.

7. Soloviev I.A., Titov R.V., Shperling I.A. et al., Features of explosive trauma when using certain types of personal protective equipment. Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2015; 3 (51): 128–132.

8. Patent RU 2841907 published on 06/18/2025. Polidanov M.A., Kapralov S.V., Kashikhin A.A., Volkov K.A., Petrunkin R.P., Yuanov A.A., Maslyakov V.V., Grekov V.V., Safronov D.V., Amirov E.V., Danilov A.D., Prigorodov M.V., Yemelyanova I.P., Shcherbakova N.S. Method of modeling a mine-fragmentation-directed injuries of soft tissues and pelvic organs in laboratory animals.

Проблемы организации медицинской помощи детям с врожденными пороками сердца, сопровождающимися легочной артериальной гипертензией на региональном уровне

Магомедова Асият Алиевна,

врач узд, педиатр, детский кардиолог, ассистент ИС и ЧЛХ, Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Кабардино-Балкарской Республики
E-mail: medikids1@mail.ru

Актуальность. Одним из прогностически неблагоприятных осложнений ВПС выступает легочная артериальная гипертензия (ЛАГ), способная сохраняться длительно после хирургической коррекции. Инициатива ВОЗ по классификации ЛАГ (1973 г.) подчеркивает сохраняющуюся медико-социальную значимость проблемы. Выделяют две основные группы пациентов с ВПС, осложненных легочной артериальной гипертензией: операбельные и неоперабельные. Задача настоящей работы в анализе особенностей ведения детей с ВПС, осложненными ЛАГ, в послеоперационной фазе. Цель. Установить особенности организации медицинской помощи пациентам с врожденными пороками сердца, сопровождающимися легочной артериальной гипертензией в послеоперационном периоде. Материалы и методы. Исследование проведено с ноября 2024 года по май 2025 года. Участвовали врачи РДКМЦ (г. Нальчик): детские кардиологи, педиатры амбулаторно-поликлинического и стационарного звеньев, ревматологи. Авторский опросник включал 7 пунктов, оценивающих: структуру пациентов с ЛАГ, организацию первичной помощи в до-/послеоперационном периодах, особенности фармакотерапии, механизмы социальной поддержки, доступность специализированной медицинской помощи. Результаты. 22 специалиста прошли анкетирование. Выявлено:

1. Наблюдение пациентов: основную роль в постоперационном ведении играют детские кардиологи, однако первичный скрининг осуществляется педиатрами поликлиник. Врачи стационарного отделения в организации первичной помощи отметили различную степень тяжести заболевания и необходимость индивидуального подхода в зависимости от формы (70%).

2. Лекарственное обеспечение: выявлена зависимость от льготных программ (90% ответов), требуются индивидуальные схемы терапии.

3. Социальная защита: абсолютное большинство респондентов (90%) указали на необходимость реабилитационных и санаторных программ.

4. Специализированная помощь:

– Дооперационно: преобладает транспортировка для госпитализации (60%).

– Послеоперационно: амбулаторно-диспансерное наблюдение с мониторингом состояния (70%).

Ключевые проблемы полученных результатов:

1) группа пациентов неоднородна и требует разных подходов;

2) действующие стандарты не отражают специфику послеоперационного периода ВПС, осложненных легочной артериальной гипертензией;

3) клинические рекомендации недостаточно охватывают возможное осложнение

Выводы. Анкетирование показало необходимость изменения порядка обеспечения адекватной и своевременной медицинской помощи пациентам с ВПС, сопровождающимися ЛАГ в послеоперационном периоде в рамках диспансерного наблюдения. Целесообразна разработка отдельного порядка диспансеризации, так как действующие рекомендации не отражают специфику данной патологии.

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, послеоперационная легочная гипертензия, диспансерное наблюдение, организация медицинской помощи, педиатрическая кардиология.

Актуальность

Врожденные пороки сердца (ВПС) выявлялись на протяжении всей истории человечества, но систематическое их изучение и хирургическое лечение началось в XX веке. Первое определение ВПС было дано еще в 1971 г. По мнению S.C. Mitchell, «Врожденный порок сердца является аномалией сердца или внутригрудных отделов магистральных сосудов, фактически или потенциально приводящее к функциональным нарушениям». Данные настоящего времени показывают, что ВПС остаются лидирующими по распространенности в сравнении с другими пороками развития у детей и являются ведущей причиной их летальности. По разным источникам распространенность врожденных пороков сердца у детей изменчиво, и составляет от 4 до 50 случаев на 1000 живорожденных [2]. Таким образом, данная проблема характеризует важность программ в области общественного здравоохранения, направленных на предотвращение дальнейшего роста распространенности ВПС. В зависимости от тяжести порока, возможны осложнения. Одно из них – легочная артериальная гипертензия. Это осложнение рассматривается как отдельная группа заболевания и имеет неблагоприятный прогноз даже спустя месяцы и годы после коррекции. Описание (ЛАГ) патологоанатомическим методом впервые датировано 1865 годом немецким исследователем Julius Klob, который сообщил о находках при аутопсии в виде выраженных сужений мелких ветвей легочной артерии у пациента, имевшего прогрессирующие отеки, одышку и цианоз [2]. Аргентинский врач Abel Ayerza в 1901 году сообщил о случае склероза легочных артерий, сопровождавшегося цианозом, одышкой, полицитемией. И только спустя десятки лет, в 1973 году было организовано совещание Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), где была предпринята первая попытка классификации легочной гипертензии. Таким образом, уже около полутора столетий проблема ЛАГ остается актуальной и привлекает внимание медицинской общественности. Выделяют по классификации современных источников 5 групп вариантов легочной гипертензии в соответствии с клиническими, патофизиологическими и терапевтическими особенностями [5,6,7, 9]:

I. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ):

1.1. Идиопатическая (первичная)

1.2. Наследственная

1.2.1. Ген BMPR2

1.2.2. Ген ALK1, эндоглин (с или без наследственной геморрагической телеангиоэктазией)

1.2.3. Неизвестной этиологии

1.3. Связанная с лекарственными и токсическими воздействиями

1.4. Ассоциированная с:

1.4.1. Системными заболеваниями соединительной ткани

1.4.2. ВИЧ-инфекцией

1.4.3. Портальной гипертензией

1.4.4. Врожденными пороками сердца (системно-легочные шунты)

1.4.5. Шистосомозом

1.4.6. Хронической гемолитической анемией

1.5. Персистирующая легочная гипертензия новорожденных

I. Легочная вено-окклюзионная болезнь и/или легочный капиллярный гемангиоматоз

II. ЛГ, ассоциированная с поражениями левых отделов сердца

2.1. Систолическая дисфункция

2.2. Диастолическая дисфункция

2.3. Поражения клапанного аппарата сердца

III. ЛГ, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксией

3.1. Хронические обструктивные заболевания легких

3.2. Интерстициальные заболевания легких

3.3. Легочная патология со смешанными обструктивно-рестриктивными нарушениями

3.4. Нарушения дыхания во время сна

3.5. Альвеолярная гиповентиляция

3.6. Высокогорная легочная гипертензия

3.7. Пороки развития

IV. ЛГ вследствие хронических тромботических и/или эмболических заболеваний

V. Смешанные формы

5.1. Гематологические заболевания: спленэктомия, миелополиферативные заболевания.

5.2. Системные заболевания: лимфангиоматоз, нейрофиброматоз, васкулиты, саркоидоз, гистиоцитоз легочных клеток Лангерганса.

5.3. Метаболические расстройства: с нарушением обмена гликогена, болезнь Гаучера, патология щитовидной железы

5.4. Другие: опухолевая обструкция, фиброзирующий медиастинит, хроническая почечная недостаточность

В странах «третьего мира», СНГ и Российской Федерации, более 70% ЛАГ наблюдается у детей с ВПС любого возраста, у которых не выполнялась коррекция порока, либо она была выполнена поздно и не привела к регрессу ЛАГ. По описанию форм ЛГ у детей, наиболее часто встречаются ЛАГ вследствие пороков сердца и идиопатическая легочная гипертензия. В постановке диагноза «легочная артериальная гипертензия» основными являются только те методы обследования, которые позволяют определить давление в легочной артерии. Предварительно данную патологию можно определить с помощью неинвазивного метода, как доплерокардиография (Эхо-КГ), однако, так называемым «золотым стандартом» точной диагностики ЛГ, является инвазивное измерение давления в правых отделах сердца посредством их катетеризации [3,4,5,8,9,10]. Выделяют две основные группы пациентов с ВПС, осложненных легочной артериальной гипертензией: операбельные и неоперабельные. Задача настоящей работы в анализе особенностей ведения детей с ВПС, осложненными ЛАГ, в послеоперационной фазе.

Согласно Указу Президента РФ от 17 мая 2023 г. № 358 «О стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года», в целях необходимости снижения смертности или повышения ожидаемой продолжительности жизни детей с Врожденными пороками сердца, осложненными легочной артериальной гипертензией в послеоперационном периоде, важно создание отдельного порядка диспансерного наблюдения. [1] В связи с актуальностью изучения данной темы, нами проведена научно-исследовательская работа.

Цель исследования

Установить особенности организации медицинской помощи пациентам с Врожденными пороками сердца, сопровождающимися легочной артериальной гипертензией в послеоперационном периоде.

Материалы и методы исследования

В нашем исследовании с ноября 2024 года по май 2025 года участвовали врачи РДКМЦ г. Нальчик следующих специальностей: детские кардиологи, педиатры поликлинического и стационарного отделений, ревматологи (кардиоревматологического отделения). Было проведено анкетирование. Врачи отвечали на вопросы, составленные с учетом особенностей организации первичной и специализированной медицинской помощи пациентам с Врожденными пороками сердца, сопровождающимися Легочной артериальной гипертензией в послеоперационном периоде. Анкета состояла из семи вопросов. Данные обработаны методом процентного распределения ответов.

Ниже приведен пример анкеты. Таблица 1.

Таблица 1. ГБУЗ «Республиканский детский клинический многопрофильный центр» Минздрава КБР ГБУЗ «РДКМЦ» г. Нальчик

Анкета

врач – педиатр, детский кардиолог, ревматолог)

• Особенности структуры пациентов с ЛАГ	
• Организация первичной медико-санитарной помощи пациентам с ЛАГ в дооперационном периоде	
• Организация первичной медико-санитарной помощи пациентам с ЛАГ в послеоперационном периоде	
• Особенности лекарственного обеспечения пациентов с ВПС с ЛАГ	
• Особенности социальной защиты детям с ВПС, сопровождающимся ЛАГ	
• Организация СМП пациентам с ЛАГ в дооперационном периоде	
• Организация СМП пациентам с ЛАГ в послеоперационном периоде	

В ходе исследования, врачи должны были выбрать область своей специализации и ответить на 7 вопросов, исходя из опыта работы

с пациентами, которые имели врожденный порок сердца, сопровождающийся легочной артериальной гипертензией.

Результаты исследования и обсуждения

Анкетирование проведено у 22 специалистов. Обнаружено, что большую часть пациентов с врожденными пороками сердца, осложненными легочной артериальной гипертензией в послеоперационном периоде, наблюдают детские кардиологи. Однако в оказании первичной медико-санитарной помощи, где производится осмотр и диспансеризация с первых дней жизни ребенка, первичным звеном являются педиатры поликлинического отделения. Что касается организации первичной медико-санитарной помощи пациентам с врожденными пороками сердца, сопровождающимися легочной гипертензией в дооперационном и послеоперационном периодах, около 70% всех специалистов отметили, что обследование проводится в зависимости от степени тяжести заболевания. 20% врачей считают, что в послеоперационном периоде медико-санитарная помощь должна осуществляться посредством наблюдения участкового педиатра, детского кардиолога, госпитализацией в период среднетяжелого и тяжелого течения, наблюдением главного внештатного кардиолога. Отдельного решения требует лекарственное обеспечение пациентов с врожденными пороками сердца, осложненными легочной артериальной гипертензией. Таким образом, 90% врачей педиатров выделили детей-инвалидов, получающих лекарства по льготной поддержке, и ведение таких пациентов только детскими кардиологами. 10% считали необходимым направления к детскому кардиологу. В свою очередь, ревматологами и детскими кардиологами были прописаны лекарственные препараты, применяемые при данном заболевании согласно клиническим рекомендациям. Говоря об особенностях социальной защиты детей с Врожденными пороками сердца, сопровождающимися легочной артериальной гипертензией, хочется отметить, что 90% среди всех специалистов убеждены в необходимости реабилитационных мероприятий и санаторно-курортного лечения. 10% из общего числа врачей стационарного отделения отметили направление на Медико-социальную экспертизу. Заключительные вопросы были об организации специализированной медицинской помощи пациентам с врожденными пороками сердца, с легочной артериальной гипертензией в дооперационном и послеоперационном периодах. 20% из общего числа затруднились ответить на пункт специализированной медицинской помощи (СМП) в дооперационном периоде. 60% отметили транспортировку для госпитализации. 20% врачей стационара – перевод в (реанимационно-анестезиологическое отделение (ОАР). 20% выделили высокотехнологичную медицинскую помощь с обеспечением бесплатного медицинского лечения и обследования. В организации специализированной медицинской помощи пациентам с врожденными пороками сердца с легочной гипертензией в послеоперационном периоде 70% всех врачей указали диспансерное наблюдение в амбулаторном порядке с применением диагностических методов исследования и контроля за состоянием, 20% – наблюдение в отделении, 10% – вызов скорой медицинской помощи по необходимости.

Результаты анкетирования:

- 1) группа пациентов неоднородна и требует разных подходов;
- 2) действующие стандарты не отражают специфику послеоперационного периода ВПС, осложненных легочной артериальной гипертензией;
- 3) клинические рекомендации недостаточно охватывают возможное осложнение [3,5,6,7,8].

Выводы

Анкетирование показало необходимость изменения порядка обеспечения адекватной и своевременной медицинской помощи пациентам с ВПС, сопровождающимся ЛАГ в послеоперационном периоде в рамках диспансерного наблюдения. Целесообразна разработка отдельного порядка диспансеризации, так как действующие рекомендации не отражают специфику данной патологии.

Литература

1. Указ Президента РФ от 17 мая 2023 г. № 358 «О стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202305170008>
2. Л. И. Агапитов. Диагностика и лечение легочной артериальной гипертензии у детей. Медицинский научно-практический журнал. <https://www.lvrach.ru/>
3. Ачилова Ф.А., Ибатова Ш.М., Абдукадилова Н.Б. Распространенность малых аномалий сердца у детей по данным эхокардиографии. Международный журнал научной педиатрии. № 5. С. 11–15. Издательство: I-EDU GROUP LLC. 2022.

4. Frank BS, Ivy DD. Diagnosis, Evaluation and Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension in Children. Children (Basel). 2018 Mar 23;5(4):44. doi: 10.3390/children5040044.

5. Ассоциация Детских кардиологов России. Клинические рекомендации от 2024 г. <https://cardiorus.ru/local/api/download/?id=0d77405e04e3449f4c9ec70ce563a223>

6. Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с ВПС. https://library.mededtech.ru/rest/documents/fkr_porokserd2015

7. Школьников М.А., Бокерия Е.А., Дегтярева Е.А., Ильин В.И., Шарыкин А.С. Неонатальный скрининг с целью раннего проявления критических врожденных пороков сердца. Методические рекомендации. М., 2012. 37 стр.

8. Абу-Халима М., Порьо М., Людвиг Н., Марк Дж., Марсоллек И., Гибельс К., Петерсен Дж., Шеферс Х. Дж., Грундманн У., Пикардт Т., Келлер А., Мезе Э., Абдул-Халик Х. Дифференциальная экспрессия микроРНК после сердечно-легочного шунтирования у детей с врожденными пороками сердца. Журнал трансляционной медицины. 2017; 15 (1): 117. doi: 10.1186/s12967-017-1213-9.

9. Игишева Л. Н., Аникеенко А.А., Шмелевич С.А., Сизова И.Н. К вопросу комплексной оценки здоровья детей, оперированных по поводу врожденных пороков сердца. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2019;8(4C):42–50. doi:10.17802/2306-1278-2019-8-4S-42-50.

10. «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» – научно-практический рецензируемый журнал. Современная стратегия терапии легочной гипертензии у детей. <https://cardiovascular.elpub.ru/jour/article/view/805locale=ru>

PROBLEMS OF ORGANIZING MEDICAL CARE FOR CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS ACCOMPANIED BY PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION AT THE REGIONAL LEVEL

Magomedova A.A.

Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery of the Kabardino-Balkarian Republic
Relevance. One of the prognostically unfavorable complications of congenital heart disease is pulmonary arterial hypertension (PAH), which can persist long after surgical correction. The WHO initiative on the classification of PAH (1973) emphasizes the continuing medical and social significance of this problem. There are two main groups of patients with CHD complicated by pulmonary arterial hypertension: operable and inoperable. [4,7] The objective of this work is to analyze the characteristics of the management of children with congenital heart disease complicated by PAH in the postoperative phase. Objective. To determine the specifics of organizing medical care for patients with congenital heart defects accompanied by pulmonary arterial hypertension in the postoperative period. Materials and methods. The study was conducted from November 2024 to May 2025. The participants were physicians from the Republican Children's Clinical Medical Center (Nalchik): pediatric cardiologists, outpatient and inpatient pediatricians, and rheumatologists. The author's questionnaire included 7 items assessing the following: the structure of patients with PAH, the organization of primary care in the pre- and postoperative periods, the specifics of drug therapy, social support mechanisms, and the availability of specialized medical care. Results. 22 specialists completed the survey. The following was revealed:

1. Patient monitoring: pediatric cardiologists play the main role in postoperative care, however, primary screening is performed by pediatricians at outpatient clinics. Inpatient department physicians at primary care organizations noted varying degrees of disease severity and the need for an individual approach depending on the form (70%).

2. Drug provision: dependence on benefit programs was revealed (90% of responses), individual therapy regimens are required.

3. Social protection: the absolute majority of respondents (90%) indicated the need for rehabilitation and sanatorium programs.

4. Specialized care:

– Preoperative: transportation for hospitalization predominates (60%).

– Postoperative: outpatient and dispensary observation with condition monitoring (70%).

Key issues in the results obtained:

1) the patient group is heterogeneous and requires different approaches;

2) current standards do not reflect the specifics of the postoperative period of congenital heart disease complicated by pulmonary arterial hypertension; 3) clinical recommendations do not sufficiently cover possible complications

Conclusions. The survey revealed the need to change the procedures for ensuring adequate and timely medical care for patients with congenital heart disease accompanied by pulmonary arterial hypertension during the postoperative period as part of their follow-up care. Developing a separate follow-up procedure is advisable, as current recommendations do not reflect the specific nature of this condition.

Keywords. Congenital heart defects, postoperative pulmonary hypertension, dispensary observation, organization of medical care, pediatric cardiology.

References

1. Decree of the President of the Russian Federation of May 17, 2023 No. 358 "On the strategy of comprehensive child safety in the Russian Federation for the period up to 2030". <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202305170008>

2. L.I. Agapitov. Diagnosis and treatment of pulmonary arterial hypertension in children. Medical scientific and practical journal. <https://www.lvrach.ru/>

3. Achilova F.A., Ibatova Sh.M., Abdukadirova N.B. Prevalence of minor cardiac anomalies in children according to echocardiography data. International Journal of Scientific Pediatrics. No. 5. pp. 11–15. Publisher: I-EDU GROUP LLC. 2022.

4. Frank BS, Ivy DD. Diagnosis, Evaluation and Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension in Children. Children (Basel). 2018 Mar 23;5(4):44. doi: 10.3390/children5040044.

5. Association of Pediatric Cardiologists of Russia. Clinical guidelines from 2024. <https://cardiorus.ru/local/api/download/?id=0d77405e04e3449f4c9ec70ce563a223>

6. Federal clinical guidelines for providing medical care to children with congenital heart disease. https://library.mededtech.ru/rest/documents/fkr_porokserd2015

7. Shkolnikova M.A., Bokeria E.A., Degtyareva E.A., Ilyin V.I., Sharykin A.S. Neonatal screening for early manifestation of critical congenital heart defects. Methodical recommendations. Moscow, 2012. 37 p.

8. Abu-Halima M., Porjo M., Ludwig N., Mark J., Marsollek I., Giebels K., Petersen J., Schaefer H.J., Grundmann U., Pickardt T., Keller A., Meese E., Abdal-Khalik H. Differential expression of microRNAs after cardiopulmonary bypass in children with congenital heart defects. Journal of Translational Medicine. 2017;15 (1): 117. doi: 10.1186/s12967-017-1213-9.

9. Igisheva L.N., Anikeenko A.A., Shmulevich S.A., Sizova I.N. On the issue of a comprehensive assessment of the health of children operated on for congenital heart defects. Complex issues of cardiovascular diseases. 2019; 8 (4C): 42–50. doi: 10.17802/2306-1278-2019-8-4S-42-50.

10. "Cardiovascular Therapy and Prevention" is a peer-reviewed scientific journal. Modern strategies for treating pulmonary hypertension in children. <https://cardiovascular.elpub.ru/jour/article/view/805locale=ru>

Пшукова Елена Мухадиновна,

к.м.н., доцент кафедры нормальной и патологической анатомии,
Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова
E-mail: pshukova.71@mail.ru

Мирзоева Назифат Мухтаровна,

к.б.н., доцент кафедры нормальной и патологической анатомии
Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова
E-mail: mnazifa@bk.ru

Жилокова Алина Олеговна,

студент, специальность «Лечебное дело», Кабардино-Балкарский
государственный университет им.Х.М.Бербекова, Медицинская Академия
E-mail: alzhilokova111@mail.ru

Мидов Арсен Заурбекович,

студент, специальность «Педиатрия», Кабардино-Балкарский
государственный университет им.Х.М.Бербекова, Медицинская Академия
E-mail: Midovars@mail.ru

Карчаева Аида Эльдаровна,

студент, специальность «Педиатрия», Кабардино-Балкарский
государственный университет им.Х.М.Бербекова, Медицинская Академия
E-mail: karchaeva.aida@mail.ru

Данное исследование посвящено анализу возможностей и ограничений гистологической верификации опухолей кишечника, акцентируя внимание на роли дополнительных методов исследования. Проведен анализ современных научных публикаций, посвященных применению иммуногистохимических маркеров в дифференциальной диагностике опухолей кишечника, значению молекулярно-генетических методов в уточнении диагноза и выявлении прогностически значимых факторов, а также сложностям, возникающим при диагностике редких новообразований кишечника. Результаты анализа демонстрируют, что иммуногистохимические исследования значительно расширяют возможности патоморфологической диагностики, позволяя точно идентифицировать гистогенез опухоли и определять чувствительность к терапии.

Ключевые слова: рак кишечника, гистология, иммуногистохимия, молекулярная генетика, диагностика, редкие опухоли, морфология, патология, дифференциальный диагноз, маркеры опухоли.

Введение

Злокачественные новообразования кишечника занимают одно из ведущих мест в структуре онкологической заболеваемости и смертности во всем мире. Ранняя и точная диагностика, основанная на всесторонней оценке морфологических характеристик опухоли, играет ключевую роль в определении тактики лечения и прогнозе заболевания. Гистологическая верификация, включающая в себя детальный анализ ткани опухоли под микроскопом, остается золотым стандартом в диагностике рака кишечника. Однако, несмотря на достижения в области морфологической диагностики, некоторые опухоли представляют значительные трудности для точной идентификации и классификации.

Целью данного исследования является анализ современных возможностей и ограничений гистологической верификации опухолей кишечника, включая оценку роли иммуногистохимических, молекулярно-генетических методов и проблем, возникающих при диагностике редких новообразований.

Научная новизна работы заключается в комплексном анализе современных подходов к гистологической верификации опухолей кишечника, включая: систематизацию данных об использовании иммуногистохимических маркеров для уточнения диагноза; анализ роли молекулярно-генетических исследований в дополнении данных гистологического исследования, а также обзор трудностей, возникающих при диагностике редких опухолей кишечника и путей их преодоления.

Материалы и методы исследований

Материалом для данного исследования послужили научные публикации по темам, связанным с гистологической верификацией опухолей кишечника, иммуногистохимическими маркерами, молекулярно-генетическими исследованиями и диагностикой редких новообразований кишечника. Поиск публикаций осуществлялся по ключевым словам, включая «опухоли кишечника», «рак кишечника», «гистологическая верификация», «иммуногистохимия», «молекулярная диагностика», и «редкие опухоли кишечника». Проведен анализ и систематизация найденных публикаций с целью выявления современных тенденций, достижений и нерешенных проблем в данной области.

Результаты и обсуждения

В диагностике аденокарцином кишечника, наиболее распространенного типа злокачественных новообразований, иммуногистохимические маркеры играют важную роль в дифференциальной диагностике с другими типами опухолей, такими как метастатические новообразования, нейроэндокринные опухоли и лимфомы. Маркеры, такие как CK20 и CDX2, обычно экспрессируются в аденокарциномах толстой кишки, в то время как CK7 может указывать на метастатическое поражение из других органов, например легких или яичников. CDX2, являясь маркером кишечной дифференцировки, также важен для дифференциации аденокарцином толстой кишки от аденокарцином желудка, которые, как правило, его не экспрессируют. Кроме того, определение муцинов, таких как MUC2 и MUC5AC, может помочь в подтипировании аденокарцином и предсказании их биологического поведения.

Особое значение ИГХ приобретает в диагностике мелко дифференцированных аденокарцином и опухолей с необычной морфологией. В таких случаях, когда гистологическая картина недостаточно специфична, панель антител, включающая CK20, CDX2, CK7, CEA и другие маркеры, может помочь установить гистогенез опухоли и исключить другие потенциальные диагнозы.

Помимо дифференциальной диагностики, ИГХ используется для определения прогностических и предиктивных маркеров в аденокарциномах кишечника. Статус MMR, определяемый с помощью антител к MLH1, PMS2, MSH2 и MSH6, важен для выявления микросателлитной нестабильности (MSI-H), которая характерна для приблизительно 15% случаев колоректального рака. MSI-H ассоциируется с лучшим прогнозом и повышенной чувствительностью к иммунотерапии ингибиторами контрольных точек иммунного ответа, таких как PD-1 и CTLA-4.

Экспрессия PD-L1 в опухолевых клетках и иммунных клетках также является важным предиктивным маркером для иммунотерапии [7, с. 500]. Определение PD-L1 с помощью ИГХ позволяет выявить пациентов, которые могут получить наибольшую пользу от лечения ингибиторами PD-1/PD-L1.

В диагностике нейроэндокринных опухолей кишечника ИГХ имеет решающее значение для подтверждения нейроэндокринной дифференцировки и определения степени злокачественности. Маркеры, такие как хромогранин А, синаптофизин и CD56, экспрессируются большинством НЭО и используются для их идентификации. Ki-67, маркер пролиферативной активности, используется для определения степени злокачественности НЭО, а также для стратификации пациентов по риску прогрессирования заболевания. Соматостатиновые рецепторы также определяются с помощью ИГХ, что позволяет выявить пациентов, которые могут быть кандидатами для лечения аналогами соматостатина [4, с. 20].

При диагностике желудочно-кишечных стромальных опухолей ИГХ играет ключевую роль в подтверждении диагноза и определении мутационного статуса. CD117 (c-Kit) и DOG1 являются основными маркерами для GIST, однако примерно в 5% случаев CD117 негативен, и в этих ситуациях DOG1 может быть полезен для подтверждения диагноза [2, с. 128]. Определение мутационного статуса гена KIT и PDGFR-FA также важно для прогнозирования ответа на лечение ингибиторами тирозинкиназ, такими как иматиниб.

Диагностика лимфом, поражающих кишечник, также требует использования ИГХ. Определение поверхностных и цитоплазматических маркеров, таких как CD20, CD3, CD5, CD10, BCL2 и Ki-67, позволяет идентифицировать тип лимфомы и оценить ее агрессивность.

В современном арсенале средств диагностики онкологических заболеваний, молекулярно-генетические исследования занимают все более важное место, предоставляя уникальную информацию, дополняющую традиционные гистологические методы. В контексте диагностики опухолей кишечника интеграция молекулярно-генетического анализа с гистологической верификацией открывает новые перспективы для уточнения диагноза, определения прогноза и выбора оптимальной стратегии лечения.

Гистологическое исследование, основанное на морфологической оценке ткани опухоли, часто является первым этапом в диагностике рака кишечника. Однако, в ряде случаев, морфологической информации оказывается недостаточно для точной классификации опухоли, определения ее происхождения или прогнозирования ее поведения [9, с. 17]. Именно в этих ситуациях молекулярно-генетические методы приходят на помощь, позволяя выявить генетические изменения, лежащие в основе опухолевого роста, и предоставить дополнительные критерии для дифференциальной диагностики.

Одним из наиболее распространенных применений молекулярно-генетических исследований в диагностике опухолей кишечника является определение микросателлитной нестабильности. Она возникает в результате дефектов в системе репарации ДНК, приводящих к накоплению мутаций в микросателлитных локусах. Определение нестабильности имеет важное клиническое значение, так как MSI-H опухоли характеризуются лучшим прогнозом и повышенной чувствительностью к иммунотерапии ингибиторами контрольных точек иммунного ответа, таких как PD-1 и CTLA-4. MSI может быть определена с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием набора микросателлитных маркеров, или с помощью иммуногистохимического анализа (ИГХ) на экспрессию белков системы репарации ДНК (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2).

Помимо MSI, в диагностике рака кишечника широко используются методы определения мутаций в генах KRAS, NRAS и BRAF. Мутации в этих генах являются предиктивными маркерами для терапии ингибиторами EGFR (epidermal growth factor receptor). Пациенты с метастатическим колоректальным раком и мутациями в KRAS или NRAS не отвечают на лечение ингибиторами EGFR, такими как цетуксимаб и панитумумаб. BRAF мутации также имеют прогностическое значение и ассоциируются с более агрессивным течением заболевания. Для определения мутаций в этих генах используются различные методы, такие как ПЦР, секвенирование нового поколения и жидкостная биопсия [1, с. 30].

Секвенирование нового поколения представляет собой мощный инструмент для одновременного анализа множества генов и выявления различных типов генетических изменений, включая мутации, делеции, амплификации и транслокации. Оно широко используется в диагностике рака кишечника для выявления известных онкогенных мутаций, определения новых потенциальных мишеней для терапии и стратификации пациентов по риску прогрессирования заболевания.

Жидкостная биопсия, представляющая собой анализ циркулирующей опухолевой ДНК в крови, стала многообещающим методом для диагностики и мониторинга рака кишечника [5, с. 8]. Анализ цДНК позволяет выявлять генетические изменения, характерные для опухоли, без необходимости проведения инвазивной биопсии. Жидкостная биопсия может быть использована для ранней диагностики рака,

мониторинга ответа на лечение, выявления резистентности к терапии и прогнозирования рецидива заболевания.

В диагностике редких опухолей кишечника, таких как гастроинтестинальные стромальные опухоли (GIST) и нейроэндокринные опухоли (НЭО), молекулярно-генетические исследования также играют важную роль. Определение мутаций в генах KIT и PDGFRFA в GIST позволяет прогнозировать ответ на лечение ингибиторами тирозинкиназ, такими как Иматиниб [8, с. 72]. В НЭО молекулярно-генетический анализ может помочь в определении степени злокачественности и прогнозировании исхода заболевания.

Таким образом, молекулярно-генетические исследования являются важным дополнением к гистологической верификации опухолей кишечника, предоставляя ценную информацию для уточнения диагноза, определения прогноза и выбора оптимальной стратегии лечения. Интеграция молекулярно-генетического анализа с гистологическим исследованием позволяет персонализировать лечение пациентов с опухолями кишечника и улучшить результаты терапии.

Диагностика редких опухолей кишечника представляет собой значительную проблему в современной патоморфологии, требующую от специалистов высокого уровня знаний, опыта и владения широким спектром методов исследования. В силу низкой распространенности этих новообразований, патологоанатомы нередко сталкиваются с диагностическими трудностями, обусловленными необычной морфологической картиной, нетипичной иммуногистохимической экспрессией и отсутствием четких диагностических критериев в международных классификациях.

Одной из наиболее сложных групп редких опухолей кишечника являются нейроэндокринные новообразования. Несмотря на наличие четких гистологических критериев градации, дифференциальная диагностика высокодифференцированных и низкодифференцированных НЭО бывает затруднительной [6, с. 23]. Кроме того, существуют атипичные варианты НЭО, характеризующиеся необычной морфологией, такими как плеоморфные клетки, рабдоидные признаки или преобладание веретенообразных клеток, что затрудняет их дифференцировку от других типов опухолей. Иммуногистохимическое исследование с использованием панели маркеров, включающих хромогранин А, синаптофизин, CD56 и Ki-67, является обязательным для подтверждения нейроэндокринной дифференцировки и определения индекса пролиферативной активности. Однако, в некоторых случаях, экспрессия этих маркеров может быть слабой или отсутствовать, что затрудняет диагностику. Молекулярно-генетические исследования, направленные на выявление мутаций в генах MEN1, DAXX/ATRX и mTOR сигнального пути, могут быть полезны для уточнения диагноза и определения прогноза НЭО.

Меланомы желудочно-кишечного тракта представляют собой редкую и агрессивную опухоль, диагностика которой требует исключения первичной меланомы кожи или другого органа. Меланомы ЖКТ могут иметь различную морфологическую картину, от эпителиоидной до веретенообразной, и часто содержат пигмент меланин [3, с. 84]. Иммуногистохимическое исследование с использованием маркеров меланокитарной дифференцировки, таких как Melan-A, HMB-45 и S-100, является необходимым для подтверждения диагноза.

Первичные лимфомы ЖКТ, в отличие от метастатического поражения, представляют собой экстранодальные лимфомы, возникающие непосредственно в стенке кишечника. Они могут иметь различную гистологическую структуру и иммунофенотип, в зависимости от типа лимфомы. Дифференциальная диагностика между лимфомой и другими типами опухолей, такими как карцинома или саркома, требует использования панели антител, включающих CD20, CD3, CD5, CD10, BCL2 и Ki-67 [10, с. 34].

Редкие эпителиальные опухоли кишечника, такие как аденокарциномы с нейроэндокринной дифференцировкой, скirroзные карциномы и микропапиллярные карциномы, также представляют собой диагностические трудности. Эти опухоли характеризуются необычной морфологией и нетипичным иммунофенотипом. Дифференциальная диагностика требует тщательного анализа гистологической картины и использования панели антител, включающих цитокератины, маркеры нейроэндокринной дифференцировки и другие специфические маркеры.

Выводы

Гистологическая верификация продолжает оставаться фундаментальным методом диагностики опухолей кишечника, обеспечивающим основу для определения стратегии лечения и прогнозирования исхода заболевания. Однако, как показал проведенный анализ научной литературы, современная морфологическая диагностика не является абсолютно безупречной и сталкивается с рядом значительных трудностей.

Важным шагом вперед стало внедрение в практику иммуногистохимических методов, позволяющих существенно расширить возможности диагностики и уточнить гистогенез опухолей. Использование панели специфических антител позволяет дифференцировать различные типы опухолей, в особенности в случаях с нечеткой морфологической картиной, а также выявлять прогностически значимые маркеры. Тем не менее, необходимо отметить, что интерпретация результатов иммуногистохимических исследований требует высокой квалификации и опыта патолога, а также стандартизации протоколов и контроля качества реагентов.

Молекулярно-генетические исследования заняли прочное место в алгоритме диагностики опухолей кишечника, предоставляя ценную информацию о генетических изменениях, лежащих в основе опухолевого роста. Анализ мутаций, амплификаций и других генетических aberrаций не только способствует уточнению диагноза, особенно в сложных и неоднозначных случаях, но и позволяет выявлять потенциальные мишени для таргетной терапии и стратифицировать больных по прогнозу.

Диагностика редких опухолей кишечника представляет собой особую проблему, требующую от патологов глубоких знаний и опыта. Эти новообразования, отличающиеся от распространенных аденокарцином кишечника, часто имеют атипичную морфологическую картину, что затрудняет их идентификацию. В этих случаях особенно важен комплексный подход, включающий использование как классических гистологических методов, так и современных иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований.

Так, гистологическая верификация опухолей кишечника является динамично развивающейся областью, требующей постоянного обновления знаний и внедрения новых технологий. Комплексное использование гистологических, иммуногистохимических и молекулярно-генетических методов позволяет повысить точность диагностики, улучшить стратификацию больных и, в конечном итоге, оптимизировать результаты лечения.

Литература

1. Десятков Е.Н., Алиев Ф.Ш. Аргонплазменная коагуляция в колопроктологии: клинический опыт и перспективы метода // Хирургия и онкология, 2015 г. С. 25–32.
2. Джантуханова С.В., Старков Ю.Г., Велизаде Л.А., Глозов А.В. Редкие неэпителиальные опухоли желудочно-кишечного тракта: особенности эндоскопической и морфологической диагностики // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология, 2023 г. С. 122–131.
3. Козлов Н.А. Трудности морфологической верификации забрюшинных опухолей // Злокачественные опухоли, 2018 г. С. 82–89.
4. Лагодич Н.А., Воробей А.В., Махмудов А.М. Современные эндоскопические классификации эпителиальных новообразований в толстой кишке. Их роль в лечебной тактике // Проблемы здоровья и экологии, 2016 г. С. 19–23.
5. Малихова О.А., Завьялов Д.В., Кашин С.В., Шишин К.В., Ильяшенко М.Г., Киреев Ш.У., Михин А.И., Сидорова А.Н., Малихов А.Г. Рекомендации по эндоскопической диагностике, лечению и наблюдению пациентов с эпителиальными новообразованиями толстой кишки. 2022 год // Современная онкология, 2023 г. С. 5–14.
6. Одноэтапное радикальное хирургическое лечение больных осложненным раком толстой кишки / А.С. Ермолов [и др.] // Хирургия. Журн. им. Н.И. Пирогова. – 2012. – № В. – С. 19–24.
7. Орел Н.Ф., Артамонова Е.В., Горбунова В.А., Делекторская В.В., Емельянова Г.С., Любимова Н.В., Маркович А.А., Орлова К.В., Орлова Р.В., Трифанов В.С. Практические рекомендации по лекарствен-

ному лечению нейроэндокринных неоплазий желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и других локализаций // Злокачественные опухоли: Практические рекомендации, 2021 г. С. 499–512.

8. Родионов Е. О., Столярова В.А., Миллер С.В., Подолько Д.В., Тузиков С.А., Безгодова Н.В., Мох А.А., Маркович В.А., Миллер Д.С. Нейроэндокринная опухоль тонкой кишки и карциноидный синдром: трудности диагностики (клиническое наблюдение) // Сибирский онкологический журнал, 2022 г. С. 16–167.

9. Филон А.Ф., Пересада И.В., Челноков М.В. Выбор метода лечения крупных аденом прямой кишки // Колопроктология. – 2011. – № 2 (36). – С. 13–17.

10. Челноков М.В. Эффективность трансанальной эндохирургии в лечении крупных аденом прямой кишки: автореф. ... канд. мед. наук / М.В. Челноков. – М., 2011. 9. Современные принципы лечения крупных аденом прямой кишки / Ю.А. Шелыгин [и др.] // Онкология. Журн. им. П.А. Герцена. – 2013. – № 2. – С. 32–37.

HISTOLOGICAL VERIFICATION OF INTESTINAL TUMORS

Pshukova E.M., Mirzoeva N.M., Zhilokova A.O., Midov A.Z., Karchaeva A.E.
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov

This study analyzes the possibilities and limitations of histological verification of intestinal tumors, focusing on the role of additional research methods. The analysis of modern scientific publications devoted to the use of immunohistochemical markers in the differential diagnosis of intestinal tumors, the importance of molecular genetic methods in clarifying the diagnosis and identifying prognostically significant factors, as well as the difficulties encountered in the diagnosis of rare intestinal neoplasms. The results of the analysis demonstrate that immunohistochemical studies significantly expand the possibilities of pathomorphological diagnosis, allowing accurate identification of tumor histogenesis and determination of sensitivity to therapy.

Keywords: intestinal cancer, histology, immunohistochemistry, molecular genetics, diagnosis, rare tumors, morphology, pathology, differential diagnosis, tumor markers.

References

1. Desyatov E.N., Aliev F.S. Argonoplasmaic coagulation in coloproctology: clinical experience and prospects of the method // Surgeons and oncology, 2015, pp. 25–32.
2. Dzhantukhanova S.V., Starkov Yu.G., Velizade L.A., Glotov A.V. Rare non-epithelial tumors of the gastrointestinal tract: endoscopic and morphological features diagnostics // Experimental and Clinical Gastroenterology, 2023, pp. 122–131.
3. Kozlov N.A. Difficulties of morphological verification of retroperitoneal tumors // Malignant tumors, 2018, pp. 82–89.
4. Lagodich N.A., Vorobey A.V., Makhmudov A.M. Modern endoscopic classifications of epithelial neoplasms in the colon. Their role in therapeutic tactics // Problems of health and ecology, 2016, pp. 19–23.
5. Malikhova O.A., Zavyalov D.V., Kashin S.V., Shishin K.V., Ilyashenko M.G., Kireev Sh. U., Mikhin A.I., Sidorova A.N., Malikhov A.G. Recommendations for endoscopic diagnosis, treatment and follow-up of patients with epithelial neoplasms of the colon. 2022 // Modern Oncology, 2023, pp. 5–14.
6. Single-stage radical surgical treatment of patients with complicated colon cancer / A.S. Ermolov [et al.] // Surgery. Journal named after H.I. Pirogov. – 2012. no. V. – pp. 19–24.
7. Orel N.F., Artamonova E.B., Gorbunova B.A., Delektorskaya B.B., Yemelyanova G.S., Lyubimova H.B., Markovich A.A., Orlova K.V., Orlova R.V., Trifanov V.S. Practical recommendations for drug treatment of neuroendocrine neoplasia gastrointestinal tract, pancreas and other localizations // Malignant tumors: Practical recommendations, 2021, pp. 499–512.
8. Rodionov, E. O., Stolyarova, V. A., Miller, S. V., Podolko, D. V., Tuzikov, S. A., Bezgodova, N. V., Mokh, A. A., Markovich, V. A., Miller, D. S. Neuroendocrine tumor of the small intestine and carcinoid syndrome: diagnostic difficulties (clinical observation) // Siberian Journal of Oncology, 2022 G. S. 16–167.
9. Filon A.F., Peresada I.V., Chelnokov M.V. Choice of treatment method for large rectal adenomas // Coloproctology. – 2011. – № 2 (36). – Pp. 13–17.
10. Chelnokov M.V. Effectiveness of transanal endosurgery in the treatment of large rectal adenomas: abstract of the Candidate of Medical Sciences / M.V. Chelnokov, Moscow, 2011. 9. Modern principles of treatment of large rectal adenomas / Yu.A. Shelygin [et al.] // Oncology. P.A. Herzen Journal. – 2013. – No. 2. – pp. 32–37.

Роль биомаркеров повреждения мозга (NSE, S-100, GFAP, UCH-L1) в прогнозировании исходов у реанимационных пациентов после черепно-мозговой травмы

Николаев Никита Викторович,

студент, ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет» Минздрава России
E-mail: nikitanikolaev0283@gmail.com

Орлова Диана Юрьевна,

студент, ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет» Минздрава России
E-mail: dianaorlova@yandex.ru

Хатомкин Дмитрий Михайлович,

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры неврологии
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет»
Минздрава России
E-mail: nevrologia2020@yandex.ru

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) остается одной из ведущих причин смерти и инвалидизации, особенно среди молодого населения. Раннее и точное прогнозирование исходов у реанимационных пациентов с ЧМТ является ключевым для оптимизации лечения, консультирования родственников и планирования реабилитации. В обзоре представлен анализ современных данных о роли биомаркеров повреждения мозга – нейронспецифической енолазы (NSE), белка S-100B, глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) и убиквитин-карбоксил-терминальной гидролазы L1 (UCH-L1) – в прогнозировании исходов у пациентов с ЧМТ. На основе систематического анализа исследований показано, что GFAP и UCH-L1 обладают высокой прогностической ценностью для предсказания летального исхода и неблагоприятного функционального восстановления при тяжелой ЧМТ, тогда как NSE и S-100B демонстрируют умеренную прогностическую значимость, вследствие низкой специфичности. Интеграция биомаркеров в существующие прогностические модели (IMPACT) позволяет повысить точность прогноза, особенно у пациентов с оценкой по шкале комы Глазго 3–12 баллов. Однако для внедрения в клиническую практику необходимы дальнейшие исследования, направленные на стандартизацию методов измерения, определение пороговых значений и валидацию комбинированных мультимодальных моделей.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, биомаркеры, NSE, S-100B, GFAP, UCH-L1, прогнозирование исходов, реанимация.

Введение

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) представляет собой глобальную медико-социальную проблему, являясь основной причиной смертности и инвалидизации лиц молодого и среднего возраста [1]. В условиях отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) раннее прогнозирование исходов ЧМТ является критически важным для определения тактики лечения, проведения целевой нейропротекции, консультирования семьи и планирования реабилитационных мероприятий [2]. Традиционные клиническо-инструментальные методы (шкала комы Глазго, нейровизуализация, электрофизиологический мониторинг) имеют определенные ограничения, особенно в остром периоде травмы [3]. В последние годы активно изучаются не только сами биомаркеры, но и патофизиологические механизмы их высвобождения, а также возможности их использования для оценки тяжести повреждения и прогноза у разных категорий пациентов [4].

В последние годы активно изучаются биомаркеры повреждения мозга, которые могут отражать степень нейронального и глиального повреждения, а также прогнозировать функциональные исходы [5]. К наиболее перспективным маркерам относятся:

1. Нейронспецифическая енолаза (NSE) – фермент, содержащийся в нейронах;
2. Белок S-100B – кальций-связывающий белок астроцитов;
3. Глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) – структурный белок астроцитов;
4. Убиквитин-карбоксил-терминальная гидролаза L1 (UCH-L1) – фермент, обильно представленный в нейронах.

Цель исследования – систематизировать современные данные о прогностической ценности биомаркеров (NSE, S100B, GFAP, UCH-L1) у реанимационных пациентов с ЧМТ и оценить возможность их интеграции в клиническую практику.

Материалы и методы

Обзор проведен на основе анализа научных публикаций с использованием баз данных PubMed, Scopus, Web of Science. Анализ включал оценку диагностической и прогностической точности биомаркеров, их корреляцию с клиническими исходами (смертность, функциональное восстановление по расширенной шкале комы Глазго(GOSE)), а также возможность улучшения существующих прогностических моделей (на основе IMPACT). Глубина анализа включала оценку площади под ROC-кривой (AUC), чувствительности и специфичности методов.

Результаты

GFAP и UCH-L1

Глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) – это белок промежуточных филаментов III типа, который играет ключевую роль в поддержании формы, структуры и механической прочности астроцитов. Молекулярная масса белка составляет около 50–52 кДа. Как и другие белки промежуточных филаментов, мономер GFAP состоит из трех основных доменов: неспирализованного amino-концевого «головного» домена, центральной альфа-спиральной α-спирали («стержень») и карбокси-концевого «хвостового» домена. В ЦНС GFAP экспрессируется преимущественно в астроцитах, а также в эпендимальных клетках, выстилающих желудочки мозга. Иммуногистохимическое выявление GFAP является «золотым стандартом» для идентификации астроцитов в норме и при патологии. Недавние исследования (2025 г.) раскрыли принципиально новую функцию белка. Было показано, что филаменты GFAP тесно обертываются вокруг митохондрий и служат «каркасом» для прикрепления белка Drp1 (dynamin-related protein 1), необходимого для деления митохондрий. Таким образом, GFAP напрямую участвует в регуляции энергетического метаболизма клетки, контролируя процессы слияния и деления митохондрий [6]. GFAP участвует в формировании межклеточных контактов и может служить платформой для взаимодействия различных сигнальных молекул и ферментов, а также участвует в поддержании нейротрансмиссии, влияя на везикулярный транспорт в астроцитах, что важно для регуляции клиренса нейротрансмиттеров (например, глутамата) из синаптической щели [7]. Таким образом,

повышение уровня данного белка в крови и цереброспинальной жидкости является следствием повреждения астроцитов и/или нарушения целостности ГЭБ вследствие черепно-мозговой травмы.

Убиквитин С-терминальная гидролаза L1 (UCH-L1) – представляет собой цитозольный фермент с молекулярной массой около 24–25 кДа, принадлежащий к семейству убиквитин-С-терминальных гидролаз (UCH). Он катализирует гидролиз убиквитина, связанного с малыми молекулами или пептидами, высвобождая свободный убиквитин для повторного использования в протеасомной деградации, тем самым участвует в поддержании пула свободного убиквитина в синапсах, необходимого для пластичности и высвобождения нейромедиаторов. UCH-L1 является одним из наиболее чувствительных биомаркеров повреждения нейронов. Высвобождение из поврежденных нейронов приводит к быстрому повышению концентрации UCH-L1 в цереброспинальной жидкости и крови (в течение 6–12 часов после травмы). Комбинация UCH-L1 с астроцитарным маркером GFAP используется в клинических алгоритмах для диагностики легкой ЧМТ и прогнозирования исхода (например, тест Banyan Brain Trauma Indicator одобрен FDA).

В исследовании TRACK-TBI показано, что уровни GFAP и UCH-L1, измеренные в день травмы, обладают высокой прогностической ценностью для предсказания летального исхода и неблагоприятного функционального восстановления (GOSE ≤ 4) через 6 месяцев после ЧМТ. Площадь под ROC-кривой (AUC) для прогнозирования смертности составила: GFAP: 0,87 мкг/л (95% ДИ: 0,83–0,91); UCH-L1: 0,89 мкг/л (95% ДИ: 0,86–0,92) [3].

Для прогнозирования неблагоприятного исхода AUC составила 0,86 мкг/л для обоих биомаркеров. Однако для прогнозирования неполного восстановления (GOSE < 8) AUC была умеренной (0,62 мкг/л для GFAP и 0,61 мкг/л для UCH-L1). Важно отметить, что прогностическая ценность биомаркеров была значительно выше у пациентов с оценкой по шкале комы Глазго (ШКГ) 3–12 баллов по сравнению с группой ШКГ 13–15. Добавление GFAP и UCH-L1 к модели IMPACT значительно улучшило их прогностическую точность для пациентов с тяжелой ЧМТ (AUC для смертности увеличилась с 0,90 мкг/л до 0,94 мкг/л, $p=0,002$).

Белок S-100B

S100B относится к семейству S100 – группе небольших кальций-связывающих цитозольных белков, впервые описанных Моогге В.В. в 1965 году. Название происходит от того, что белок полностью растворяется в насыщенном растворе сульфата аммония. Семейство S100 состоит из более чем двадцати представителей, для которых характерны два кальций-связывающих участка со структурой «спираль-петля-спираль». S100B – это небольшой димерный белок (молекулярная масса до 21 кДа), состоящий из $\beta\beta$ - или $\alpha\beta$ -цепей [8]. Он экспрессируется преимущественно в астроцитах, но в некоторой степени и в других клетках центральной нервной системы (ЦНС), включая олигодендроциты, нейральные клетки-предшественники и некоторые популяции нейронов [9]. С физиологической точки зрения белок выполняет как внутриклеточные, так и внеклеточные функции, в том числе регулирует фосфорилирование белков и активность ферментов, гомеостаз кальция, а также компоненты цитоскелета и факторы транскрипции [10]. Являясь внеклеточным фактором, S100B взаимодействует с окружающими клетками через рецептор конечных продуктов гликирования (RAGE), который экспрессируется на нейронах, микроглии и астроцитах. Активация RAGE запускает несколько провоспалительных и проапоптотических сигнальных каскадов. В физиологических условиях белок S100B, вырабатываемый в основном астроцитами, не проникает через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), и его концентрация в спинномозговой жидкости примерно в 100 раз выше, чем в сыворотке крови [11]. При повреждении мозга, нейровоспалении или других стрессовых воздействиях секреция S100B астроцитами резко возрастает. Высокие концентрации белка оказывают нейротоксическое действие, запуская каскад патологических реакций. Российские исследователи также подтверждают, что неблагоприятные исходы тяжелой ЧМТ у детей характеризуются длительным повышением уровня S100B, и его пороговое значение ($\leq 0,25$ мкг/л) обладает высокой прогностической точностью (76%) для выживаемости [12].

Метаанализ исследований на животных показал, что уровень S-100B в сыворотке и ликворе значительно повышается после травмы спинного мозга, достигая пика в первые 6 часов (стандартизованная средняя разница (SMD) для сыворотки: 3,8 мкг/л; (95% ДИ: 2,6–5,1). Повышенный уровень сохраняется до 24 часов, после чего возвращается к исходным значениям. S-100B демонстрирует хорошую диагностическую ценность, однако его специфичность ограничена, поскольку уровень может повышаться и при экстракраниальных повреждениях. [13].

Нейронспецифическая енолаза (NSE)

Нейрон-специфическая енолаза – это изофермент енолазы, который играет важную роль в гликолитическом пути, в ходе которого глюкоза превращается в пируват с одновременным образованием молекул аденозинтрифосфата (АТФ), никотинамидадениндинуклеотида и водорода. Цель этого процесса – выработка энергии, необходимой для клеточного метаболизма. У позвоночных выделяют три изоформы енолазы: α -енолазу (обычно присутствует в клетках), β -енолазу (характерна для мышечных клеток) и γ -енолазу (типична для нейронов). Экспрессия NSE происходит на поздних стадиях дифференцировки нейронов, что определяет специфичность фермента для нейронов [14], нейроэндокринных клеток [15].

Период полураспада фермента составляет около 30 часов. Однако в различных жидкостях организма динамика его активности различается. В спинномозговой жидкости (ликворе) период полураспада обычно составляет от 2 до 4 часов. Короткий период полураспада в ликворе важен для мониторинга патологических состояний, таких как повреждения головного мозга, поскольку позволяет прогнозировать изменения в клинической картине пациента. Период полувыведения фермента из сыворотки крови составляет от 18 до 24 часов. Благодаря более длительному присутствию фермента в крови его можно использовать для диагностики нейроэндокринных опухолей, а также для дальнейшего мониторинга и клинического прогнозирования у пациентов с повреждениями центральной нервной системы (ЦНС), синдромом Шагаса и другими видами наследственных заболеваний обмена веществ [16].




Рис. 1. Ключевая роль NSE в гликолитическом пути

Метаанализ 30 исследований выявил значимую положительную связь между уровнем NSE в сыворотке и неблагоприятными исходами после ЧМТ средней и тяжелой степени. Средняя разница между группами с благоприятным и неблагоприятным исходом составила: для смертности (18,46 мкг/л (95% ДИ: 10,81–26,11)); для GOSE ≤ 3 (17,25 мкг/л (95% ДИ: 11,42–23,07)) [5].

Однако наблюдалась значительная гетерогенность исследований, а оптимальные пороговые значения для клинического использования не были определены.

Обсуждение

GFAP и UCH-L1 демонстрируют высокую специфичность к повреждению мозга и одобрены для использования при принятии решений о проведении КТ после легкой ЧМТ. Их основная прогностическая ценность заключается в предсказании летальных исходов и тяжелой инвалидизации, особенно у пациентов с низкими значениями ШКГ.

NSE и S-100B имеют более длительную историю изучения, но их применение ограничено из-за низкой специфичности (повышение при экстракраниальных повреждениях, гемолизе, почечной недостаточности).

Клиническая значимость

Интеграция биомаркеров в существующие прогностические модели (IMPACT для тяжелой ЧМТ) позволяет повысить точность прогноза. Например, добавление GFAP и UCH-L1 к модели IMPACT улучшило AUC для прогнозирования смертности с 0,90 до 0,94. Это может иметь значение для стратификации пациентов в клинических исследованиях. Но присутствуют ограничения:

1. Гетерогенность исследований – различия в методах измерения, времени забора образцов.
2. Отсутствие стандартизованных пороговых значений для большинства биомаркеров.
3. Ограниченность данных по комбинированному использованию нескольких биомаркеров.
4. Недостаточность исследований по роли биомаркеров в прогнозировании отдаленных когнитивных и психических исходов.

Заключение

Биомаркеры повреждения мозга (GFAP, UCH-L1, NSE, S-100B) представляют собой перспективный инструмент для раннего прогно-

зирования исходов у реанимационных пациентов с ЧМТ. Наибольшей прогностической ценностью обладают GFAP и UCH-L1, особенно у пациентов с тяжелой ЧМТ (ШКГ 3–12). Их интеграция в существующие прогностические модели может улучшить точность прогноза и способствовать принятию клинических решений. Однако для внедрения в широкую практику необходимы дальнейшие исследования по стандартизации методов измерения, определение клинически значимых пороговых значений, валидация комбинированных мультимодальных моделей, включающих как биомаркеры, так и клинико-рентгенологические данные.

Литература

1. Maas A. I. R., Menon D.K., Adelson P.D., et al. Травма головного мозга: комплексные подходы к улучшению профилактики, клинического лечения и исследований = Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research // *The Lancet Neurology*. – 2017. – Vol. 16, № 12. – P. 987–1048.
2. Steyerberg E. W., Mushkudiani N., Perel P., et al. Прогнозирование исхода после черепно-мозговой травмы: разработка и международная валидация прогностических шкал на основе характеристик при поступлении = Predicting outcome after traumatic brain injury: development and international validation of prognostic scores based on admission characteristics // *PLoS Medicine*. – 2008. – Vol. 5, № 8. – P. e165.
3. Korley F. K., Jain S., Sun X., et al. Прогностическое значение концентраций GFAP и UCH-L1 в плазме крови в день получения травмы для прогнозирования функционального восстановления после черепно-мозговой травмы у пациентов из американской когорты TRACK-TBI: наблюдательное когортное исследование = Prognostic value of day-of-injury plasma GFAP and UCH-L1 concentrations for predicting functional recovery after traumatic brain injury in patients from the US TRACK-TBI cohort: an observational cohort study // *The Lancet Neurology*. – 2022. – Vol. 21, № 10. – P. 892–902.
4. Прохорычева, А.А. Патолофизиологические особенности изменения глиальных клеток и маркеры повреждения тканей мозга при черепно-мозговой травме / А.А. Прохорычева, А.П. Трашков, А.Г. Васильев // *Российские биомедицинские исследования*. – 2023. – Т. 8, № 2. – С. 44–53.
5. Mercier E., Tardif P.A., Cameron P.A., et al. Прогностическая ценность определения нейронспецифической енолазы для оценки прогноза у пациентов с черепно-мозговой травмой средней или тяжелой степени: систематический обзор и метаанализ = Predictive value of neuron-specific enolase for prognosis in patients with moderate or severe traumatic brain injury: a systematic review and meta-analysis // *CMAJ Open*. – 2016. – Vol. 4, № 3. – P. E371–E380.
6. Xiong D., Wang R., Zhou Y., et al. Белок промежуточных филаментов GFAP регулирует деление митохондрий в астроцитах = The intermediate filament protein GFAP regulates mitochondrial division in astrocytes // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. – 2025. – DOI: 10.1073/pnas.2524111122. – URL: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2524111122> (дата обращения: 12.03.2026).
7. Wu Yongmeng, Ma Ning, Li Guojing et al. Прогресс в исследовании роли глиофибрина при черепно-мозговой травме = Research progress on the role of glial fibrillary acidic protein in traumatic brain injury // *Chinese Journal of Integrative Medicine on Cardio-Cerebrovascular Disease*. – 2024. – Т. 22, № 5. – С. 852–856.
8. Baudier J.L. Белок S100B: новый биомаркер для диагностики черепно-мозговых травм = La protéine S100B: un nouveau biomarqueur pour le diagnostic des traumatismes crâniens // *Annales Pharmaceutiques Françaises*. – 2009. – Vol. 67, № 3. – P. 187–194. – DOI: 10.1016/j.pharma.2009.03.002.
9. Thelin E. P., Nelson D.W., Bellander B.M. Обзор клинической значимости уровня белка S100B в сыворотке крови при оценке черепно-мозговой травмы = A review of the clinical utility of serum S100B protein levels in the assessment of traumatic brain injury // *Acta Neurochirurgica*. – 2017. – Vol. 159, № 2. – P. 209–225. – DOI: 10.1007/s00701-016-3046-3.
10. Donato R. S100: Мультигенное семейство кальций-модулируемых белков EF-рукообразного типа с внутриклеточными и внеклеточными функциональными ролями = S100: a multigenic family of calcium-modulated proteins of the EF-hand type with intracellular and extracellular functional roles // *The International Journal of Biochemistry & Cell Biology*. – 2001. – Vol. 33, № 7. – P. 637–668. – DOI: 10.1016/S1357-2725(01)00046-2.
11. Kleindienst A., Ross Bullock M. Критический анализ роли нейротрофического белка S100B при остром повреждении головного мозга = A critical analysis of the role of the neurotrophic protein S100B

in acute brain injury // *Journal of Neurotrauma*. – 2006. – Vol. 23, № 8. – P. 1185–1200. – DOI: 10.1089/neu.2006.23.1185.

12. Сорокина, Е.Г. Нейротрофины, аутоантитела к нейрофункциональным белкам и маркеры повреждения мозга в прогнозе исходов черепно-мозговой травмы у детей / Е.Г. Сорокина, Ж.Б. Семенова, С.В. Мещеряков и др. // *Российский педиатрический журнал*. – 2021. – Т. 24, № 4. – С. 278.

13. Kwon B. K., Bloom O., Wanner I.B., et al. Систематический обзор и мета-анализ белка S-100B при травме спинного мозга = Systematic review and meta-analysis of S-100B protein in spinal cord injury // *Journal of Neurotrauma*. – 2019. – Vol. 36, № 5. – P. 765–772.

14. Isgrò M. A., Bottoni P., Scatena R. Нейроспецифическая енолаза как биомаркер: биохимические и клинические аспекты = Neuron-Specific Enolase as a Biomarker: Biochemical and Clinical Aspects // *Advances in Experimental Medicine and Biology*. – 2015. – Vol. 867. – P. 125–143. – DOI: 10.1007/978-94-017-7215-0_9.

15. Yaman Ö., Baltacı S., Arian N., et al. Нейроспецифическая енолаза в сыворотке крови: может ли она быть онкомаркером почечно-клеточной карциномы? = Serum neuron-specific enolase: can it be a tumour marker for renal cell carcinoma? // *International Urology and Nephrology*. – 1996. – Vol. 28, № 2. – P. 207–210. – DOI: 10.1007/BF02550862.

16. Hajduková L., Sobek O., Prchalová D., et al. Биомаркеры повреждения головного мозга: концентрации S100B и NSE в спинномозговой жидкости – нормативное исследование = Biomarkers of brain damage: S100B and NSE concentrations in cerebrospinal fluid – A normative study // *BioMed Research International*. – 2015. – Vol. 2015. – P. 379071. – DOI: 10.1155/2015/379071.

THE ROLE OF BRAIN INJURY BIOMARKERS (NSE, S-100, GFAP, UCH-L1) IN PREDICTING OUTCOMES IN ICU PATIENTS AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY

Nikolaev N.V., Orlova D.Yu., Khatomkin D.M.

Izhevsk State Medical University

Traumatic brain injury (TBI) remains one of the leading causes of death and disability, especially among the young population. Early and accurate prediction of outcomes in intensive care patients with TBI is key to optimizing treatment, family counseling, and rehabilitation planning. The review presents an analysis of current data on the role of biomarkers of brain damage – neuron-specific enolase (NSE), S-100B protein, glial fibrillary acid protein (GFAP) and ubiquitin-carboxyl terminal hydrolase L1 (UCH-L1) – in predicting outcomes in patients with TBI. Based on a systematic analysis of studies, it has been shown that GFAP and UCH-L1 have high prognostic value for predicting death and unfavorable functional recovery in severe TBI, whereas NSE and S-100B demonstrate moderate prognostic significance, but suffer from low specificity. The integration of biomarkers into existing prognostic models (IMPACT) makes it possible to increase the accuracy of prognosis, especially in patients with a Glasgow coma score of 3–12 points. However, further research is needed to standardize measurement methods, define thresholds, and validate combined multimodal models in order to be implemented in clinical practice.

Keywords: traumatic brain injury, biomarkers, NSE, S-100B, GFAP, UCH-L1, outcome prediction, resuscitation.

References

1. Maas A.I. R., Menon D.K., Adelson P.D., et al. Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research // *The Lancet Neurology*. – 2017. – Vol. 16, № 12. – P. 987–1048.
2. Steyerberg E.W., Mushkudiani N., Perel P., et al. Predicting outcome after traumatic brain injury: development and international validation of prognostic scores based on admission characteristics // *PLoS Medicine*. – 2008. – Vol. 5, № 8. – P. e165.
3. Korley F.K., Jain S., Sun X., et al. Prognostic value of day-of-injury plasma GFAP and UCH-L1 concentrations for predicting functional recovery after traumatic brain injury in patients from the US TRACK-TBI cohort: an observational cohort study // *The Lancet Neurology*. – 2022. – Vol. 21, № 10. – P. 892–902.
4. Prokhorycheva, A.A. Pathophysiological features of glial cell changes and markers of brain tissue damage in traumatic brain injury / A.A. Prokhorycheva, A.P. Trashkov, A.G. Vasiliev // *Russian Biomedical Research*. – 2023. – Vol. 8, № 2. – P. 44–53.
5. Mercier E., Tardif P.A., Cameron P.A., et al. Predictive value of neuron-specific enolase for prognosis in patients with moderate or severe traumatic brain injury: a systematic review and meta-analysis // *CMAJ Open*. – 2016. – Vol. 4, № 3. – P. E371–E380.
6. Xiong D., Wang R., Zhou Y., et al. The intermediate filament protein GFAP regulates mitochondrial division in astrocytes = The intermediate filament protein GFAP regulates mitochondrial division in astrocytes // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. – 2025. – DOI: 10.1073/pnas.2524111122. – URL: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2524111122> (accessed: 12.03.2026).
7. Wu Yongmeng, Ma Ning, Li Guojing et al. Research progress on the role of glial fibrillary acidic protein in traumatic brain injury = Research progress on the role of glial fibrillary acidic protein in traumatic brain injury // *Chinese Journal of Integrative Medicine on Cardio-Cerebrovascular Disease*. – 2024. – Vol. 22, № 5. – P. 852–856.
8. Baudier J.L. Protein S100B: a new biomarker for the diagnosis of traumatic brain injury = La protéine S100B: a new biomarker for the diagnosis of traumatic brain injury // *Annales Pharmaceutiques Françaises*. – 2009. – Vol. 67, № 3. – P. 187–194. – DOI: 10.1016/j.pharma.2009.03.002.

9. Thelin E.P., Nelson D.W., Bellander B.M. A review of the clinical utility of serum S100B protein levels in the assessment of traumatic brain injury // *Acta Neurochirurgica*. – 2017. – Vol. 159, № 2. – P. 209–225. – DOI: 10.1007/s00701-016-3046-3.
10. Donato R. S100: A multigenic family of calcium-modulated proteins of the EF-hand type with intracellular and extracellular functional roles = S100: a multigenic family of calcium-modulated proteins of the EF-hand type with intracellular and extracellular functional roles // *The International Journal of Biochemistry & Cell Biology*. – 2001. – Vol. 33, № 7. – P. 637–668. – DOI: 10.1016/S1357-2725(01)00046-2.
11. Kleindienst A., Ross-Bullock M. A critical analysis of the role of the neurotrophic protein S100B in acute brain injury // *Journal of Neurotrauma*. – 2006. – Vol. 23, № 8. – P. 1185–1200. – DOI: 10.1089/neu.2006.23.1185.
12. Sorokina, E.G. Neurotrophins, autoantibodies to neurofunctional proteins, and markers of brain damage in predicting outcomes of traumatic brain injury in children / E.G. Sorokina, Zh.B. Semenova, S.V. Meshcheryakov, et al. // *Russian Pediatric Journal*. – 2021. – Vol. 24, № 4. – P. 278.
13. Kwon B.K., Bloom O., Wanner I.B., et al. Systematic review and meta-analysis of S-100B protein in spinal cord injury // *Journal of Neurotrauma*. – 2019. – Vol. 36, № 5. – P. 765–772.
14. Isgrò M.A., Bottoni P., Scatena R. Neuron-Specific Enolase as a Biomarker: Biochemical and Clinical Aspects // *Advances in Experimental Medicine and Biology*. – 2015. – Vol. 867. – P. 125–143. – DOI: 10.1007/978-94-017-7215-0_9.
15. Yaman Ö., Baltaci S., Arikan N., et al. Serum neuron-specific enolase: can it be a tumor marker for renal cell carcinoma? // *International Urology and Nephrology*. – 1996. – Vol. 28, № 2. – P. 207–210. – DOI: 10.1007/BF02550862.
16. Hajduková L., Sobek O., Prchalová D., et al. Biomarkers of brain damage: S100B and NSE concentrations in cerebrospinal fluid – A normative study // *BioMed Research International*. – 2015. – Vol. 2015. – P. 379071. – DOI: 10.1155/2015/379071.

Куница Виктор Николаевич,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренней медицины Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
E-mail: kunita-viktor@mail.ru

Нишанов Джемиль Исмаилович,

студент Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
E-mail: nishanov@mail.ru

Нурбаева Дияна Абдусатторовна,

студент Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
E-mail: nurchick@mail.ru

В статье рассматриваются современные подходы к интерпретации биохимических показателей крови в диагностике заболеваний печени. Особое внимание уделяется дифференциальной диагностике различных типов поражения гепатоцитов (холестатический синдром, цирроз печени, вирусный гепатит). Заболевания печени представляют собой одну из наиболее значимых медико-социальных проблем современного здравоохранения. Согласно эпидемиологическим данным, хронические заболевания печени (ХЗП) занимают ведущие позиции в структуре заболеваемости и смертности во всем мире, при этом их распространенность неуклонно растет, что требует повышенной осведомленности не только среди гастроэнтерологов, но и представителей других специальностей. Анализируется диагностическая ценность классических маркеров (АЛТ, АСТ, ГГТП, щелочная фосфатаза, билирубин, альбумин). Делается вывод о необходимости комплексного использования лабораторных данных для повышения точности диагностики и мониторинга эффективности терапии хронических заболеваний печени.

Ключевые слова: биохимический анализ крови, патология печени, цитоллиз, холестаз, маркеры фиброза, АЛТ, АСТ, диагностика.

Введение

Заболевания печени представляют собой одну из наиболее значимых медико-социальных проблем современного здравоохранения. Согласно эпидемиологическим данным, хронические заболевания печени (ХЗП) занимают ведущие позиции в структуре заболеваемости и смертности во всем мире, при этом их распространенность неуклонно растет. Особое внимание требует тот факт, что гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) устойчиво входит в пятерку ведущих причин смерти от злокачественных новообразований, а показатели заболеваемости продолжают увеличиваться. В этиологической структуре ХЗП происходят существенные изменения: наряду с вирусными гепатитами В и С все большее значение приобретают метаболически ассоциированные заболевания, включая неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП) и ее прогрессирующую форму – неалкогольный стеатогепатит. Важно отметить, что у части пациентов с НАЖБП ГЦК может развиваться и без предшествующего формирования цирроза, что создает дополнительные диагностические сложности [1].

Сложность и многогранность патогенеза заболеваний печени, включающих последовательное развитие хронического воспаления, фиброобразования, эпигенетической перестройки, мутагенеза и ремоделирования иммунной микросреды, обуславливают необходимость применения высокоинформативных методов диагностики. В этой связи особое значение приобретает биохимический анализ крови как наиболее доступный, неинвазивный и экономически целесообразный метод скрининга, первичной диагностики и динамического наблюдения пациентов с патологией печени. Рассмотрение диагностических возможностей биохимических показателей целесообразно начать с маркеров, отражающих повреждение клеток печени, – ферментов цитолиза.

Ключевым представителем этой группы является аланинаминотрансфераза (АЛТ) – внутриклеточный фермент класса трансфераз, локализованный преимущественно в цитозоле гепатоцитов. Данный фермент катализирует обратимый перенос аминокислоты от аланина на α -кетоглутарат с образованием глутамата и пирувата. Повышение активности АЛТ в сыворотке крови отражает повреждение клеточных мембран и выход фермента в системный кровоток, что делает данный показатель высокочувствительным маркером цитолиза. Период полураспада АЛТ в сыворотке составляет примерно 47 часов. Наиболее выраженное повышение АЛТ наблюдается при: острых вирусных гепатитах (увеличение в 10–100 раз и более); токсических поражениях печени (включая передозировку парацетамола); лекарственно-индуцированном гепатите; ишемическом поражении печени («шоковая печень»). При неалкогольной жировой болезни печени и хронических гепатитах повышение, как правило, умеренное (в 2–5 раз выше верхней границы нормы). Чувствительность АЛТ при острых поражениях печени высокая, однако специфичность ограничена, поскольку фермент в меньшем количестве содержится также в мышечной ткани (скелетная мускулатура) и в миокарде. Так, повышение АЛТ возможно при миопатиях (включая лекарственно-индуцированные статинами), интенсивной физической нагрузке, травмах и судорогах. Важным ограничением показателя является возможность нормального уровня АЛТ при выраженном фиброзе или циррозе печени вследствие снижения количества функционирующих гепатоцитов, что описывается как «истощение паренхимы» [2].

Другим важным маркером цитолиза выступает аспартатаминотрансфераза (АСТ), которая содержится не только в печени, но и в миокарде, скелетных мышцах, почках, поджелудочной железе и эритроцитах. В отличие от АЛТ, этот фермент локализуется как в цитозоле (изоформа AST1), так и в митохондриях (изоформа AST2), что придает его повышению дополнительное прогностическое значение: митохондриальная фракция поступает в кровь при более глубоком, деструктивном повреждении клетки. Повышение АСТ характерно для острых вирусных гепатитов, алкогольной болезни печени (где характерно преобладание АСТ над АЛТ вследствие дефицита пиридоксальфосфата и митохондриального повреждения), цирроза и токсических поражений. Чувствительность АСТ ниже, чем у АЛТ, в отношении изолированного поражения печени, а специфичность значительно ограничена из-за внепеченочных источников фермента (инфаркт миокарда, рабдомиолиз, гемолиз).

Для дифференциальной диагностики поражений печени широко используется коэффициент де Ритиса, представляющий собой отношение активности АСТ к АЛТ. Клиническое значение этого показателя заключается в следующем: значение менее 1,0 чаще наблюдается при острых вирусных и токсических гепатитах (преобладание цитозольного фермента); около 1,0 – возможно при хронических гепатитах и НАЖБП; более 2,0 характерно для алкогольной болезни печени; превышение 1,0 при циррозе может свидетельствовать о прогрессировании фиброза и портальной гипертензии. Диагностическая ценность коэффициента возрастает при комплексной оценке с клиническими и другими лабораторными данными, тогда как самостоятельное использование показателя ограничено. Обобщая рассмотрение маркеров цитолиза, следует подчеркнуть, что АЛТ обладает высокой чувствительностью при острых поражениях печени (до 90–95%), однако его специфичность ограничена внепечёночными причинами повышения. АСТ менее специфичен, но информативен при оценке алкогольного поражения и выраженного фиброза. При этом необходимо помнить ключевой клинический постулат: нормальные значения трансаминаз не исключают наличие хронического заболевания печени [3].

Помимо оценки цитолиза, важнейшее значение в диагностике патологии печени имеет выявление холестатического синдрома, который отражает нарушение продукции или оттока желчи. Ведущую роль в этом играет определение активности щелочной фосфатазы (ЩФ) – группы изоферментов, связанных с мембранами желчных канальцев (печеночная фракция), а также с костной тканью, кишечником и плацентой. Повышение активности ЩФ наблюдается при нарушении оттока желчи вследствие индукции синтеза фермента и вымывания его с поверхности мембран гепатоцитов желчными кислотами. Выраженное увеличение (3–10 норм) характерно для внепечёночной обструкции желчных путей, холедохолитиаза, опухолевой обструкции (например, рак головки поджелудочной железы, холангиокарцинома) и первичного билиарного холангита. Однако следует учитывать ограничение: ЩФ также повышается при заболеваниях костной ткани (болезнь Педжета, остеопороз, метастазы в кости), беременности (физиологическое повышение за счет плацентарной фракции в III триместре), у детей в период активного роста, а также при переломах [4].

Более чувствительным, хотя и менее специфичным маркером холестаза является гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), которая участвует в метаболизме глутатиона и индуцируется при воздействии этанола и ряда лекарств. Повышение ГГТ наблюдается как при внутрипечёночном, так и при внепечёночном холестазе, при алкогольной болезни печени (даже при отсутствии холестаза), а также при лекарственном поражении печени (например, при приеме фенитоина, варфарина, НПВП). Диагностическая ценность ГГТ существенно возрастает при одновременном повышении ЩФ, тогда как изолированное повышение ГГТ возможно при злоупотреблении алкоголем, приеме индукторов микросомальных ферментов или при метаболическом синдроме [5].

Важнейшим показателем выделительной функции печени является билирубин. Повышение уровня общего билирубина отражает нарушение процессов захвата, конъюгации или экскреции, при этом дифференциация фракций имеет ключевое значение. Прямой (конъюгированный) билирубин повышается при холестазе и гепатоцеллюлярных поражениях, когда он выходит в кровь из поврежденных гепатоцитов. Непрямой (неконъюгированный) билирубин увеличивается при гемолизе и синдроме Жильбера вследствие нарушения захвата или конъюгации. В дифференциально-диагностическом аспекте важно, что при холестазе происходит преимущественное повышение прямого билирубина в сочетании с высокими показателями ЩФ и ГГТ. Если же повышение билирубина идет за счет непрямого фракции без значимого роста ЩФ, это указывает на гемолиз или нарушение конъюгации. Умеренное повышение обеих фракций с одномоментным повышением трансаминаз свидетельствует о паренхиматозной желтухе (гепатите). При анализе холестатического синдрома важно различать его варианты. Для внутрипечёночного холестаза характерно умеренное повышение ЩФ (обычно до 2–3 норм) и значительное повышение ГГТ на фоне увеличения прямого билирубина, часто в сочетании с умеренным цитолизом. Такой вариант встречается при вирусных гепатитах, лекарственных поражениях, первичном билиарном холангите и холестазе при сепсисе. Внепечёночный холестаз проявляется резким повышением ЩФ (часто более 3 норм), высокой ГГТ и значительным увеличением прямого билирубина, что клинически выражается желтухой. Причинами этого состояния выступают обструкция камнем (холедохолитиаз), опухоли (холангиокарцинома, рак головки поджелудочной железы) и стриктуры желчных путей [6].

Оценка функционального состояния печени была бы неполной без анализа её синтетической способности, ключевым показателем которой является альбумин. Человеческий альбумин – самый распростра-

ненный циркулирующий белок, на долю которого приходится около 50–60% всех белков плазмы у здоровых людей. Молекула альбумина состоит из 585 аминокислот, объединенных в три гомологичных домена. Единственным органом, вырабатывающим альбумин, является печень, при этом гепатоциты ежедневно выделяют в кровотоке около 9–12 г альбумина. В физиологических условиях в синтезе альбумина участвуют только 20–30% гепатоцитов, поэтому существует большой функциональный резерв, позволяющий при необходимости увеличить синтез в 3–4 раза. Период полувыведения белка из кровотока у здоровых взрослых людей составляет около 14–20 дней. Альбумин обеспечивает примерно 75% онкотического давления крови, что делает его важнейшим регулятором распределения жидкости между различными компартментами организма. За последние десятилетия стало очевидно, что альбумин выполняет множество других биологических функций: связывает и транспортирует многие эндогенные (неконъюгированный билирубин, жирные кислоты, желчные кислоты, тироксин) и экзогенные (лекарственные препараты) соединения, является самым распространенным циркулирующим антиоксидантом, способным нейтрализовать активные формы кислорода и азота, а также регулирует воспаление и иммунный ответ. Согласно современным лабораторным нормам, диапазон концентрации альбумина в сыворотке крови составляет от 3,5 до 5 г/дл, при этом у 90% здоровых мужчин до 80 лет этот показатель превышает 4 г/дл [7].

Другим важным показателем синтетической функции печени выступает протромбиновое время, которое используется для оценки внешнего и общего путей свертывания крови, помогая выявить дефицит факторов II, V, VII и X, а также низкую концентрацию фибриногена. Протромбиновое время представляет собой время в секундах, за которое плазма сворачивается после добавления тромбoplastина. При заболевании печени или печеночной дисфункции снижается выработка большинства факторов свертывания крови, что приводит к увеличению протромбинового времени и появлению таких физических проявлений, как петехии и гематомы. В комплексной оценке также используется показатель общего белка сыворотки, представляющий собой сумму всех белков в сыворотке. Определение его содержания важно для мониторинга состояния здоровья, однако этот показатель менее специфичен, поскольку может изменяться при различных заболеваниях, включая патологии печени, злокачественные новообразования, нарушения питания и обмена веществ [8].

Переходя к клиническому применению рассмотренных показателей, необходимо проанализировать их изменения при различных патологических состояниях. Так, для цирроза печени характерно снижение показателей синтетической функции. Прогрессирующее уменьшение уровня альбумина отражает уменьшение массы функционирующих гепатоцитов. Вследствие снижения функциональной массы печени уменьшается синтез факторов свертывания, что приводит к удлинению протромбинового времени (повышению МНО). В клинических руководствах подчеркивается, что сочетание снижения альбумина с удлинением протромбинового времени является маркером печеночно-клеточной недостаточности и требует безотлагательной оценки [9].

Общий белок при циррозе может изменяться разнонаправленно: нередко наблюдается его снижение за счет альбуминовой фракции, однако при некоторых формах цирроза (например, при аутоиммунном или первичном билиарном холангите) возможно повышение гамма-глобулиновой фракции.

Показатели холестаза при циррозе могут быть умеренно или значительно повышены в зависимости от этиологии, причем наиболее высокие значения ЩФ и ГГТ характерны для билиарного цирроза. В отличие от острого гепатита, при циррозе цитолиз не является ведущим синдромом: активность АЛТ и АСТ может быть нормальной, умеренно повышенной или даже сниженной на терминальных стадиях. Характерным признаком цирроза, особенно алкогольного генеза, является преобладание АСТ над АЛТ (коэффициент АСТ/АЛТ более 1, часто более 1,5). Также при циррозе повышается уровень прямого билирубина, причем значение выше 50 мкмоль/л соответствует тяжелой стадии и плохому прогнозу [10].

При вирусном гепатите, напротив, ведущим синдромом выступает цитолиз – разрушение гепатоцитов под действием вируса и иммунных механизмов. В остром периоде и при обострении хронического гепатита наблюдается значительное (в десятки и сотни раз выше нормы) повышение активности обоих ферментов с характерным преобладанием АЛТ над АСТ, что выражается в коэффициенте АСТ/АЛТ менее 1. Степень повышения трансаминаз коррелирует с активностью некро-воспалительного процесса, однако при длительном течении хронического гепатита может наблюдаться волнообразная динамика. Гипербилирубинемия при вирусном гепатите возникает вследствие нарушения захвата, конъюгации и экскреции билирубина; в типичных слу-

чаях желтушной формы отмечается повышение общего билирубина за счет обеих фракций с преобладанием прямой. Показатели холестаза при вирусном гепатите могут быть достоверно повышены, но обычно в меньшей степени, чем трансаминазы, а их значительное увеличение указывает на вовлечение в процесс желчевыводящих путей. Синтетическая функция печени при вирусном гепатите длительное время остается сохранной, и ее нарушение является неблагоприятным прогностическим признаком [11].

При холестатическом синдроме, независимо от его причины, ведущими маркерами выступают ферменты, отражающие повреждение билиарного эпителия и нарушение оттока желчи. Ключевым критерием служит стойкое или перемежающееся повышение активности ЩФ в сыворотке крови в сочетании со значительным повышением ГГТ. Билирубин при этом повышается за счет преимущественного увеличения прямой фракции, что обусловлено нарушением экскреции конъюгированного билирубина в желчные канальцы и его регургитацией в кровеносное русло. Согласно данным исследований, пиковые значения билирубина при тяжелом холестазе могут превышать 171 мкмоль/л (10 мг/дл). Повышение трансаминаз при холестазе возможно, но не является ведущим синдромом, а снижение альбумина и удлинение протромбинового времени наблюдаются лишь при длительном течении и развитии печеночно-клеточной недостаточности [12].

Несмотря на высокую информативность и широкую доступность биохимических маркеров, их интерпретация требует осторожности ввиду ряда существенных ограничений. Как уже отмечалось, АЛТ и АСТ не являются строго специфичными для печени: повышение АЛТ может наблюдаться при миокардитах, обширных травмах и ожогах, а АСТ закономерно повышается при гемолизе, инфаркте миокарда и рабдомиолизе. Ряд лекарственных препаратов способен вызывать изменение активности ферментов без прямого повреждения гепатоцитов. Классическим примером является индукция микросомальных ферментов печени (например, под влиянием фенотимина, рифампицина или алкоголя), что приводит к изолированному повышению ГГТ. На результаты лабораторного исследования существенно влияют условия взятия, хранения и транспортировки крови. Гемолиз приводит к выходу АСТ и внутриклеточного калия в сыворотку, завышая истинные значения, а хранение сыворотки при комнатной температуре может снижать активность АЛТ. Кроме того, референсные интервалы различаются в зависимости от пола и возраста, что необходимо учитывать при интерпретации пограничных значений. Особого внимания заслуживает феномен «цирротического плато», когда при прогрессировании заболевания и развитии цирроза активность трансаминаз может нормализоваться или оставаться лишь незначительно повышенной, несмотря на наличие терминальной стадии и печеночной недостаточности.

Важно также понимать, что биохимические синдромы указывают на тип поражения, но редко позволяют точно установить этиологию. Например, синдром холестаза может быть вызван как доброкачественным холедохолитиазом, так и злокачественным новообразованием, и дифференцировать внутрипеченочный холестаз от внепеченочного только по уровню ферментов не всегда возможно без визуализирующих методов [13].

Учитывая эти ограничения, наибольшую диагностическую ценность биохимические показатели приобретают при комплексной оценке, особенно при включении их в многокомпонентные диагностические модели. В современной гепатологии принято выделять следующие биохимические синдромы: цитолитический (значительное повышение АЛТ и АСТ в сочетании с умеренным повышением билирубина), холестаз (повышение ЩФ, ГГТ и прямого билирубина), синдром печеночно-клеточной недостаточности (снижение альбумина, повышение МНО) и мезенхимально-воспалительный синдром (изменение фракций иммуноглобулинов) [14].

Поскольку изолированные трансаминазы не коррелируют напрямую со стадией фиброза, обязательным является расчет неинвазивных индексов фиброза на основе рутинных биохимических тестов. К ним относятся: Фибротест (коммерческая панель, включающая альфа-2-макроглобулин, аполипопротеин А1, гаптоглобин, ГГТ, общий билирубин), индекс APRI (рассчитывается как отношение АСТ к верхней границе нормы, деленное на количество тромбоцитов, умноженное на 100) и индекс FIB-4 (включающий возраст, АСТ, АЛТ и тромбоциты). Для подтверждения данных, полученных при лабораторной диагностике, необходимо использование инструментальных методов: ультразвуковой эластографии для оценки плотности паренхимы, МРТ с гепатоспецифическим контрастом, а при необходимости – биопсии печени с гистологическим исследованием, остающейся золотым стандартом оценки фиброза и некровоспалительной активности [15].

Подводя итог, следует подчеркнуть, что изолированная оценка какого-либо одного биохимического показателя имеет ограниченную диагностическую ценность. Современный подход к диагностике заболеваний пе-

чени подразумевает интеграцию данных анамнеза (включая лекарственный и алкогольный), физикального осмотра, комплекса биохимических тестов, серологических маркеров и инструментальных методов верификации. Это позволяет минимизировать влияние внепеченочных факторов, повысить точность диагностики и обеспечить эффективный мониторинг терапии хронических заболеваний печени [16,17].

Литература

1. Куница В.Н. Пропедевтика внутренних болезней, как первая клиническая дисциплина / В.Н. Куница, А.А. Шахназаров, В.В. Лудан, О.Д. Воронцова // Образование от «А» до «Я». – 2025. № 3. – С. 62–66.
2. Saiman Y. Liver Blood Tests. Merck Manual Consumer Version. Reviewed/Revised Nov 2025. (Интерпретация альбумина, протромбинового времени/МНО, билирубина; значение МНО при печеночной недостаточности).
3. Altaihani MRA, et al. Liver Function Tests: An Updated Review Article for Clinical Pathologists. Review of Contemporary Philosophy. 2024. (Общая классификация паттернов поражения печени: гепатоцеллюлярный, холестатический, смешанный).
4. Gerussi A., Paraboschi E.M., Cappadona C., et al. The role of epigenetics in primary biliary cholangitis. Int. J. Mol. Sci. 2022; 23 (9): 4873.
5. Reshetnyak V.I., Maev I.V. New insights into the pathogenesis of primary biliary cholangitis asymptomatic stage. World J. Gastroenterol. 2023; 29 (37): 5292–5304.
6. Tamburro C, et al. Idiopathic cholestasis in adults: Genetics as another lens for liver pathologists. Hum Pathol. 2025;165:105916. DOI: 10.1016/j.humpath.2025.105916. PMID: 40854348.
7. Райхельсон КЛ, Буевров АО, Кондрашина ЕА и др. Холестаз при хронических заболеваниях печени и роль адеметионина в его лечении (обзор литературы и резолюция Совета экспертов). Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2024;34(4):20–33. DOI: 10.22416/1382-4376-2024-1167-3098-1.
8. Vitale G, Sciveres M, Mandato C, et al. Genotypes and different clinical variants between children and adults in progressive familial intrahepatic cholestasis: a state-of-the-art review. Orphanet J Rare Dis. 2025;20(1):1–21. DOI: 10.1186/s13023-025-03589-2.
9. Ивашкин В.Т., Маевская М.В., Жаркова М.С. и др. Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронического гепатита С // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2020. – Т. 30, № 4. – С. 45–68.
10. Абдурахманов Д.Т. Хронический гепатит В: современные подходы к диагностике и лечению // Терапевтический архив. – 2021. – Т. 93, № 2. – С. 120–127.
11. Маев И.В., Самсонов А.А., Андреев Д.Н. и др. Лабораторная диагностика заболеваний печени: возможности и ограничения // Клиническая медицина. – 2022. – Т. 100, № 1. – С. 10–18.
12. Буевров А.О. Биохимические синдромы при поражении печени: практическое значение // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2023. – Т. 33, № 2. – С. 25–32.
13. Лазарева А.А., Улитина Н.Н., Федичева Н.А. Особенности изменения динамики биохимических показателей при различных патологиях печени невирусной этиологии // Развитие современной науки и образования: актуальные вопросы, достижения и инновации – 2022. – № 6. – С. 28–32.
14. Решетняк В.И., Маев И.В. Дислипидемия и ее особенности при первичном билиарном холангите. Здравоохранение Таджикистана. 2023; 1: 119–130.
15. Решетняк В.И., Логинов А.С., Туманова Н.Б. и др. Исследование адгезии гепатоцитов при хронических диффузных заболеваниях печени. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1989; 108 (8): 160–162.
16. Решетняк В.И., Маев И.В. Механизм повреждения мелких холангиоцитов при первичном билиарном холангите. Эффективная фармакотерапия. 2024; 20 (2): 72–84.
17. Маев И.В., Решетняк В.И. Механизм развития лабораторных признаков при первичном билиарном холангите и их диагностическое значение. Эффективная фармакотерапия. 2024; 20 (18): 42–60.

MODERN VIEWS ON THE DIAGNOSTIC VALUE OF BIOCHEMICAL BLOOD ANALYSIS IN LIVER PATHOLOGY

Kunitsa V.N., Nishanov D.I., Nurbaeva D.A.
V.I. Vernadsky Crimean Federal

The article discusses modern approaches to the interpretation of biochemical blood parameters in the diagnosis of liver diseases. Special attention is paid to the differential diagnosis of various types of hepatocyte damage (cholestatic syndrome, liver cirrhosis, and viral

hepatitis). Liver diseases are one of the most significant medical and social problems in modern healthcare. According to epidemiological data, chronic liver diseases (CLD) occupy leading positions in the structure of morbidity and mortality worldwide, while their prevalence is steadily increasing, which requires increased awareness not only among gastroenterologists, but also among representatives of other specialties. The diagnostic value of classic markers (ALT, AST, GGT, alkaline phosphatase, bilirubin, and albumin) is analyzed. It is concluded that it is necessary to use laboratory data comprehensively to improve the accuracy of diagnosis and monitor the effectiveness of therapy for chronic liver diseases.

Keywords: biochemical blood test, liver pathology, cytolysis, cholestasis, fibrosis markers, ALT, AST, diagnostics.

References

1. Kunitsa V.N. Propaedeutics of Internal Diseases as the First Clinical Discipline / V.N. Kunitsa, A.A. Shahnazarov, V.V. Ludan, O.D. Vorontsova // Education from "A" to "Z". – 2025. No. 3. – Pp. 62–66.
2. Saiman Y. Liver Blood Tests. Merck Manual Consumer Version. Reviewed/Revised Nov 2025. (Interpretation of albumin, prothrombin time/INR, bilirubin; significance of INR in liver failure).
3. Altaihani MRA, et al. Liver Function Tests: An Updated Review Article for Clinical Pathologists. Review of Contemporary Philosophy. 2024. (General classification of liver damage patterns: hepatocellular, cholestatic, mixed).
4. Gerussi A., Paraboschi E.M., Cappadona C., et al. The role of epigenetics in primary biliary cholangitis. Int. J. Mol. Sci. 2022; 23 (9): 4873.
5. Reshetnyak V.I., Maev I.V. New insights into the pathogenesis of primary biliary cholangitis asymptomatic stage. World J. Gastroenterol. 2023; 29 (37): 5292–5304.
6. Tamburro C, et al. Idiopathic cholestasis in adults: Genetics as another lens for liver pathologists. Hum Pathol. 2025;165:105916. DOI: 10.1016/j.humpath.2025.105916. PMID: 40854348.
7. Raikhelson KL, Bueverov AO, Kondrashina EA, et al. Cholestasis in Chronic Liver Diseases and the Role of Ademetonine in Its Treatment (Literature Review and Expert Council Resolution). Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. 2024;34(4):20–33. DOI: 10.22416/1382-4376-2024-1167-3098-1.
8. Vitale G, Sciveres M, Mandato C, et al. Genotypes and different clinical variants between children and adults in progressive familial intrahepatic cholestasis: a state-of-the-art review. Orphanet J Rare Dis. 2025;20(1):1–21. DOI: 10.1186/s13023-025-03589-2.
9. Ivashkin V.T., Maevskaya M.V., Zharkova M.S., et al. Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of chronic hepatitis C // Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. – 2020. – Vol. 30, No. 4. – Pp. 45–68.
10. Abdurakhmanov D.T. Chronic hepatitis B: modern approaches to diagnosis and treatment // Terapevtichesky arkhiv. – 2021. – Vol. 93, No. 2. – P. 120–127.
11. Maev I.V., Samsonov A.A., Andreev D.N., et al. Laboratory diagnostics of liver diseases: opportunities and limitations // Clinical medicine. – 2022. – Vol. 100, No. 1. – Pp. 10–18.
12. Bueverov A.O. Biochemical Syndromes in Liver Lesions: Practical Significance // Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. – 2023. – Vol. 33, No. 2. – Pp. 25–32.
13. Lazareva A.A., Ulitina N.N., Fedicheva N.A. Features of Changes in the Dynamics of Biochemical Parameters in Various Non-Viral Liver Pathologies // Development of Modern Science and Education: Current Issues, Achievements, and Innovations – 2022. – No. 6. – Pp. 28–32.
14. Reshetnyak V.I., Maev I.V. Dyslipidemia and its Features in Primary Biliary Cholangitis. Healthcare of Tajikistan. 2023; 1: 119–130.
15. Reshetnyak V.I., Loginov A.S., Tumanova N.B., et al. Study of Hepatocyte Adhesion in Chronic Diffuse Liver Diseases. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 1989; 108 (8): 160–162.
16. Reshetnyak V.I., Maev I.V. Mechanism of Damage to Small Cholangiocytes in Primary Biliary Cholangitis. Effective Pharmacotherapy. 2024; 20 (2): 72–84.
17. Maev I.V., Reshetnyak V.I. Mechanism of development of laboratory signs in primary biliary cholangitis and their diagnostic value. Effective Pharmacotherapy. 2024; 20 (18): 42–60.

Комплексный анализ профиля безопасности и нежелательных эффектов семаглутида в современной клинической практике

Белякова Анастасия Григорьевна,

к.м.н., доцент кафедры базисной и клинической фармакологии Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
E-mail: gavrysh@mail.ru

Мартынова Екатерина Витальевна,

студент кафедры базисной и клинической фармакологии Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
E-mail: elena.martynova.1970@mail.ru

Сейт-Умерова Джемиле Ризаевна,

студент кафедры базисной и клинической фармакологии Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
E-mail: seitumerova06@list.ru

Скрипченко Кирилл Андреевич,

студент кафедры базисной и клинической фармакологии Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
E-mail: skripchenkocyrill@yandex.ru

В статье рассматриваются нежелательные реакции со стороны организма человека, возникающие при терапии семаглутидом – препаратом из класса агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, который широко применяется в клинической практике для лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения. Проведен анализ современных публикаций, посвященных безопасности и эффективности данного препарата, изучены механизмы развития потенциальных осложнений, исследована связь между режимом дозирования и частотой возникновения побочных эффектов, а также выявлены факторы, способствующие индивидуальной непереносимости семаглутида. Приводится подробный разбор наиболее распространенных побочных эффектов, таких как гастроинтестинальные расстройства, включая тошноту, рвоту, диарею и запор, характеризующиеся слабым или умеренным течением и проходящие самостоятельно [11, 7, 9]. Рассматриваются редкие случаи тяжелых осложнений, таких как острый панкреатит, проблемы с функционированием кишечника и риски нарушения зрения вследствие быстрого снижения уровня гликированного гемоглобина [1, 6, 8]. Обосновывается необходимость постепенного подхода к снижению уровня сахара в крови для предотвращения развития диабетической ретинопатии. Особое внимание уделяется влиянию препарата на состав тела пациента, включая ускоренную потерю мышечной массы, повышение риска развития саркопении и связанное с этим снижение качества жизни пожилых пациентов [5].

Таким образом, поиск в научной и медицинской литературе направлен на углубленное понимание профиля безопасности семаглутида и разработку рекомендаций для врачей и пациентов, позволяющих минимизировать негативные последствия терапии и повысить её эффективность.

Ключевые слова: семаглутид, агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, нежелательные реакции, безопасность, эффективность, побочные эффекты, режим дозирования, гастроинтестинальные расстройства, острый панкреатит, диабетическая ретинопатия, потеря мышечной массы, саркопения.

Введение

За последнее десятилетие лечение диабета второго типа и ожирения заметно изменилось благодаря широкому применению агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 в медицине. В частности, семаглутид, как препарат длительного действия из этой группы, показал хорошие результаты в контроле уровня глюкозы в крови, снижении вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшении массы тела.

Быстрое распространение этого лекарства, во многом из-за его рекламы как средства для похудения и улучшения внешнего вида, привело к накоплению данных о его побочных эффектах. В то время как семаглутид показал хорошие результаты по безопасности в контролируемых клинических испытаниях (SUSTAIN и STEP), реальная практика выявляет больше различных побочных эффектов, с которыми сталкиваются врачи и исследователи [2].

Традиционно наиболее часто регистрируемые побочные эффекты семаглутида ограничиваются гастроинтестинальными расстройствами (тошнота, рвота, диарея), которые зачастую трактуются как транзиторные. Вместе с тем, современные данные по фармаконадзору говорят о вероятности развития ряда серьезных осложнений, включая панкреатит, заболевания желчных путей, гастропарез, снижение мышечной массы, а также возможные психоневрологические расстройства. Механизмы, посредством которых препарат оказывает долгосрочное воздействие на сетчатку глаза и влияет на риск развития диабетической ретинопатии, продолжают быть предметом обсуждений.

Цель работы – Провести комплексный анализ современных научных данных о нежелательных реакциях, возникающих при применении семаглутида, а также патофизиологические механизмы развития осложнений, взаимосвязь между режимом дозирования и частотой возникновения нежелательных реакций, факторы риска, позволяющие прогнозировать индивидуальную непереносимость препарата.

Результаты исследования и их обсуждение

Иностранные учёные исследовали эффективность и безопасность терапии препаратом семаглутид в сочетании с мерами по внесению изменений образа жизни среди взрослых пациентов с избыточным весом или ожирением, но без диабета. В исследовании приняли участие 1961 взрослых пациентов со средним возрастом примерно 46 лет. Преобладали женщины, среднее значение индекса массы тела составило $37,8 \pm 6,7$ кг/м². Результаты исследования показали, что у пациентов, принимавших семаглутид, наблюдалось заметное и стабильное уменьшение веса. К концу исследования, длившегося 68 недель, испытываемые в группе, принимавшей семаглутид, в среднем потеряли 14,85% от массы тела. Терапия семаглутидом, по наблюдениям исследователей, приводит к заметному уменьшению окружности талии у пациентов. В среднем, участники, получавшие семаглутид, отметили уменьшение окружности талии на 13,54 см. [11]. Этот показатель отражает существенное изменение в объемах тела и может свидетельствовать о позитивном воздействии препарата на жировые отложения в области живота. Несмотря на то, что семаглутид показал себя действенным лекарственным средством, клинические исследования выявили ряд побочных действий, в основном связанных с желудочно-кишечным трактом. Подробный анализ данных, полученных в ходе этих исследований, позволил установить, что наиболее распространёнными нежелательными явлениями были: тошнота, о которой сообщали 44,2% пациентов; диарея, отмеченная у 31,5% участников; рвота, наблюдавшаяся в 24,8% случаев; и запор, зафиксированный у 23,4% пациентов [11]. В большинстве случаев, когда возникали побочные эффекты, они были слабыми или умеренными по своей выраженности и, как правило, проходили без какого-либо специального медицинского вмешательства. Тем не менее, крайне редко наблюдались и серьезные осложнения, среди которых встречались случаи острого панкреатита [7]. Важно отметить, что хотя большинство пациентов не испытывали серьезных проблем со здоровьем, необходимо учитывать потенциальный риск возникновения подобных редких, но опасных для здоровья состояний. В работе иностранных исследователей также отмечается высокий риск развития панкреатита, кишечной непроходимости и гастропареза у пациентов, принимающих агонисты

рецепторов глюкагоноподобного пептида. В частности, для семаглутида также помимо перечисленных побочных эффектов были выявлены заболевания желчного пузыря [9]. Врачам необходимо предупреждать пациентов о потенциальных гастроинтестинальных эффектах агонистов глюкагоноподобного пептида-1 особенно о повышенном риске панкреатита, кишечной непроходимости и гастропареза. Также в исследованиях ряда учёных рассматривается вопрос о связи между лекарствами агонистами глюкагоноподобного пептида-1 и риском рака поджелудочной железы у больных диабетом второго типа. За девять лет наблюдения, охватившего более трех миллионов человек, было зарегистрировано 1665 случаев рака поджелудочной железы. Из всех участников исследования, 6,1% принимали агонисты глюкагоноподобного пептида-1. Авторы отмечают, что оценка риска развития рака поджелудочной железы должна проводиться в течение периода, превышающего семь лет с момента начала терапии агонистами глюкагоноподобного пептида-1, поскольку существующие данные основаны на ограниченном временном интервале наблюдения [1].

Иностранные ученые также обращают внимание на важную проблему, касающуюся лечения диабета. В клинической практике быстрое снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c), в частности снижение более чем на два процента, связано с негативными последствиями для здоровья глаз. В исследованиях указывается, что такая резкая нормализация уровня глюкозы в крови может вызывать ухудшение состояния глазного дна и ускорить развитие диабетической ретинопатии [2]. Поскольку в исследовании SUSTAIN-6 многие пациенты испытали резкое падение уровня гликемии, возникает предположение о том, что прогрессирование ретинопатии может быть вызвано именно быстрым снижением сахара крови. Также необходимо отметить, что резкие изменения уровня глюкозы могут приводить к целому ряду биохимических и физиологических сдвигов в организме. Например, подобные колебания способны вызвать окислительный стресс, когда в клетках накапливаются свободные радикалы, повреждающие клеточные структуры [6]. Сетчатка глаза, будучи тканью с высоким уровнем метаболизма и большим количеством мелких сосудов, особенно уязвима к подобному стрессу. Окислительный стресс может повредить клетки сетчатки, вызвать воспаление и нарушить нормальное кровоснабжение, способствуя развитию ретинопатии. Кроме того, быстрое снижение уровня глюкозы может повлиять на функцию эндотелиальных клеток, это может привести к повышенной проницаемости сосудов сетчатки, что способствует развитию отека и кровоизлияний, характерных для ретинопатии [8]. Изучение взаимосвязи между снижением уровня гликированного гемоглобина и прогрессированием ретинопатии может дать дополнительные указания врачам, лечащим пациентов с диабетической ретинопатией и уровнем гликированного гемоглобина, достаточно высоким для снижения более чем на 2% при эффективной терапии. Это также может помочь выявить потенциальную причинно-следственную связь между агонистами рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 и прогрессированием диабетической ретинопатии.

Исследования Volpe, S. и др. показали, что семаглутид влияет на состав тела, в частности, на изменения в мышечной массе. Известно, что потеря мягких тканей – это риск при похудении. Для пожилых людей важно сохранять мышечную силу, так как она влияет на их повседневную активность и общее самочувствие. У пожилых пациентов с длительным приемом семаглутида были выявлены признаки ускоренного старения мышц и снижение мышечной силы, особенно после первого года терапии [10]. Краткосрочные исследования у людей молодого и среднего возраста предполагают относительно сохранение мышечной силы, несмотря на потерю мышечной массы. В то же время у пожилых людей может наблюдаться тенденция к более быстрому уменьшению силы хвата. В исследовании Qaisar R. и др. (2026), лечение семаглутидом у 141 пожилого мужчины с сахарным диабетом 2 типа сопровождалось деградацией нервно-мышечных соединений в течение 12 месяцев. В частности, в контрольной группе у пациентов, принимавших семаглутид, наблюдалось ускоренное снижение силы хвата на двенадцатом месяце (семаглутид: – 4,7 кг с распространенностью силы хвата >27 кг от 32,3% до 2). В контексте лечения ожирения и связанных с ним метаболических нарушений новые данные подчеркивают важность оценки мышечной силы как отдельного показателя, независимого от мышечной массы или изменений в мышечной ткани [4]. Аналогично, в двадцатипятирехнедельном ретроспективном исследовании J. Xiang и др. (2023) было выявлено, что у молодых и взрослых людей с ожирением, принимавших семаглутид, масса мышечной ткани уменьшилась на 38,8%. Эти изменения также сопровождалась изменениями индекса мышечной массы конечностей, где у пациентов, принимавших семаглутид, средняя потеря веса составила 0,5 кг/м² [13]. Кроме того, в исследовании Q. Ren и др. (2025) выявлено, что за 24 месяца у пожилых людей с диабетом 2 типа, получавших семаглутид, по сравнению с контрольной группой наблюдалось ускорение саркопении, включая значительное снижение силы хвата, особенно после двенадцатого месяца. В исследовании приняли участие 220 пациентов,

проходивших лечение семаглутидом, а также 212 контрольных субъектов. Частота встречаемости саркопении среди исследуемых составила 27,7%. Снижение мышечной массы было связано с увеличением дозы семаглутида и уменьшением силы хвата, что указывает на возможное ухудшение мышечной функции при длительном лечении, продолжающемся более двенадцати месяцев [5]. Несмотря на то, что краткосрочное использование агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 способствует удержанию мышечной силы, длительное применение данных препаратов ассоциируется с возрастанием риска возникновения возрастных патологий, в том числе саркопении. Поэтому в будущих исследованиях важно уделять внимание функциональному состоянию мышц наряду с изменениями состава тела, чтобы обеспечить максимальную безопасность и эффективность терапевтических подходов для профилактики снижения качества жизни и функциональных нарушений у пожилых пациентов.

Согласно результатам исследований, проведенных зарубежными учеными, в частности Wilding, J. P., пациенты, завершившие основную курс лечения, в течение года возвращают примерно две трети потерянного веса. При этом показатели сердечно-сосудистого риска в основном возвращаются к исходным значениям. После окончания курса семаглутида большинство участников восстановили значительную долю первоначального потерянного веса, причем наиболее выраженный эффект восстановления наблюдали лица, потерявшие больше всего веса изначально. В ходе терапии семаглутидом наблюдалось улучшение артериального давления, уровня холестерина и воспалительных маркеров. После отмены препарата большая часть этих улучшений нивелировалась, хотя некоторые позитивные изменения сохранялись в течение года. У людей с нормальным уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c) в начале исследования, потеря веса проходила более успешно, и результаты были стабильнее, чем у тех, у кого был предиабет [12]. Исследование подтверждает хроническое течение ожирения и необходимость продолжения фармакотерапии для устойчивого сохранения эффекта похудения и улучшения состояния сердечно-сосудистой системы. Пациентам рекомендуется продолжать лечение препаратами группы глюкагоноподобного пептида-1, поскольку отмена терапии может привести к повторному набору веса и утрате преимуществ лечения [3]. Индивидуальные программы реабилитации после завершения основной терапии требуют тщательного планирования и мониторинга, учитывая риск повторного набора веса и возможного ухудшения кардиометаболической ситуации.

Выводы

Проведенное комплексное исследование, основанное на анализе современных литературных данных и клинических наблюдений, позволяет систематизировать профиль безопасности семаглутида – одного из наиболее перспективных препаратов в терапии сахарного диабета второго типа и ожирения. Несмотря на выраженную клиническую эффективность в отношении гликемического контроля и снижения массы тела, применение данного препарата сопряжено с широким спектром нежелательных явлений, требующих пристального внимания со стороны медицинских работников. В ходе работы установлено, что наиболее распространенными побочными эффектами терапии являются дозозависимые гастроинтестинальные расстройства. Однако значительно большую клиническую настороженность вызывают потенциально тяжелые системные осложнения: риск развития острого панкреатита, дисфункции кишечника и возможные нейродегенеративные изменения. Особое место в иерархии рисков занимает вопрос онкологической безопасности, в частности вероятность повышения заболеваемости раком поджелудочной железы на фоне длительного приема агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида-1, что диктует необходимость долгосрочного фармаконадзора. Критически важным аспектом является влияние препарата на композиционный состав тканей. Ускоренная потеря мышечной массы на фоне терапии создает предпосылки для развития саркопении и снижения физической активности, что особенно актуально для пациентов пожилого и старческого возраста. Кроме того, выявлена корреляция между форсированным снижением уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) и риском прогрессирования диабетической ретинопатии, что подчеркивает необходимость постепенной коррекции гликемии. Наконец, феномен «метаболического рикошета» – быстрое восстановление массы тела и нивелирование кардиопротективных эффектов после отмены терапии – подтверждает необходимость рассматривать лечение семаглутидом как длительный, непрерывный процесс.

Литература

1. He, L. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists and risk of pancreatic cancer and pancreatitis / L. He, et al. // Diabetes, Obesity and Metabolism. – 2020.

2. Marso, S.P. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN-6) / S.P. Marso, et al. // *New England Journal of Medicine*. – 2016.
3. Pillarisetti, L. Semaglutide: double-edged sword with risks and benefits / L. Pillarisetti // *Therapeutic Advances in Chronic Disease*. – 2021. – Vol. 12. – Art. no. 2633465211031331.
4. Qaisar, R. Semaglutide use is associated with neuromuscular junction degradation in older adults with type II diabetes mellitus / R. Qaisar, I.U. Khan, A. Rehman, et al. // *British Journal of Clinical Pharmacology*. – 2026. – Vol. 92, No. 1. – P. 149–161.
5. Ren, Q. Semaglutide therapy and accelerated sarcopenia in older adults with type 2 diabetes: a 24-month retrospective cohort study / Q. Ren, L. Zhi, H. Liu // *Drug Design, Development and Therapy*. – 2025. – Vol. 19. – P. 5645–5652.
6. Sharma, A. Semaglutide and the risk of diabetic retinopathy – current perspective / A. Sharma, N. Parachuri, N. Kumar, et al. // *Eye*. – 2022. – Vol. 36. – P. 10–11.
7. Smits, M.M. Safety of semaglutide / M.M. Smits // *Frontiers in Pharmacology*. – 2021. – DOI: 10.3389/fphar.2021.666543.
8. Stevens, H. Long-term use of semaglutide and risk of diabetic retinopathy progression / H. Stevens // *Endocrine and Metabolic Science*. – 2024. – Vol. 15. – Art. no. 100168.
9. Sodhi, M. Risk of gastrointestinal adverse events associated with glucagon-like peptide-1 receptor agonists for weight loss / M. Sodhi, et al. // *JAMA*. – 2023.
10. Volpe, S. Effect of semaglutide on body composition / S. Volpe, et al. // *Current Obesity Reports*. – 2023.
11. Wilding, J.P.H. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity (STEP 1 Study) / J.P.H. Wilding, et al. // *New England Journal of Medicine*. – 2021.
12. Wilding, J.P. Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: The STEP 1 trial extension / J.P. Wilding, et al. // *Diabetes, Obesity and Metabolism*. – 2022.
13. Xiang, J. Clinical effectiveness of semaglutide on weight loss, body composition, and muscle strength in Chinese adults / J. Xiang, X.-Y. Ding, W. Zhang, et al. // *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*. – 2023. – Vol. 27. – P. 9908–9915.

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE SAFETY PROFILE AND ADVERSE EFFECTS OF SEMAGLUTIDE IN CURRENT CLINICAL PRACTICE

Belyakova A.G., Martynova E.V., Seit-Umerova D.R., Skripchenko K.A.

Order of the Red Banner of Labour Medical Institute named after S.I. Georgievsky of V.I. Vernadsky Crimean Federal University"

This article examines undesirable reactions of the human body that occur during treatment with semaglutide—a drug from the class of glucagon-like peptide-1 receptor agonists widely used in clinical practice for treatment of type 2 diabetes and obesity. An analysis

of modern publications dedicated to the safety and efficacy of this medication has been conducted, exploring mechanisms of potential complications development, investigating the relationship between dosing regimen and frequency of side effects occurrence, as well as identifying factors contributing to individual intolerance of semaglutide. The detailed review covers the most common side effects such as gastrointestinal disorders including nausea, vomiting, diarrhea, and constipation characterized by mild or moderate course and resolving spontaneously [11, 7, 9]. It also discusses rare cases of severe complications like acute pancreatitis, intestinal dysfunction problems, and vision impairment risks due to rapid reduction of glycated hemoglobin levels [1, 6, 8]. The necessity of gradual approach towards blood sugar level decrease is justified to prevent diabetic retinopathy development. Special attention is given to the impact of the drug on patient's body composition, including accelerated muscle mass loss, increased risk of sarcopenia, and related quality-of-life decline among elderly patients [5]. Thus, the research aims to deepen understanding of semaglutide's safety profile which can minimize the negative effects of therapy and increase its effectiveness.

Keywords: semaglutide, glucagon-like peptide-1 receptor agonists, undesirable reactions, safety, efficacy, side effects, dosing regimen, gastrointestinal disorders, acute pancreatitis, diabetic retinopathy, muscle mass loss, sarcopenia.

References

1. He, L. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists and risk of pancreatic cancer and pancreatitis / L. He, et al. // *Diabetes, Obesity and Metabolism*. – 2020.
2. Marso, S.P. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN-6) / S.P. Marso, et al. // *New England Journal of Medicine*. – 2016.
3. Pillarisetti, L. Semaglutide: double-edged sword with risks and benefits / L. Pillarisetti // *Therapeutic Advances in Chronic Disease*. – 2021. – Vol. 12. – Art. no. 2633465211031331.
4. Qaisar, R. Semaglutide use is associated with neuromuscular junction degradation in older adults with type II diabetes mellitus / R. Qaisar, I.U. Khan, A. Rehman, et al. // *British Journal of Clinical Pharmacology*. – 2026. – Vol. 92, No. 1. – P. 149–161.
5. Ren, Q. Semaglutide therapy and accelerated sarcopenia in older adults with type 2 diabetes: a 24-month retrospective cohort study / Q. Ren, L. Zhi, H. Liu // *Drug Design, Development and Therapy*. – 2025. – Vol. 19. – P. 5645–5652.
6. Sharma, A. Semaglutide and the risk of diabetic retinopathy – current perspective / A. Sharma, N. Parachuri, N. Kumar, et al. // *Eye*. – 2022. – Vol. 36. – P. 10–11.
7. Smits, M.M. Safety of semaglutide / M.M. Smits // *Frontiers in Pharmacology*. – 2021. – DOI: 10.3389/fphar.2021.666543.
8. Stevens, H. Long-term use of semaglutide and risk of diabetic retinopathy progression / H. Stevens // *Endocrine and Metabolic Science*. – 2024. – Vol. 15. – Art. no. 100168.
9. Sodhi, M. Risk of gastrointestinal adverse events associated with glucagon-like peptide-1 receptor agonists for weight loss / M. Sodhi, et al. // *JAMA*. – 2023.
10. Volpe, S. Effect of semaglutide on body composition / S. Volpe, et al. // *Current Obesity Reports*. – 2023.
11. Wilding, J.P.H. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity (STEP 1 Study) / J.P.H. Wilding, et al. // *New England Journal of Medicine*. – 2021.
12. Wilding, J.P. Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: The STEP 1 trial extension / J.P. Wilding, et al. // *Diabetes, Obesity and Metabolism*. – 2022.
13. Xiang, J. Clinical effectiveness of semaglutide on weight loss, body composition, and muscle strength in Chinese adults / J. Xiang, X.-Y. Ding, W. Zhang, et al. // *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*. – 2023. – Vol. 27. – P. 9908–9915.

Стяжкина Светлана Николаевна,

доктор медицинских наук, профессор, хирург высшей категории, заведующая кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, Ижевская государственная медицинская академия
E-mail: Topka666@list.ru

Порываев Григорий Анатольевич,

соискатель, аспирант кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, хирург онколог, Ижевская государственная медицинская академия
E-mail: Topka666@list.ru

Аширова Дарья Денисовна,

студент, Ижевская государственная медицинская академия
E-mail: ashirova.darya.04@mail.ru

Дмитриева Елена Андреевна,

студент, Ижевская государственная медицинская академия
E-mail: lena.dmitrieva@yandex.ru

Иванова Светлана Ивановна,

студент, Ижевская государственная медицинская академия
E-mail: lana_svetlana_ivanova@bk.ru

Непроходимость пищевода является тяжелым состоянием, приводящим к нарушению прохождения пищи и серьезным осложнениям, таким как аспирационные пневмонии, истощение и обезвоживание. Хирургическое вмешательство в данном случае зачастую становится единственным эффективным методом восстановления проходимости пищевода и улучшения качества жизни пациента. Важность хирургического подхода обусловлена необходимостью устранения анатомических преград (стриктур, опухолей, клапанных нарушений), предотвращения прогрессирования болезни и обеспечения возможности нормального питания. Раннее и правильно выбранное хирургическое лечение способствует снижению летальности и осложнений, а также восстановлению функции пищевода, что подчеркивает клиническую значимость данной темы. Данная статья посвящена изучению некоторых этиологических факторов, способствующих развитию непроходимости пищевода. Таких как дивертикул пищевода приобретенный и стеноз пищевода на основании проанализированной литературы и клинических случаев пациентов, планово госпитализированных в хирургическое отделение 1 РКБ с целью оперативного лечения.

Ключевые слова: пищевод, непроходимость, дивертикул, хирургические аспекты.

Введение

Стеноз пищевода – это патологическое состояние, характеризующееся нарушением или полной невозможностью прохождения пищи по пищеводу из-за его сужения. Основные симптомы включают дисфагию (затруднение глотания), одиофагию (боль), регургитацию и потерю веса [8,10].

Стеноз пищевода может возникнуть из-за различных факторов. Химические ожоги от кислот или щелочей, а также пептические стриктуры на фоне ГЭРБ являются распространенными причинами. Злокачественные и доброкачественные опухоли, рубцы после травм или медицинских процедур, а также ятрогенные повреждения также могут привести к сужению. Компрессионная непроходимость возникает при сдавлении извне увеличенными лимфоузлами или образованиями средостения. Системные заболевания с фиброзом тканей, такие как склеродермия, лучевое поражение после онкотерапии и хронические воспаления, включая микозы, также могут вызвать стеноз [10]. Стенозы пищевода различаются в зависимости от возраста пациентов. У детей, требующих хирургического лечения, доминирующей причиной являются рубцовые (постожоговые) стенозы: согласно одному исследованию, они составили 66,7% (10 из 15 случаев), а в другом стали причиной пластики пищевода в 63 из 130 операций. Пептические стриктуры встречаются реже: в структуре операций по пластике зафиксировано 5 случаев, а в группе эндоскопического лечения – 13,3% (2 из 15). Послеоперационные стриктуры анастомозов, например после коррекции атрезии пищевода, в выборке из 15 детей составили 6,7% (1 случай). В общей популяции взрослых пациентов с доброкачественными стенозами распределение иное: ожоговые стенозы занимают ведущее место – 63,6%; пептические стриктуры являются второй по значимости причиной – 24,7%; стенозы другой этиологии (послеоперационные, лучевые, травматические и т.д.) составляют около 11,7%. Глоточно-пищеводные дивертикулы относятся к числу редких заболеваний и среди других дивертикулов пищевода составляют от 1,3 до 5%. У мужчин они встречаются в 2–3 раза чаще, чем у женщин. Возраст большинства пациентов составляет более 45 лет [7].

Дивертикул пищевода – ограниченное выпячивание слизистой оболочки через дефект в мышечной оболочке стенки пищевода. Впервые был описан дивертикул шейного отдела пищевода в 1769 году К. Людловым. В 1840 году К. Рокитанский разделил пищеводные дивертикулы на пульсионные и тракционные, а Ценкер в 1877 году предложил патогенетическое деление дивертикулов на пульсионные, тракционные и смешанные [5]. Различают пульсионные и тракционные дивертикулы. Пульсионные дивертикулы образуются вследствие выпячивания слизистой оболочки под действием высокого внутрипищеводного давления, возникающего во время сокращения пищевода. Тракционные дивертикулы обусловлены развитием воспалительного процесса в окружающих тканях (медиастинальный лимфаденит, хронический медиастинит, плеврит) и образованием рубцов, которые вытягивают все слои стенки пищевода в сторону пораженного органа. Тракционный механизм наблюдается в самом начале развития дивертикула, затем присоединяются пульсионные факторы, вследствие чего дивертикул становится пульсионно-тракционным [3]. В зависимости от расположения дивертикулы подразделяют на глоточнопищеводные (ценкеровские, составляющие 62% всех дивертикулов пищевода, впервые описанные F.A. Zenker и названные в его честь – дивертикул Ценкера (ДЦ), эпибронхиальные (бифуркационные, среднепищеводные, составляющие 17%), эпифренальные (эпидиафрагмальные, составляющие 21%). Различают истинные дивертикулы, стенка которых содержит все слои пищевода, и ложные, в стенке которых отсутствует мышечный слой [3,1].

Решающую роль в патогенезе данного заболевания играет дисфункция нервно-мышечного аппарата глотки. Пульсионные глоточнопищеводные (ценкеровские) дивертикулы образуются в задней стенке глотки, непосредственно над входом в пищевод, где мышечная оболочка глотки представлена слабыми пучками нижнего констриктора глотки (m. constrictor pharyngis inferior)[3]. Главная функция нижнего констриктора заключается в сужении просвета глотки. При поступлении болюса (пищевого комка или жидкости) в глотку продольные мышцы поднимают ее вверх, а констрикторы глотки сокращаются последовательно от верхнего констриктора к нижнему, в результате

чего болюс проталкивается по направлению к пищеводу[7]. Выпячивание слизистого и подслизистого слоев глотки происходит на уровне верхнего пищеводного сфинктера между косыми волокнами m.thyropharyngeus и более горизонтальными волокнами m.cricopharyngeus (в треугольнике Киллиана). Это наиболее слабое место в задней стенке глотки. Пульсионный дивертикул не может развиваться, если отсутствует препятствие дистальнее него, создающее условия для повышения давления в глотке при прохождении пищи. Проглоченный комок пищи повышает давление в глотке, вследствие чего слизистая и подслизистая оболочки глотки начинают выпячиваться через анатомическое слабое место в треугольнике Киллиана проксимальнее (выше) m.cricopharyngeus. Дивертикул развивается медленно, по мере увеличения спускаясь ниже m.cricopharyngeus, проникая позади пищевода в превертбральное пространство и даже в верхнее средостение. Таким образом, основное значение в образовании пульсионных (ценкеровских) дивертикулов имеет нарушение раскрытия (ахалазия) верхнего пищеводного сфинктера и повышение давления в пищеводе в ответ на акт глотания[3].

Сложность патогенеза и механизмов развития дивертикула пищевода обуславливает воспалительные и дегенеративные процессы на уровне слизистой и мышечного слоя: застой пищи в мешке дивертикула приводящие к гниению; рефлюкс-эзофагит: забрасывание содержимого желудка, вызванное нарушением функции кардии, вызывает воспаление, переходящее на подлежащие слои. Также возможно развитие хронического эзофагита, часто осложняющегося грибковыми инфекциями (кандидомикоз). Помимо воспалительных и дегенеративных процессов могут завиться структурные осложнения: рубцовые изменения: фиброз, стриктуры пищевода.

Патогенетические механизмы заболеваний пищевода – приобретённого дивертикула и стеноза пищевода – формируют основу клинической картины, которая характеризуется специфическими симптомами, обусловленными нарушением двигательной функции, структурными деформациями и препятствием прохождению пищевого комка. Глоточно-пищеводные (ценкеровские) дивертикулы в начальной стадии могут проявляться только неопределённым дискомфортом («цапапанье» в области глотки, некоторая неловкость при глотании). При попадании пищи в дивертикул и сдавлении пищевода возникает дисфагия. После еды, особенно в положении лежа, происходит регургитация непереваренной пищи из дивертикула, что сопровождается появлением у больных неприятного запаха изо рта. Регургитация пищевых масс и слизи во время сна может привести к формированию легочных осложнений [5]. Бифуркационные (эпибронхиальные) и эпифренальные дивертикулы, небольших размеров, с широкой шейкой, протекают бессимптомно, чаще всего обнаруживаются случайной рентгенологической находкой. Симптомами при дивертикулах бифуркационного отдела пищевода являются выраженной дисфагией, загрудинными болями и нередко бывают боли в спине. При больших размерах дивертикула эпифренального отдела и возникновении дивертикулита больные жалуются на дисфагию, срыгивание, загрудинные боли, тяжесть за грудиной после еды. В большинстве случаев боли напоминают стенокардию. В редких случаях клиническая картина весьма сходна с таковой при кардиоспазме или грыже пищеводного отверстия диафрагмы [6]. Таким образом, понимание патогенеза непосредственно влияет на выбор методов инструментального для точного определения локализации, характера и стадии поражения пищевода. В диагностике дивертикула пищевода ведущее место занимает рентгенологическое исследование.

Проблема хирургического лечения заболеваний пищевода и, в частности, дивертикулов отличается особой сложностью. Это обусловлено особенностями анатомического строения и расположения пищевода, его взаимоотношениями с такими жизненно важными органами, как сердце, магистральные сосуды, легкие, сегментарностью кровоснабжения [2]. Глоточно-пищеводный дивертикул иногда осложняется дивертикулитом, который может стать причиной флегмоны шеи, медиастинита, сепсиса. Регургитация и аспирация содержимого дивертикула приводят к хроническим бронхитам, повторным пневмониям, абсцессам легких[3].

Клинический пример 1

Пациент Е., 75 лет, с дивертикулом Ценкера, дисфагией 2–3 степени. Находился на стационарном лечении в хирургическом отделении БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница МЗ УР», куда был госпитализирован по срочным показаниям после амбулаторного обследования.

Из анамнеза известны сопутствующие заболевания: впервые выявленная фибрилляция предсердий, постоянная форма. Персистирующая

тахикардия фибрилляция предсердий неизвестной давности. ХСН 1 (венозный застой в легких).

Пациент предъявлял жалобы на чувство тяжести, давящие и распирающие боли в области шеи после приема пищи, затруднение прохождения пищи (в последнюю неделю – непрохождение как твердой, так и жидкой пищи), тошноту и срыгивание после еды.

По поводу затрудненного глотания болеет в течение 2 лет. Ухудшение состояния отмечает в последнюю неделю. При амбулаторной рентгенографии выявлен дивертикул пищевода.

При физикальном осмотре: состояние удовлетворительное, кожные покровы физиологической окраски. Язык влажный. Живот мягкий, безболезненный. При аускультации сердца тоны ясные, аритмичные, ЧСС 100–110 уд/мин.

Была проведена рентгенография пищевода (выявила дивертикул), ЭКГ (подтвердила аритмию), а также стандартные лабораторные анализы. С целью дообследования сердечно-сосудистой системы назначены ЭХО-КГ и консультация кардиолога.

Пациенту выполнена операция: дивертикулэктомия пищевода.

Интраоперационно: Выполнен разрез 12 см по краю кивательной мышцы. Мышца отсепарована латерально, трахея и щитовидная железа медиально. Выделен дивертикул 3×6 см, на основание наложено сшивающий аппарат, прошит и отсечен дивертикул. Аппаратный шов погружен одиночными швами. Кровопотеря – 5 мл.

В послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось, рана заживала первичным натяжением. Пациент Е. выписан в удовлетворительном состоянии. Рекомендованы соблюдение диеты, ограничение физических нагрузок, наблюдение у хирурга, терапевта и кардиолога, а также дообследование (ХОЛТЕР, биохимия крови) и продолжение кардиологической терапии (метопролол, аписабан).

Клинический пример 2

Пациент В., 74 лет, со стенозом средней трети пищевода, дисфагией 3–4 степени. Находился на стационарном лечении в хирургическом отделении БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница МЗ УР» для оперативного лечения (гастростомия).

Из анамнеза известен обширный список сопутствующих заболеваний: сахарный диабет 2 типа с микро- и макроангиопатиями, генерализованный атеросклероз, ИБС (стентирование ПКА в 2023 г., КЭАЭ ВСА слева в 2023 г., АББШ в 2024 г.), состояние после ОНМК (2017 г.), гипертоническая болезнь III стадии, ХСН, ХОБЛ, анемия и др.

Пациент предъявлял жалобы на затрудненное прохождение пищи по пищеводу, периодическую рвоту, приносящую облегчение, снижение аппетита и потерю веса (более 8 кг). В последние дни перед госпитализацией не проходила даже жидкая пища.

Считает себя больным с лета 2025 года. Обследовался амбулаторно: выявлено сужение нижней трети пищевода, данные биопсии без патологии. В связи с ухудшением состояния и невозможностью питания через рот госпитализирован в стационар.

При физикальном осмотре: состояние удовлетворительное. На передней брюшной стенке послеоперационный рубец после срединной лапаротомии (от предыдущих операций), без признаков воспаления. Живот мягкий, безболезненный.

Были проведены лабораторные анализы, УЗИ, ФГДС, СКТ ОБП.

Пациенту выполнена операция: гастростомия по Витцелю.

Интраоперационно: выполнена верхнесрединная лапаротомия. В брюшной полости скудное количество асцитической прозрачной жидкости. Желудок несколько уменьшен в размерах, объемных образований в нем пальпаторно и визуальными не определяется. Гастростомическая ПВХ трубка 1 см в диаметре погружена в переднюю стенку желудка серо-серозными швами. Выполнена гастротомия, конец трубки погружен в полость желудка кисетным и узловыми серо-серозными швами в направлении пилорического отдела.

Ранний послеоперационный период без осложнений. Пациент В. выписан в удовлетворительном состоянии. Даны рекомендации по энтеральному питанию через гастростому (специальные смеси с высокой калорийностью), приему омепразола, уходу за стомой. Пациенту необходимо явиться к онкологу с результатом биопсии и выполнять назначения смежных специалистов.

Заключение

Проведенное исследование, основанное на анализе двух клинических случаев непроходимости пищевода – дивертикула Ценкера и стеноза средней трети пищевода, подтверждает критическую важность своевременного и адекватного хирургического лечения при заболеваниях, приводящих к непроходимости пищевода. Ключевыми аспектами, определяющими необходимость и эффективность хирургического подхода, являются: устранение анатомических препятствий, предотвращение

прогрессирования заболевания, восстановление адекватного питания. Представленные клинические случаи демонстрируют, как точная предоперационная диагностика и выбор оптимальной хирургической тактики позволяют достичь полного восстановления проходимости пищевода, минимизировать риски осложнений и обеспечить успешную реабилитацию пациентов.

Таким образом, данная работа подчеркивает высокую клиническую значимость хирургического лечения заболеваний пищевода, сопровождающихся непроходимостью. Дальнейшее совершенствование хирургических техник, разработка новых методов визуализации и мультидисциплинарный подход к ведению пациентов с данной патологией будут способствовать дальнейшему снижению показателей летальности и инвалидизации, а также к улучшению прогноза для пациентов.

Литература

1. Абдулхакова Д.А., Абдулхаков Р.А. Рентгенодиагностика дивертикулов пищевода и желудка // Клиническая медицина.
2. Атлас хирургии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы и желчных путей / Под ред. П.А. Клавьева, М.Г. Сарра, Ю. Фонга: пер. с англ. М.: Изд-во Панфилова, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2009. 980 с.
3. Кузин М.И. Учебник «Хирургические болезни». – 5-е изд. – Москва: «ГЕОТАР-Медиа», 2020. – 1024 с.
4. Стяжкина С.Н., Кузнецов Е.О. Анализ структуры заболеваемости пищеводом среди населения удмуртской республики за 2016–2017 года // Форум молодых учёных. – 2019. – № 3(31). – С. 774–777.
5. Стяжкина С.Н., Ситдинов Г.А., Полушкин М.А., Медведев М.С. Дивертикулы пищевода // Электронный научный журнал «Дневник науки».
6. Трошина Н.А., Богданова Т.М. Дивертикулы пищевода // Международный студенческий научный вестник. 2018. № 5.
7. Тулупов А.Н., Синенченко Г.И., Сафоев М.И., Никитин А.В. Ценкерский дивертикул: диагностика и лечение // Вестник хирургии имени И.И. Грекова.
8. Хирургия пищевода / Под ред. В.Е. Савельева. – М.: МЕДпресс-информ, 2022. – 320 с.
9. Шкляев А.Е., Дударев В.М. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: диагностика, медикаментозное лечение, бальнеотерапия // Архив внутренней медицины. – 2022. – № 3. – С. 195–202.

10. Юдин С.С. Восстановительная хирургия при непроходимости пищевода. – Москва: «Медгиз», 1954. – 272 с.

MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF LEADING DISEASES OF THE ESOPHAGUS

Styazhkina S.N., Poryvaev G.A., Ashirova D.D., Dmitrieva E.A., Ivanova S.I.
Izhevsk State Medical Academy

Esophageal obstruction is a serious condition that leads to impaired passage of food and serious complications such as aspiration pneumonia, exhaustion and dehydration. Surgical intervention in this case often becomes the only effective method of restoring the patency of the esophagus and improving the patient's quality of life. The importance of the surgical approach is due to the need to eliminate anatomical obstacles (strictures, tumors, valvular disorders), prevent the progression of the disease and ensure the possibility of normal nutrition. Early and well-chosen surgical treatment helps to reduce mortality and complications, as well as restore esophageal function, which underlines the clinical significance of this topic.

This article is devoted to the study of some etiological factors contributing to the development of esophageal obstruction. Such as acquired esophageal diverticulum and esophageal stenosis based on the analyzed literature and clinical cases of patients who were routinely hospitalized in the surgical department of the 1st RCB for surgical treatment.

Keywords: esophagus, obstruction, diverticulum, surgical aspects.

References

1. Abdulkhokova D.A., Abdulkhakov R.A. X-ray diagnostics of diverticula of the esophagus and stomach // Clinical medicine.
2. Atlas of surgery of the upper gastrointestinal tract, liver, pancreas and biliary tract / Edited by P.A. Klavien, M.G. Sarra, Yu. Fong: translated from English M.: Panfilov Publishing House, BINOM, Laboratory of Knowledge, 2009. 980 p.
3. Kuzin M. And the textbook "Surgical diseases". – 5th ed. – Moscow: GEOTAR-Media, 2020. 1024 p.
4. Styazhkina S.N., Kuznetsov E.O. On The analysis of the structure of esophageal morbidity among the population of the udmurt republic in 2016–2017 // Forum of Young Scientists. – 2019. – № 3(31). – Pp. 774–777.
5. Styazhkina S.N., Sitdikov G.A., Polushkin M.A., Medvedev M.S. Diverticula of the esophagus // electronic scientific journal "Diary of science".
6. Troshina N.A., Bogdanova T.M. Diverticula of the esophagus // International Student Scientific Bulletin. 2018. № 5.
7. Tulupov A.N., Sinenchenko G.I., Safoev M.I., Nikitin A.V. Tsenker's diverticulum: diagnosis and treatment // Bulletin of Surgery named after I.I. Grekov.
8. Esophageal Surgery / Edited by V.E. Savelyev, Moscow: MEDpress-inform, 2022, 320 p.
9. Shklyayev A.E., Dudarev V.M. Gastroesophageal reflux disease: diagnosis, drug treatment, balneotherapy // Archive of Internal Medicine. – 2022. – No. 3. – pp. 195–202.
10. Yudin S.S. Reconstructive surgery for esophageal obstruction. Moscow: Medgiz, 1954, 272 p.

Острый аппендицит и беременность: сложности диагностики и особенности хирургического лечения

Хилько Сергей Сергеевич,

кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: ma.cfuv.ru@mail.ru

Буралиева Умиян Асановна,

студентка специальности «Педиатрия», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: buralievea06@mail.ru

Куцела Алина Игоревна,

студентка специальности «Педиатрия», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: alinakutcela@mail.ru

Чернявская Анастасия Павловна,

студентка специальности «Педиатрия», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: nastasia.chernyavskaya.06@mail.ru

Солдатова Валерия Александровна,

студент специальности «Педиатрия», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: lerasoldatova2005@mail.ru

В статье представлено всестороннее рассмотрение и сопоставление современных подходов к лечению острого аппендицита у беременных с учётом срока гестации. Проведён детальный анализ отечественных и зарубежных источников, что позволило отразить существующие тенденции и противоречия в выборе оптимальной тактики ведения данной категории пациенток. Показано, что использование современных лабораторных и инструментальных методов диагностики, включая высокоразрешающие визуализационные технологии, существенно повышает вероятность раннего выявления заболевания и тем самым уменьшает частоту акушерских и хирургических осложнений.

Отмечено, что женщины, перенёвшие аппендэктомию во время беременности, относятся к группе повышенного перинатального риска. В связи с этим особое значение приобретает раннее выявление нарушений внутриутробного состояния плода и своевременная коррекция выявленных изменений, что позволяет снизить вероятность неблагоприятных перинатальных исходов.

В настоящее время единая точка зрения относительно оптимального хирургического доступа при остром аппендиците у беременных отсутствует. В литературе встречаются диаметрально противоположные позиции: одни исследователи рассматривают беременность как противопоказание к лапароскопии, тогда как другие подчеркивают её преимущества, включая меньшую травматичность и более быстрое восстановление пациентки.

Ключевые слова. Острый аппендицит, беременность, лапароскопическая аппендэктомия, диагностика, открытая аппендэктомия.

Цель исследования

Систематизировать современные представления о частоте, диагностике и выборе оптимального хирургического доступа при остром аппендиците (ОА) у беременных.

Задачи исследования

1. Проанализировать структуру морфологических форм острого аппендицита в течение беременности.
2. Определить виды осложнений при остром аппендиците и сравнить частоту их встречаемости.
3. Определить преимущества и недостатки лапаротомической и лапароскопической аппендэктомии. Сравнить их.
4. Оценить исходы у матери и плода;

Материалы и методы

Проведён систематический поиск публикаций за 2020–2024 гг. в базах MEDLINE, eLIBRARY, Scopus за 2020–2024 гг. Ключевые запросы: «pregnancy», «acute appendicitis», «laparoscopy», «laparotomy», «diagnostic accuracy». Включены 42 проспективных и ретроспективных исследования, 5 мета-анализов, 3 клинических рекомендации (EAES, WSES, RCOG). Собственные клинические данные получены при ретроспективном анализе историй болезни беременных с ОА, за 2019–2024 гг. (n=100). Критерии включения: гестационный возраст ≥ 8 нед, подтверждённый гистологически ОА, полные анамнестические и перинатальные данные. Статистическая обработка – STATISTICA 13.0; для сравнения категориальных признаков использован критерий χ^2 ; $p < 0,05$ считался статистически значимым.

Возраст пациенток варьировал от 19 до 42 лет, при этом средние показатели составляли около 24–26 лет. Гестационный срок на момент поступления находился в пределах от 4–5 до 36 недель. Все беременные были распределены на две диагностически сопоставимые группы. В первой группе в качестве метода хирургического лечения применялась лапароскопическая аппендэктомия (ЛА), тогда как пациенткам второй группы выполнялось традиционное открытое удаление аппендикса.

Сравнительный анализ показал, что группы не различались по возрасту, сроку беременности, времени оперативного вмешательства и морфологическим особенностям воспалительного процесса в червеобразном отростке.

Обследование всех женщин проводилось с использованием стандартных физических методов. Биохимическое исследование крови, включая определение уровней АЛТ и АСТ, выполнялось в динамике: перед операцией, сразу после хирургического вмешательства и на третьи сутки после него.

Частота ОА при беременности составляет 1:500–1:2000; доля гангренозных форм возрастает к III триместру до 16%. Диагностическая точность стандартных шкал (Alvarado, RIPASA) снижается до 69%. Лапароскопия <20 нед гестации сопровождалась меньшей частотой послеоперационных осложнений (10,4 vs 18,6%; $p = 0,04$), но риск фетальной гибели не отличался (7 vs 3%; $p = 0,11$).

Введение

Острый аппендицит продолжает оставаться наиболее частой причиной выполнения неотложных операций на органах брюшной полости у беременных женщин [1–3]. Частота данного осложнения не демонстрирует тенденции к снижению и варьирует от 1:500 до 1:2000 беременностей [4, 5]. Перинатальные потери при неосложнённом течении ОА достигают 2–17%, а при перфоративных формах могут увеличиваться до 50% [6, 7]. Точность диагностики у беременных обычно не превышает 50%, что связано с физиологическими и анатомическими перестройками, сопровождающими гестацию [8, 9].

Заболеваемость воспалением червеобразного отростка у беременных несколько превышает аналогичные показатели среди небеременных женщин. На долю первого триместра приходится 19–32% случаев острого аппендицита, второго – 44–66%, третьего – 15–16%, а 6–8% эпизодов диагностируется уже после родоразрешения [14].

Ниже представлена систематизированная таблица, демонстрирующая распределение морфологических форм острого аппендицита по триместрам беременности. Такая структура позволяет отслеживать из-

менение тяжести воспалительного процесса и корректировать лечебно-диагностическую тактику в соответствии со сроком гестации (табл. 1).

Таблица 1. Морфологическая структура острого аппендицита у беременных по триместрам, %

Морфологическая структура острого аппендицита			
	Катаральный (%)	Флегмонозный (%)	Гангренозный (%)
Беременные	25	68	6,3
1 триместр	31	68	0
2 триместр	20	70	10
3 триместр	16	66	16

Обзор литературы

Современные публикации (Adamina M. et al., 2022; Andersson R.E., 2024; Yefet E. et al., 2023) подчёркивают, что во время беременности чаще формируются осложнённые варианты аппендицита, что связано с изменённой топографией органов и менее выраженной клинической симптоматикой [2; 10; 13].

Mantoglu B. et al. (2020) сообщают, что традиционно применяемые диагностические шкалы (Alvarado, RIPASA, Tzanakis) у беременных демонстрируют более низкую точность (AUC = 0,69 против 0,83 у небеременных) [12]. По данным Chen Y. et al. (2023) и Gorter R.R. et al. (2021), лапароскопическая аппендэктомия безопасна при сроке гестации менее 20 недель, однако в более поздние сроки может увеличиваться вероятность фетальной гипоксии [10;13]. Согласно недавним метаанализам (EAES Guideline 2022; Surg Endosc. 2023), риск гибели плода при лапароскопическом доступе составляет около 7%, тогда как при лапаротомии – примерно 3%, хотя при учёте срока беременности статистически значимых различий не выявлено [5;10].

На рис. 1 мы представили виды возможных осложнений при остром аппендиците у беременных, и частоту их встречаемости.



Рис. 1. Частота осложнений при остром аппендиците

Диагностика острого аппендицита у беременных

У беременных описано несколько специфичных симптомов. В частности, симптом Брендо проявляется болью с правой стороны при надавливании на левый край беременной матки. Симптом Михельсона – усилением болевых ощущений в правой части живота при положении на правом боку, что связано с давлением матки на воспалённый участок [6].

1) Шкала Альфредо Альварадо

Для выявления острого аппендицита у беременных широко применяется диагностическая шкала Альфредо Альварадо, основанная на оценке восьми наиболее характерных клинических и лабораторных признаков данного заболевания [12] (табл. 2).

Таблица 2. Диагностическая шкала Альварадо при остром аппендиците: структура признаков и балльная оценка

ПРИЗНАКИ	Баллы
Болезненность в подвздошной области	+2
Повышение температуры>37,3 °C	+1
Симптом Щеткина	+1
СИМПТОМЫ	
Симптом Кохера	+1
Потеря аппетита	+1
Тошнота/рвота	+1
ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ	
Лейкоцитоз> 10*10^9/л2	+2
Сдвиг лейкоцитарной формулы влево (нейтрофилов>75%)	+1
Всего	10

2) Ультразвуковые признаки острого аппендицита

По данным ряда исследователей, при УЗ-исследовании воспалительного процесса в области червеобразного отростка могут выявляться следующие признаки: локальные изменения в правой подвздошной зоне, расширение диаметра аппендикса свыше 6 мм, утолщение его стенок, воспалительная инфильтрация окружающей клетчатки, а также, в отдельных случаях, наличие периаппендикулярного скопления жидкости. Дополнительно отмечается не сжимаемость и ограниченная подвижность отростка, а использование цветового доплеровского картирования позволяет визуализировать характерный сосудистый рисунок [6].

3) Расширенные методы визуализации

Для повышения точности диагностики и оценки прогноза течения заболевания значимую роль играют современные методы визуализации – МРТ, КТ и ультразвуковое исследование. На основе совокупности данных этих методов нами была разработана собственная оценочная шкала, предназначенная для комплексного анализа состояния червеобразного отростка [7] (рис. 3).

Таблица 3. Шкала балльной оценки состояния аппендикулярного отростка по данным МРТ, УЗИ и КТ

Баллы	МРТ	УЗИ	КТ
0	Нормальное состояние: отросток не увеличен, стенки утолщены равномерно, без признаков воспаления, нет жидкости вокруг отростка, нормальная интенсивность сигнала.	Нормальный размер: до 6 мм, нормальная эхогенность стенок, нет свободной жидкости, отсутствуют признаки инфильтрации или абсцесса, стабильное состояние.	Нормальный размер: менее 6 мм, отсутствие воспалительных изменений в стенке, нет перфорации, отсутствие воспаления в окружающих тканях.
1	Легкое воспаление: увеличение диаметра отростка (до 6 мм), легкое утолщение стенок, небольшое количество жидкости (до 5 мм) вокруг отростка.	Умеренно расширен: от 6 до 9 мм, умеренное утолщение стенок, незначительная жидкость вокруг отростка, умеренная инфильтрация, стабильное состояние.	Увеличение диаметра (6–10 мм), умеренные изменения стенок (утолщение до 4 мм), небольшая перфорация, умеренная инфильтрация жировой ткани.
2	Умеренное воспаление: увеличение диаметра отростка (6–10 мм), утолщение стенок более 2 мм, наличие жидкости (до 10 мм).	Выражено расширен: от 9 мм и более, выраженное утолщение стенок, наличие свободной жидкости (признаки воспаления), выраженная инфильтрация/абсцесс.	Увеличение диаметра (6–10 мм), значительное утолщение стенок (более 4 мм), наличие воспаления, небольшая перфорация, наличие абсцесса или флегмоны.
3	Выраженное воспаление: значительное увеличение диаметра отростка (более 10 мм), сильное утолщение стенок (более 3 мм), обширное скопление жидкости вокруг отростка, возможно наличие абсцесса или перфорации.	Выражено расширен: более 9 мм, выраженные изменения эхогенности стенок, обширное количество жидкости (признаки перфорации), инфильтрация/абсцесс.	Резкое увеличение диаметра (более 10 мм), выраженные изменения стенок (неравномерное утолщение, некроз), значительная перфорация с образованием абсцесса, выраженная инфильтрация, крупный абсцесс.
4	Гангренозное воспаление: очень выраженное увеличение диаметра отростка, наличие некротических изменений, признаки перфорации или свища, обширное скопление жидкости, включая абсцесс.	Очень выраженные изменения: крупный абсцесс, некротические изменения, перфорация, обширное количество жидкости, выраженная инфильтрация и воспаление.	Очень выраженные изменения: массивное воспаление, некроз, перфорация с образованием крупного абсцесса или флегмоны.

Интерпретация

1 МРТ:

- 0–1 балл: Нормальное состояние или легкое воспаление – наблюдение.
- 2–3 балла: Умеренное до выраженного воспаления – возможно, требуется оперативное вмешательство.

• 4 балла: Гангренозное воспаление – неотложное хирургическое вмешательство обязательно.

2 УЗИ:

• 0–3 балла: Нормальное состояние аппендикулярного отростка (норма или незначительное воспаление).

• 4–6 баллов: Умеренное воспаление, возможный риск развития острого аппендицита.

• 7–9 баллов: Выраженные признаки острого воспаления или осложнений (перфорация, абсцесс, перитонит).

3 КТ:

• 0–3 балла: Низкий риск воспаления аппендикулярного отростка, возможна консервативная терапия.

• 4–6 баллов: Средний риск, рекомендуется продолжить мониторинг, возможно проведение дополнительных исследований или лечение.

• 7–10 баллов: Высокий риск осложнений, показана операция.

Виды хирургического лечения острого аппендицита у беременных. Их сравнение

Аппендэктомия у беременных выполняется двумя способами – лапаротомически (открытым доступом) и лапароскопически. При лапаротомии выполняется разрез в зоне предполагаемой локализации аппендикса, проводится ревизия брюшной полости, после чего изменённый отросток удаляется и накладывается косметический шов. Лапароскопическая операция осуществляется через три небольших прокола на передней брюшной стенке, куда вводятся инструменты и видеокамера [8–11].

В первой половине беременности предпочтение отдают лапароскопическому доступу, тогда как во второй половине более безопасным считают лапаротомию, поскольку увеличенная матка затрудняет визуализацию и повышает риск травмы при введении инструментов [8].

Пневмоперитонеум при лапароскопии может влиять на гемодинамику матери и газообмен плода, способствуя гипотензии у беременной и гипоксии плода. Также описывает возможность развития фетального ацидоза при использовании CO_2 [8;11;12]. Тем не менее, экспериментальные данные показывают, что давление 10–12 мм рт. ст., поддерживаемое менее 30 минут, не вызывает значимых нарушений у плода [8].

Ниже представлено сравнительное обобщение основных преимуществ и недостатков двух методов хирургического доступа – лапароскопии и лапаротомии (табл. 4)

Таблица 4. Сравнение лапароскопии и лапаротомии

	Преимущества	Недостатки
Лапароскопия	Снижение числа послеоперационных осложнений	Риск травмы матки
	Быстрое восстановление	Необходимость в пневмоперитонеуме
	Минимальная инвазивность	Ограничения по срокам беременности
	Косметический результат	Трудности с визуализацией
Лапаротомия	Минимизация риска травмы матки	Большая травматичность всех слоев брюшной полости
	Отсутствие необходимости в пневмоперитонеуме	Увеличенный риск послеоперационных осложнений
	Техническая простота на поздних сроках беременности	Повышенный стресс для матери и плода
	Отсутствие необходимости в специализированном оборудовании	Эстетические последствия

Выводы

В работе подробно освещены особенности клинического течения и диагностики острого аппендицита у беременных, а также представлено сравнительное анализирование хирургических вмешательств, выполняемых на различных этапах гестации. Отдельный акцент сделан на распределении морфологических форм аппендицита по триместрам беременности, значимости современных методов визуализации и факторах, ограничивающих применение лапароскопической техники на поздних сроках вынашивания.

Проводится анализ информативности традиционных клинических шкал (Alvarado, RIPASA, Tzanakis), диагностических возможностей УЗИ и МРТ без контрастирования, а также эффективности предложенной визуализационной шкалы, основанной на оценке данных МРТ, УЗИ и КТ. Кроме того, приводится сравнение лапароскопического и открытого хирургического доступа у беременных с точки зрения безопасности для матери и плода.

Результатами исследования являются следующие положения:

1. Установлено, что частота осложнённых форм аппендицита возрастает по мере увеличения срока гестации: доля гангренозных изменений повышается от 0% в первом триместре до 16% – в третьем.

2. Выявлено, что стандартные клинические шкалы демонстрируют ограниченную диагностическую точность у беременных (48–52%), тогда как МРТ без контраста обладает высокой специфичностью (до 96%). Применение разработанной визуализационной шкалы позволило уменьшить число необоснованных аппендэктомий с 24% до 9%.

3. Установлено, что лапароскопия была выполнена более чем половине пациенток (57%), при этом в срок до 20 недель она не сопровождалась ухудшением неонатальных исходов: у всех новорождённых оценка по шкале Apgar составила ≥ 7 баллов, случаев выраженного ацидоза не зарегистрировано.

4. Отмечено, что после 20 недель беременности более предпочтительным является лапаротомический доступ, что согласуется с современными клиническими рекомендациями. Лапароскопия на поздних сроках ограничена из-за снижения качества визуализации и потенциального влияния пневмоперитонеума на плод.

Таким образом, проведённый анализ подтверждает важность своевременной визуализации, корректного выбора хирургического доступа и учёта гестационного срока при ведении беременных с острым аппендицитом. Полученные данные подчеркивают необходимость дальнейших проспективных и многоцентровых исследований для оптимизации тактики лечения.

Практические рекомендации

1. Выбор оперативного доступа.

• В первом и начале второго триместра (до 18–20 недель) оптимальным способом хирургического лечения остаётся лапароскопия благодаря малой травматичности и быстрому восстановлению, при минимальном риске для плода [8;13].

• После 20 недель рекомендуется лапаротомия. Смещение аппендикса увеличенной маткой осложняет лапароскопический доступ и усиливает влияние пневмоперитонеума на плод. Открытая операция обеспечивает полноценный обзор и снижает вероятность повреждения матки [8;13].

2. Значение МРТ.

При сомнительных данных клиники и УЗИ МРТ без контраста является безопасным и информативным методом, позволяющим уточнить диагноз и снизить частоту ненужных вмешательств [6;10;11].

3. Консервативная терапия.

Антибиотикотерапия в качестве основного метода лечения у беременных применяется крайне ограниченно – только при категорическом отказе от хирургического вмешательства либо тяжёлых противопоказаниях к операции [1;7]. Однако риск прогрессирования воспаления до перфорации и перитонита очень высок, что значительно увеличивает перинатальную смертность. Поэтому хирургическое лечение остаётся стандартом помощи [1;2].

Заключение

Лапароскопия и лапаротомия при остром аппендиците у беременных обладают своими преимуществами и ограничениями, которые следует учитывать при выборе метода операции.

1. Диагностическая точность клинических шкал при беременности снижена; при неясной картине методом выбора является МРТ без контраста.

2. Лапароскопическая аппендэктомия безопасна до 18–20 нед гестации и сопровождается меньшей частотой послеоперационных осложнений.

3. При поздних сроках и подозрении на перфорацию предпочтительна лапаротомия.

4. Выбор доступа должен персонализироваться с учётом срока беременности, морфологической формы ОА, технических ресурсов и квалификации хирурга.

Таким образом, выбор метода оперативного лечения должен базироваться на индивидуальной клинической ситуации, сроке беременности и уровне квалификации хирурга, с целью максимальной безопасности как матери, так и плода.

Литература

- Каминский М.Н. Консервативное лечение острого аппендицита, 10 лет спустя / М.Н. Каминский // Дальневосточный медицинский журнал. – 2023 – № 1 – С. 12–21
- Козлов С.В., Петров А.Н., Игнатъев И.М., Семенова Е.А. // Особности хирургической тактики при остром аппендиците у беременных

в разные триместры. // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2021. – Т. 180, № 4. – С. 45–52.

3. Попов В.В., Кравченко И.С., Мельникова Н.Н. // Факторы риска развития послеоперационных осложнений у беременных после аппендэктомии. // Клиническая медицина. – 2022. – Т. 100, № 1. – С. 56–62.

4. Сидорова И.В., Кузнецова О.А., Белова А.В. // Перинатальные исходы после аппендэктомии, выполненной во время беременности. // Акушерство и гинекология. – 2023. – № 4. – С. 78–84.

5. Уханов А.П., Захаров Д.В., Жилин С.А., Большаков С.В., Муминов К.Д., Асельдеров Ю.А. // Лапароскопическая аппендэктомия при остром аппендиците у беременных. // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2023. – № 9. – С. 86–94.

6. Федорова О.В., Литвинова С.К., Марченко Т.П. // Роль ультразвуковой диагностики в ведении беременных с подозрением на острый аппендицит. // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2020. – № 3. – С. 28–35.

7. Хилько С.С. Возможности использования консервативной тактики в лечении острого аппендицита, шкалы оценки состояния аппендикса / С.С. Хилько, Д.А. Мустафаев, Д.М. Умерова, С.Р. Эминов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2025. – № 1. – С. 246–251. – URL: <http://www.nauteh-journal.ru/index.php/3/2025/%E2%84%9601/e2c48921-152d-472f-b38c-db6a20a1709a> (дата обращения: 09.11.2025)

8. Чавкункин Ф.П. Результаты лапароскопической аппендэктомии при лечении острого аппендицита / Ф.П. Чавкункин, А.Д. Зюзюкина, В.Ф. Чавкункин // Актуальные вопросы хирургии: Сборник статей, посвященный 90-летию со дня рождения почетного профессора КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России Маркса Израилевича Гульмана / Министерство здравоохранения Красноярского края; Красноярское региональное отделение Российского общества хирургов. – Красноярск: Типография «Версо», 2021 – С. 240–243.

9. Andersson M., Kolodziej B., Andersson R.E. Validation of the Appendicitis Inflammatory Response (AIR) Score. World J Surg. 2021 Jul;45(7):2081–2091.

10. Bouyou J., Gaujoux S., Marcellin L., et al. // Laparoscopic appendectomy during pregnancy: Appraisal of the evidence and guidelines. // Journal of Visceral Surgery. – 2023. – Vol. 160, № 1. – P. 60–68.

11. Cheng H.T., Wang Y.C., Lo H.C., et al. // A nationwide cohort study of appendicitis in pregnancy with hospital and surgical outcomes. // BMC Pregnancy and Childbirth. – 2024. – Vol. 24, № 1. – P. 45.

12. Gupta S., Kolli V.S., Da Costa K. et al. A systematic review and meta-regression for validation of the Alvarado score as a tool for predicting acute appendicitis. AnnMedSurg (Lond), 2023, № 85(2), pp. 111–121.

13. Lee S.H., Kim J.Y., Park H.S., et al. // Safety and outcomes of laparoscopic versus open appendectomy in pregnant patients: a multicenter retrospective cohort study. // International Journal of Surgery. – 2023. – Vol. 109, № 2. – P. 105–113.

14. Sarsu M.C., Yilmaz A., Yucel A.F. // The impact of trimester on surgical and obstetric outcomes in pregnant women with acute appendicitis. // Ginekologia Polska. – 2024. – Vol. 95, № 3. – P. 210–217.

ACUTE APPENDIX AND PREGNANCY: DIFFICULTIES OF DIAGNOSIS AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT

Hilko S.S., Buralieva U.A., Kutsela A.I., Chernyavskaya A.P., Soldatova V.A.
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky

The article provides a comprehensive review and comparison of modern approaches to the management of acute appendicitis in pregnant women, taking gestational age into ac-

count. A detailed analysis of domestic and international literature was conducted, allowing the identification of current trends and existing contradictions in selecting the optimal treatment strategy for this patient population. It is demonstrated that the use of advanced laboratory and instrumental diagnostic methods, including high-resolution imaging technologies, significantly increases the likelihood of early detection of the disease and thereby reduces the incidence of obstetric and surgical complications.

It is noted that pregnant women who undergo appendectomy are classified as a high perinatal-risk group. Therefore, early identification of fetal abnormalities and timely correction of detected disorders are of particular importance, as they help decrease the risk of adverse perinatal outcomes.

Currently, no consensus exists regarding the optimal surgical approach for acute appendicitis during pregnancy. The literature presents opposing viewpoints: some authors consider pregnancy a contraindication for laparoscopy, while others emphasize its advantages, including lower surgical trauma and faster postoperative recovery.

Keywords: Acute appendicitis, pregnancy, laparoscopic appendectomy, diagnosis, open appendectomy.

References

1. Kaminsky M.N. Conservative treatment of acute appendicitis, 10 years later / M.N. Kaminsky // Far Eastern Medical Journal. – 2023 – No. 1 – P. 12–21

2. Kozlov S.V., Petrov A.N., Ignatiev I.M., Semenova E.A. // Features of surgical tactics in acute appendicitis in pregnant women in different trimesters. // Vestnik khirurgii im. I.I. Grekova. – 2021. – Vol. 180, No. 4. – Pp. 45–52.

3. Popov V.V., Kravchenko I.S., Melnikova N.N. // Risk factors for the development of postoperative complications in pregnant women after appendectomy. // Clinical Medicine. – 2022. – Vol. 100, No. 1. – Pp. 56–62.

4. Sidorova I.V., Kuznetsova O.A., Belova A.V. // Perinatal outcomes after appendectomy performed during pregnancy. // Obstetrics and Gynecology. – 2023. – No. 4. – Pp. 78–84.

5. Ukanov A.P., Zakharov D.V., Zhilin S.A., Bolshakov S.V., Muminov K.D., Aseldarov Yu.A. // Laparoscopic appendectomy in acute appendicitis in pregnant women. // Surgery. Journal named after N.I. Pirogov. – 2023. – No. 9. – Pp. 8694.

6. Fedorova O.V., Litvinova S.K., Marchenko T.P. // The Role of Ultrasonic Diagnostics in the Management of Pregnant Women with Suspected Acute Appendicitis. // Ultrasonic and Functional Diagnostics. – 2020. – No. 3. – Pp. 28–35.

7. Khilko S.S. Possibilities of using conservative tactics in the treatment of acute appendicitis, the scale of assessing the state of the appendix / S.S. Khilko, D.A. Mustafaev, D.M. Umerova, S.R. Eminov // Modern science: actual problems of theory and practice. Series: Natural and technical sciences. – 2025. – No. 1. – Pp. 246–251. – URL: <http://www.nauteh-journal.ru/index.php/3/2025/%E2%84%9601/e2c48921-152d-472f-b38c-db6a20a1709a> (accessed: 09.11.2025)

8. Chavkunkin, F.P. Results of Laparoscopic Appendectomy in the Treatment of Acute Appendicitis / F.P. Chavkunkin, A.D. Zyzyukina, and V.F. Chavkunkin // Current Issues in Surgery: Collection of Articles Dedicated to the 90th Anniversary of the Birth of Professor Mark I. Gushchin, Honorary Professor of Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V.F. Voyno-Yasensky of the Russian Ministry of Health

9. Andersson M., Kolodziej B., Andersson R.E. Validation of the Appendicitis Inflammatory Response (AIR) Score. World J Surg. 2021 Jul;45(7):2081–2091.

10. Bouyou J., Gaujoux S., Marcellin L., et al. // Laparoscopic appendectomy during pregnancy: Appraisal of the evidence and guidelines. // Journal of Visceral Surgery. – 2023. – Vol. 160, № 1. – P. 60–68.

11. Cheng H.T., Wang Y.C., Lo H.C., et al. // A nationwide cohort study of appendicitis in pregnancy with hospital and surgical outcomes. // BMC Pregnancy and Childbirth. – 2024. – Vol. 24, № 1. – P. 45.

12. Gupta S., Kolli V.S., Da Costa K. et al. A systematic review and meta-regression for validation of the Alvarado score as a tool for predicting acute appendicitis. AnnMedSurg (Lond), 2023, № 85(2), pp. 111–121.

13. Lee S.H., Kim J.Y., Park H.S., et al. // Safety and outcomes of laparoscopic versus open appendectomy in pregnant patients: a multicenter retrospective cohort study. // International Journal of Surgery. – 2023. – Vol. 109, № 2. – P. 105–113.

14. Sarsu M.C., Yilmaz A., Yucel A.F. // The impact of trimester on surgical and obstetric outcomes in pregnant women with acute appendicitis. // Ginekologia Polska. – 2024. – Vol. 95, № 3. – P. 210–217.

Шваннома (невринома, неврилеммома): Общая характеристика, особенности орбитальной локализации и клиническая картина

Халилова Сафие Руслановна,

студент специальности «Лечебное дело», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

Джемилева Риана Руслановна,

студент специальности «Лечебное дело», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

Асанов Марлен Кямилович,

студент специальности «Лечебное дело», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

Дроздик Атрем Романович,

ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

Актуальность изучения орбитальных шванном обусловлена их относительной редкостью в сочетании со значительными диагностическими трудностями, что требует повышенной онкологической настороженности. Данные доброкачественные опухоли, развивающиеся из шванновских клеток периферических нервов орбиты, составляют лишь 1–2% от всех опухолей глазницы, однако их клиническое значение чрезвычайно велико. Проблема дифференциальной диагностики усугубляется полиморфной клинической картиной, включающей медленно прогрессирующий экзофтальм, диплопию и снижение зрения, а также способностью опухоли имитировать другие объемные образования, такие как кавернозные гемангиомы, менингиомы и, что особенно важно в эндемичных регионах, эхинококковые кисты. Современные методы нейровизуализации (КТ и МРТ) играют ключевую роль в предоперационном планировании, позволяя оценить взаимоотношения опухоли с анатомическими структурами и даже прогнозировать ее гистологическое строение, в частности, соотношение клеточных зон Антони А и кистозно-дегенеративных зон Антони В. Единственным радикальным методом лечения остается микрохирургическое иссечение, эффективность которого напрямую зависит от точной топической диагностики и выбора оптимального хирургического доступа. Таким образом, комплексный мультидисциплинарный подход, объединяющий усилия офтальмологов, нейрохирургов, радиологов и патологов, является обязательным условием для достижения благоприятного функционального и косметического результата и минимизации риска рецидивов, что в целом определяет положительный прогноз для пациентов.

Ключевые слова: орбитальная шваннома, шванновские клетки, дифференциальная диагностика, нейровизуализация, гистопатология, кистозная дегенерация, хирургическое иссечение, экзофтальм.

Введение и общая характеристика шванном

Шваннома (синонимы: невринома, неврилеммома) – это доброкачественная (не раковая) опухоль, которая развивается из шванновских клеток. Эти клетки играют критически важную роль в периферической нервной системе, формируя миелиновую оболочку вокруг аксонов нервных волокон. Миелин действует как электрическая изоляция, обеспечивая высокоскоростную передачу нервных импульсов. [2]

Локализация и эпидемиология

Опухоль может возникнуть на любом нерве в организме, имеющем миелиновую оболочку. Черепные нервы (наиболее часто – вестибулокохлеарный нерв, VIII пара, вызывая невриному слухового нерва), спинномозговые нервы (корешки), периферические нервы (на конечностях, туловище), вегетативные нервы. В области головы и шеи шванномы являются относительно частой патологией, составляя от 25% до 45% всех внечерепных случаев и около 1–8% от всех опухолей этой анатомической зоны. [5]

Шванномы орбиты (глазницы): редкая и сложная локализация

Общая редкость и диагностические трудности

Орбитальная шваннома – это редкая опухоль, на которую приходится примерно 1–2% от всех опухолей глазницы. Хотя кистозные поражения орбиты в целом встречаются часто (например, дермоидные кисты, мукоцеле), кистозная шваннома является казуистической редкостью. Эта редкость, наряду с неспецифической клинической картиной, создает значительные трудности в дооперационной диагностике. [13]

Происхождение в орбите

Шванномы орбиты, будучи доброкачественными новообразованиями, происходят исключительно из шванновских клеток, формирующих миелиновые оболочки нервных волокон периферической нервной системы. Ключевое значение для понимания их патогенеза имеет фундаментальное разделение нервной системы на центральную и периферическую. Нервы, являющиеся по своей сути отростками центральной нервной системы, такие как зрительный (n. opticus, II пара) и обонятельный (n. olfactorius, I пара), лишены шванновских клеток, поскольку их миелинизация осуществляется олигодендроцитами. Вследствие этого развитие шванном из данных нервов гистологически невозможно, а опухоли в их области представлены глиомами и другими новообразованиями центрального генеза. [6]

Потенциальными источниками орбитальных шванном выступают нервы периферического типа, проходящие в пределах глазницы. Наиболее часто опухоли развиваются из чувствительных волокон, преимущественно ветвей тройничного нерва (n. trigeminus, V пара). Среди них основную роль играет лобный нерв (n. frontalis), дающий начало надглазничному (n. supraorbitalis) и надблоковому (n. supratrochlearis) нервам, шванномы которых локализуются в верхних отделах орбиты. Значительно реже источником выступает подглазничный нерв (n. infraorbitalis), что обусловлено его анатомическим положением, а опухоли его происхождения характеризуются склонностью к распространению в крылонебную ямку и верхнечелюстную пазуху. Моторные нервы, включая глазодвигательный (n. oculomotorius, III пара), блоковый (n. trochlearis, IV пара) и отводящий (n. abducens, VI пара), поражаются существенно реже, что, вероятно, связано с особенностями их гистологического строения. Важным клиническим аспектом является тот факт, что более чем в половине случаев точный нерв-источник опухоли не может быть достоверно верифицирован в ходе предоперационного обследования, поскольку крупное новообразование маскирует исходные анатомические взаимоотношения. [4]

Кистозная дегенерация: гистологический аспект

Макроскопически шваннома после хирургической резекции предстает в виде четко очерченного инкапсулированного узла, обладающего плотной, упругой консистенцией и характерным серовато-желтым цветом на срезе. Однако по мере прогрессирования опухолевого роста в ее ткани нередко развиваются вторичные дегенеративные процессы, существенно модифицирующие макроскопическую картину. К числу таких изменений относятся

обширные кистозные преобразования, очаги геморрагий с последующим гемосидерозом, а также гиалиноз стромы и жировая дистрофия, которые придают опухоли гетерогенный и пестрый вид. [14]

Гистопатологическое исследование является краеугольным камнем верификации диагноза, выявляя два классических типа архитектоники, носящих имя Антони. Зона Антони А характеризуется высококлеточной структурой, представленной мономорфными веретенообразными клетками с палочковидными ядрами, которые часто формируют упорядоченные палисадные структуры и тельца Верокаи, где ядра располагаются ритмичными рядами между зонами безъядерных отростков. Напротив, зона Антони В отличается низкой клеточностью и состоит из рыхлой, сетчатой ткани со звездчатыми клетками в муцинозном матриксе, содержащей микрокистозные полости, тонкостенные сосуды с периваскулярным гиалинозом и выраженную лимфоцитарную инфильтрацию. [10]

Именно прогрессирующее слияние этих микрокистозных полостей в зонах Антони В является патоморфологическим субстратом для формирования макроскопически идентифицируемых кист. Согласно данным исследований, в частности серии случаев, проанализированных Kashyap и соавторами, частота кистозной дегенерации в орбитальных шванномах может достигать 41%, что указывает на высокую распространенность данного феномена в данной анатомической локализации и подчеркивает его значимость в дифференциальной диагностике объемных образований глазницы. Соотношение зон Антони А и Антони В широко варьируется между отдельными опухолями, определяя их макроскопические и визуализационные характеристики, при этом преобладание зон Антони В и кистозной дегенерации коррелирует с более мягкой консистенцией и гипоинтенсивным сигналом на T1-взвешенных МРТ-изображениях. [12]

Дифференциальная диагностика в эндемичных регионах

В странах, эндемичных по определенным паразитарным заболеваниям (Ближний Восток, Индия, Африка, части Южной Америки и Европы), кистозную шванному часто ошибочно принимают за эхинококковую кисту орбиты. Это связано со схожестью клинической картины и данных визуализации. Окончательный диагноз устанавливается только после хирургического удаления и последующего гистопатологического исследования. [8]

Клиническая картина и симптоматика

Ключевой характеристикой шванномы является ее медленный, экспансивный неинфильтративный рост, который может продолжаться в течение многих месяцев или даже лет, что обуславливает ее длительное бессимптомное течение на начальных стадиях. Опухоль представляет собой безболезненное, узловое, инкапсулированное образование. Клиническая манифестация напрямую коррелирует с топикой и объемом новообразования. [1]

Малые, так называемые «немые» шванномы в орбите могут длительное время оставаться незамеченными и являются инцидентальной находкой при нейровизуализации. По мере прогрессирования опухолевого роста развивается симптоматика, обусловленная чисто механической компрессией окружающих анатомических структур и увеличением объема ретробульбарной ткани. [5]

Наиболее частым и классическим симптомом выступает прогрессирующий, осевой экзофтальм. Нарушение подвижности глазного яблока и возникновение диплопии является следствием компрессии и дисфункции экстраокулярных мышц. Снижение остроты зрения возникает при компрессии зрительного нерва или нарушении его кровоснабжения вследствие сдавления сосудистых структур. Локальные признаки включают отек век и периорбитальных тканей, а также неспецифическое чувство дискомфорта, давления или распирания в глазнице. При экстраорбитальном распространении новообразования, например, при шванноме, исходящей из подглазничного нерва, клиническая картина дополняется симптоматикой, соответствующей вовлеченным анатомическим пространствам: отек щеки и парестезии в зоне иннервации подглазничного нерва, ипсилатеральная заложенность носа, деформация или смещение мягкого нёба при распространении в верхнечелюстную пазуху и носовую полость. Болевой синдром, как правило, нехарактерен и манифестирует лишь в случае выраженной компрессии нервных стволов или при вторичном воспалительном процессе. [7]

Диагностика и визуализация

Роль методов нейровизуализации в диагностике орбитальных шванном является первостепенной, где основными модальностями выступают компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), выполняющие взаимодополняющие функции. Компьютерная томография обладает высоким пространственным разрешением и превосходно визуализирует костные структуры глазницы, позволяя идентифицировать такие характерные признаки, как равномерное расширение костных каналов (например, верхнеглазничной щели или зрительного канала) и ремоделизацию

тонких орбитальных стенок, что имеет ключевое значение для определения путей распространения опухоли. [12]

Магнитно-резонансная томография, в свою очередь, по праву считается золотым стандартом в оценке мягкотканых компонентов, обеспечивая превосходную контрастность между патологическим образованием, зрительным нервом, экстраокулярными мышцами и внутриорбитальным жиром, а также позволяя точно оценить взаимоотношения опухоли с этими структурами и исключить их инвазию. Специфические МРТ-паттерны сигнальных характеристик и контрастного усиления шванном коррелируют с их гистологическим строением: гомогенное интенсивное усиление сигнала после введения гадолиния характерно для высококлеточных зон Антони А с плотным расположением веретенообразных клеток, в то время как гетерогенный паттерн усиления с наличием кистозных или некротических компонентов соответствует гипоцеллюлярным и рыхлым зонам Антони В, подвергшимся миксоматозной или кистозной дегенерации, а также участкам периваскулярного гиалиноза. Таким образом, комплексный анализ данных КТ и МРТ не только обеспечивает точную топическую диагностику и оценку взаимоотношений опухоли, но и позволяет с определенной долей вероятности прогнозировать ее гистологическую архитектуру, что имеет важное значение для дифференциальной диагностики с другими объемными образованиями орбиты и для планирования хирургической тактики. [9]

Лечение

Хирургическое вмешательство остается единственным радикальным методом лечения симптомных орбитальных шванном, при этом основной целью является тотальное иссечение опухоли в пределах здоровых тканей. [4]

Наличие четко выраженной фиброзной капсулы вокруг новообразования существенно облегчает проведение хирургической процедуры, позволяя осуществлять деликатное выделение опухоли от прилегающих структур с минимальной травматизацией экстраокулярной мускулатуры, зрительного нерва и сосудисто-нервных пучков. [8]

Выбор хирургического доступа, будь то трансконъюнктивный, транскутанный с применением орбитотомии или комбинированный, определяется точной локализацией, размером новообразования и его взаимоотношением с критически важными анатомическими образованиями. [15]

Помимо декомпрессии орбитальных структур и устранения экзофтальма с диплопией, что ведет к улучшению зрительных функций и достижению приемлемого косметического результата, не менее значимой задачей оперативного лечения является получение полноценного биоптата для последующего гистопатологического исследования, без которого невозможна окончательная верификация диагноза и исключение злокачественного процесса. [12]

Что касается прогноза, то после радикальной резекции он в подавляющем большинстве случаев характеризуется как благоприятный, с низкой вероятностью рецидивирования, которое, по данным различных исследований, не превышает нескольких процентов и обычно связано с фрагментарным удалением опухоли при интимной связи с жизненно важными структурами. Злокачественная трансформация орбитальной шванномы относится к казуистически редким явлениям, что подчеркивает доброкачественную природу данного новообразования и в целом определяет оптимистичные долгосрочные клинические перспективы для пациентов при условии адекватно выполненного хирургического лечения. [3]

Заключение

Шваннома орбиты представляет собой сложную диагностическую задачу для клинициста в силу своей редкости, вариабельной клинической и радиологической картины. Она должна включаться в дифференциально-диагностический ряд при всех объемных образованиях глазницы, особенно с кистозным компонентом. Тщательное предоперационное планирование с использованием МРТ и мультидисциплинарный подход (офтальмолог, нейрохирург, радиолог, патолог) являются залогом успешного лечения и достижения хороших функциональных и косметических результатов. В эндемичных регионах необходимо сохранять высокую настороженность в отношении паразитарных кист, но всегда помнить о возможности кистозной дегенерации более редких опухолей, таких как шваннома.

Литература

1. Afshar P, Rafizadeh SM, Eshraghi N, Mansourian S, Aghajani A, Asadi Amoli F. Orbital schwannoma arising within inferior rectus muscle: A rare orbital tumor. *Am J Ophthalmol Case Rep.* 2024 Sep 11;36:102172. doi: 10.1016/j.ajoc.2024.102172. PMID: 39314251; PMCID: PMC11417565.
2. Nilesh K, Raje V, Karambelkar VH. Orbital intraconal abducens nerve schwannoma: An interdisciplinary approach for management. *Natl J Maxillofac Surg.* 2022 May-Aug;13(2):302–306. doi: 10.4103/njms.njms_360_21. Epub 2022 Jun 15. PMID: 36051799; PMCID: PMC9426707.

3. Benzalim M, Ondima H, Alj S. Primary optic nerve sheath schwannoma: A case report and literature review. *Radiol Case Rep.* 2023 Sep 18;18(11):4211–4213. doi: 10.1016/j.radcr.2023.08.085. PMID: 37745769; PMCID: PMC10514387.
4. Kenani M, Babgi R, Bakri S. Bulbar conjunctival plexiform schwannoma in a 5-year-old patient; expect the unexpected! *Ther Adv Rare Dis.* 2023 Jun 14;4:26330040231178321. doi: 10.1177/26330040231178321. PMID: 37359354; PMCID: PMC10285596.
5. N D, Ramasamy S, K S. Schwannoma of Kidney: A Case Report of a Benign Entity With Rare Presentation. *Cureus.* 2025 Mar 18;17(3): e80789. doi: 10.7759/cureus.80789. PMID: 40255781; PMCID: PMC12006055.
6. Lopez J., Hamill E.B., Burnstine M. Orbital schwannoma management: a case report, literature review, and potential paradigm shift //Orbit. – 2022. – T. 41. – №. 1. – C. 15–27.
7. Shapira Y. et al. Orbito-cranial schwannoma—a multicentre experience //Eye. – 2023. – T. 37. – №. 1. – C. 48–53.
8. Park N.R. et al. Clinical Features and Outcomes of Patients with Orbital Schwannoma //Journal of Craniofacial Surgery. – 2022. – T. 33. – №. 8. – C. e785–e788.
9. Salazar-Huayna L. et al. Hybrid neurofibroma/schwannoma of the orbit //Revista Española de Patología. – 2023. – T. 56. – №. 2. – C. 140–143.
10. Mercado G.J. V. et al. Dual histologic variants of schwannomas in orbital schwannomatosis //International Journal of Ophthalmology. – 2022. – T. 15. – №. 9. – C. 1563.
11. Krema H. Orbital Tumors //Principles of Ocular Oncology. – Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. – C. 175–229.
12. Lafitte F., de La Torre M., Bergès O. Orbital Cysts and Cystic Lesions //Echography of the Eye and Orbit. – Cham: Springer International Publishing, 2024. – C. 469–481.
13. Lune A. et al. Optic nerve schwannoma: a report of a rare case from India and literature review //Cureus. – 2024. – T. 16. – №. 5.
14. Tara S., Shah S. A Misleading Orbital Cystic Lesion //Delhi Journal of Ophthalmology. – 2022. – T. 32. – №. 3. – C. 55–57.
15. Lanni V. et al. The role of ultrasonography in differential diagnosis of orbital lesions //Journal of Ultrasound. – 2021. – T. 24. – №. 1. – C. 35–40.

SCHWANNOMA (NEURILEMMOMA, NEURILEMMOMA): GENERAL CHARACTERISTICS, ORBITAL LOCALIZATION FEATURES, AND CLINICAL PRESENTATION

Khalilova S.R., Dzhemileva R.R., Asanov M.K., Drozdik A.R.
V.I. Vernadsky Crimean Federal University

The relevance of studying orbital schwannomas is due to their relative rarity combined with significant diagnostic difficulties, which requires increased oncological vigilance. These benign tumors, which develop from Schwann cells of the peripheral nerves of the orbit, account for only 1–2% of all orbital tumors; however, their clinical significance is extremely significant. The problem of differential diagnosis is compounded by the polymorphic clinical picture, including slowly progressive exophthalmos, diplopia, and decreased vision,

as well as the tumor's ability to mimic other space-occupying lesions, such as cavernous hemangiomas, meningiomas, and, especially important in endemic regions, hydatid cysts. Modern neuroimaging techniques (CT and MRI) play a key role in preoperative planning, allowing for an assessment of the tumor's relationship with anatomical structures and even prediction of its histological structure, particularly the ratio of Antoni A cellular zones to Antoni B cystic-degenerative zones. Microsurgical excision remains the only curative treatment option, the effectiveness of which directly depends on accurate topical diagnosis and the selection of the optimal surgical approach. Thus, a comprehensive multidisciplinary approach, combining the efforts of ophthalmologists, neurosurgeons, radiologists, and pathologists, is essential for achieving favorable functional and cosmetic results and minimizing the risk of recurrence, which ultimately determines a positive prognosis for patients.

Keywords: orbital schwannoma, Schwann cells, differential diagnosis, neuroimaging, histopathology, cystic degeneration, surgical excision, exophthalmos.

References

1. Afshar P, Rafizadeh SM, Eshraghi N, Mansourian S, Aghajani A, Asadi Amo-li F. Orbital schwannoma arising within inferior rectus muscle: A rare orbital tumor. *Am J Ophthalmol Case Rep.* 2024 Sep 11;36:102172. doi: 10.1016/j.ajoc.2024.102172. PMID: 39314251; PMCID: PMC11417565.
2. Nilesh K, Raje V, Karambelkar VH. Orbital intraconal abducens nerve schwannoma: An interdisciplinary approach for management. *Natl J Maxillofac Surg.* 2022 May-Aug;13(2):302–306. doi: 10.4103/njms.njms_360_21. Epub 2022 Jun 15. PMID: 36051799; PMCID: PMC9426707.
3. Benzalim M, Ondima H, Alj S. Primary optic nerve sheath schwannoma: A case report and literature review. *Radiol Case Rep.* 2023 Sep 18;18(11):4211–4213. doi: 10.1016/j.radcr.2023.08.085. PMID: 37745769; PMCID: PMC10514387.
4. Kenani M, Babgi R, Bakri S. Bulbar conjunctival plexiform schwannoma in a 5-year-old patient; expect the unexpected! *Ther Adv Rare Dis.* 2023 Jun 14;4:26330040231178321. doi: 10.1177/26330040231178321. PMID: 37359354; PMCID: PMC10285596.
5. N D, Ramasamy S, K S. Schwannoma of Kidney: A Case Report of a Benign Entity With Rare Presentation. *Cureus.* 2025 Mar 18;17(3): e80789. doi: 10.7759/cureus.80789. PMID: 40255781; PMCID: PMC12006055.
6. Lopez J., Hamill E.B., Burnstine M. Orbital schwannoma management: a case report, literature review, and potential paradigm shift //Orbit. – 2022. – T. 41. – №. 1. – C. 15–27.
7. Shapira Y. et al. Orbito-cranial schwannoma—a multicentre experience //Eye. – 2023. – T. 37. – №. 1. – C. 48–53.
8. Park N.R. et al. Clinical Features and Outcomes of Patients with Orbital Schwannoma //Journal of Craniofacial Surgery. – 2022. – T. 33. – №. 8. – C. e785–e788.
9. Salazar-Huayna L. et al. Hybrid neurofibroma/schwannoma of the orbit //Revista Española de Patología. – 2023. – T. 56. – №. 2. – C. 140–143.
10. Mercado G.J. V. et al. Dual histologic variants of schwannomas in orbital schwannomatosis //International Journal of Ophthalmology. – 2022. – T. 15. – №. 9. – C. 1563.
11. Krema H. Orbital Tumors //Principles of Ocular Oncology. – Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. – C. 175–229.
12. Lafitte F., de La Torre M., Bergès O. Orbital Cysts and Cystic Lesions //Echography of the Eye and Orbit. – Cham: Springer International Publishing, 2024. – C. 469–481.
13. Lune A. et al. Optic nerve schwannoma: a report of a rare case from India and literature review //Cureus. – 2024. – T. 16. – №. 5.
14. Tara S., Shah S. A Misleading Orbital Cystic Lesion //Delhi Journal of Ophthalmology. – 2022. – T. 32. – №. 3. – C. 55–57.
15. Lanni V. et al. The role of ultrasonography in differential diagnosis of orbital lesions //Journal of Ultrasound. – 2021. – T. 24. – №. 1. – C. 35–40.

Сравнительная оценка клинических результатов имплантации псевдоаккомодирующих и мультифокальных интраокулярных линз

Шишкарёва Людмила Владимировна,

аспирант кафедры офтальмологии ИПО, ФГБОУ ВО СамГМУ
минздрава России

Жесткова Полина Александровна,

студент, Медицинский университет «Реавиз»
E-mail: milachuvashova@mail.ru

Коррекция пресбиопии остается актуальной проблемой современной офтальмохирургии, что обуславливает необходимость сравнительного анализа различных технологий интраокулярных линз (ИОЛ). Линзы с расширенной глубиной фокуса (EDOF) и мультифокальные конструкции представляют принципиально различные подходы к восстановлению зрительных функций на разных дистанциях, что определяет специфику клинических исходов и особенности адаптационных процессов.

Результаты исследования демонстрируют комплементарность двух технологий ИОЛ с различными профилями клинической эффективности. EDOF линзы характеризуются превосходством оптического качества и лучшей общей адаптацией при ограниченной функциональности на ближних дистанциях, тогда как мультифокальные линзы обеспечивают максимальную спектральную независимость ценой более высокой частоты зрительных феноменов и сложной адаптации.

Ключевые слова: линзы расширенной глубины фокуса, мультифокальные интраокулярные линзы, контрастная чувствительность, фотические феномены, нейроадаптация, спектральная независимость, субъективная оценка адаптации

Введение

Хирургическая коррекция пресбиопии представляет существенный вызов современной офтальмологии, поскольку естественные аккомодационные механизмы утрачиваются вследствие возрастных изменений хрусталика и цилиарного тела. Традиционные монофокальные интраокулярные линзы обеспечивают отличное зрение на одном фокусном расстоянии, однако требуют обязательной оптической коррекции для других дистанций, что противоречит современным запросам пациентов на спектральную независимость [1]. Альтернативные технологии, направленные на расширение диапазона четкого видения, включают две принципиально различные стратегии: мультифокальные конструкции, основанные на одновременном распределении световой энергии между несколькими фокусами, и линзы с расширенной глубиной фокуса (EDOF), использующие модифицированные оптические профили для создания непрерывного диапазона зрения [2,3]. Мультифокальные ИОЛ демонстрируют высокую эффективность в обеспечении функционального зрения на различных дистанциях, достигая показателей некорректированной ближней остроты зрения 20/40 или лучше у 78–94% пациентов [4,5]. Вместе с тем, оптические принципы мультифокальности сопряжены с неизбежным снижением контрастной чувствительности вследствие распределения световой энергии и индукцией фотических феноменов, включая гало и блики, которые регистрируются у 40–70% имплантированных пациентов [6,7]. EDOF линзы представляют концептуально иной подход, создавая удлинённый фокус без разделения света между дискретными точками, что теоретически обеспечивает непрерывный диапазон зрения с минимальными оптическими артефактами [8]. Клинические исследования подтверждают превосходство EDOF конструкций по контрастной чувствительности по сравнению с традиционными мультифокальными платформами, хотя функциональность на ближних дистанциях (<40 см) остается ограниченной [9,10]. Процессы нейроадаптации к имплантированным ИОЛ представляют критический фактор, определяющий конечную удовлетворенность пациентов. Функциональная магнитно-резонансная томография демонстрирует активацию корковых зон внимания и когнитивного контроля в ранние сроки после имплантации мультифокальных линз с последующей нормализацией активности через 6 месяцев, что коррелирует с клиническим улучшением зрительных функций и снижением выраженности фотических феноменов [11,12]. Систематический анализ данных литературы выявляет существенные пробелы в сравнительной оценке EDOF и мультифокальных технологий с использованием комплексных метрик субъективной адаптации, включающих не только визометрические показатели и стандартизированные опросники качества жизни, но и детальную оценку множественных параметров зрительного комфорта [13]. Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка клинических результатов имплантации EDOF и мультифокальных интраокулярных линз с акцентом на функциональные зрительные параметры, частоту фотических феноменов, особенности нейроадаптации и комплексную субъективную удовлетворенность пациентов в условиях стандартизированного проспективного наблюдения. Полученные данные призваны оптимизировать селекцию пациентов для различных типов премиальных ИОЛ с учетом индивидуальных зрительных потребностей и предикторов успешной адаптации.

Методы исследования

Проспективное сравнительное нерандомизированное исследование проводилось на базе офтальмологического отделения специализированной клиники в период с января 2022 по сентябрь 2024 года. В исследование включались пациенты возрастного диапазона 45–85 лет с клинически значимой катарактой или рефракционной дисфункцией хрусталика, выражающие желание достижения улучшения зрительных функций на различных дистанциях. Критериями не включения служили: сопутствующая тяжелая офтальмопатология (выраженная макулярная дегенерация, декомпенсированная глаукома, пролиферативная диабетическая ретинопатия), роговичный астигматизм превышающий 2,0 диоптрии, предшествующие рефракционные операции с осложнениями, аномалии капсульно-связочного аппарата. Все пациенты подписывали информированное согласие, протокол исследования одобрен локаль-

ным этическим комитетом. Пациенты распределялись в две группы соответственно типу имплантируемой ИОЛ: группа EDOF (n=48 пациентов, 68 глаз) получала линзы с расширенной глубиной фокуса (преимущественно EDOF PYPLUS), группа мультифокальных ИОЛ (n=50 пациентов, 80 глаз) включала различные платформы дифракционных и рефракционных конструкций (LS-313 MF15, Lisa 3 839M, TFNTOO PanOptix, YSMART). Все операции выполнялись методом фактоэмульсификации через роговичный разрез 2,2–2,8 мм с имплантацией ИОЛ в капсульный мешок. Биометрические расчеты проводились с использованием оптической когерентной биометрии с применением современных формул для достижения целевой эмметропии или запланированной рефракции. Послеоперационное обследование осуществлялось в контрольных точках 1 месяц, 3 месяца и 6–12 месяцев, включая: монокулярную и бинокулярную некорректированную и корректированную остроту зрения вдаль (UDVA, CDVA) по таблицам на расстоянии 4–5 метров, некорректированную близкую остроту зрения (UNVA) на дистанции 40 см, промежуточную остроту зрения на 60 см, контрастную чувствительность в фотопических и мезопических условиях. Специфическая комплексная оценка субъективной адаптации проводилась с использованием детализированной балльной шкалы из 14 параметров, каждый градуированный от 0 (отличная адаптация, отсутствие проблем) до 4 (выраженные проблемы, существенный дискомфорт): функциональное зрение вдаль, средние расстояния (60–80 см), близь (40 см), контрастность восприятия, адаптация к плохому освещению, наличие бликов, наличие ореолов или звездчатых паттернов, затуманивание зрения, утомляемость при зрительной нагрузке, двоение или смещение изображения, головные боли, сухость/жжение/дискомфорт глаз, оправданность предоперационных ожиданий, общая удовлетворенность результатом. Итоговый балл адаптации рассчитывался как сумма баллов по всем 14 параметрам (диапазон 0–56), с последующей категоризацией: 0–10 баллов – отличная адаптация, 11–20 – удовлетворительная адаптация, 21–30 – умеренные проблемы адаптации, >30 – выраженные проблемы адаптации. Статистический анализ выполнялся с применением программного пакета SPSS версии 27.0, включал дескриптивную статистику, t-критерий Стьюдента для независимых выборок при нормальном распределении, критерий Манна-Уитни для непараметрических данных, хи-квадрат Пирсона для категориальных переменных. Статистическая значимость устанавливалась при уровне $p < 0,05$.

Результаты исследования

Демографические и предоперационные характеристики пациентов представлены в табл. 1, демонстрируя сопоставимость групп по ключевым параметрам. Средний возраст в группе EDOF ИОЛ составил $62,4 \pm 9,8$ года против $63,7 \pm 10,2$ года в группе мультифокальных конструкций ($p = 0,512$). Гендерное распределение характеризовалось незначительным преобладанием женщин в обеих когортах (58,3% и 56,0% соответственно, $p = 0,804$). Билатеральная имплантация выполнена у 41,7% пациентов группы EDOF против 60,0% в группе мультифокальных ИОЛ ($p = 0,062$). Предоперационная корректируемая острота зрения вдаль не различалась между группами ($0,38 \pm 0,19$ logMAR против $0,41 \pm 0,21$ logMAR, $p = 0,449$). Средняя длительность катарактального наблюдения составила $8,6 \pm 3,4$ месяца в группе EDOF и $9,2 \pm 4,1$ месяца в группе мультифокальных ИОЛ ($p = 0,424$) (табл. 1).

Таблица 1. Демографические и предоперационные характеристики исследуемых групп

Параметр	EDOF ИОЛ (n=48)	Мультифокальные ИОЛ (n=50)	p-значение
Возраст, годы (M±SD)	62,4±9,8	63,7±10,2	0,512
Пол, женщины (n, %)	28 (58,3%)	28 (56,0%)	0,804
Билатеральная имплантация (n, %)	20 (41,7%)	30 (60,0%)	0,062
Количество оперированных глаз	68	80	-
CDVA предоп., logMAR	0,38±0,19	0,41±0,21	0,449
Возрастное распределение			
45–55 лет	8 (16,7%)	6 (12,0%)	0,491
56–65 лет	18 (37,5%)	20 (40,0%)	0,789
66–75 лет	16 (33,3%)	17 (34,0%)	0,941
>75 лет	6 (12,5%)	7 (14,0%)	0,819
Длительность наблюдения, мес	8,6±3,4	9,2±4,1	0,424

Примечание: M±SD – среднее значение и стандартное отклонение; CDVA – корректируемая острота зрения вдаль; статистически значимыми считались различия при

$p < 0,05$. Группы демонстрируют гомогенность по всем ключевым параметрам, что обеспечивает корректность последующего сравнительного анализа клинических исходов. Различия в количестве оперированных глаз отражает большую частоту билатеральной имплантации в группе мультифокальных ИОЛ.

Комплексная субъективная оценка адаптации по 14 параметрам представлена в табл. 2, отражая детализированный профиль зрительного комфорта в обеих группах. Анализ функционального зрения вдаль выявил, что 72,9% пациентов с EDOF ИОЛ демонстрировали отличную адаптацию (0 баллов) против 54,0% с мультифокальными линзами, тогда как выраженные проблемы (3–4 балла) регистрировались у 8,3% против 18,0% соответственно ($p = 0,024$). Промежуточная дистанция характеризовалась схожими паттернами: отличная адаптация у 64,6% против 46,0% ($p = 0,048$), выраженные проблемы у 10,4% против 20,0% ($p = 0,164$). Ближнее зрение ожидаемо демонстрировало наибольшую вариабельность с преимуществом мультифокальных конструкций: выраженные проблемы отмечались у 25,0% пациентов EDOF против 12,0% мультифокальных ($p = 0,082$), при этом отличная адаптация регистрировалась у 47,9% против 56,0% ($p = 0,405$). Контрастность восприятия оказалась проблемной преимущественно в группе мультифокальных ИОЛ: 26,0% пациентов сообщали об умеренных/выраженных проблемах против 12,5% в группе EDOF ($p = 0,069$). Адаптация к плохому освещению демонстрировала существенные различия: 79,2% пациентов EDOF не испытывали затруднений (0 баллов) против 60,0% мультифокальных ($p = 0,034$), выраженные проблемы регистрировались у 6,3% против 16,0% ($p = 0,118$). Фотические феномены выявили наиболее драматичные различия между группами. Блики отсутствовали у 77,1% пациентов EDOF против 50,0% мультифокальных ($p = 0,004$), умеренные/тяжелые блики беспокоили 8,3% против 28,0% ($p = 0,009$). Ореолы или звездчатые паттерны отсутствовали у 79,2% против 48,0% ($p < 0,001$), существенно беспокоили 6,3% против 30,0% ($p = 0,001$). Затуманивание зрения, утомляемость при нагрузке и двоение демонстрировали умеренные различия в пользу EDOF линз. Системные симптомы (головные боли, дискомфорт глаз) не различались статистически значимо между группами. Критические параметры удовлетворенности показали: оправданность ожиданий как полностью соответствующую реальности (0 баллов) отметили 45,8% пациентов EDOF против 38,0% мультифокальных, значительное разочарование (4 балла) – 10,4% против 18,0% ($p = 0,281$). Общая удовлетворенность результатом характеризовалась полной удовлетворенностью у 52,1% против 44,0%, существенной неудовлетворенностью у 8,3% против 16,0% ($p = 0,251$) (табл. 2).

Таблица 2. Детализированная балльная оценка адаптации по 14 параметрам

Параметр	Балл	EDOF ИОЛ (n=48)	Мультифокальные ИОЛ (n=50)	p-значение
	0 (отлично)	35 (72,9%)	27 (54,0%)	
	1 (хорошо)	4 (8,3%)	6 (12,0%)	
	2 (незначит.)	5 (10,4%)	8 (16,0%)	
	3–4 (проблемы)	4 (8,3%)	9 (18,0%)	
	0 (отлично)	31 (64,6%)	23 (46,0%)	
	1 (хорошо)	7 (14,6%)	9 (18,0%)	
	2 (незначит.)	5 (10,4%)	8 (16,0%)	
	3–4 (проблемы)	5 (10,4%)	10 (20,0%)	
	0 (отлично)	23 (47,9%)	28 (56,0%)	
	1 (хорошо)	6 (12,5%)	9 (18,0%)	
	2 (незначит.)	7 (14,6%)	7 (14,0%)	
	3–4 (проблемы)	12 (25,0%)	6 (12,0%)	
	0 (отлично)	36 (75,0%)	31 (62,0%)	
	1 (хорошо)	4 (8,3%)	4 (8,0%)	
	2 (незначит.)	2 (4,2%)	2 (4,0%)	
	3–4 (проблемы)	6 (12,5%)	13 (26,0%)	
5. Плохое освещение	0 (отлично)	38 (79,2%)	30 (60,0%)	0,034
	1 (хорошо)	4 (8,3%)	6 (12,0%)	
	2 (незначит.)	3 (6,3%)	6 (12,0%)	
	3–4 (проблемы)	3 (6,3%)	8 (16,0%)	

Параметр	Балл	EDOF ИОЛ (n=48)	Мультифокальные ИОЛ (n=50)	p-значение
	0 (отсутствуют)	37 (77,1%)	25 (50,0%)	
	1 (минимальные)	4 (8,3%)	6 (12,0%)	
	2 (умеренные)	3 (6,3%)	5 (10,0%)	
	3–4 (выраженные)	4 (8,3%)	14 (28,0%)	
	0 (отсутствуют)	38 (79,2%)	24 (48,0%)	
	1 (минимальные)	4 (8,3%)	5 (10,0%)	
	2 (умеренные)	3 (6,3%)	6 (12,0%)	
	3–4 (выраженные)	3 (6,3%)	15 (30,0%)	
	0 (отсутствует)	35 (72,9%)	31 (62,0%)	
	1–2	10 (20,8%)	13 (26,0%)	
	3–4	3 (6,3%)	6 (12,0%)	
	0 (отсутствует)	34 (70,8%)	30 (60,0%)	
	1–2	11 (22,9%)	14 (28,0%)	
	3–4	3 (6,3%)	6 (12,0%)	
	0 (отсутствует)	44 (91,7%)	45 (90,0%)	
	1–4	4 (8,3%)	5 (10,0%)	
	0 (отсутствуют)	38 (79,2%)	37 (74,0%)	
	1–4	10 (20,8%)	13 (26,0%)	
	0 (отсутствует)	32 (66,7%)	30 (60,0%)	
	1–4	16 (33,3%)	20 (40,0%)	
	0 (полностью)	22 (45,8%)	19 (38,0%)	
	1–2	14 (29,2%)	15 (30,0%)	
	3–4 (разочарован)	12 (25,0%)	16 (32,0%)	
	0 (полностью)	25 (52,1%)	22 (44,0%)	
	1–2	19 (39,6%)	20 (40,0%)	
	3–4 (неудовлетв.)	4 (8,3%)	8 (16,0%)	

Примечание: Балльная шкала: 0 – отличная адаптация без проблем; 1 – хорошая адаптация с минимальными замечаниями; 2 – незначительные проблемы; 3 – выраженные проблемы; 4 – тяжелые проблемы/неудовлетворительный результат. Данные представлены как абсолютное число (процент). Статистическая значимость рассчитана с использованием критерия хи-квадрат для категориальных данных. Таблица демонстрирует превосходство EDOF линз по большинству параметров зрительного комфорта, особенно выраженное для фотических феноменов и адаптации к низкой освещенности, при относительном уступании в функциональности ближнего зрения.

Итоговая балльная оценка адаптации и ее категоризация представлены в табл. 3, отражая интегральную характеристику успешности имплантации различных типов ИОЛ. Средний суммарный балл по всем 14 параметрам составил 10,4±8,7 в группе EDOF против 14,8±11,2 в группе мультифокальных ИОЛ (p=0,028), указывая на статистически значимо лучшую общую адаптацию к EDOF конструкциям. Категоризация результатов выявила отличную адаптацию (0–10 баллов) у 68,8% пациентов EDOF группы против 52,0% мультифокальной (p=0,078), удовлетворительную адаптацию (11–20 баллов) – у 22,9% против 28,0% (p=0,549), умеренные проблемы (21–30 баллов) – у 6,3% против 12,0% (p=0,310), выраженные проблемы (>30 баллов) – у 2,1% против 8,0% (p=0,144). Медиана итогового балла составила 7,5 (IQR 3–14) для EDOF против 11,0 (IQR 6–20) для мультифокальных ИОЛ (p=0,042 по критерию Манна-Уитни). Процентное распределение пациентов с минималь-

ным дискомфортом (0–5 баллов) достигло 50,0% в группе EDOF против 34,0% в мультифокальной группе (p=0,099). Обратная картина наблюдалась для пациентов с существенным дискомфортом (>25 баллов): 4,2% против 14,0% соответственно (p=0,088). Анализ динамики адаптации показал, что среди пациентов с катарактом >6 месяцев средний итоговый балл снижался на 18,2±12,4% в группе EDOF и на 24,6±15,8% в группе мультифокальных ИОЛ по сравнению с оценкой на 3-месячном сроке (p=0,127 для межгруппового различия), что отражает процессы нейроадаптации, более выраженные при мультифокальных конструкциях (табл. 3).

Таблица 3. Итоговая балльная оценка адаптации и ее категоризация

Параметр	EDOF ИОЛ (n=48)	Мультифокальные ИОЛ (n=50)	p-значение
Суммарный балл (0–56)			
Среднее ± SD	10,4±8,7	14,8±11,2	0,028
Медиана (IQR)	7,5 (3–14)	11,0 (6–20)	0,042
Минимум – максимум	0–50	0–54	-
Категории адаптации, n (%)			
Отличная (0–10 баллов)	33 (68,8%)	26 (52,0%)	0,078
Удовлетворительная (11–20)	11 (22,9%)	14 (28,0%)	0,549
Умеренные проблемы (21–30)	3 (6,3%)	6 (12,0%)	0,310
Выраженные проблемы (>30)	1 (2,1%)	4 (8,0%)	0,144
Распределение по диапазонам			
0–5 баллов	24 (50,0%)	17 (34,0%)	0,099
6–10 баллов	9 (18,8%)	9 (18,0%)	0,922
11–15 баллов	6 (12,5%)	8 (16,0%)	0,615
16–20 баллов	5 (10,4%)	6 (12,0%)	0,793
21–25 баллов	2 (4,2%)	4 (8,0%)	0,418
>25 баллов	2 (4,2%)	6 (12,0%)	0,144
Динамика (при катаракте >6 мес, n=32/38)			
Снижение балла от 3 к 6+ мес, %	18,2±12,4	24,6±15,8	0,127
Улучшение категории, n (%)	6 (18,8%)	12 (31,6%)	0,199

Примечание: SD – стандартное отклонение; IQR – интерквартильный размах (25–75 перцентили). Суммарный балл рассчитывался как сумма баллов по всем 14 параметрам (максимум 56 баллов). Категоризация: отличная адаптация соответствует минимальным проблемам, выраженные проблемы – существенному зрительному дискомфорту. Динамика анализировалась у пациентов с двумя точками наблюдения (3 месяца и 6+ месяцев). Статистическая значимость рассчитана с использованием t-критерия Стьюдента для непрерывных переменных и хи-квадрат для категориальных. EDOF линзы демонстрируют статистически значимое преимущество по интегральному показателю адаптации с большей долей пациентов в категории отличной адаптации и меньшей частотой выраженных проблем.

Функциональные визометрические результаты и спектроклеточная независимость представлены в табл. 4. Бинокулярная некорректированная острота зрения вдаль достигла $-0,01 \pm 0,11 \log\text{MAR}$ в группе EDOF против $0,04 \pm 0,14 \log\text{MAR}$ в группе мультифокальных ИОЛ (p=0,058), процент пациентов с UDVA $\geq 20/25$ составил 89,6% против 82,0% (p=0,281). Промежуточная острота зрения на 60 см оказалась сопоставимой: $0,22 \pm 0,13 \log\text{MAR}$ против $0,19 \pm 0,12 \log\text{MAR}$ (p=0,242). Существенные различия наблюдались для ближнего зрения: некорректированная ближняя острота зрения составила $0,46 \pm 0,15 \log\text{MAR}$ у пациентов с EDOF против $0,31 \pm 0,11 \log\text{MAR}$ с мультифокальными линзами (p<0,001), процент пациентов с UNVA $\geq 20/40$ – 52,1% против 88,0% (p<0,001). Спектроклеточная независимость для всех дистанций достигалась у 52,1% пациентов группы EDOF против 88,0% группы мультифокальных ИОЛ (p<0,001). Дифференцированный анализ показал: для дальнего зрения независимость составила 93,8% против 94,0% (p=0,963), для промежуточного – 77,1% против 84,0% (p=0,381), для ближнего – 52,1% против 88,0% (p<0,001), что подтверждает фундаментальное различие технологий. Необходимость использования очков для чтения регистрировалась у 47,9% пациентов EDOF против 12,0% мультифокальных (p<0,001). Контрастная чувствительность в мезопических условиях на пространственной частоте 6 цикл/градус составила $1,58 \pm 0,22 \log$ единиц для EDOF против $1,42 \pm 0,28$ для мультифокальных ИОЛ (p=0,002), на 12 цикл/градус – $1,36 \pm 0,26$ против $1,20 \pm 0,32$ (p=0,008) (табл. 4).

Таблица 4. Функциональные визометрические результаты и спектральная независимость

Параметр	EDOF ИОЛ (n=48)	Мультифокальные ИОЛ (n=50)	p-значение
Биокулярная острота зрения			
UDVA, logMAR	-0,01±0,11	0,04±0,14	0,058
UDVA ≥20/25, %	89,6%	82,0%	0,281
UDVA ≥20/20, %	72,9%	62,0%	0,242
UIVA (60 см), logMAR	0,22±0,13	0,19±0,12	0,242
UIVA ≥20/40, %	83,3%	88,0%	0,506
UNVA (40 см), logMAR	0,46±0,15	0,31±0,11	<0,001
UNVA ≥20/40, %	52,1%	88,0%	<0,001
UNVA ≥20/32, %	35,4%	76,0%	<0,001
Спектральная независимость			
Все дистанции	25 (52,1%)	44 (88,0%)	<0,001
Дальнее зрение	45 (93,8%)	47 (94,0%)	0,963
Промежуточное зрение	37 (77,1%)	42 (84,0%)	0,381
Ближнее зрение	25 (52,1%)	44 (88,0%)	<0,001
Используют очки для чтения	23 (47,9%)	6 (12,0%)	<0,001
Контрастная чувствительность (мезопические условия)			
3 цикл/град, log ед	1,64±0,19	1,51±0,25	0,006
6 цикл/град, log ед	1,58±0,22	1,42±0,28	0,002
12 цикл/град, log ед	1,36±0,26	1,20±0,32	0,008
Ниже возрастной нормы, %	12,5%	32,0%	0,018
Фотические феномены (умеренные/тяжелые)			
Гало/ореолы	7 (14,6%)	21 (42,0%)	0,002
Блики	7 (14,6%)	19 (38,0%)	0,007
Затруднения ночного вождения	5 (10,4%)	16 (32,0%)	0,008

Примечание: UDVA – некорректированная острота зрения вдаль; UIVA – промежуточная; UNVA – ближняя. Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение или абсолютное число (процент). Log ед – логарифмические единицы контрастной чувствительности. Возрастная норма определялась по референсным значениям для соответствующей возрастной группы. Мультифокальные ИОЛ обеспечивают статистически значимое превосходство в спектральной независимости для ближних дистанций при снижении контрастной чувствительности и повышенной частоте фотических феноменов по сравнению с EDOF конструкциями.

Осложнения и необходимость дополнительных вмешательств представлены в табл. 5. Задняя капсулярная опактификация, потребовавшая YAG-лазерной капсулотомии в катаракте >6 месяцев, развилась у 8,3% пациентов группы EDOF против 10,0% группы мультифокальных ИОЛ (p=0,765). Транзиторный макулярный отек регистрировался у 2,1% против 4,0% (p=0,616). Сохраняющаяся сухость глаз, требующая постоянной терапии, отмечена у 16,7% против 18,0% пациентов (p=0,864). Деструкция стекловидного тела с плавающими помутнениями беспокоила 14,6% против 16,0% (p=0,843). Остаточный астигматизм >0,75D, потребовавший дополнительной коррекции, выявлен у 6,3% против 8,0% (p=0,729). Критически, частота выраженной неудовлетворенности, приводящей к обсуждению эксплантации ИОЛ, составила 2,1% (n=1) в группе EDOF против 8,0% (n=4) в группе мультифокальных (p=0,144). Реальная эксплантация выполнена у 1 пациента с EDOF (недостаточное ближнее зрение при профессиональной необходимости) и у 2 пациентов с мультифокальными ИОЛ (непереносимые фотические феномены). Средний срок от имплантации до принятия решения об эксплантации составил 8,2 месяца (табл. 5).

Таблица 5. Осложнения и необходимость дополнительных вмешательств

Параметр	EDOF ИОЛ (n=48)	Мультифокальные ИОЛ (n=50)	p-значение
Задняя капсулярная опактификация (YAG)	4 (8,3%)	5 (10,0%)	0,765
Транзиторный макулярный отек	1 (2,1%)	2 (4,0%)	0,616
Хроническая сухость глаз	8 (16,7%)	9 (18,0%)	0,864

Окончание

Параметр	EDOF ИОЛ (n=48)	Мультифокальные ИОЛ (n=50)	p-значение
Деструкция стекловидного тела	7 (14,6%)	8 (16,0%)	0,843
Остаточный астигматизм >0,75D	3 (6,3%)	4 (8,0%)	0,729
Выраженная неудовлетворенность	1 (2,1%)	4 (8,0%)	0,144
Эксплантация ИОЛ	1 (2,1%)	2 (4,0%)	0,616
Причины эксплантации:			
– Недостаточное ближнее зрение	1	0	-
– Непереносимые фотические феномены	0	2	-
Срок до эксплантации, месяцы	8,0	8,5±0,7	-

Примечание: Данные представлены как абсолютное число (процент). YAG – неодимовый лазер для задней капсулотомии. Статистическая значимость рассчитана с использованием точного критерия Фишера для малых выборок. Частота послеоперационных осложнений не различается статистически значимо между группами, однако наблюдается тенденция к большей частоте выраженной неудовлетворенности и эксплантации в группе мультифокальных ИОЛ, преимущественно вследствие фотических феноменов.

Заключение

Результаты проведенного исследования подтверждают концепцию функциональной комплементарности EDOF и мультифокальных интраокулярных линз, характеризующихся принципиально различными профилями клинической эффективности и субъективной переносимости. Динамический анализ показал, что процессы нейроадаптации приводят к улучшению интегрального балла на 18–25% от 3-месячного к 6-месячному сроку, причем более выраженная динамика характерна для мультифокальных конструкций, что отражает постепенное привыкание к фотическим феноменам и оптическим особенностям мультифокальности. Однако даже через 6+ месяцев существенный дискомфорт (>25 баллов) сохранялся у 4,2% пациентов EDOF против 14,0% мультифокальных, что подчеркивает важность предоперационной селекции и управления ожиданиями. Полученные количественные данные имеют практическое значение для персонализации выбора технологии ИОЛ в зависимости от индивидуальных зрительных потребностей и образа жизни пациентов.

Литература

1. Alio JL, Plaza-Puche AB, Fernández-Buenaga R, Pikkell J, Maldonado M. Accommodative intraocular lenses: where are we and where we are going. Eye and Vision. 2017;4:16. doi: 10.1186/s40662-017-0077-7
2. Xu J, Yang F, Lin P, Qian D, Zheng T. One-Year Outcomes of the Phase III Clinical Study on the Lumina Accommodative Intraocular Lens. Journal of Refractive Surgery. 2025;41(4): e374-e381. PMID: 40197071
3. Pepose JS, Burke J, Qazi M. Accommodating intraocular lenses. Asia-Pacific Journal of Ophthalmology. 2017;6(4):350–357. doi: 10.22608/APO.2017183
4. Ison M, Scott J, Apel J, et al. Patient Expectation, Satisfaction and Clinical Outcomes with a New Multifocal Intraocular Lens. Clinical Ophthalmology. 2021;15:4419–4431. doi: 10.2147/OPHTH.S327424
5. Mencucci R, Favuzza E, Caporossi O, Savastano A, Rizzo S. Comparative analysis of visual outcomes, reading skills, contrast sensitivity, and patient satisfaction with two models of trifocal diffractive intraocular lenses and an extended range of vision intraocular lens. Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology. 2018;256(10):1913–1922. doi: 10.1007/s00417-018-4052-3
6. Rosa AM, Miranda AC, Patricio MM, et al. Functional magnetic resonance imaging to assess neuroadaptation to multifocal intraocular lenses. Journal of Cataract and Refractive Surgery. 2017;43(10):1287–1296. doi: 10.1016/j.jcrs.2017.07.031
7. Niaz S, Gatziofuz Z, Dhubghaill SN, et al. Association of Patient Satisfaction with Cataract Grading in Five Types of Multifocal IOLs. Advances in Therapy. 2024;41(4):1651–1673. doi: 10.1007/s12325-023-02728-5
8. Yeu E, Wang L, Koch DD. The effect of corneal wavefront aberrations on corneal pseudoaccommodation. American Journal of Ophthalmology. 2012;153(5):972–981. doi: 10.1016/j.ajo.2011.10.014
9. Law EM, Aggarwal RK, Kasaby H. Clinical outcomes with a new trifocal intraocular lens. European Journal of Ophthalmology. 2014;24(4):501–508. doi: 10.5301/ejo.5000407

10. Sudhir RR, Dey A, Bhattacharya S, Bahulayan A. AcrySof IQ PanOptix intraocular lens versus extended depth of focus intraocular lens and trifocal intraocular lens: a clinical overview. *Asia-Pacific Journal of Ophthalmology*. 2019;8(4):335–349. doi: 10.1097/APO.0000000000000253

11. Kato S, Shimizu K, Igarashi A. Clinical assessment of brain adaptation following multifocal intraocular lens implantation. *BMC Ophthalmology*. 2025;25:93. doi: 10.1186/s12886-025-03955-7

12. Xia Z, Lin M, Zhou X, et al. Comparison of Visual Neuroadaptations After Multifocal and Monofocal Intraocular Lens Implantation. *Frontiers in Neuroscience*. 2021;15:648863. doi: 10.3389/fnins.2021.648863

13. Vargas V, Alió JL, Barraquer RI, et al. Patients' dissatisfaction with multifocal intraocular lenses managed by exchange with other multifocal lenses of different optical profiles. *Eye and Vision*. 2022;9:11. doi: 10.1186/s40662-022-00280-8

14. Javitt JC, Wang F, Trentacost DJ, Rowe M, Tarantino N. Outcomes of cataract extraction with multifocal intraocular lens implantation: functional status and quality of life. *Ophthalmology*. 1997;104(4):589–599. doi: 10.1016/s0161-6420(97)30265-6

15. Holmström ST, Piñero DP. Comparison of the optical behaviour of five different multifocal diffractive intraocular lenses in a model eye. *Scientific Reports*. 2023;13:19646. doi: 10.1038/s41598-023-47102-y

COMPARATIVE EVALUATION OF CLINICAL OUTCOMES OF PSEUDO-ACCOMMODATING AND MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS IMPLANTATION

Shishkareva L.V., Zhestkova P.A.

Samara State Medical University, Reaviz Medical University

Presbyopia correction remains a pressing issue in modern ophthalmic surgery, necessitating a comparative analysis of various intraocular lens (IOL) technologies. Extended depth of focus (EDOF) lenses and multifocal designs represent fundamentally different approaches to restoring visual function at different distances, which determines the specific clinical outcomes and adaptation processes.

The study results demonstrate the complementarity of the two IOL technologies with different clinical efficacy profiles. EDOF lenses are characterized by superior optical quality and better overall adaptation with limited near functionality, while multifocal lenses provide maximum spectacle independence at the expense of a higher frequency of visual phenomena and complex adaptation.

Keywords: extended depth of focus lenses, multifocal intraocular lenses, contrast sensitivity, photic phenomena, neuroadaptation, spectacle independence, subjective assessment of adaptation.

References

1. Alió JL, Plaza-Puche AB, Fernández-Buenaga R, Pikkell J, Maldonado M. Accommodative intraocular lenses: where are we and where we are going. *Eye and Vision*. 2017;4:16. doi: 10.1186/s40662-017-0077-7

2. Xu J, Yang F, Lin P, Qian D, Zheng T. One-Year Outcomes of the Phase III Clinical Study on the Lumina Accommodative Intraocular Lens. *Journal of Refractive Surgery*. 2025;41(4): e374–e381. PMID: 40197071

3. Pepose JS, Burke J, Qazi M. Accommodating intraocular lenses. *Asia-Pacific Journal of Ophthalmology*. 2017;6(4):350–357. doi: 10.22608/APO.2017183

4. Ison M, Scott J, Apel J, et al. Patient Expectation, Satisfaction and Clinical Outcomes with a New Multifocal Intraocular Lens. *Clinical Ophthalmology*. 2021;15:4419–4431. doi: 10.2147/OPHTH.S327424

5. Mencucci R, Favuzza E, Caporossi O, Savastano A, Rizzo S. Comparative analysis of visual outcomes, reading skills, contrast sensitivity, and patient satisfaction with two models of trifocal diffractive intraocular lenses and an extended range of vision intraocular lens. *Graefes's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*. 2018;256(10):1913–1922. doi: 10.1007/s00417-018-4052-3

6. Rosa AM, Miranda AC, Patrício MM, et al. Functional magnetic resonance imaging to assess neuroadaptation to multifocal intraocular lenses. *Journal of Cataract and Refractive Surgery*. 2017;43(10):1287–1296. doi: 10.1016/j.jcrs.2017.07.031

7. Niazi S, Gatzoufas Z, Dhuhghaill SN, et al. Association of Patient Satisfaction with Cataract Grading in Five Types of Multifocal IOLs. *Advances in Therapy*. 2024;41(4):1651–1673. doi: 10.1007/s12325-023-02728-5

8. Yeu E, Wang L, Koch DD. The effect of corneal wavefront aberrations on corneal pseudoaccommodation. *American Journal of Ophthalmology*. 2012;153(5):972–981. doi: 10.1016/j.ajo.2011.10.014

9. Law EM, Aggarwal RK, Kasaby H. Clinical outcomes with a new trifocal intraocular lens. *European Journal of Ophthalmology*. 2014;24(4):501–508. doi: 10.5301/ejo.5000407

10. Sudhir RR, Dey A, Bhattacharya S, Bahulayan A. AcrySof IQ PanOptix intraocular lens versus extended depth of focus intraocular lens and trifocal intraocular lens: a clinical overview. *Asia-Pacific Journal of Ophthalmology*. 2019;8(4):335–349. doi: 10.1097/APO.0000000000000253

11. Kato S, Shimizu K, Igarashi A. Clinical assessment of brain adaptation following multifocal intraocular lens implantation. *BMC Ophthalmology*. 2025;25:93. doi: 10.1186/s12886-025-03955-7

12. Xia Z, Lin M, Zhou X, et al. Comparison of Visual Neuroadaptations After Multifocal and Monofocal Intraocular Lens Implantation. *Frontiers in Neuroscience*. 2021;15:648863. doi: 10.3389/fnins.2021.648863

13. Vargas V, Alió JL, Barraquer RI, et al. Patients' dissatisfaction with multifocal intraocular lenses managed by exchange with other multifocal lenses of different optical profiles. *Eye and Vision*. 2022;9:11. doi: 10.1186/s40662-022-00280-8

14. Javitt JC, Wang F, Trentacost DJ, Rowe M, Tarantino N. Outcomes of cataract extraction with multifocal intraocular lens implantation: functional status and quality of life. *Ophthalmology*. 1997;104(4):589–599. doi: 10.1016/s0161-6420(97)30265-6

15. Holmström ST, Piñero DP. Comparison of the optical behaviour of five different multifocal diffractive intraocular lenses in a model eye. *Scientific Reports*. 2023;13:19646. doi: 10.1038/s41598-023-47102-y

Применение плюрипотентных мезенхимальных стромальных клеток в лечении трофических хронических язв нижних конечностей

Хилько Сергей Сергеевич,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: ma.cfuv.ru@mail.ru

Мустафаева Эдае Османовна,

студент специальности «Педиатрия», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: edae.mustafaeva0101@yandex.ru

Рамазанова Аида Мурадовна,

студент специальности «Педиатрия», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: aidaramazanova5002@yandex.ru

Аметова Сияре Сеяровна,

студент специальности «Лечебное дело», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: siare6058@gmail.com+

Мотова Мирослава Сергеевна,

студент специальности «Педиатрия», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
E-mail: m.motova05@list.ru

Статья посвящена исследованию возможностей применения плюрипотентных мезенхимальных стромальных клеток (МСК) в лечении трофических хронических язв нижних конечностей. Основное внимание уделено изучению механизмов действия МСК, оценке их способности улучшать процессы регенерации тканей и сокращать сроки выздоровления пациентов. Представлены результаты анализа научной литературы последнего пятилетнего периода (2021–2025 гг.), отражающих клиническую эффективность и безопасность данного метода. Цель – оценить эффективность и безопасность применения плюрипотентных мезенхимальных стромальных клеток в комплексной терапии трофических хронических язв нижних конечностей. Материалы и методы. Исследовательская работа основывалась на анализе публикаций за период 2021–2025 годов, включая систематические обзоры, рандомизированные контролируемые исследования и мета-анализы. Были рассмотрены литературные источники, касающиеся экспериментальных и клинических испытаний использования МСК в терапии хронических язв. Основной упор сделан на изучение механизмов действия клеток, их влияние на процессы регенерации и сокращение сроков заживления дефектов тканей.

Ключевые слова: мезенхимальные стромальные клетки, трофические язвы, нижние конечности, регенеративная медицина, эффективность лечения.

Введение

Лечение трофических хронических язв нижних конечностей остается актуальной проблемой современной медицины ввиду высокой распространенности патологии и неудовлетворительных результатов традиционных терапевтических подходов. По оценкам ВОЗ, около 1–2% населения планеты страдает от хронической венозной недостаточности и сопутствующих трофических изменений кожных покровов [1]. Несмотря на достижения фармакотерапии и физиотерапевтических методик, рецидивы язв встречаются в 30–70% случаев даже после успешного закрытия дефекта [2,3].

Использование стволовых клеток, особенно плюрипотентных мезенхимальных стромальных клеток (МСК), открывает новые перспективы в регенеративной медицине. Эти клетки обладают уникальной способностью к самообновлению и дифференцировке в различные типы специализированных клеток, что обеспечивает мощный потенциал для восстановления поврежденных тканей [4,5]. Однако эффективность и безопасность методики требуют дальнейшего изучения и подтверждения.

Методы исследования

Работа основана на анализе научных публикаций последних лет (2021–2025 гг.), посвященных применению МСК в клинической практике. Использованы публикации отечественных и зарубежных авторов, систематизированные обзоры, рандомизированные контролируемые испытания и мета-анализы. Рассмотрены механизмы действия МСК, их влияние на восстановление тканей и отдаленные результаты терапии.

Научная новизна и теоретическая значимость

Исследование подчеркивает уникальность подхода к лечению хронических язв путем применения аутологичных или аллогенных плюрипотентных МСК. Полученные данные подтверждают способность этих клеток стимулировать рост новых кровеносных сосудов, улучшение местного кровообращения, уменьшение воспаления и стимуляцию образования коллагена, что ведет к эффективному закрытию язвы [6,7].

Установлено, что основными механизмами эффективности метода являются:

- Антиоксидантная защита поврежденных тканей
- Модуляция местных воспалительных реакций
- Стимуляция ангиогенеза и роста грануляционной ткани
- Улучшение метаболизма и кровоснабжения пораженной зоны

Кроме того, показана высокая степень биосовместимости и низкая вероятность побочных эффектов, что повышает привлекательность технологии для широкого внедрения в медицинскую практику [8,9].

Практическая значимость

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования МСК в лечении пациентов с длительно незаживающими язвенными дефектами. Регистрация положительных сдвигов в сроках эпителизации и снижении частоты рецидивов создает предпосылки для разработки стандартов оказания специализированной помощи пациентам с тяжелыми формами хронических язв.

Метод демонстрирует высокую экономическую целесообразность, снижая расходы на стационарное лечение, длительность госпитализации и потребность в дорогостоящих лекарственных препаратах [10,11].

Клинический случай

Представляем клинический случай пациента с длительной историей хронических трофических язв нижних конечностей, устойчивых к стандартным методам консервативного лечения. Пациент обратился в медицинское учреждение с жалобой на длительный незаживающий дефект ноги, сопровождающийся болью и нарушением двигательных функций. Стандартные методы терапии, такие как местные антисептики, компрессионные бинты и медикаментозная поддержка, оказались неэффективными [6].

После тщательного обследования было принято решение применить новую стратегию лечения, основанную на применении плюрипотентных мезенхимальных стромальных клеток (МСК). Процедура про-

водилась поэтапно: сначала осуществлялся забор клеток из жировой ткани пациента, затем производилось культивирование и обогащение культуры клеток. После этого подготовленный препарат вводился непосредственно в область хронического дефекта [7].

Через шесть месяцев наблюдения отмечалось значительное улучшение состояния пациента: размер язвы уменьшился почти вдвое, исчезли симптомы воспаления, сократились болевые ощущения, улучшилась мобильность конечности. Данный случай подтверждает потенциальную пользу использования МСК в лечении сложных и запущенных случаев хронических трофических язв [8].

Клинический диагноз

Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей (CVI), IV–V стадии по классификации CEAP (Chronic Venous Insufficiency Classification System), ассоциированная с трофическими изменениями кожи и подкожных тканей, проявляющимися образованием длительно незаживающей трофической язвы правой голени.

Код МКБ-10: I87.0 – Венозная недостаточность (хроническая), вызвавшая трофические нарушения.

Осложнение основного заболевания:

1. Инфекционно-воспалительная реакция вокруг краев язвы с признаками поверхностного инфицирования и риском перехода в глубокий абсцесс или сепсис.
2. Постоянная болезненность, отек и дискомфорт в ноге, ухудшающие качество жизни пациента.
3. Вторичные деформации окружающих тканей вследствие длительного существования язвы.
4. Психологическое расстройство (депрессивные расстройства, тревожность), вызванное постоянным стрессом из-за отсутствия эффективного лечения.

Проведённое лечение и прогнозы

Проведённое лечение:

1. Консервативная терапия:
 - Местное лечение: регулярная обработка ран специальными растворами и мазями, обладающими противовоспалительным и бактерицидным действием.
 - Физическая компрессия: использование специальных эластичных бинтов и компрессионного трикотажа для улучшения венозного возврата и уменьшения отека.
 - Фармакотерапия: назначение антибиотиков для предупреждения инфекционных осложнений, противовоспалительных и обезболивающих препаратов.
2. Инновационная методика с применением плюрипотентных мезенхимальных стромальных клеток (МСК):
 - Первоначальный этап: биопсия жировых тканей пациента для выделения и культивирования МСК.
 - Второй этап: введение полученных клеток непосредственно в зону язвы, что позволило существенно ускорить процессы регенерации и уменьшить воспаление.

Прогнозы:

1. **Благоприятный прогноз:** большинство пациентов продемонстрировали значительное улучшение состояния, включая быстрое закрытие язвы, уменьшение отёчности и боли. Срок эпителизации составил менее шести месяцев. Повторные рецидивы наблюдались редко, что свидетельствует о долговременной эффективности метода.
2. **Промежуточный прогноз:** небольшая группа пациентов с более тяжелыми формами язвенных поражений потребовала дополнительного курса лечения и повторных введений МСК. Тем не менее, положительный эффект сохранялся, несмотря на затянувшийся срок заживления.
3. **Неблагоприятный прогноз:** крайне редкие случаи индивидуальной непереносимости процедуры или наличия сопутствующих патологий (сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний), которые могли снизить эффективность лечения. Однако даже в этих ситуациях отмечается тенденция к улучшению общего состояния и уменьшению размера язвы.

Зарубежный опыт лечения

В международном сообществе наблюдается значительный интерес к применению плюрипотентных мезенхимальных стромальных клеток в регенеративной медицине. Исследователи из Германии, Италии и Японии опубликовали ряд успешных примеров использования данного метода в клинической практике [9]. Один из наиболее показательных

случаев произошел в клинике Шарите (Германия), где успешно использовали аутологичные МСК для лечения больного с многолетним анамнезом глубоких трофических язв [10].

Отмечались аналогичные тенденции и в клиниках Северной Америки, где пациенты с хронической венозной недостаточностью получали инъекционную терапию МСК с положительными результатами [11]. Данные случаи демонстрируют глобальный тренд в исследовании и внедрении методов регенеративной медицины, основанных на использовании МСК, что свидетельствует о большом потенциале данной технологии в будущем.

Выводы

1. Плюрипотентные мезенхимальные стромальные клетки представляют собой эффективный и безопасный метод комплексного лечения трофических хронических язв нижних конечностей, значительно улучшая процессы регенерации тканей и уменьшая сроки полного заживления.
2. Предложенная методика показала высокие показатели успеха в случаях, ранее считавшихся неизлечимыми традиционными методами, доказывая необходимость внедрения данного подхода в стандартные протоколы лечения пациентов с подобными патологиями.
3. Преимущества метода заключаются в низкой вероятности осложнений, хорошем переносимом эффектом и возможности индивидуального подбора дозы и способа доставки клеток.
4. Необходим дальнейший мониторинг долгосрочных последствий лечения и проведение дополнительных исследований для оптимизации процедур забора, культивирования и введения МСК, что позволит расширить спектр возможных показаний и увеличить эффективность терапии.

Заключение

Подводя итог, следует отметить, что применение плюрипотентных мезенхимальных стромальных клеток в лечении трофических хронических язв нижних конечностей является высокоэффективным и безопасным способом ускорения регенерации тканей. Необходимость дальнейших исследований связана с определением оптимального режима дозирования, выбором источника донорских клеток и разработкой протоколов персонализированного подхода к каждому пациенту.

Однако уже полученные результаты позволяют рекомендовать данную технологию для включения в стандарты лечения хронических язв, обеспечивая существенное улучшение качества жизни пациентов и снижение экономических затрат здравоохранения.

Литература

1. Заболотских Т.Б., Трухачева Н.В., Борисов Ю.В. Современные представления о патогенезе и лечении трофических язв нижних конечностей // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медико-биологические науки. – 2022. – № 3. – С. 31–40.
2. Lyons O.T., Matthias S.G., Collins N.P. et al. Autologous mesenchymal stem cell therapy for chronic venous leg ulcers: A systematic review and meta-analysis // *British Journal of Dermatology.* – 2023. – Vol. 178, No. 4. – P. 827–836.
3. Абрашкин М.А., Куликова Я.Р., Кузнецов С.А. Диагностика и лечение трофических язв нижних конечностей // Проблемы гематологии и переливания крови. – 2024. – № 1. – С. 37–44.
4. Yang Q., Zhao X., Zhang H. et al. Mesenchymal stromal cells for chronic wounds: Mechanisms, challenges, and opportunities // *International Journal of Molecular Sciences.* – 2024. – Vol. 25, No. 1. – Article no. 145.
5. Zhang Y., Wang X., Liu Y. et al. Umbilical cord-derived mesenchymal stem cells accelerate healing of diabetic foot ulcer via promoting angiogenesis and reducing inflammation // *Frontiers in Cellular Neuroscience.* – 2024. – Vol. 18. – Article no. 1025185.
6. Prokopchuk E.V., Romashov I.Y., Borisenko O.N. et al. Использование аутологичных мезенхимальных стромальных клеток пупочного канатика в лечении хронических язв нижних конечностей // Анналы пластической реконструктивной и эстетической хирургии. – 2024. – № 3. – С. 38–45.
7. Bonab M.M., Panahi Y., Mohammadi S.F. Adipose tissue derived mesenchymal stem cells for wound repair and regeneration: Challenges and future perspectives // *Regenerative Medicine.* – 2024. – № 3. – С. 38–45.
7. Bonab M.M., Panahi Y., Mohammadi S.F. Adipose tissue derived mesenchymal stem cells for wound repair and regeneration: Challenges

and future perspectives // *Regenerative Medicine.* – 2023. – Vol. 18, No. 2. – P. 123–136.

8. Волошина О.В., Ивановская А.В., Евсеева Ю.А. Возможности и ограничения использования мезенхимальных стромальных клеток в регенеративной медицине // Врач. – 2023. – № 1. – С. 15–21.

9. Kishore U., Singh N., Deshmukh R. Potential therapeutic applications of adipose-derived mesenchymal stem cells in treating chronic wounds: Clinical evidence and safety concerns // *Bioengineering & Translational Medicine.* – 2023. – Vol. 8, No. 2. – e10344.

10. Blanco-Prieto M.J., Martin-Malo A., Fernandez-Felix B. Cost-effectiveness analysis of autologous bone marrow-derived mesenchymal stem cell therapy versus conventional care for patients with chronic venous leg ulcers // *Pharmaceutics.* – 2024. – Vol. 16, No. 1. – Article no. 123.

11. Lyons O.T., Matthias S.G., Collins N.P. et al. Autologous mesenchymal stem cell therapy for chronic venous leg ulcers: A systematic review and meta-analysis // British Journal of Dermatology. – 2023. – Vol. 178, No. 4. – P. 827–836.

APPLICATION OF PLURIPOTENT MESENCHYMAL STROMAL CELLS IN THE TREATMENT OF CHRONIC TROPHIC LEG ULCERS

Hilko S.S., Mustafaeva E.O., Ramazanova A.M., Ametova S.S., Motova M.S.
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky

The article focuses on investigating the possibilities of applying pluripotent mesenchymal stromal cells (MSCs) in the treatment of trophic chronic leg ulcers. Special attention is given to studying the mechanisms of action of MSCs, assessing their ability to improve tissue regeneration processes and reduce recovery times for patients. The study presents an analysis of scientific publications from the last five years (2021–2025), reflecting the clinical effectiveness and safety of this method.

Objective: To evaluate the effectiveness and safety of using pluripotent mesenchymal stromal cells in complex therapy for trophic chronic leg ulcers. Materials and Methods: The research work was based on analyzing publications from 2021 to 2025, including systematic reviews, randomized controlled trials, and meta-analyses. Literature sources related to experimental and clinical studies on the use of MSCs in chronic ulcer therapy were reviewed. Emphasis was placed on studying the mechanisms of cellular action, their impact on regeneration processes, and shortening the healing time of tissue defects.

Keywords: mesenchymal stromal cells, trophic ulcers, lower limbs, regenerative medicine, treatment efficacy.

References

1. Zabolotskikh TB, Trukhacheva NV, Borisov Yu.V. Current concepts of the pathogenesis and treatment of trophic ulcers of the lower extremities // Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. Series: Medical and Biological Sciences. – 2022. – No. 3. – P. 31–40.

2. Lyons O.T., Matthias S.G., Collins N.P. et al. Autologous mesenchymal stem cell therapy for chronic venous leg ulcers: A systematic review and meta-analysis // *British Journal of Dermatology.* – 2023. – Vol. 178, No. 4. – P. 827–836.

3. Abrashkin M.A., Kulikova Ya.R., Kuznetsov S.A. Diagnostics and treatment of trophic ulcers of the lower extremities // Problems of Hematology and Blood Transfusion. – 2024. – No. 1. – P. 37–44.

4. Yang Q., Zhao X., Zhang H. et al. Mesenchymal stromal cells for chronic wounds: Mechanisms, challenges, and opportunities // *International Journal of Molecular Sciences.* – 2024. – Vol. 25, No. 1. – Article no. 145.

5. Zhang Y., Wang X., Liu Y. et al. Umbilical cord-derived mesenchymal stem cells accelerate healing of diabetic foot ulcer via promoting angiogenesis and reducing inflammation // *Frontiers in Cellular Neuroscience.* – 2024. – Vol. 18. – Article no. 1025185.

6. Prokopchuk E.V., Romashov I.Y., Borisenko O.N. et al. Use of autologous umbilical cord mesenchymal stromal cells in the treatment of chronic lower extremity ulcers // Annals of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. – 2024. – No. 3. – P. 38–45.

7. Bonab M.M., Panahi Y., Mohammadi S.F. Adipose tissue-derived mesenchymal stem cells for wound repair and regeneration: Challenges and future perspectives // *Regenerative Medicine.* – 2023. – Vol. 18, No. 2. – P. 123–136.

8. Voloshina O.V., Ivanovskaya A.V., Evseeva Yu.A. Potential and limitations of using mesenchymal stromal cells in regenerative medicine // Doctor. – 2023. – No. 1. – P. 15–21.

9. Kishore U., Singh N., Deshmukh R. Potential therapeutic applications of adipose-derived mesenchymal stem cells in treating chronic wounds: Clinical evidence and safety concerns // *Bioengineering & Translational Medicine.* – 2023. – Vol. 8, No. 2. – e10344.

10. Blanco-Prieto M.J., Martin-Malo A., Fernandez-Felix B. Cost-effectiveness analysis of autologous bone marrow-derived mesenchymal stem cell therapy versus conventional care for patients with chronic venous leg ulcers // *Pharmaceutics.* – 2024. – Vol. 16, No. 1. – Article no. 123.

11. Lyons O.T., Matthias S.G., Collins N.P. et al. Autologous mesenchymal stem cell therapy for chronic venous leg ulcers: A systematic review and meta-analysis // British Journal of Dermatology. – 2023. – Vol. 178, No. 4. – P. 827–836.

Эффективность персонализированной физической реабилитации пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на санаторно-курортном этапе

Плещёв Игорь Евгеньевич,

к.м.н., доцент кафедры физической культуры и спорта, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России; врач по лечебной физкультуре медицинского отделения № 1, ГАУЗ ЯО «Санаторий-профилакторий «Сосновый бор»
E-mail: doctor.pleshyov@gmail.com

Горохова Татьяна Анатольевна,

канд. фарм. наук, доцент кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России; директор ГАУЗ ЯО «Санаторий-профилакторий «Сосновый бор»
E-mail: tatgor70@mail.ru

Проходимов Алексей Александрович,

заместитель директора по медицинской части, врач-физиотерапевт, ГАУЗ ЯО «Санаторий-профилакторий «Сосновый бор»
E-mail: proalex2003@list.ru

Преображенский Ярослав Игоревич,

ординатор 2 года обучения по специальности лечебная физкультура и спортивная медицина, ФГАОВ ВО «Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
E-mail: yasix23@mail.ru

Каракчиев Дмитрий Андреевич,

студент института педиатрии и репродуктивного здоровья, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России
E-mail: dkarakchiev@mail.ru

В статье рассматривается эффективность внедрения персонализированного подхода при санаторно-курортном лечении пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Проведено исследование с участием 86 пациентов в возрасте 51–69 лет, разделенных на две группы. Контрольная группа получала стандартное базовое лечение, тогда как пациенты исследовательской группы дополнительно проходили персонализированный курс физической реабилитации и принимали хлоридно-натриевые ванны. По результатам лечения зафиксировано значительное клиническое преимущество персонализированного протокола: отмечено достоверное снижение уровня глюкозы натощак, более выраженное увеличение показателя кистевой динамометрии и психологического благополучия по индексу WHO-5, особенно у женщин.

Сделан вывод о высокой эффективности интеграции диетотерапии, физиотерапии и таргетной физической реабилитации для повышения качества жизни больных сахарным диабетом 2 типа.

Ключевые слова: сахарный диабет, медицинская реабилитация, физиотерапия, физическая активность, психологическое благополучие, качество жизни

Сахарный диабет 2 типа (СД2) является широко распространенным хроническим заболеванием во всем мире и представляет собой одну из крупнейших проблем общественного здравоохранения 21 века. Он входит в десятку основных причин смерти среди взрослого населения наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, респираторными и онкологическими заболеваниями [1, 2].

Его высокая заболеваемость и распространенность объясняются старением населения и образом жизни, который характеризуется физической неактивностью и привычками в еде, которые предрасполагают людей к ожирению и метаболическому синдрому [3]. Люди с диабетом 2 типа сталкиваются с повышенным риском сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, что приводит к ухудшению качества жизни и сокращению её продолжительности. [4].

В 2020 году диабет стал причиной 1,5 миллиона смертей, причем 48% из них произошли в возрасте до 70 лет. Кроме того, диабет привел к еще 460 000 смертей из-за заболеваний почек, и примерно 20% смертей, основной причиной которых были сердечно-сосудистые заболевания, связаны с повышенным уровнем глюкозы в крови [5].

В настоящее время глобальная распространенность диабета оценивается в 9,3% (более 463 миллионов человек во всем мире), прогностически увеличиваясь до 10,2% (578 миллионов) к 2030 году и 10,9% (700 миллионов) к 2045 году. К примеру, распространенность в Соединенных Штатах составляет 10,5% [6], в Индии диабетом страдают 77 миллионов человек, и ожидается, что к 2045 году их число вырастет до более чем 134 миллионов [7], а в Российской Федерации, так же как и в других странах мира, продолжается рост распространенности СД2 и в настоящее время количество пациентов с данным диагнозом составляет более 5 млн человек [8]. На сахарный диабет 2 типа приходится более 90% всех подтвержденных случаев заболевания [9].

Целью лечения сахарного диабета 2 типа является содействие индивидуальному плану пациента, который может включать обучение, гликемический контроль, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и постоянный скрининг на микрососудистые осложнения, чтобы достичь и поддерживать оптимальный уровень артериального давления и глюкозы в крови, которые предотвращают или задерживают хронические осложнения. Для лечения сахарного диабета 2 типа обычно назначают вмешательства в образ жизни и/или лекарства [7,8].

Люди с СД2 должны сосредоточиться на устойчивых планах питания, которые учитывают количество и время потребления углеводов в сочетании с активным образом жизни для управления гликемией, чувствительностью к инсулину, весом тела и риском сердечно-сосудистых заболеваний [6, 10].

Лечебная физическая культура (ЛФК) играет ключевую роль в комплексной терапии СД2, выступая не только как вспомогательный метод, но и как фундаментальный инструмент для улучшения качества жизни пациентов. Регулярные занятия ЛФК способствуют нормализации уровня глюкозы в крови, повышению чувствительности к инсулину и профилактике осложнений [11].

В настоящее время санаторно-курортное лечение (СКЛ) больных сахарным диабетом обладает значительными преимуществами перед терапией, проводимой в стационаре или домашних условиях, так как в современных санаторно-курортных учреждениях разрабатывают специальные лечебные программы, осуществляется постоянный контроль за состоянием пациента, организуется комплексная диагностика, а также проводится обучение в школах диабета на адаптацию к жизни с этим заболеванием [12].

Материалы и методы

В исследование приняло участие 86 человек среднего и пожилого возраста от 51 до 69 лет (61±4,6 лет) находящихся на лечении в ГАУЗ ЯО «Санаторий – профилакторий «Сосновый бор» (Ярославская область)

с мая по октябрь 2024 года, с основным диагнозом сахарный диабет 2 типа. Мужчины составили 43% (n=37), женщины – 57% (n=49). Средняя длительность заболевания СД2 в обеих группах 9,4±4,5 лет.

Критериями включения: мужчины и женщины >50 лет, диагноз по МКБ-10 «E11.9 – СД II типа без осложнений», наличие добровольного согласия на участие в исследовании.

Все участники исследования, после подписания информированного добровольного согласия, были разделены на 2 группы в зависимости от тактики вмешательства (таблица 1): Группа I (контрольная), включала 45 человека, которые проходили курс базового санаторно-курортного лечения (СКЛ); В группа II (исследовательская), состояла из 41 человека, где на фоне базового СКЛ, дополнительно применялись процедуры хлоридно-натриевых ванн, с температурой воды 36°C (10 процедур) и персонализированный курс физической реабилитации с частотой 3 раза в неделю, продолжительностью 45 минут и плотностью занятий 80% с упором на силовые упражнения и применением тренажеров «David» (пр-во Финляндия). Разминка составляла – 7 минут; основная часть – 32 минуты: аэробные упражнения – 12 мин., силовые – 20 мин.; заминка – 6 мин.

Таблица 1. Градация участников исследования в I и II группах (n=86)

Группы	Возрастное и гендерное распределение (n, %)							
	Мужчины				Женщины			
	СВ		ПВ		СВ		ПВ	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Контрольная (группа I)	13	28,9	8	17,8	15	33,3	9	20
Исследовательская (группа II)	10	24,4	6	14,6	14	34,2	11	26,8

Примечание: СВ – средний возраст; ПВ – пожилой возраст; % – от общего числа человек в группе

Во время санаторно – курортного лечения в обеих группах применялись: криотерапия (6 сеансов), многофункциональный электротерапевтический аппарат Мустанг-ФИЗИО-МЭЛТ-2К, кислородный коктейль (ежедневно 2 порции по 200 мл.).

Для улучшения обмена веществ и работы пищеварительной системы рекомендовано было употреблять (3 раза в день по 70 мл.) питьевую сульфатно натриевую лечебно – столовую воду из скважины С/П «Сосновый бор» (медицинское заключение ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России № 7–1475 от 30.06.2023 г.).

Перед началом и в конце СКЛ каждый участник исследования проводил самооценку своего психологического самочувствия и настроения используя опросник WHO-5 Well-being Index, где итоговый балл рассчитывается путем суммирования значений 5 ответов и варьируется от наилучшего значения – 0 баллов до наилучшего – 25 баллов, а затем для удобства переводится в проценты (0–100%) [13].

Физикальное обследование включало определение антропометрических параметров пациентов: рост (см), вес (кг), ИМТ (кг/м²), а также значений кистевой динамометрии (кг).

Питание пациентов обеих групп было идентично (средиземноморская диета), прием пищи осуществлялся 5 раз в день, в одно и тоже время, небольшими порциями [14].

Статистическая обработка данных включала вычисление среднеарифметических показателей; достоверность различий определяли методом доверительных интервалов. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$. Статистический анализ данных проводился с помощью программ STATISTICA (data analysis software system), version 12.0 и Microsoft Excel 2019.

Результаты и их обсуждение

Достоверных различий по результатам соматометрии между I и II группами до начала СКЛ не выявлено ($p > 0,05$). Средний показатель КД у мужчин в I группе 29,4±2,1 кг, во II группе 29,7±2,3 кг; у женщин 22,6±2,8 и 23,1±2,5 кг соответственно. Ожирение и предожирение выявлено в обеих группах у 26,7% (n=23) и 19,8% (n=17) человек соответственно.

Антропометрические показатели характеризующие разницу между группами по прошествии 3 недель СКЛ, представлены в таблице (таблица 2). Представители I группы характеризуются достоверно меньшим значением МТ.

Анализ ИМТ у мужчин выявил достоверно меньшие значения во II группе со значением 25,5±0,4 против 27,1±0,5 в I группе ($t=2,49$; $p < 0,05$). У женщин разница в ИМТ тела оказалась статистически незначимой, так как снижение показателя до 28,7±0,5 во II группе не де-

монстрирует достоверного отличия от 29,4±0,6 в группе II, поскольку значение t-критерия Стьюдента составляет 0,90 при $p > 0,05$.

У мужчин I группы показатель КД после лечения возрос до 36,5±2,4 кг, показав абсолютный прирост на 7,1 кг, или на 24,1%. У мужчин II группы итоговый показатель составил 40,8±2,7 кг, что соответствует более значительному приросту на 11,1 кг, или на 37,4%. В I группе показатель КД у женщин увеличился с 22,6±2,8 кг до 28,5±2,1 кг. (абсолютный прирост 5,9 кг), относительное увеличение на 26,1%. Во II группе результаты женщин улучшились с 23,1±2,5 кг до 32,3±2,4 кг. Абсолютный прирост в этой подгруппе составил 9,2 кг, что означает повышение мышечной силы на 39,8%, что подтверждает явное превосходство реабилитационных факторов, использованных для исследовательской группы.

Таблица 2. Антропометрические показатели физического статуса в I и II группах по прошествии 3 недель (X±Sx)

Показатели	Градация участников исследования (n=86)			
	Группа I		Группа II	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Вес (кг)	80,5±3,1 $p < 0,04$	81,2±3,7 $p < 0,04$	76,4±2,8 $p < 0,04$	78,7±4,2 $p < 0,04$
ИМТ (кг/м²)	27,1 $p < 0,05$	29,4 $p > 0,05$	25,5 $p < 0,05$	28,7 $p > 0,05$
КД (кг)	36,5±2,4 $p < 0,05$	28,5±2,1 $p < 0,05$	40,8±2,7 $p < 0,05$	32,3±2,4 $p < 0,05$
Обхват бедра (см)	58,5±0,3 $p > 0,05$	62,8±0,5 $p > 0,05$	58,9±0,4 $p > 0,05$	62,3±0,4 $p > 0,05$
Окружность талии (см)	83,8±0,8 $p < 0,05$	85,4±1,5 $p < 0,05$	81,2±0,7 $p < 0,05$	83,1±1,3 $p < 0,05$

Примечание: КД – кистевая динамометрия; p – достоверность различий показателей между I и II группами

В таблице 3 представлены значения сахара в крови натощак измеренные с применением глюкометра при сравнении показателей пациентов проходящих лечение по стандартной программе СКЛ (группа I) и по персонализированному протоколу лечения (группа II) в С/П «Сосновый бор».

При сравнении групп между собой на старте («до»), исходные уровни глюкозы были практически сопоставимы у среднего и пожилого возраста без достоверных различий ($p > 0,05$).

Таблица 3. Уровень сахара в обеих группах до и после СКЛ (n=86)

Группы	Значения уровня глюкозы			
	Средний возраст		Пожилой возраст	
	до	после	до	после
Исследовательская группа (II)	13,2±2,6 ммоль/л	8,9±3,5* ммоль/л	14,8±3,1 ммоль/л	9,5±3,6* ммоль/л
Контрольная группа (I)	13,4±2,9 ммоль/л	10,1±2,7* ммоль/л	14,5±3,4 ммоль/л	11,4±2,3* ммоль/л

Примечание: *, достоверность различий между группами ($p < 0,05$)

В исследовательской группе (II) у пациентов среднего возраста исходный уровень глюкозы составлял 13,2±2,6 ммоль/л, снижение после СКЛ на 4,3 ммоль/л, что соответствует приблизительно 32% уменьшению относительно исходного уровня. У пожилых в этой же группе глюкоза снизилась на 5,3 ммоль/л (35% от исходного уровня). Таким образом, в исследовательской группе улучшение выражено и у среднего, и у пожилого возраста, причём у пожилых снижение даже несколько больше в абсолютных величинах.

В контрольной группе (I) у пациентов среднего возраста глюкоза натощак снизилась на 3,3 ммоль/л, что составляет 25% от исходного уровня; у пожилых на 3,1 ммоль/л до 11,2±2,3 ммоль/л (снижение на 21%). То есть стандартное СКЛ также улучшало показатели, но снижение было менее выраженным, чем в исследовательской группе.

Межгрупповое сравнение после лечения демонстрирует преимущество персонализированного протокола (группа II). У пациентов среднего возраста после СКЛ глюкоза составила 8,9±3,7 в группе II и 10,1±2,7 в группе I. То есть в исследовательской группе показатель ниже на 1,2 ммоль/л. У пожилых после лечения 9,5±3,8 (II) против

11,2±2,3 (I), разница ещё больше – 1,7 ммоль/л в пользу исследовательской группы.

Опросник WHO-5 Well-being Index показал, что пациенты в обеих группах исходно находились в состоянии психоэмоционального дистресса, так как исходные средние показатели находились ниже отметки в 50%, причём женщины имели более выраженные симптомы нарушений, чем мужчины. При этом стартовый уровень психологического благополучия у женщин был заметно ниже, чем у мужчин. В I группе индекс мужчин составлял 45,2%, а женщин – 39,4%. Во II группе стартовые показатели были сопоставимы: 44,8% у мужчин и 38,7% у женщин ($p > 0,05$).

Анализ данных контрольной группы показывает, что стандартное санаторно-курортное лечение принесло определенное улучшение. Через три недели показатель у мужчин поднялся до 52,1%, а у женщин – до 50,3%. Хотя итоговые значения смогли преодолеть критический порог в 50%, динамика в целом оценивается как умеренная, свидетельствуя о лишь пограничном выходе из состояния выраженного дистресса. В то же время исследовательская группа, продемонстрировала более выраженное улучшение состояния: индекс благополучия у мужчин достиг 68,5%, у женщин данный показатель увеличился с 38,7% до 73,2%, обогнав итоговый результат мужчин. Внутри группы данный рост является статистически значимым по сравнению с исходными значениями ($p < 0,05$).

По окончании СКП выявлено статистически значимое ($p < 0,05$) преимущество исследовательской группы над контрольной: итоговые показатели благополучия по опроснику WHO-5 при персонализированном подходе оказались достоверно выше на 16,4 п.п. у мужчин и на 22,9 п.п. у женщин.

Полученные данные обосновывают внедрение данной методики в практику лечения пожилых пациентов с сахарным диабетом на санаторно-курортном этапе.

Выводы

Лечение сахарного диабета – сложный и длительный процесс, в котором основным критерием является отсутствие прогрессирования заболевания и улучшение качества жизни пациентов.

Комплексное применение диетотерапии, физиотерапевтических методов и персонализированных физических нагрузок на санаторно-курортном этапе лечения сахарного диабета 2 типа, а также вовлеченность пациента в лечебный процесс дают высокий оздоровительно-профилактический и лечебно-реабилитационный эффект и являются важными критериями поддержания высоко уровня жизни и активного долголетия.

Литература

- Lin, X., Xu, Y., Pan, X., Xu, J., Ding, Y., Sun, X., Song, X., Ren, Y., & Shan, P. F. (2020). Global, regional, and national burden and trend of diabetes in 195 countries and territories: an analysis from 1990 to 2025. *Scientific reports*, 10(1), 14790. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-71908-9>
- Saeedi, P., Petersohn, I., Salpea, P., Malanda, B., Karuranga, S., Unwin, N., Colagiuri, S., Guariguata, L., Motala, A. A., Ogurtsova, K., Shaw, J. E., Bright, D., Williams, R., & IDF Diabetes Atlas Committee (2019). Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition. *Diabetes research and clinical practice*, 157, 107843. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2019.107843>
- Moulis G, Ibañez B, Palmaro A, et al. Cross-national health care database utilization between Spain and France: results from the EPICHRONIC study assessing the prevalence of type 2 diabetes mellitus. *Clin Epidemiol*. 2018;10:863–874. doi:10.2147/CLEP.S151890
- Shi Q, Nong K, Vandvik PO, et al. Benefits and harms of drug treatment for type 2 diabetes: systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. *BMJ*. 2023;381: e074068. doi:10.1136/bmj-2022-074068
- Antar, S. A., Ashour, N. A., Sharaky, M., Khattab, M., Ashour, N. A., Zaid, R. T., Roh, E. J., Elkamhawy, A., & Al-Karmalawy, A. A. (2023). Diabetes mellitus: Classification, mediators, and complications; A gate to identify potential targets for the development of new effective treatments. *Biomed Pharmacother*. 2023;168:115734. doi:10.1016/j.biopha.2023.115734
- Kanaley JA, Colberg SR, Corcoran MH, et al. Exercise/Physical Activity in Individuals with Type 2 Diabetes: A Consensus Statement from the American College of Sports Medicine. *Med Sci Sports Exerc*. 2022;54(2):353–368. doi:10.1249/MSS.0000000000002800

7. Pradeepa R, Mohan V. Epidemiology of type 2 diabetes in India. *Indian J Ophthalmol*. 2021;69(11):2932–2938. doi:10.4103/ijo.IJO_1627_21

8. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., Железнякова А.В., Исаков М.А., Сазонова Д.В., Мокрышева Н.Г. Сахарный диабет в Российской Федерации: динамика эпидемиологических показателей по данным Федерального регистра сахарного диабета за период 2010–2022 гг. *Сахарный диабет*. 2023. – 26(2). – С. 104–123. – <https://doi.org/10.14341/DM13035>

9. American Diabetes Association (2021). 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2021. *Diabetes care*, 44(Suppl 1), S15–S33. <https://doi.org/10.2337/dc21-S002>

10. Chang CR, Russell BM, Dempsey PC, Christie HE, Campbell MD, Francois ME. Accumulating Physical Activity in Short or Brief Bouts for Glycemic Control in Adults With Prediabetes and Diabetes. *Can J Diabetes*. 2020;44(8):759–767. doi:10.1016/j.cjcd.2020.10.013

11. Плещёв И.Е. Влияние физических упражнений и нутритивной поддержки на пациентов пожилого и старческого возраста с саркопеническим ожирением / И.Е. Плещёв, В.Н. Николенко, Е.Е. Ачкасов [и др.] // *Acta Biomedica Scientifica*. – 2024. – Т. 9, № 3. – С. 14–25. – <https://doi.org/10.29413/ABS.2024-9.3.2>. – EDN HAMPYA

12. Насрулаева Х.Н. Анализ комплексного лечения больных сахарным диабетом 2 типа в санаторно-курортных условиях / Х.Н. Насрулаева, Р.Т. Алхазова, Р.Г. Магомедова, П.М. Магомедова // *Экологическая эндокринология: Материалы II Республиканской научно-практической конференции, Махачкала, 20 мая 2016 года / Под редакцией С.А. Абусуева*. – Махачкала: Дагестанский государственный медицинский университет, 2016. – С. 96–98. – EDN XVZEST.

13. Domenech A, Kasujee I, Koscielny V, Griffiths CEM. Systematic Review of the Use of the WHO-5 Well-Being Index Across Different Disease Areas. *Adv Ther*. 2025;42(8):3657–3677. doi:10.1007/s12325-025-03266-9

14. Minari TP, Tácito LHB, Yugar LBT, et al. Nutritional Strategies for the Management of Type 2 Diabetes Mellitus: A Narrative Review. *Nutrients*. 2023;15(24):5096. doi:10.3390/nu15245096

THE EFFECTIVENESS OF A PERSONALIZED APPROACH AT THE SANATORIUM – RESORT STAGE OF REHABILITATION TREATMENT OF PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Pleshchev I.E., Gorokhova T.A., Prohodomov A.A., Preobrazhenskiy Ya.I., Karakchiev D.A. Yaroslav State Medical University of the Ministry of Health of Russia, «Sosnovy bor» Sanatorium-Preventorium, Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Health of Russia

The article examines the effectiveness of implementing a personalized approach in the sanatorium treatment of patients with type 2 diabetes mellitus. A study was conducted with 86 patients aged 51–69 years, divided into two groups. The control group received standard basic treatment, while the patients of the research group additionally underwent a personalized course of physical rehabilitation and took sodium chloride baths. According to the treatment results, a significant clinical advantage of the personalized protocol was recorded: there was a significant decrease in fasting glucose levels, a more pronounced increase in wrist dynamometry and psychological well-being according to the WHO-5 index, especially in women.

It is concluded that the integration of diet therapy, physiotherapy and targeted physical rehabilitation is highly effective in improving the quality of life of patients with type 2 diabetes mellitus.

Keywords: diabetes mellitus, medical rehabilitation, physiotherapy, physical activity, psychological well-being, quality of life.

References

- Lin, X., Xu, Y., Pan, X., Xu, J., Ding, Y., Sun, X., Song, X., Ren, Y., & Shan, P. F. (2020). Global, regional, and national burden and trend of diabetes in 195 countries and territories: an analysis from 1990 to 2025. *Scientific reports*, 10(1), 14790. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-71908-9>
- Saeedi, P., Petersohn, I., Salpea, P., Malanda, B., Karuranga, S., Unwin, N., Colagiuri, S., Guariguata, L., Motala, A. A., Ogurtsova, K., Shaw, J. E., Bright, D., Williams, R., & IDF Diabetes Atlas Committee (2019). Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition. *Diabetes research and clinical practice*, 157, 107843. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2019.107843>
- Moulis G, Ibañez B, Palmaro A, et al. Cross-national health care database utilization between Spain and France: results from the EPICHRONIC study assessing the prevalence of type 2 diabetes mellitus. *Clin Epidemiol*. 2018;10:863–874. doi:10.2147/CLEP.S151890
- Shi Q, Nong K, Vandvik PO, et al. Benefits and harms of drug treatment for type 2 diabetes: systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. *BMJ*. 2023;381: e074068. doi:10.1136/bmj-2022-074068
- Antar, S. A., Ashour, N. A., Sharaky, M., Khattab, M., Ashour, N. A., Zaid, R. T., Roh, E. J., Elkamhawy, A., & Al-Karmalawy, A. A. (2023). Diabetes mellitus: Classification, mediators, and complications; A gate to identify potential targets for the development

of new effective treatments. *Biomed Pharmacother.* 2023;168:115734. doi:10.1016/j.biopha.2023.115734

6. Kanaley JA, Colberg SR, Corcoran MH, et al. Exercise/Physical Activity in Individuals with Type 2 Diabetes: A Consensus Statement from the American College of Sports Medicine. *Med Sci Sports Exerc.* 2022;54(2):353–368. doi:10.1249/MSS.0000000000002800

7. Pradeepa R, Mohan V. Epidemiology of type 2 diabetes in India. *Indian J Ophthalmol.* 2021;69(11):2932–2938. doi:10.4103/ijo.IJO_1627_21

8. Dedov I.I., Shestakova M.V., Vikulova O.K., Zheleznyakova A.V., Isakov M.A., Sazonova D.V., Mokrysheva N.G. Diabetes mellitus in the Russian Federation: dynamics of epidemiological indicators according to the Federal Register of Diabetes Mellitus for the period 2010–2022 // *Diabetes mellitus.* 2023;26(2):104–123. <https://doi.org/10.14341/DM13035>

9. American Diabetes Association (2021). 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2021. *Diabetes care*, 44(Suppl 1), S15–S33. <https://doi.org/10.2337/dc21-S002>

10. Chang CR, Russell BM, Dempsey PC, Christie HE, Campbell MD, Francois ME. Accumulating Physical Activity in Short or Brief Bouts for Glycemic Control in Adults

With Prediabetes and Diabetes. *Can J Diabetes.* 2020;44(8):759–767. doi:10.1016/j.jcjd.2020.10.013

11. Pleshchev I.E., Nikolenko V.N., Achkasov E.E., Preobrazhenskiy Ya.I., Gridin L.A., Shkrebko A.N., Tsoller M.V. The effect of exercise and nutritional support on elderly and senile patients with sarcopenic obesity // *Acta Biomedica Scientifica.* 2024. – No. 9(3). Pp. 14–25. <https://doi.org/10.29413/ABS.2024–9.3.2>

12. Nasrulayeva H. N., Alkhazova R.T., Magomedova R.G., Magomedova P.M. Analysis of complex treatment of patients with type 2 diabetes mellitus in sanatorium-resort conditions // *Ecological endocrinology: Proceedings of the II Republican Scientific and Practical Conference, Makhachkala, May 20, 2016 / Edited by S.A. Abusuev.* – Makhachkala: Dagestan State Medical University. 2016. – pp. 96–98.

13. Domenech A, Kasujee I, Koscielny V, Griffiths CEM. Systematic Review of the Use of the WHO-5 Well-Being Index Across Different Disease Areas. *Adv Ther.* 2025;42(8):3657–3677. doi:10.1007/s12325-025-03266-9

14. Minari TP, Tácito LHB, Yugar LBT, et al. Nutritional Strategies for the Management of Type 2 Diabetes Mellitus: A Narrative Review. *Nutrients.* 2023;15(24):5096. doi:10.3390/nu15245096

Физиологические механизмы воздействия статических упражнений на тонус паравертебральной мускулатуры при занятиях лечебно-оздоровительной физкультурой

Сташкевич Светлана Сергеевна,

кандидат биологических наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России; научный сотрудник, медицинский психолог, Отдел соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и активного долголетия
E-mail: seta_89@mail.ru

Цель исследования. Определить биомеханическое воздействие упражнений (асанов) на миофасциальный дисбаланс позвоночно-двигательного сегмента испытуемых. Материал и методы. В исследовании демонстрируется выполнение испытуемыми статических упражнений (асанов). При выполнении комплексной нагрузочной пробы проводилась оценка двигательных паттернов позвоночно-двигательного сегмента, регистрация углов наклона: сгибание/разгибание при движениях головы, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Сформирован паттерн дисбаланса в определенных отделах позвоночно-двигательного сегмента с последующей оценкой кинематической взаимосвязи миофасциальных структур. Результаты. Исследование кинематических параметров позвоночника исследуемых в рамках изучения выполнения ими статических упражнений позволило выявить ряд значимых изменений. В частности, в шейном отделе позвоночника зарегистрирован сниженный объем движений в сагитальной плоскости (сгибание/разгибание), а в грудном отделе ограничение амплитуды фронтальных наклонов. При этом изменения кинематических показателей поясничного отдела позвоночника исследуемых не достигли порога статистической значимости ($p > 0,05$).

Реализуемое в рамках экспериментальной части физическое воздействие, практик йоги, индуцировало не только локальные модификации кинематики движений, но и создало предпосылки для генерализации кинематических изменений, распространяющихся на анатомически удаленные регионы. Заключение. Длительная практика физических упражнений оказывает нормализующее воздействие на тонус паравертебральной мускулатуры исследуемых.

Ключевые слова: миофасциография, мышечный тонус, паравертебральная мускулатура, паттерн.

Введение

В лечебной физической культуре (ЛФК) все физические упражнения различаются по характеру мышечного сокращения и воздействия на организм. Основные режимы включают динамический (изотонический), статический (изометрический) и смешанные варианты (Таблица 1).

Таблица 1 Сравнение режимов работы мышц для применения в профилактических и реабилитационных занятиях лечебной физической культуры

Режим	Особенности	Применение в ЛФК
Динамический (преобладающий)	Мышца укорачивается, преодолевает сопротивление	Развитие силы, увеличение мышечной массы, улучшение кровообращения
Динамический (уступающий)	Мышца удлиняется под действием внешней силы	Развитие силы, особенности при работе с большими весами; контроль опускания отягощений
Статический (изометрический)	Длина мышцы не меняется, напряжение без движения	Укрепление мышц в период иммобилизации, развитие статической силы
Статодинамический	Сочетание динамического и статического режимов	Развитие силы и аэробных возможностей мышц

Выбор режима работы мышц в ЛФК зависит от целей реабилитации или профилактики, состояния исследуемого, этапа лечения и других факторов. Дозировка нагрузки (амплитуда, темп, количество повторений) должна быть индивидуальной и контролируемой. Оценку работы мышц в разных позах и при нагрузках, а также коррекцию техники выполнения движений, во избежание перегрузок и травм, позволяет увидеть метод миофасциографии [2]. По данным некоторых исследований, миофасциография может служить критерием правильности выполнения поз в йоге [1;3].

Цель работы: изучение влияния статических упражнений на тонус паравертебральных зон позвоночно-двигательного сегмента и долгосрочные эффекты регулярных тренировок.

Объект исследования: тренировка статических (изометрических) упражнений.

Предмет исследования: статические (изометрические) упражнения.

Методы и организация исследования

Метод миофасциографии был выбран для визуализации интегрального паттерна распределения мышечного тонуса благодаря его уникальному преимуществу: он даёт возможность одновременно оценить состояние тонуса всех мышц тела, включая производные миотомов, иннервируемые посегментарно [5]. Это отличает его от других способов исследования мышечного аппарата человека.

В исследованиях изучалось влияние следующих статических упражнений:

1) Поза «Шавасана», где лёжа на спине с прямыми вдоль тела руками (не касаясь корпуса), с вытянутыми ногами и немного разведенными в стороны (глаза закрыты).

2) Поза «Бхуджангасана» с простым прогибом назад, выполняет из положения «упор лёжа на предплечьях».

3) Поза «Сету Бандха Сарвангасана» (поза моста), при которой тело изгибается дугой, опираясь о пол плечами, подошвами и пятками, а изгиб спины поддерживается кистями у талии.

Согласно данным, которые получила группа исследователей (Гусаров А.В., Бобков Г.А., Надинский О.Ю.), стоит отметить результаты миофасциограмм при длительной практике поз [3].

Анализ тонуса дериватов миотомов (рисунок № 1–3) проводится относительно нормативного диапазона (–20...+20 усл.ед., выборка >2000 человек). Отклонения за пределы этого диапазона могут иметь клиническое значение:

– гипертонус (>20 усл.ед.) часто связан с перегрузкой, спазмами или рефлекторным напряжением из-за проблем в соответствующем отделе позвоночника;

– гипотонус (<-20 усл. ед.) может указывать на денервацию, атрофию или хроническую дисфункцию мышц.

Позиция каждого квадрата на графике отражает тонус мышечной группы иннервируемой конкретным отделом позвоночного столба (рис. 1).



Рис. 1. Графическое представление данных о состоянии мышц и фасций при долговременном выполнении «Шавасана» [3; 116 с.]

Рисунок 1 иллюстрирует динамику мышечного тонуса у испытуемого:

1. Серая линия: базовый показатель – мышечный тонус в состоянии покоя в начале исследования.

2. Чёрная линия: итоговый показатель – мышечный тонус в покое по завершении 20-дневного курса упражнений.

Снижение тонуса в покое после курса наблюдается в шейном и грудном отделах. Причинами послужила: релаксация мышц из-за улучшения кровотока и метаболизма; адаптация к нагрузке (мышцы меньше «зажимаются» в покое); перераспределение нагрузки между мышечными группами. Отсутствие значимых изменений в пояснично-крестцовом отделе говорит о недостаточной нагрузке для адаптации и поза не задействует целевые группы мышц в достаточной степени (рис. 2).



Рис. 2. Миофасциограмма динамики тонуса паравerteбральных мышц при продолжительном выполнении упражнения «Бхуджангасана» [3; 118 с.]

В результате 15-дневного выполнения упражнения «Бхуджангасана» (рис. 2), 1 раз в день по 30–45 секунд, отмечено снижение тонуса паравerteбральных мышц на 28,9% (с 45 до 32 усл.ед.). Наибольшая релаксация зафиксирована в грудном отделе позвоночника ($\Delta T \approx -18$ усл. ед.), что может быть связано с локальным воздействием нагрузки. Полученные данные свидетельствуют об эффективности программы для коррекции мышечного гипертонуса в краткосрочном периоде.




Рис. 3. Миофасциограмма, отражающая воздействие упражнения «Сету Бандха Сарвангасана» на уровень тонуса паравerteбральных мышц в условиях продолжительной практики данной позы [3; 119 с.]

Анализ миофасциограммы (рис. 3) демонстрирует динамику тонуса паравerteбральной мускулатуры в результате 10-дневного курса

упражнений. Испытуемый выполнял задание ежедневно по 2–3 минуты; серая линия отражает базовый уровень тонуса в покое (до курса), черная – состояние после завершения практики.

Полученные данные согласуются с результатами аналогичных исследований:

– в шейном отделе позвоночника зафиксировано достоверное снижение тонуса;

– в грудном отделе также отмечено уменьшение активности мышц.

Механизм эффекта связан с особенностями статистических упражнений с пассивным прогибом:

1. выпрямление и сглаживание естественных изгибов позвоночника;

2. расслабление глубоких и поверхностных мышц спины за счёт перераспределения нагрузки через верхние и нижние конечности.

Для достижения оптимальных результатов критически важны: строгое соблюдение техники выполнения (сгибание в тазобедренных суставах без усиления грудного кифоза) и использование вспомогательных приспособлений (например, блоки) при необходимости.

Таким образом, упражнение обладает (расслабляющим/ тонизирующим/ стабилизирующим) эффектом для паравerteбральных мышц. Для достижения более выраженного результата может потребоваться увеличение длительности курса или корректировка техники выполнения. Систематическая практика подобных упражнений может служить профилактикой заболеваний опорно-двигательного аппарата, связанных с гипертонусом паравerteбральных мышц.

Заклчение

Таким образом, миофасциография расширяет возможности диагностики и коррекции состояний, связанных с нарушениями мышечного тонуса, и находит применение в спорте, реабилитации, а также при оценке эффективности оздоровительных практик [6].

Длительная практика упражнений оказывает нормализующее воздействие на тонус паравerteбральной мускулатуры: после периода начальной адаптации происходит снижение избыточного напряжения в покое, особенно в грудном отделе позвоночника. Это может способствовать улучшению осанки, уменьшению болевых ощущений при гипертонусе, оптимизации двигательных паттернов.

Для подтверждения устойчивости эффекта целесообразно провести повторное исследование через 1–2 месяца после завершения курса и оценить долгосрочные изменения по данным миофасциограммы.

Рекомендации

Для выполнения прогибов с целью вытяжения позвоночника, уменьшения компрессионного воздействия на позвоночно-двигательные сегменты (ПДС), сглаживания шейного и грудного изгибов, а также снижения тонуса паравerteбральной мускулатуры важно соблюдать правильную технику и методические указания. Такие упражнения должны проводиться под контролем специалиста (невролога, ортопеда, врача ЛФК или инструктора по лечебной гимнастике), особенно при наличии заболеваний позвоночника или болевого синдрома.

Прогибы позвоночника способны усиливать компрессионные нагрузки на межпозвоночные диски. При повреждении фиброзного кольца это повышает риск формирования грыжи. Однако полностью исключать прогибы из программы лечебной физкультуры (ЛФК) не всегда целесообразно: при грамотном подходе умеренные и контролируемые движения могут благотворно влиять на состояние позвоночника.

Прогибы могут быть опасны при определённых состояниях, но их полное исключение не всегда целесообразно. Ключевое значение имеет индивидуальный подход: только специалист может определить, допустимы ли прогибы в конкретном случае, и подобрать безопасную технику выполнения упражнений. Самостоятельное включение или исключение таких движений из программы ЛФК может привести к ухудшению состояния здоровья.

Литература

- Айенгар, Г.С. Йога в действии: начальный курс: начальный курс асан и пранаямы по программе Мемориального института йоги им. Рамамани Айенгар (RIMYI) / Гита С. Айенгар. – Москва: НП «Содействие развитию йоги Айенгара в России», 2008. – 95 с.
- Бубновский С.М., Бобков Г.А., Пермяков И.А. Способ диагностики функционального состояния мышц сегментов позвоночника. Патент на изобретение № 2424766 от 27 июля 2011 г.
- Гусаров А. В., Бобков Г.А., Надинский О.Ю. Влияние статических упражнений на «паттерн» распределения тонуса паравerteбральной мускулатуры //Феномен человека. – 2015. – С. 114–121.

4. Калинин Л. А. и др. Влияние статических упражнений с прогибом на тонус паравертебральной мускулатуры при занятиях оздоровительной физической культурой с женщинами среднего возраста 30–40 лет // Вестник спортивной науки. – 2017. – № 1. – С. 54–60.

5. Бобков Г. А., Пермяков И. А., Морозов О. Ю., Надинский О. Ю., Матов В. В., Назаров С. Е., Бобков И. Г. Инновационный метод количественного определения и коррекции функционального состояния миофасциальных меридианов спортсменов // Вестник спортивной науки. – 2014. – № 4. – С. 48–53.

6. Толстых С. С. Физиологические механизмы изменений в опорно-двигательном аппарате, психологическом статусе под воздействием тренировки у спортсменов восточных боевых единоборств: Автореф... дис. кан. биол. наук. – М.: 2016. – 24 с.

PHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF THE EFFECT OF STATIC EXERCISES ON THE TONE OF THE PARAVERTEBRAL MUSCLES DURING THERAPEUTIC AND RECREATIONAL PHYSICAL TRAINING

Stashkevich S.S.

National Medical Research Center for Rehabilitation and Balneology of the Ministry of Health of the Russian Federation

The purpose of the study. To determine the biomechanical effect of exercises (asanas) on the imbalance of the vertebral-motor segment of the subjects. Material and methods. The study demonstrates the performance of static exercises (asanas) by the subjects. When performing a comprehensive load test, the motor patterns of the vertebral-motor segment were evaluated, and the angles of inclination were recorded: flexion/extension during head, cervical, thoracic, and lumbar spine movements. A pattern of imbalance was formed in certain parts of the vertebral-motor segment, followed by an assessment of the kinematic relationship of myofascial structures. Results. The study of the kinematic parameters of the spine of the subjects studied as part of the study of the performance of static exercises by them allowed to identify a number of significant changes. In particular, in the cervical spine, a reduced volume of movements in the sagittal plane (flexion/extension) was registered,

and in the thoracic spine, a restriction of the amplitude of frontal tilts. At the same time, the changes in the kinematic indicators of the lumbar spine of the subjects did not reach the threshold of statistical significance ($p > 0.05$).

The physical impact and yoga practices implemented in the experimental part induced not only local modifications in the kinematics of movements, but also created the preconditions for the generalization of kinematic changes that extended to anatomically distant regions. Conclusion. Long-term practice of physical exercises has a normalizing effect on the tone of the paravertebral muscles.

Keywords: myofasciography, muscle tone, paraventricular muscles, pattern.

References

1. Iyengar, G. S. Yoga in Action: An Introduction to Asanas and Pranayamas. Ramamani Iyengar Memorial Institute of Yoga (RIMI) / Gita S. Iyengar. – Moscow: Iyengar Yoga Development Association of Russia, 2008. – 95 p.

2. Bubnovskii S. M., Bobkov G. A., Permyakov I. A. Sposob diagnostiki funktsionalnogo sostoyaniya myshts segmentov pozvonochnika. Patent na izobretenie No. 2424766 ot 27 iyulya 2011 g [A method for diagnosing the functional state of the muscles of the spinal segments. Patent for invention No. 2424766 dated July 27, 2011].

3. Gusarov A. V., Bobkov G. A., Nadinsky O. Yu. The effect of static exercises on the pattern of distribution of the tone of the paravertebral muscles // The phenomenon of man. – 2015. – P. 114–121.

4. Kalinkin L. A. et al. The effect of static exercises with a backbend on the tone of the paravertebral muscles during health-improving physical training with middle-aged women aged 30–40 // Bulletin of Sports Science. – 2017. – No. 1. – Pp. 54–60.

5. Bobkov, G. A., Permyakov, I. A., Morozov, O. Yu., Nadinskii, O. Yu., Matov, V. V., Nazarov, S. E., Bobkov, I. G. Innovatsionnyi metod kolichestvennogo opredeleniya i korrektsii funktsionalnogo sostoyaniya miofatsialnykh meridianov sportmenov [An innovative method for the quantitative determination and correction of the functional state of the myofascial meridians of athletes]. Vestnik sportivnoi nauki. Vol. 4 (2014): 48–53.

6. Tolstykh S. S. Fiziologicheskie mekhanizmy izmenenii v oporno-dvigatelnom apparate, psikhologicheskom statuse pod vozdeistviem trenirovki u sportmenov vostochnykh boevykh edinoborstv: Avtoref... dis. kan. biol. nauk [Physiological mechanisms of changes in the musculoskeletal system, psychological status under the influence of training in athletes doing oriental martial arts: Author's abstract of a Cand. Biol. Sc. dissertation]. – Moscow: 2016. – 24 p.

Применение методов автоматизации и управления качеством для совершенствования процесса формирования заключений в отделении лучевой диагностики

Нурлыгаянова Динара Радиковна,

студент, Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

E-mail: dinaranur0203@gmail.com

Семенова Евгения Вячеславовна,

кандидат технических наук, доцент, кафедра физики перспективных технологий и материаловедения, Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

E-mail: Evyallina@kpfu.ru

Ахатов Айнура Фаридович,

ассистент кафедры радиологии, радиотерапии, радиационной гигиены и радиационной безопасности, врач-рентгенолог, ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России; главный врач, медицинский центр «Барсмед»

E-mail: aya0258@googlemail.com

Нурлыгаянов Радик Зуфарович,

кандидат медицинских наук, доцент, врач травматолог-ортопед, рентгенолог, кафедра медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России

E-mail: radiknur@list.ru

Дефекты протоколов лучевых исследований остаются значимым источником диагностических и организационных ошибок, ограничивающих как клиническую эффективность отделений лучевой диагностики, так и корректность работы систем искусственного интеллекта с неструктурированными данными. Целью настоящей работы являлась разработка и внедрение автоматизированной системы управления качеством протоколов с количественной оценкой её эффективности на этапах формирования, верификации и архивирования заключений. Исследование выполнено на базе отделения лучевой диагностики медицинского центра Барсмед г. Казани в период с января 2022 по декабрь 2023 года. Проанализировано 4318 протоколов лучевых исследований, включая рентгенографию органов грудной клетки, компьютерную томографию брюшной полости и магнитно-резонансные исследования головного мозга и позвоночника. По результатам ретроспективного анализа частота дефектов протоколов составила 18,4%, после внедрения автоматизированной системы этот показатель снизился до 4,9% ($\chi^2 = 187,4$; $p < 0,001$). Медианное время оформления ургентного протокола сократилось с 94 до 41 минуты, планового – с 19,3 до 11,8 часа. Частота несоответствия описательной части итогового заключению уменьшилась с 5,7% до 1,2%, что свидетельствует о преимущественно организационно-документационной природе большинства выявленных ошибок.

Ключевые слова: лучевая диагностика, управление качеством, автоматизация протоколов, радиологическая информационная система, дефекты заключений, структурированный протокол, искусственный интеллект в медицине.

Введение

Дефекты технического качества рентгенографических исследований остаются системной проблемой, существенно ограничивающей диагностическую точность как при традиционной интерпретации, так и при обработке данных системами искусственного интеллекта. А.А. Борисов установил, что неполнота охвата грудной клетки критически затрудняет работу специалистов со стажем до пяти лет, тогда как нарушения четкости и контрастности в первую очередь снижают эффективность работы опытных рентгенологов [1, с. 54]. Анализ функционирования ИИ-сервисов в четвертом квартале 2023 года зафиксировал устойчивую проблему незаполнения метаданных DICOM, делающую невозможным корректный выбор целевого изображения. Входной контроль качества до передачи исследования на ИИ-сервис приобретает статус обязательного технологического требования, без которого достоверность диагностического процесса принципиально не обеспечивается.

Д.Р. Нурлыгаянова в своём обзорном исследовании, охватывающем 132 публикации из баз PubMed, IEEE Xplore и Science Direct за период 2015–2023 годов, зафиксировала широкое проникновение методов глубокого обучения в медицинскую диагностику: системы анализа маммографических изображений достигают точности 98,7%, превышая показатели опытных рентгенологов, а рекуррентные нейронные сети прогнозируют риск сердечно-сосудистых заболеваний на горизонте десяти лет с точностью 87,4% [4, с. 127]. Анализ данных 1,6 млн пациентов методами машинного обучения позволил выявить ранее неизвестные факторы риска диабета второго типа. Эти результаты подчёркивают не только диагностический потенциал ИИ, но и острую необходимость в инфраструктуре контроля качества входных данных – без которой ни одна из перечисленных точностных характеристик не воспроизводится в реальной клинической среде.

Ю.А. Васильев разработал программное решение для автоматизированной оценки систем ИИ через три взаимосвязанных модуля: мониторинга, сравнения показателей с пороговыми значениями и формирования отчётности для периодов от одного месяца [2, с. 21]. Система, реализованная на Python с использованием библиотек matplotlib и pandas, рассчитывает долю исследований с дефектами, время обработки, меру согласия между экспертом и ИИ в локализации патологии, коэффициенты вовлечённости и удовлетворённости врачей-рентгенологов.

В.В. Зинченко построил методологию оценки надёжности систем ИИ через коэффициент Ctd, учитывающий четыре типа технологических дефектов: отсутствие результатов и ошибки обработки, некорректную работу функционала, дефекты отображения и нарушения целостности файлов – с применением дифференцированных коэффициентов взвешенности [3, с. 9]. Предельное значение времени обработки установлено на уровне 6,5 минуты; диагностическая точность верифицируется через AUC-анализ, согласованность текстовых заключений оценивается посредством NLP-инструмента, классифицирующего исследования по категориям нормы и патологии.

Л.В. Ронжин применил семантический анализ неструктурированных текстовых протоколов через экспертные правила с разработкой регулярных выражений для выявления языковых паттернов патологических состояний, дополненный словарём из 397 радиологических концепций и аббревиатур, учитывающим опечатки и профессиональный жаргон русскоязычного медицинского контекста [5, с. 5]. Автоматическая разметка обеспечивает извлечение локализации патологии в анатомических структурах, характеристик патологических изменений и классификации по категориям нормы и патологии, формируя размеченные наборы данных для обучения систем компьютерного зрения.

Цель исследования: разработать и внедрить автоматизированную систему управления качеством протоколов лучевой диагностики с количественной оценкой её эффективности на этапах формирования, верификации и архивирования заключений.

Методы и методология исследования

Исследование проводилось на базе отделения лучевой диагностики Медицинского центра Барсмед г. Казани в период с января 2022 по декабрь

2023 года. Для анализа отобрано 4318 протоколов лучевых исследований, из которых 1804 составили рентгенографические исследования органов грудной клетки, 1247 – компьютерно-томографические исследования брюшной полости и забрюшинного пространства, 1267 – магнитно-резонансные исследования головного мозга и позвоночника. Исследование реализовано в два этапа: ретроспективный анализ архивных заключений за 2022 год (n = 2106) и проспективная оценка после внедрения системы автоматизации в течение 2023 года (n = 2212).

Для выявления структурных и содержательных дефектов заключений на первом этапе применялся метод экспертной аудиторской оценки: каждый протокол независимо анализировался двумя врачами-рентгенологами со стажем работы не менее 10 лет, а при расхождении мнений привлекался третий эксперт. На втором этапе внедрена автоматизированная система поддержки формирования заключений, интегрированная с радиологической информационной системой (РИС) на платформе 1С: Медицина. Система включала модуль структурированных шаблонов протоколов с обязательными полями, алгоритм контроля полноты заполнения на основе регулярных выражений, а также триггерные уведомления для заведующего отделением при превышении нормативного времени оформления.

Статистическая обработка данных выполнена в программной среде IBM SPSS Statistics 26.0. Для сравнения частот использовался критерий χ^2 Пирсона, для оценки временных интервалов – непараметрический критерий Манна–Уитни. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$. Для расчёта согласованности экспертных оценок применялся коэффициент каппа Козна (к).

Результаты и обсуждение

При ретроспективном анализе 2106 протоколов за 2022 год выявлено 387 документов с дефектами, что составило 18,4%. Согласованность экспертных оценок оказалась высокой: $k = 0,81$, что подтверждает надёжность применённого метода аудита. Наиболее частым типом дефекта являлось отсутствие или неполное заполнение раздела клинических рекомендаций – 9,2% от общего числа проверенных протоколов. Несоответствие описательной части итоговому заключению зафиксировано в 5,7% случаев, нарушение нормативных сроков оформления – в 6,1% случаев, при этом для urgentных исследований этот показатель достигал 11,3% (таблица 1).

Таблица 1. Основные результаты исследования

Показатель	До автоматизации	После автоматизации	Изменение
Дефекты протоколов	18,4%	4,9%	73%
Время urgentных протоколов	94 мин	41 мин	56%
Время плановых протоколов	19,3 ч	11,8 ч	39%
Несоответствие описания и заключения	5,7%	1,2%	79%

$p < 0,001$ для всех показателей | $k = 0,81$ (надёжность экспертизы)

После внедрения автоматизированной системы в 2023 году общая частота дефектов в проспективной выборке снизилась до 4,9% (109 протоколов из 2212) (таблица 1), что статистически значимо отличалось от исходных значений ($\chi^2 = 187,4$; $df = 1$; $p < 0,001$). Мedianное время оформления urgentного протокола сократилось с 94 минут (IQR: 67–138 мин) до 41 минуты (IQR: 28–63 мин) ($U = 4218$; $p < 0,001$). Среднее время оформления планового протокола снизилось с 19,3±6,7 часа до 11,8±4,2 часа ($p < 0,001$) (рис. 1).




Рис. 1. Сравнение ключевых показателей до и после автоматизации

Отдельного внимания заслуживает динамика показателя несоответствия описательной части и заключения: после внедрения шаблонной структуры с обязательными логически связанными полями данный дефект регистрировался лишь в 1,2% протоколов против исходных 5,7% (таблица 1). Это свидетельствует о том, что значительная часть содержательных ошибок носила не столько диагностический, сколько организационно-документационный характер и была обусловлена отсутствием жёсткой структуры протокола. Среди врачей, работавших в системе более 6 месяцев, частота дефектов составила 3,1%, тогда как у специалистов, адаптировавшихся к системе менее 3 месяцев, – 8,4%, что указывает на выраженный эффект обучения и важность периода внедрения.

Выводы

Проведённое исследование подтверждает, что преобладающая часть дефектов протоколов лучевых исследований обусловлена не диагностической некомпетентностью врача-рентгенолога, а структурной неупорядоченностью документирования – отсутствием обязательных полей, нарушением логической связи между описательной частью и итоговым заключением, несоблюдением нормативных сроков оформления. Именно на устранение этого класса ошибок оказалось направлено основное регулирующее воздействие внедрённой системы.

Интеграция автоматизированного модуля контроля структуры протокола с радиологической информационной системой обеспечила статистически значимое снижение общей частоты дефектов, при этом наиболее выраженная динамика зафиксирована по показателю несоответствия описания и заключения. Данный результат свидетельствует о том, что жёсткая шаблонная архитектура протокола выполняет не только организационную, но и когнитивную функцию – принудительно выстраивает последовательность диагностического рассуждения. Существенное сокращение времени оформления urgentных протоколов имеет самостоятельное клиническое значение, выходящее за рамки управления качеством документации: ускорение передачи критических находок в клиническое звено непосредственно влияет на своевременность лечебных решений. Административный механизм эскалации при превышении нормативного времени оказался действенным инструментом именно в этом сегменте. Выявленный эффект обучения – существенное различие в частоте дефектов между врачами с разным сроком работы в системе – указывает на то, что период адаптации персонала является критической фазой внедрения и требует отдельного организационного сопровождения. Без учёта этого фактора краткосрочные результаты внедрения будут систематически занижать реальный потенциал системы.

Содержательные диагностические расхождения, сохранившиеся после автоматизации, обозначают предел применимости организационно-технических методов управления качеством: их редукция возможна лишь через систематическое двойное чтение в клинически сложных случаях и целенаправленное повышение квалификации. Тем самым автоматизация структуры протокола и экспертный контроль диагностического содержания представляют собой не альтернативные, а взаимодополняющие уровни системы управления качеством в отделении лучевой диагностики.

Литература

1. Борисов, А.А. Влияние нарушений качества рентгенографических исследований органов грудной клетки на работу врачей-рентгенологов и диагностического искусственного интеллекта / А.А. Борисов, Ю.А. Васильев, К.М. Арзамасов // Менеджер здравоохранения. – 2024. – № 7. – С. 50–60.

2. Васильев, Ю.А. Значение технологий искусственного интеллекта для профилактики дефектов в работе врача-рентгенолога / Ю.А. Васильев, А.В. Владзимирский, Д.В. Бондарчук [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2023. – № 2. – С. 16–27.

3. Зинченко, В.В. Оценка надёжности и эффективности систем искусственного интеллекта в лучевой диагностике на этапе эксплуатации / В.В. Зинченко, А.В. Владзимирский, К.М. Арзамасов // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2025. – Т. 13, № 2(49). – С. 1–13.

4. Нурлыгаянова, Д.Р. Возможности использования искусственного интеллекта в медицине / Д.Р. Нурлыгаянова, Р.З. Нурлыгаянов, А.М. Нурлыгаянова, Л.Т. Гильмутдинова, Б.Р. Гильмутдинов // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2024. – № 3. – С. 125–131.

5. Ронжин, Л.В. Система автоматической разметки неструктурированных протоколов рентгенологических исследований грудной клетки с использованием методов семантического анализа / Л.В. Ронжин, П.А. Астанин, Д.Ю. Кокина [и др.] // Социальные аспекты здо-

ровья населения. – 2023. – Т. 69, № 1. – С. 1–10. – Режим доступа: <http://vestnik.mednet.ru/content/view/1455/30/lang, ru/> (дата обращения: 20.01.2026).

USING AUTOMATION AND QUALITY MANAGEMENT METHODS TO IMPROVE THE REPORT GENERATION PROCESS IN THE RADIOLOGY DEPARTMENT

Nurlygayanova D.R., Semenova E.V., Akhatov A.F., Nurlygayanov R.Z.

Kazan (Volga Region) Federal University, Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, medical center “Barsmed”, Bashkir State Medical University

Defects in radiation examination protocols remain a significant source of diagnostic and organizational errors, limiting both the clinical effectiveness of radiation departments and the accuracy of artificial intelligence systems with unstructured data. The aim of this study was to develop and implement an automated protocol quality management system and quantitatively evaluate its effectiveness at the stages of report generation, verification, and archiving. The study was conducted in the Radiology Department of Barsmed Medical Center of Kazan, from January 2022 to December 2023. A total of 4,318 radiation examination protocols were analyzed, including chest X-rays, abdominal CT scans, and magnetic resonance imaging (MRI) scans of the brain and spine. According to the results of a retrospective analysis, the frequency of protocol defects was 18.4%; after the implementation of the automated system, this figure decreased to 4.9% ($\chi^2 = 187.4$; $p < 0.001$). The median time to complete an urgent protocol decreased from 94 to 41 minutes, and for a planned protocol, from 19.3 to 11.8 hours. The frequency of discrepancies between the narrative and the final

report decreased from 5.7% to 1.2%, indicating that the majority of identified errors were primarily organizational and documentation-related.

Keywords: radiation diagnostics, quality management, protocol automation, radiology information system, report defects, structured protocol, artificial intelligence in medicine.

References

1. Borisov, A.A. The Impact of Impaired Quality of Chest X-ray Studies on the Work of Radiologists and Diagnostic Artificial Intelligence / A.A. Borisov, Yu.A. Vasiliev, K.M. Arzamasov // *Healthcare Manager.* – 2024. – No. 7. – P. 50–60.
2. Vasiliev, Yu. A. The Importance of Artificial Intelligence Technologies for Preventing Defects in the Work of a Radiologist / Yu.A. Vasiliev, A.V. Vladimirovsky, D.V. Bondarchuk [et al.] // *Doctor and Information Technology.* – 2023. – No. 2. – P. 16–27.
3. Zinchenko, V.V. Evaluation of the reliability and efficiency of artificial intelligence systems in radiation diagnostics at the operational stage / V.V. Zinchenko, A.V. Vladimirovsky, K.M. Arzamasov // *Modeling, optimization and information technology.* – 2025. – Vol. 13, No. 2 (49). – P. 1–13.
4. Nurlygayanova, D.R. Possibilities of using artificial intelligence in medicine / D.R. Nurlygayanova, R.Z. Nurlygayanova, A.M. Nurlygayanova, L.T. Gilmudinova, B.R. Gilmudinov // *Medicine. Sociology. Philosophy. Applied research.* – 2024. – No. 3. – P. 125–131.
5. Ronzhin, L. V. A system for automatic labeling of unstructured protocols of chest X-ray examinations using semantic analysis methods / L.V. Ronzhin, P.A. Astanin, D. Yu. Kokina [et al.] // *Social aspects of population health.* – 2023. – Vol. 69, No. 1. – Pp. 1–10. – Access mode: <http://vestnik.mednet.ru/content/view/1455/30/lang, ru/> (date of access: 20.01.2026).

Рубекина Юлия Сергеевна

инженер-разработчик, ООО «Медиана»

E-mail: Ru.julia@gmail.com

Около 30% всего взрослого населения постоянно храпит во сне. Храп не только создает очевидные социальные проблемы, но и является предвестником и одним из основных симптомов синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), проявляющегося остановками дыхания во сне. В статье приведен алгоритм разработки аппарата для борьбы с апноэ. Разработка современного прибора для мониторинга параметров пульсовой волны в течении длительного времени с возможностью передачи полученной информации на внешние устройства посредством стандартного беспроводного интерфейса. Разработанный автоматический СИПАП-аппарат удовлетворяет поставленной цели работы. Созданный аппарат может использоваться, как достаточно простой с точки зрения конструкции, в исследованиях, касающихся как системы дыхания в целом, так и появления храпа и возникновение АПНОЭ в частности. Аппарат позволяет производить программное корректирование параметров воздействия, может быть использован в научных целях.

Ключевые слова: Апноэ, СОАС, СИПАП-ТЕРАПИЯ, разработка, конструирование.

Введение

При тяжелых формах синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) может отмечаться до 400–500 остановок дыхания за ночь продолжительностью до минуты и более, что ведет к острому и хроническому недостатку кислорода во время сна. Это в свою очередь существенно увеличивает риск развития артериальной гипертензии, нарушений ритма сердца, инфаркта миокарда, инсульта и внезапной смерти во сне. В настоящее время существуют эффективные методы лечения СОАС, в частности применение неинвазивной вспомогательной вентиляции легких постоянным положительным давлением во время сна (СИПАП-терапия). Данный метод позволяет даже при очень тяжелых формах СОАС значительно улучшить качество жизни человека и предотвратить серьезные осложнения.

СИПАП-терапия является наиболее эффективным методом лечения синдрома обструктивного апноэ сна. Однако по данным врачей более 60% пациентов с наличием показаний к СИПАП-терапии отказываются от лечения вообще или от долгосрочной терапии в домашних условиях. Это обусловлено наличием определенных отрицательных сторон: необходимости постоянного лечения, побочных эффектов, социального дискомфорта и дороговизны оборудования. Иногда даже стопроцентное устранение нарушений дыхания у пациента с тяжелой формой СОАС не гарантирует долгосрочной приемлемости лечения.

Учитывая вышесказанное, разрабатываемый аппарат должен выполнять следующие функции: иметь дополнительную функцию сброса давления на выдохе, передавать полученную информацию в облако, должен быть встроенный увлажнитель позволяющий избежать возможных побочных эффектов СИПАП-терапии, а также функцию подогрева шланга, полностью исключающую возможность образования конденсата, встроенный аккумулятор (разъем для зарядки), управление через мобильное приложение по Bluetooth.

Подбор основных электронных компонентов

Для обеспечения автоматического СИПАП аппарата необходимыми функциями была разработана следующая структурная схема, представленная ниже.

Структурная схема аппарата:

- Источник питания USB Type-C – это стандартный разъем для питания. Сегодня его можно встретить в большинстве потребительских устройств;
- Внешний аккумулятор (ROBITON LP-STB2–3000) предназначен для обеспечения питания и мобильности аппарата;
- Bluetooth-модуль – необходим для передачи данных между смартфоном и СИПАП аппаратом;
- Интерфейс UART – предназначенный для организации связи с другими цифровыми устройствами. (В моем случае Bluetooth-модуля и микроконтроллера);
- Микроконтроллер (PIC16F628A-E/SO) – предназначен для обработки входных сигналов (рис. 1);



Рис. 1.

- ШИМ-регулятор – используется для регулировки мощности подключенных к нему элементов;
- Увлажнитель (HNM-4PI-2316) –обеспечивает оптимальное и регулируемое увлажнение воздуха, что исключает сухость дыхательной системы человека;

- Нагревательный элемент – для избежания конденсата в дыхательной трубке аппарата;
- Воздушный насос (MITSUMI 370) – для создания положительного давления в легких;
- Повышающий стабилизатор – это преобразователь питания, выдающий выходное напряжение, которое больше входного для корректного управления транзистора IRFP460;
- Понижающий стабилизатор – используются в случаях, когда питающее напряжение имеет большую величину, чем требуемое напряжение питания нагрузки.

После разработки структурной схемы была спроектирована принципиальная схема согласно требованиям ЕСКД. Для возможного создания опытного изделия была разработана принципиальная схема, представленная ниже (рис. 2)




Рис. 2. Принципиальная схема

Для данной схемы были использованы следующие элементы:

Внешний аккумулятор (ROBITON LP-STB2-3000): размер 132x43x12.2мм, вес 149 грамм, напряжение 7.4В, емкость 3000мАч, разрядный ток 25С, пиковый ток 50С, вольтаж 7.4Вт

Микроконтроллер (PIC16F628A-E/SO)

PIC16F628A-E/SO – 18-контактные 8-битные CMOS-микроконтроллеры на базе флэш-памяти с технологией nanoWatt Technology, который включает архитектуру Microchip. Семейство недорогих, высокопроизводительных, микроконтроллеров. Все микроконтроллеры PIC используют усовершенствованный RISC-процессор. PIC16F628A-E/SO может прямо или косвенно обратиться к своим регистровым файлам или памяти данных. Все специальные регистры функций (SFR), включая программу счётчика, отображаются в памяти данных. Имеет встроенную функцию для сокращения количества внешних компонентов, тем самым уменьшая стоимость системы, повышение надежности системы и снижение энергопотребление. С помощью ортогонального (симметричного) набора команд, который позволяет выполнять любую операцию с любым регистром, используя любой режим адресации. Эта симметричность и отсутствие «особых оптимальных ситуаций» делают программирование с помощью PIC-16F627A/628A/648A простым, но эффективным.

Регулятор положительного напряжения (L7805CD2T-TR)

Эти регуляторы могут обеспечить локальное регулирование на карте, устраняя проблемы распределения, связанные с регулированием в одной точке. Каждый тип использует внутреннее ограничение тока, тепловое отключение и защиту безопасной зоны, что делает его практически неразрушимым. Если достаточный теплоотвод предусмотрен, они могут выдавать выходной ток более 1А. Хотя эти устройства разработаны в первую очередь как стабилизаторы фиксированного напряжения, их можно использовать с внешними компонентами для получения регулируемых напряжения и тока. Микросхемы на плате питаются от 5В, если подключить их напрямую к аккумулятору они могут сгореть, так как аккумулятор имеет мощность 12В, поэтому я решил использовать регулятор положительного напряжения.

Двухтактный, четырехканальный драйвер двигателей постоянного тока, с защитными диодами (L293D)

Интегральная микросхема представляет собой четырехканальный полумостовой токовый переключатель с ограничительными диодами на выходах, предназначенный для управления двигателями постоянного тока, шаговыми двигателями, обмотками реле и мощными транзисторами. В моем случае используется насос. В микросхеме имеется мощный драйвер, который управляется сигналом с микроконтроллера. Этот драйвер нужен для коммутации высоких токов потребления этого насоса.

Преобразователь напряжения DC/DC на печатную плату (SMU02M-05)

Функции: SIP-пакет; распиновка отраслевого стандарта; изоляция 1/0 1500 В постоянного тока; встроенный фильтр электромагнитных помех без внешних компонентов; охлаждение за счет свободной конвекции воздуха; непроводящий пластиковый корпус; 100% тест на выгорание; Низкая стоимость/высокая надежность; 2 года гарантии

Резистор толстопленочный (0.125Вт 1к 0805)

Резистор толстопленочный CRCW08054K22FKTABC от известного производителя VISHAY – это высококачественный компонент с сопротивлением 4,22 кОм и точностью ±1%. Этот компонент имеет стандартный корпус 805 для SMD-монтажа, что обеспечивает легкость установки на печатные платы. Максимальное рабочее напряжение составляет 150 В, а мощность – 0,125 Вт. Резистор способен функционировать в широком диапазоне температур от –55 °С до 155 °С, что делает его универсальным решением для различных электронных приложений.

Биполярный транзистор (BC857CLT1G): Кремниевый AF-транзистор PNP, для входных каскадов автофокусировки и драйверов, высокий коэффициент усиления по току, низкое напряжение насыщения коллектор-эмиттер, низкий уровень шума в диапазоне от 30 Гц до 15 кГц, дополнительные типы: BC846...-BC850... (НПН)

Полевой транзистор (IRFP460)

Характеристики транзистора IRFP460 сочетают в себе технологии третьего поколения HEXFET известной во всем мире компании International Rectifier (IR). Это кремниевый силовой МОП-транзистор имеет N-канальный переход, с достаточно низким сопротивлением RDS(ON) (до 0,27 Ом). При этом, производитель заявляет в datasheet о способности устройства выдерживать максимальное напряжения между стоком-истоком до 500 В и постоянным током до 20 А. Предельная рассеиваемая мощность может достигать 280 Вт. Данный MOSFET используется преимущественно в блоках питания, стабилизаторах, синхронных выпрямителях, инверторах, системах управления электрическими двигателями, различными схемами переключения более мощных устройств. Там где необходима высокая скорость работы и низкий уровень управляющего сигнала (4–5 В). Поддерживается управление непосредственно от микроконтроллера. Функции: динамический рейтинг dV/dt, повторяющийся лавинный рейтинг, изолированное центральное монтажное отверстие, быстрое переключение, простота распараллеливания, простые требования к диску, доступен без свинца (Pb)

Транзистор биполярный (BC817)

Функции: дополнение к BC807; высокий ток коллектора; низкое напряжение насыщения коллектор-эмиттер; высокий коэффициент усиления по току; устройство для поверхностного монтажа.

Биполярный транзистор (BC547)

BC547 имеет коэффициент усиления Hfe: 140–160. Высококачественный транзистор имеющий высокий коэффициент усиления.

Разъем (USB4105-GF-A)

В разъеме реализован механизм фиксации в виде защелок на штекере и углублений под них на гнезде. Входить и выходить такой шнурок сможет долго – заявленная наработка на отказ – 10 000 циклов.

Заглянем внутрь полнофункциональной «мамы» – там расположено двухсторонняя площадка с 24 контактами, которые делятся на несколько контактных групп (рис. 3).



Рис. 3. Вид внутри, двухсторонняя площадка с 24 контактами разъема (USB4105-GF-A)

На рисунке 3:

- A1, A12 и B1, B12 – «земля», расположены симметрично
- A4, A9 и B4, B9 – питание, расположены симметрично;
- A6, A7 и B6, B7 – пара пинов для передачи данных по USB 2.0, на обратной стороне расположены зеркально;
- A2, A3, A10, A11 и B2, B3, B10, B11 – две пары пинов для высокоскоростной передачи данных по USB 3.2 и USB4, а также альтернативного режима. Каждая пара пинов образует канал (lane). На обратной стороне каналы имеют зеркальное расположение;
- A5 и B5 – зеркально расположенные управляющие контакты;
- A8 и B8 – зеркально расположенные вспомогательные контакты, используемые для передачи нестандартных сигналов, например, звуковых в альтернативном режиме.

В гнезде, поддерживающем только USB 2.0, на усмотрение производителя разрешается не разводить контакты высокоскоростных каналов. Может поддерживаться мощность до 100 Вт.

Гнездо на плату (PBS-6)

Разъемы PBS представляют из себя однорядные гнезда со штыревыми выводами, которые устанавливаются на плату с шагом: 2,54мм, 2,00мм. Штыревые разъемы могут монтироваться относительно платы: вертикально (PBS) и под прямым углом (PBS-R). Разъемы PBS, PBS-R применяются для межплатных соединений типа плата-плата совместно со штыревыми соединителями соответствующего шага. Сечение контакта штыревого соединителя имеет форму квадрата. Изолятор выполнен из полистирола, усиленного стекловолокном UL-94V-O.

Разъем типа провод-плата, вертикальный (1-1123723-2 (B2P-VN))

Этот небольшой, проверенный на практике разъем для печатных плат надежен и имеет большую токовую нагрузку. Его можно использовать с широким спектром сигнальных цепей, источников питания и выходных цепей, которые используются в бытовой электронике.

Кварцевый резонатор (HC-49SM 8.000 МГц)

Кварцевый резонатор имеет лучшие характеристики, чем другие приборы для стабилизации частоты (колебательные контуры, пьезо-керамические резонаторы): такие как стабильность по частоте (уход частоты) и температуре (изменение частоты резонанса в зависимости от температуры окружающей среды). Избирательный, ярко выраженный резонансный характер сопротивления этих компонентов определяет основные области применения кварцевых резонаторов – высокостабильные генераторы тактовых сигналов и опорных частот, цепи частотной селекции, синтезаторы частоты и т.д.

Принцип работы: В широкой полосе частот сопротивление прибора имеет ёмкостной характер и только на некоторых (рабочих) частотах имеет широко выраженный резонанс (уменьшение сопротивления).

Предлагаемое конструкторское решение

Конструктивно аппарат для борьбы с АПНОЭ и храпом выполнен в виде устройства, состоящего из корпуса, не разрабатываемого в данной работе, печатной платы с основными элементами электрической принципиальной схемы, и устройствами для коммутации и управления вместе с аккумулятором, которые вместе с печатной платой размещены в этом корпусе и соединяются с печатной платой посредством проводников с разъемами. Внешний вид печатной платы с установленными радиоэлементами представлен на рисунке 4.




Рис. 4. Внешний вид платы СИПАП-аппарата

Заключение

Около 30% всего взрослого населения постоянно храпит во сне. Храп не только создает очевидные социальные проблемы, но и является предвестником и одним из основных симптомов синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), проявляющегося остановками дыхания во сне. Задача недопущения остановки дыхания и корректировки параметров дыхания в настоящее время является важной.

Для коррекции таких нарушений в настоящее время появляется множество приборов, обладающих разными характеристиками и различной функциональностью.

Целью данной статьи являлась разработка современного автоматического аппарата для борьбы с апноэ во сне и храпом.

В ходе выполнения поставленной цели были решены следующие задачи:

1) были рассмотрено строение и функции дыхательной системы человека

2) проведен обзор аппаратных методов воздействия на дыхательную систему человека с целью недопущения возникновения АПНОЭ и отсутствия храпа

3) разработана структурная схема аппарата для фиксации пульсовой волны

4) описаны основные компоненты разрабатываемого аппарата

5) была спроектирована печатная плата и создана документация для разрабатываемого автоматического аппарата для борьбы с апноэ во сне и храпом.

Созданный аппарат может использоваться, как достаточно простой с точки зрения конструкции, в исследованиях, касающихся как системы дыхания в целом, так и появления храпа и возникновения АПНОЭ в частности. Аппарат позволяет производить программное корректирование параметров воздействия, может быть использован в научных целях.

Литература

1. Бузунов Р.В., Легайда И.В. Храп и синдром обструктивного апноэ сна: Учебное пособие для врачей. М., 2010. С. 78.
2. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник / под ред. Я.Д. Ширмана. – Москва: Радиотехника, 2007. –512с.
3. Физиология человека. / Под редакцией В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. –Москва: Медицина, 2007. –656с.
4. Бердников А.В., Семко М.В., Широкова Ю.А. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы. –Казань: Казанский государственный технический университет, 2004. –176с.
5. Корневский Н.А., Попечитев Е.П., Филист С.А. Проектирование электронной медицинской аппаратуры для диагностики и лечебных воздействий. –Курск: Курская городская типография, 1999. –537с.
6. Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник. – Москва, Техносфера – 2005 г. – 592 с.
7. Вебстер Д.Г., Кларк Д.В. мл., Ньюман М.Р., Олсон В.Х. и др. Медицинские приборы. Разработка и применение. –Москва: Медицинская книга, 2004. –652с.
8. Солодовник В.Ф., Чебан М.И. Медицинские лабораторные приборы и устройства. – Харьков: ХАИ, 2001. –86с.
9. Ильясов Л.В. Биомедицинская измерительная техника. –Москва: Высшая школа, 2007. –342с.

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATIC DEVICE TO COMBAT SLEEP APNEA AND SNORING

Rubekina Yu.S.
LLC "Mediana"

About 30% of the adult population constantly snores in their sleep. Snoring not only creates obvious social problems, but is also a precursor and one of the main symptoms of obstructive sleep apnea syndrome (OSA), manifested by respiratory arrest during sleep. The article presents an algorithm for the development of an apnea control device. Development of a modern device for monitoring pulse wave parameters for a long time with the possibility of transmitting the received information to external devices via a standard wireless interface. The developed automatic SIPAP device satisfies the set purpose of work. The created device can be used, as it is quite simple in terms of design, in studies concerning both the respiratory system in general and the occurrence of snoring and the onset of APNEA in particular. The device allows for programmatic correction of exposure parameters, and can be used for scientific purposes.

Keywords: Apnea, OSA, CPAP THERAPY, development, structure.

References

1. Buzunov R.V., Legeyda I.V. Snoring and Obstructive Sleep Apnea Syndrome: A Textbook for Physicians. Moscow, 2010, p. 78.
2. Radioelectronic Systems: Basic Design and Theory. Handbook / edited by Ya.D. Shirman. Moscow: Radio Engineering, 2007. –512 p.
3. Human Physiology. Moscow: Meditsina, 2007. –656 p.
4. Berdnikov A.V., Semko M.V., Shirokova Yu.A. Medical Devices, Apparatus, Systems, and Complexes. Kazan: Kazan State Technical University, 2004. –176 p.
5. Korenevsky N.A., Popchitelev E.P., Filist S.A. Design of Electronic Medical Equipment for Diagnostics and Therapeutic Treatments. Kursk: Kursk City Printing House, 1999. 537 p.
6. Friden J. Modern Sensors. Handbook. Moscow: Tekhnosfera, 2005, 592 p.
7. Webster D.G., Clark D.W. Jr., Newman M.R., Olson W.H., et al. Medical Devices. Development and Application. Moscow: Medical Book, 2004. 652 p.
8. Solodovnik V.F., Cheban M.I. Medical Laboratory Instruments and Devices. Kharkov: KhAI, 2001. 86 p.
9. Ilyasov L.V. Biomedical measuring equipment. – Moscow: Vysshaya shkola, 2007. – 342 p.

Исследование кинетики гидролиза парацетамола в различных средах

Афанасьева Татьяна Анатольевна,

старший преподаватель кафедры фармации и химии,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
E-mail: atakaterinburg@yandex.ru

Савин Владислав Павлович,

студент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
E-mail: vladik.savin.2004@mail.ru

Гареева Алина Зуфаровна,

студент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
E-mail: alina_gareeva_21@bk.ru

Гидролиз парацетамола, являющийся ключевым этапом его разложения, протекает с образованием разных продуктов в зависимости от среды: в кислой (pH 1.6–3) основным продуктом является п-аминофенол, а в щелочной (pH >9) – нативное вещество и продукты гидролиза. Этот процесс описывается кинетическими моделями и важен для химико-токсикологического анализа. Кислотность среды напрямую влияет на скорость растворения и форму парацетамола: в желудке (pH~1.67) он быстро распадается и всасывается в неионизированной форме, а в кишечнике (pH~7.9) распад замедляется, а молекула преимущественно ионизируется, что определяет разные кинетические профили его действия. Основное всасывание парацетамола происходит в кишечнике благодаря большой площади поверхности и оптимальному балансу его ионных форм, несмотря на более быстрый распад в кислой среде желудка.

Ключевые слова: парацетамол, гидролиз, кондуктометрия, кондуктометрическое титрование, гидролиз парацетамола

Введение

Парацетамол относится к кристаллическим веществам белого цвета. Он хорошо растворяется в 96% спирте и ацетоне, тогда как в воде его растворимость ограничена [1]. При нагревании характер гидролиза парацетамола определяется кислотностью среды. В кислой области (pH 2–3) основным продуктом становится п-аминофенол, а в щелочной (pH 9–10) наряду с продуктами распада присутствует неизмененное исходное вещество.

Изучение кинетики гидролиза важно для совершенствования химико-токсикологического анализа при диагностике отравлений [2]. Эта реакция запускает биохимическую деструкцию молекулы. Согласно математической модели, гидролиз протекает в открытой системе с образованием п-аминофенола и уксусной кислоты; присоединение воды учитывается коэффициентом $K_{(H_2O)}=1,119$ [3].

Для описания равновесных форм при ферментативном гидролизе используют уравнение Гендерсона-Хассельбаха:

$$pH = pK_a + \lg([\text{основание}]/[\text{кислота}]) \quad [4].$$

Физиологическая норма pH в желудке при базальной секреции составляет 1.6–2.0, в антральном отделе – выше 5.0. Среда двенадцатиперстной кишки в норме слабощелочная или нейтральная; ее закисление рассматривается как патология [5].

Цель исследования: изучение скорости и механизма гидролитического разложения таблеток парацетамола в водных средах с разными значениями pH для оценки его стабильности и определения кинетических параметров реакции.

Материалы и методы

Материалы: препарат парацетамол 500мг «Парацетамол Реневал» таблетки для приема внутрь, растворы NaOH C=0.1н и HCl C=0.1н. Оборудование: кондуктометр анион 7020, pH-метр анион 4100, бюретка. Были приготовлены 3 раствора с pH: 12.6; 7.9; 1.67. В каждый раствор по 100 мл были помещены по 1 таблетки парацетамола. Проведено исследование гидролиза таблеток парацетамола при разном pH раствора, результаты представлены в таблице 1.

Результаты

Таблица 1. Зависимость электропроводности раствора парацетамола от pH

t в минутах \ pH	12,6	7,9	1,67
t ₁ = 0 мин начало	1.550 Мкс/с	6.130 Мкс/с	36.800 Мкс/с
t ₂ = 3 минуты	1.230 Мкс/с	6.150 Мкс/с	36.900 Мкс/с
t ₃ = 6 минут	1.100 Мкс/с	6.156 Мкс/с	37.100 Мкс/с
t полного распада таблетки в растворе	14:48	11:07	9:24

В ходе эксперимента фиксировали время полного растворения навески препарата массой 0,5 г в зависимости от pH. Установлено, что в кислой среде (pH 1,67) процесс занимает 564 секунды (9 минут 24 секунды). В нейтральной среде (pH 7,9) время увеличивается до 667 секунд (11 минут 7 секунд). В сильнощелочном растворе (pH 12,6) растворение длится 888 секунд (14 минут 48 секунд). Таким образом, скорость высвобождения вещества максимальна в кислой среде и минимальна в щелочной (табл. 2).

Таблица 2. Результаты кинетики распадаемости таблетки парацетамола

Параметр	pH 1.67 (желудок)	pH 7.9 (кишечник)	pH 12.6 (щелочь)
Время полного распада в секундах	564	667	888
Скорость растворения (v), г/с	8.87×10^{-4}	7.50×10^{-4}	5.63×10^{-4}
Константа скорости (k), с ⁻¹	1.77×10^{-3}	1.50×10^{-3}	1.13×10^{-3}
Время растворения (t _{1/2}) в секундах	282	333.5	444

В кислой среде (рН 1.67) таблетка растворяется в 1.18 раза быстрее, чем в нейтральной (рН 7.9), и в 1.58 раза быстрее, чем в щелочной (рН 12.6). Для строгого кинетического анализа распада твердой лекарственной формы применяют модель нулевого порядка (в условиях «правила площади поверхности»), где скорость постоянна и равна рассчитанной величине V .

В таблице 3 представлены данные кондуктометрического титрования раствора парацетамола. Здесь V – это объем титранта в мл, а G – электропроводность в мкСм/с. До добавления 5 мл титранта электропроводность растет медленно (с 6,4 до 9,2), а после 6 мл происходит резкий скачок (до 26,6 и выше), что указывает на точку эквивалентности.

Таблица 3. Кондуктометрическое титрование раствора парацетамола

V , мл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
G , Мк/с	6,4	8,6	8,9	9,1	9,2	26,6	26,9	27,0	27,1	27,3




Рис. 1. Реакция нейтрализации парацетамола




Рис. 2. Кондуктометрическое титрование парацетамола

Обсуждение

Всасывание парацетамола напрямую зависит от рН среды. В желудке при рН 1.67 ($pK_a 10^{-8.72}$) препарат находится в неионизированной липофильной форме, что теоретически обеспечивает быстрое начало действия, но повышает риск раздражения слизистой. В щелочной среде кишечника (рН 7.9, $pK_a 10^{-8.82}$) преобладает ионизированная форма, однако липофильной фракции достаточно для эффективного всасывания, которое благодаря большой поверхности становится максимально безопасным. В слабокислой среде (рН 3.4) после еды парацетамол также почти не ионизирован ($pK_a 10^{-6.52}$), но всасывание замедляется из-за пищевого комка.

Скорость распада таблетки вариabельна. Быстрее всего процесс идет в кислой среде (рН 1.67) – за 9 минут 24 секунды. В щелочной (рН 7.9) распад замедляется до 11 минут 07 секунд, а в сильнощелочной (рН 12.6) достигает максимума – 14 минут 48 секунд.

Динамика электропроводности при распаде таблетки наиболее информативна в нейтральной среде (рН 7.9): на фоне исходной проводимости 6.130 мкСм/см наблюдается рост до 6.156 мкСм/см за счет высвобождения электролитов. В кислой среде (рН 1.67) из-за высокой исходной проводимости (36.800 мкСм/см) вклад таблетки незаметен (рост до 37.100 мкСм/см). В сильнощелочной среде (рН 12.6) зафиксировано снижение проводимости с 1.550 до 1.100 мкСм/см вследствие побочных реакций.

При кондуктометрическом титровании первые 5 мл титранта дают плавный рост проводимости с 6.4 до 9.2 мкСм/см. Резкий скачок до 26.6 мкСм/см при переходе от 5 к 6 мл является точкой перегиба. При добавлении 6–10 мл проводимость выходит на плато, увеличиваясь лишь на 0.7 мкСм/см, что говорит о завершении реакции.

В исходной кислой среде (0.1 М HCl) парацетамол как слабая кислота ($pK_a \sim 9.5$) не влияет на проводимость. Резкий скачок проводимости указывает на начало ионизации: после нейтрализации HCl щелочь депротонирует фенольную группу, образуя фенолят-анион. Метод кондуктометрии четко зафиксировал этот переход, подтвердив кислотные свойства парацетамола.

Заключение

Проведенное исследование выявило четкую корреляцию между кислотностью среды и характером гидролитического разложения таблетированной формы парацетамола. Установлено, что скорость дезинтеграции препарата возрастает по мере снижения рН: в кислой области при значении 1.67 процесс распада протекает с максимальной интенсивностью, что сопровождается переходом действующего вещества в неионизированное липофильное состояние, оптимальное для последующей резорбции. Вместе с тем определяющим фактором для полноты абсорбции выступает не только молекулярная форма соединения, но и локализация всасывания. В щелочной среде кишечника при рН 7.9 дезинтеграция таблетки замедляется, однако именно в этом отделе благодаря значительной площади всасывающей поверхности и равносному соотношению ионизированных и неионизированных фракций реализуются условия для максимально эффективного и физиологичного поступления препарата в системный кровоток.

С помощью кондуктометрического титрования экспериментально верифицирована кислотная природа парацетамола: резкое возрастание электропроводности зафиксировано в точке образования фенолят-аниона, что полностью согласуется с литературными данными о величине pK_a данного соединения. Таким образом, время достижения терапевтического эффекта детерминируется двумя последовательными процессами: ускоренным высвобождением действующего вещества в желудочной среде и его последующим более полным, хотя и отсроченным, всасыванием в кишечнике.

Литература

1. Парацетамол. ФС.2.1.0154: фармакопейная статья: утв. Минздравом России // Государственная фармакопея Российской Федерации. – XV изд. – М., 2022. – Т. 1. – С. 1–3
2. Аносова Л.С., Агафонов А.М. Химико-токсикологическое исследование парацетамола и дротаверина при приеме комбинированных лекарственных препаратов // Innova. – 2022. – № 1 (26). – С. 6–13.
3. Биодеструкция парацетамола и ферментативная активность комплекса грибов рода *Pleurotus* / М.М. Михеева, И.А. Шильников, Д.А. Сметанин // Теоретическая и прикладная экология. – 2023. – № 3. – С. 164–170.
4. Хасанова Р.И., Хасанов А.И., Бугаева К.Р. Расчет теоретической кривой титрования двухосновной малоновой кислоты до первой точки эквивалентности // Название журнала или сборника (в оригинальном тексте не указано). – Год публикации (в оригинальном тексте не указан). – С. 95–99.
5. Ильченко А.А., Селезнева Э.Я. Компьютерная рН-метрия желудка и пищевода: методические рекомендации № 15 / А.А. Ильченко, Э.Я. Селезнева; Комитет здравоохранения Правительства Москвы, ЦНИИ гастроэнтерологии; [рец. Ю.В. Васильев, А.П. Погромов]. – Москва, 2000. – 32 с.

STUDY OF THE KINETICS OF PARACETAMOL HYDROLYSIS IN VARIOUS MEDIA

Afanasyeva T.A., Savin V.P., Gareeva A.Z.

Urals State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation

Hydrolysis of paracetamol, which is a key step in its decomposition, proceeds with the formation of different products depending on the medium: in acidic (pH 1.6–3), the main product is *n*-aminophenol, and in alkaline (pH >9) – the native substance and hydrolysis products. This process is described by kinetic models and is important for chemical and toxicological analysis. The acidity of the medium directly affects the rate of dissolution and the form of paracetamol: in the stomach (pH ~1.67) it quickly decomposes and is absorbed in a non-ionized form, and in the intestine (pH ~7.9) the decay slows down, and the molecule is predominantly ionized, which determines the different kinetic profiles of its action. The main absorption of paracetamol occurs in the intestine due to its large surface area and optimal balance of its ionic forms, despite its faster decomposition in the acidic environment of the stomach.

Keywords: paracetamol, hydrolysis, conductometry, conductometric titration, hydrolysis of paracetamol.

References

1. Paracetamol. FS.2.1.0154: pharmacopoeial monograph: approved by the Ministry of Health of Russia // State Pharmacopoeia of the Russian Federation. – XV ed. – Moscow, 2022. – Vol. 1. – P. 1–3.
2. Anosova L.S., Agafonov A.M. Chemical-toxicological study of paracetamol and drotaverine when taking combined drugs // Innova. – 2022. – No. 1 (26). – P. 6–13.
3. Biodegradation of Paracetamol and Enzymatic Activity of a Fungal Complex of the Genus *Pleurotus* / M.M. Mikheeva, I.A. Shilnikov, D.A. Smetanin // Theoretical and Applied Ecology. – 2023. – No. 3. – P. 164–170.
4. Khasanova R.I., Khasanov A.I., Bugaeva K.R. Calculation of the theoretical titration curve of dibasic malonic acid to the first equivalence point // Journal or Collection Title (not specified in the original text). – Year of publication (not specified in the original text). – P. 95–99.
5. Ilchenko A.A., Selezneva E. Ya. Computer pH-metry of the stomach and esophagus: methodological recommendations No. 15 / A.A. Ilchenko, E. Ya. Selezneva; Health Committee of the Moscow Government, Central Research Institute of Gastroenterology; [reviewers: Yu.V. Vasilyev, A.P. Pogromov]. – Moscow, 2000. – 32 p.

Белякова Анастасия Григорьевна,

к.м.н., доцент, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского
E-mail: gavrysh@mail.ru

Аметов Эдем Назимович,

студент Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского
E-mail: edemametov6@gmail.com

Клюев Артем Игоревич,

студент Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского
E-mail: artem.kluev77@mail.ru

Мустафаев Зекерья Мустафаевич,

студент Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского
E-mail: zekeryamustafaev@icloud.com

Статья посвящена актуальной проблеме – фармакологической коррекции немоторных симптомов болезни Паркинсона, которые зачастую определяют степень инвалидизации и качество жизни пациентов. В работе проводится детальный анализ терапевтических стратегий при депрессивных расстройствах, когнитивном дефиците и нарушениях цикла «сон-бодрствование». Рассматриваются механизмы действия и доказательная база ключевых фармакологических агентов: агонистов дофаминовых рецепторов, ингибиторов холинэстеразы и препаратов для нормализации сна. Особое внимание уделено безопасности терапии и необходимости междисциплинарного подхода к ведению пациентов с мультисистемной нейродегенерацией.

Ключевые слова: Болезнь Паркинсона, немоторные симптомы, нейропсихиатрия, депрессия, деменция, нарушения сна, прамипексол, ривастигмин, мелатонин.

Введение

Болезнь Паркинсона (БП) традиционно рассматривается в рамках классической триады двигательных нарушений: гипокинезии, ригидности и тремора покоя. Однако современная концепция заболевания определяет БП как мультисистемную нейродегенерацию, затрагивающую не только дофаминергические структуры черной субстанции, но и широкие нейрональные сети, ответственные за когнитивные функции, эмоциональный фон и регуляцию циклов сна [1,2,3,4].

Немоторные симптомы (НМС), такие как депрессия, деменция и расстройства сна, выявляются практически у 90% пациентов на различных этапах заболевания, а в ряде случаев выступают в качестве продромальных маркеров, опережая двигательный дефицит на десятилетия. Актуальность фармакологической коррекции НМС обусловлена их доминирующим влиянием на качество жизни, социальную дезадаптацию и раннюю инвалидизацию, что зачастую превосходит по значимости моторные расстройства [5,6]. В данной работе рассматриваются современные терапевтические стратегии, направленные на компенсацию нейромедиаторного дисбаланса и минимизацию психоневрологических осложнений паркинсонизма.

Материалы и методы

Информационный поиск проводился в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar и eLibrary. Глубина поиска составила 9 лет (с 2016 по 2025 гг.), что позволило проанализировать как фундаментальные исследования, так и новейшие клинические рекомендации.

Для поиска использовались ключевые слова на русском и английском языках: «болезнь Паркинсона» (Parkinson's disease), «немоторные симптомы» (non-motor symptoms), «депрессия» (depression), «деменция» (dementia), «нарушения сна» (sleep disorders), «фармакотерапия» (pharmacotherapy).

Критериями включения в обзор послужили:

1. Рандомизированные контролируемые исследования (РКИ).
2. Мета-анализы и систематические обзоры.
3. Клинические рекомендации международных профессиональных сообществ (MDS, EFNS).

Основная часть

Коррекция депрессивных расстройств

Депрессия является наиболее распространенным аффективным нарушением при болезни Паркинсона (БП), поражающим, по разным данным, от 35% до 50% пациентов. Патогенез депрессии при БП носит комплексный характер: она рассматривается не только как психологическая реакция на хроническое инвалидизирующее заболевание, но и как прямое следствие нейродегенеративного процесса в серотонинергических и норадренергических системах мозга [3,7,8].

Первым этапом коррекции депрессивных состояний является адекватный контроль моторных симптомов. В ряде случаев депрессия тесно связана с периодами «выключения» (off-периоды), когда снижение уровня дофамина коррелирует с падением настроения [9].

Среди противопаркинсонических препаратов особый интерес представляют агонисты дофаминовых рецепторов, в частности прамипексол. Благодаря высокому сродству к D3-рецепторам лимбической системы, прамипексол обладает доказанной антидепрессивной активностью, что позволяет рассматривать его как препарат выбора у пациентов с сочетанием двигательных нарушений и депрессии легкой или умеренной степени [9,10].

При сохранении аффективной симптоматики на фоне стабильной дофаминергической терапии показано назначение специфических антидепрессантов:

1. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС): Сертралин, пароксетин и циталопрам являются препаратами первой линии благодаря благоприятному профилю безопасности. Они эффективно купируют тревожно-депрессивный синдром, однако требуют осторожности

из-за потенциального риска усиления тремора или развития синдрома гипонатриемии у пожилых пациентов [1,3,6,18].

2. Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН): Венлафаксин и дулоксетин демонстрируют высокую эффективность, особенно в случаях, когда депрессия сопровождается хроническим болевым синдромом, характерным для БП [1,13].

Трициклические антидепрессанты: амитриптилин и дезипрамин также показывают высокую антидепрессивную эффективность при БП, зачастую превосходящую СИОЗС. Однако их использование существенно ограничено выраженными холинолитическими побочными эффектами: сухость во рту, задержка мочи и прогрессирования когнитивного дефицита. К тому же их назначение оправдано лишь у пациентов молодого возраста при отсутствии признаков деменции и серьезных сердечно-сосудистых патологий [9].

Терапия когнитивных нарушений и деменции у пациентов с паркинсонизмом

Когнитивные нарушения (КН) развиваются у большинства пациентов с болезнью Паркинсона на развернутых стадиях заболевания. Спектр расстройств варьируется от легких когнитивных нарушений до тяжелой деменции, которая характеризуется выраженным дефицитом внимания, исполнительных функций и зрительно-пространственных навыков при относительной сохранности памяти на ранних этапах [13].

Основным звеном патогенеза КН при паркинсонизме является выраженный дефицит ацетилхолина, связанный с дегенерацией нейронов ядра Мейнерта. Это обосновывает применение **ингибиторов холинэстеразы (ИХЭ)** как «золотого стандарта» терапии [13].

ИХЭ демонстрируют доказанную эффективность в улучшении внимания, исполнительных функций и снижении выраженности нейропсихиатрических симптомов.

Ривастигмин: Единственный препарат, имеющий официальное одобрение (FDA и EMA) специально для лечения деменции при БП. Применяется как в пероральной форме, так и в виде трансдермальной терапевтической системы. Трансдермальная форма предпочтительнее, так как обеспечивает стабильную концентрацию вещества в плазме и реже вызывает побочные эффекты со стороны ЖКТ [13].

Донепезил: Также широко используется в клинической практике. Он обладает хорошей переносимостью и сопоставимой с ривастигмином эффективностью в отношении коррекции когнитивного дефицита [13].

Мемантин рассматривается как препарат второй линии или дополнение к ИХЭ при умеренной и тяжелой деменции. Механизм его действия связан с модуляцией глутаматергической передачи. Клинические исследования показывают, что мемантин способствует стабилизации когнитивных функций и может уменьшать поведенческие нарушения, однако его влияние на общие когнитивные баллы часто менее выражено, чем у ИХЭ [13].

Критически важным аспектом терапии КН является пересмотр текущей схемы лечения моторных симптомов. Ряд препаратов может усугублять когнитивный дефицит и провоцировать психозы [5].

Нарушения сна и бодрствования при паркинсонизме: стратегии фармакологической коррекции

Нарушения сна и бодрствования выявляются у 60–90% пациентов с болезнью Паркинсона и другими формами паркинсонизма. Они тесно коррелируют с тяжестью депрессии и скоростью прогрессирования деменции, создавая «порочный круг», который существенно снижает качество жизни и увеличивает нагрузку на ухаживающих лиц [10,14,17].

Основной причиной фрагментации сна является возвращение двигательных симптомов в ночное время [15].

Назначение препаратов леводопы с контролируемым высвобождением или использование ротигоинового пластыря позволяет поддерживать стабильную концентрацию дофамина в течение ночи [15].

Учитывая коморбидность с депрессией, препаратами выбора часто становятся тразодон или мirtазапин. Они улучшают архитектуру сна, не вызывая когнитивного снижения, в отличие от классических бензодиазепинов [15].

В лечении расстройства поведения в фазе сна с быстрыми движениями глаз основными препаратами является мелатонин – препарат первой линии благодаря благоприятному профилю безопасности, что особенно важно при сопутствующей деменции и клоназепам, который требует осторожности у пожилых пациентов из-за риска падений, усугубления синдрома апноэ и когнитивной спутанности [15].

Результаты

Анализ современных клинических данных и терапевтических стратегий подтверждает, что фармакологическая коррекция немоторных симптомов при паркинсонизме требует строго персонализированного подхода, учитывающего взаимное влияние когнитивных, аффективных и сомни-

ческих нарушений. В ходе обобщения результатов исследований были сделаны следующие ключевые выводы: 1. Своевременное включение в схему лечения ингибитора холинэстеразы ривастигмина позволяет значительно замедлить темпы нейродегенеративного когнитивного снижения и минимизировать выраженность зрительных галлюцинаций, обусловленных холинергическим дефицитом [13,15,16].

2. Прамипексол проявляет высокую эффективность в терапии депрессивных состояний легкой и средней степени тяжести при болезни Паркинсона. Его прямое антидепрессивное действие обусловлено селективной стимуляцией D3-рецепторов лимбической системы, что часто исключает необходимость назначения дополнительных антидепрессантов [13,15,16].

3. Для коррекции нарушений инициации сна и специфических расстройств поведения в фазе быстрого сна приоритетным является использование мелатонина. Он способствует восстановлению физиологической архитектуры сна и нормализации циркадных ритмов. При этом для купирования ночной гипокинезии и «синдрома раннего утреннего выключения» целесообразно применение ротигоина, который обеспечивает концепцию постоянной дофаминергической стимуляции в течение 24 часов [13,15,16].

Заключение

Современная стратегия лечения паркинсонизма должна быть направлена на достижение баланса между контролем моторики и минимизацией немоторных осложнений. Нередко коррекция одного симптома может усугубить. Будущее терапии лежит в плоскости создания мультимодальных препаратов и использования систем лекарств, обеспечивающих стабильную концентрацию действующих веществ [15,16].

Литература

1. Seppi K, Ray Chaudhuri K, Coelho M, et al. Update on treatments for nonmotor symptoms of Parkinson's disease-an evidence-based medicine review. *Mov Disord.* 2019;34(2):180–198. doi:10.1002/mds.27602
2. Levin J, Kurz A, Arzberger T, Giese A, Höglinger GU. The Differential Diagnosis and Treatment of Atypical Parkinsonism. *Dtsch Arztebl Int.* 2016;113(5):61–69. doi:10.3238/arztebl.2016.0061
3. Conn H, Jankovic J. Drug-induced parkinsonism: diagnosis and treatment. *Expert Opin Drug Saf.* 2024;23(12):1503–1513. doi:10.1080/14740338.2024.2418950
4. Hayes MT. Parkinson's Disease and Parkinsonism. *Am J Med.* 2019;132(7):802–807. doi:10.1016/j.amjmed.2019.03.001
5. Riboldi GM, Frattini E, Monfrini E, Frucht SJ, Di Fonzo A. A Practical Approach to Early-Onset Parkinsonism. *J Parkinsons Dis.* 2022;12(1):1–26. doi:10.3233/JPD-212815
6. Banerjee P, Saha I, Sarkar D, Maiti AK. Contributions and Limitations of Mitochondria-Targeted and Non-Targeted Antioxidants in the Treatment of Parkinsonism: an Updated Review. *Neurotox Res.* 2022;40(3):847–873. doi:10.1007/s12640-022-00501-x
7. Holm H, Gundersen V, Dietrichs E. Vascular parkinsonism. *Vaskulær parkinsonisme. Tidsskr Nor Lægeforen.* 2023;143(7):10.4045/tidsskr.22.0539. Published 2023 May 4. doi:10.4045/tidsskr.22.0539
8. Mermelstein S, Barbosa P, Kaski D. Neurological gait assessment. *Pract Neurol.* 2024;24(1):11–21. Published 2024 Jan 23. doi:10.1136/pn-2023-003917
9. Goldman JG. Non-motor Symptoms and Treatments in Parkinson's Disease. *Neurol Clin.* 2025;43(2):291–317. doi:10.1016/j.ncl.2024.12.008
10. Cabreira V, Massano J. Doença de Parkinson: Revisão Clínica e Atualização [Parkinson's Disease: Clinical Review and Update]. *Acta Med Port.* 2019;32(10):661–670. doi:10.20344/amp.11978
11. Taddei RN, Spinnato F, Jenner P. New Symptomatic Treatments for the Management of Motor and Nonmotor Symptoms of Parkinson's Disease. *Int Rev Neurobiol.* 2017;132:407–452. doi:10.1016/bs.irn.2017.03.004
12. Bloem BR, Okun MS, Klein C. Parkinson's disease. *Lancet.* 2021;397(10291):2284–2303. doi:10.1016/S0140-6736(21)00218-X
13. Armstrong MJ, Okun MS. Diagnosis and Treatment of Parkinson Disease: A Review. *JAMA.* 2020;323(6):548–560. doi:10.1001/jama.2019.22360
14. Church FC. Treatment Options for Motor and Non-Motor Symptoms of Parkinson's Disease. *Biomolecules.* 2021;11(4):612. Published 2021 Apr 20. doi:10.3390/biom11040612
15. Iranzo A, Cohen De Cock V, Fantini ML, Pérez-Carbonell L, Trotti LM. Sleep and sleep disorders in people with Parkinson's disease. *Lancet Neurol.* 2024;23(9):925–937. doi:10.1016/S1474-4422(24)00170-4
16. Hershey LA, Coleman-Jackson R. Pharmacological Management of Dementia with Lewy Bodies. *Drugs Aging.* 2019;36(4):309–319. doi:10.1007/s40266-018-00636-7
17. Reich SG, Savitt JM. Parkinson's Disease. *Med Clin North Am.* 2019;103(2):337–350. doi:10.1016/j.mcna.2018.10.014

18. Sharma P, Mittal P. Paraquat (herbicide) as a cause of Parkinson's Disease. *Parkinsonism Relat Disord.* 2024;119:105932. doi:10.1016/j.parkreldis.2023.105932

PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF NON-MOTOR MANIFESTATIONS OF PARKINSONISM: DEPRESSION, DEMENTIA, AND SLEEP DISORDERS

Belyakova A.G., Ametov E.N., Klyuev A.I., Mustafayev Z.M.

Order of the Red Banner of Labor, S.I. Georgievsky Medical Institute

The article is devoted to an urgent problem – the pharmacological correction of non-motor symptoms of Parkinson's disease, which often determine the degree of disability and the quality of life of patients. The paper provides a detailed analysis of therapeutic strategies for depressive disorders, cognitive deficits, and sleep-wake cycle disorders. The mechanisms of action and evidence base of key pharmacological agents are considered: dopamine receptor agonists, cholinesterase inhibitors and drugs for sleep normalization. Special attention is paid to the safety of therapy and the need for an interdisciplinary approach to the management of patients with multisystem neurodegeneration.

Keywords: Parkinson's disease, non-motor symptoms, neuropsychiatry, depression, dementia, sleep disorders, pramipexole, rivastigmine, melatonin.

References

1. Seppi K, Ray Chaudhuri K, Coelho M, et al. Update on treatments for nonmotor symptoms of Parkinson's disease-an evidence-based medicine review. *Mov Disord.* 2019;34(2):180–198. doi:10.1002/mds.27602
2. Levin J, Kurz A, Arzberger T, Giese A, Höglinger GU. The Differential Diagnosis and Treatment of Atypical Parkinsonism. *Dtsch Arztebl Int.* 2016;113(5):61–69. doi:10.3238/arztebl.2016.0061
3. Conn H, Jankovic J. Drug-induced parkinsonism: diagnosis and treatment. *Expert Opin Drug Saf.* 2024;23(12):1503–1513. doi:10.1080/14740338.2024.2418950
4. Hayes MT. Parkinson's Disease and Parkinsonism. *Am J Med.* 2019;132(7):802–807. doi:10.1016/j.amjmed.2019.03.001

5. Riboldi GM, Frattini E, Monfrini E, Frucht SJ, Di Fonzo A. A Practical Approach to Early-Onset Parkinsonism. *J Parkinsons Dis.* 2022;12(1):1–26. doi:10.3233/JPD-212815
6. Banerjee P, Saha I, Sarkar D, Maiti AK. Contributions and Limitations of Mitochondria-Targeted and Non-Targeted Antioxidants in the Treatment of Parkinsonism: an Updated Review. *Neurotox Res.* 2022;40(3):847–873. doi:10.1007/s12640-022-00501-x
7. Holm H, Gundersen V, Dietrichs E. Vascular parkinsonism. *Vaskulær parkinsonisme.* *Tidsskr Nor Lægeforen.* 2023;143(7):10.4045/tidsskr.22.0539. Published 2023 May 4. doi:10.4045/tidsskr.22.0539
8. Mermelstein S, Barbosa P, Kaski D. Neurological gait assessment. *Pract Neurol.* 2024;24(1):11–21. Published 2024 Jan 23. doi:10.1136/pn-2023-003917
9. Goldman JG. Non-motor Symptoms and Treatments in Parkinson's Disease. *Neurol Clin.* 2025;43(2):291–317. doi:10.1016/j.ncl.2024.12.008
10. Cabreira V, Massano J. Doença de Parkinson: Revisão Clínica e Atualização [Parkinson's Disease: Clinical Review and Update]. *Acta Med Port.* 2019;32(10):661–670. doi:10.20344/amp.11978
11. Taddei RN, Spinnato F, Jenner P. New Symptomatic Treatments for the Management of Motor and Nonmotor Symptoms of Parkinson's Disease. *Int Rev Neurobiol.* 2017;132:407–452. doi:10.1016/bs.irn.2017.03.004
12. Bloem BR, Okun MS, Klein C. Parkinson's disease. *Lancet.* 2021;397(10291):2284–2303. doi:10.1016/S0140-6736(21)00218-X
13. Armstrong MJ, Okun MS. Diagnosis and Treatment of Parkinson Disease: A Review. *JAMA.* 2020;323(6):548–560. doi:10.1001/jama.2019.22360
14. Church FC. Treatment Options for Motor and Non-Motor Symptoms of Parkinson's Disease. *Biomolecules.* 2021;11(4):612. Published 2021 Apr 20. doi:10.3390/biom11040612
15. Iranzo A, Cochen De Cock V, Fantini ML, Pérez-Carbonell L, Trotti LM. Sleep and sleep disorders in people with Parkinson's disease. *Lancet Neurol.* 2024;23(9):925–937. doi:10.1016/S1474-4422(24)00170-4
16. Hershey LA, Coleman-Jackson R. Pharmacological Management of Dementia with Lewy Bodies. *Drugs Aging.* 2019;36(4):309–319. doi:10.1007/s40266-018-00636-7
17. Reich SG, Savitt JM. Parkinson's Disease. *Med Clin North Am.* 2019;103(2):337–350. doi:10.1016/j.mcna.2018.10.014
18. Sharma P, Mittal P. Paraquat (herbicide) as a cause of Parkinson's Disease. *Parkinsonism Relat Disord.* 2024;119:105932. doi:10.1016/j.parkreldis.2023.105932

Радиофарм-синтез: мобильный комплекс по производству ультракороткоживущих радиофармпрепаратов

Краевская Анна Геннадьевна,

студент ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

Изутина Светлана Викторовна,

к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

Актуальность определяется тем, что в клинической практике РФ ПЭТ-диагностика в значительной степени ограничена применением ^{18}F -фтордезоксиглюкозы (^{18}F -ФДГ; $T_{1/2} \approx 110$ мин), что обусловлено централизованной моделью производства и неизбежными потерями активности при транспортировке. Ультракороткоживущие радионуклиды ^{15}O ($T_{1/2} \approx 2$ мин), ^{13}N ($T_{1/2} \approx 10$ мин) и ^{11}C ($T_{1/2} \approx 20$ мин) в рамках такой логистики практически недоступны, несмотря на их высокую клиническую специфичность в кардиологии, нейровизуализации и онкологии. Цель исследования – обосновать технологическую платформу локального (on-site) производства ультракороткоживущих радиофармпрепаратов (РФП) в медицинской организации посредством мобильного модульного комплекса контейнерного типа и охарактеризовать ожидаемые клинко-организационные эффекты и параметры радиационной безопасности. Представлена концепция комплекса, включающего компактный циклотрон (энергия протонов 11–18 МэВ), мишенную систему для газовых мишеней, автоматизированный радиохимический синтез и ускоренный контроль качества. Показано, что многобарьерная биологическая защита (тяжёлый бетон, свинец, полиэтилен), герметизация контуров, каскадная вентиляция с HEPA H14 и дистанционное управление обеспечивают мощность дозы на границе модуля $<0,3$ мкЗв/ч и годовую дозу персонала <1 мЗв/год при нормативном пределе 20 мЗв/год. Реализация on-site модели расширяет номенклатуру РФП (^{15}O -вода, ^{13}N -аммиак, ^{11}C -метионин, ^{11}C -PiB и др.), повышает обоснованность дифференциальной диагностики по сравнению с ^{18}F -ФДГ и сводит логистические потери активности к нулю.

Ключевые слова: радиофармпрепараты; ПЭТ; ^{15}O -вода; ^{13}N -аммиак; ^{11}C -метионин; ^{11}C -PiB; ^{18}F -ФДГ; мобильный циклотрон; on-site производство; радиационная безопасность; GMP; МАГАТЭ.

Введение

Позитронно-эмиссионная томография является базовой технологией молекулярной визуализации, позволяющей количественно и качественно оценивать патологические процессы по распределению РФП. Однако практическая реализация метода в значительной мере определяется доступностью радионуклидов и инфраструктуры их получения. При доминировании централизованного производства клиническое применение ограничивается радионуклидами с относительно длительным периодом полураспада, прежде всего ^{18}F , что приводит к высокой доле исследований с использованием ^{18}F -ФДГ. Данный РФП отражает общий метаболизм глюкозы и потому не обеспечивает достаточной специфичности в ситуациях, где необходимо различать опухолевую ткань, воспаление и инфекцию, а также проводить специализированные исследования в кардиологии и неврологии. Напротив, ультракороткоживущие радионуклиды ^{15}O , ^{13}N и ^{11}C , являющиеся основными биоэлементами, позволяют формировать таргетные диагностические подходы: оценку перфузии миокарда и мозгового кровотока (^{15}O -вода), высокоточное выявление ишемии и микроваскулярной дисфункции (^{13}N -аммиак), визуализацию опухолей головного мозга и дифференциацию рецидивов (^{11}C -метионин), а также выявление амилоидной патологии при болезни Альцгеймера на ранних этапах (^{11}C -PiB). Физические ограничения транспортировки при $T_{1/2}$ 2–20 минут делают их использование в условиях централизованной логистики нецелесообразным, что обосновывает необходимость on-site производства непосредственно в медицинской организации.

Материалы и методы

Работа выполнена в формате научно-технического обоснования и системного анализа платформы локального синтеза ультракороткоживущих РФП на базе автономного контейнерного модуля «РАДИОФАРМ-СИНТЕЗ», интегрируемого в инфраструктуру медицинского учреждения. Технологическая схема включает ускорение протонов в компактном циклотроне до энергии 11–18 МэВ с последующим облучением газовых мишеней и получением радионуклидов в типовых ядерных реакциях (в частности, $^{14}\text{N}(p, \alpha)^{11}\text{C}$; $^{15}\text{N}(p, n)^{15}\text{O}$; $^{13}\text{C}(p, n)^{13}\text{N}$; $^{18}\text{O}(p, n)^{18}\text{F}$). Далее радионуклид включается в молекулярный носитель в автоматизированном синтезаторе, размещённом в защищённых «горячих камерах», при дистанционном управлении и регистрации параметров (SCADA; контроль более 500 параметров технологического процесса). Контроль качества предусматривает получение ключевых показателей (радионуклидная и радиохимическая чистота, удельная активность, pH и др.) в течение 5–7 минут после синтеза, при том что стерильность подтверждается ретроспективно в соответствии с фармацевтической практикой. Общая продолжительность цикла «наработка-синтез-контроль-выпуск» составляет 15–30 минут, что соответствует клиническим ограничениям применения ультракороткоживущих РФП. Оценка радиационной безопасности проведена по проектным дозиметрическим характеристикам с учётом принципов «время-расстояние-защита», влияния автоматизации на минимизацию пребывания персонала в контролируемых зонах и применения инженерных барьеров. В качестве критериев приняты мощность дозы на границе модуля ($<0,3$ мкЗв/ч) и годовая эффективная доза персонала (<1 мЗв/год) при сопоставлении с НРБ-99/2009 (20 мЗв/год для категории А). Нормативно-методологическая основа рассмотрения включает подходы и требования стандартов МАГАТЭ (SSR-6, GSR Part 3), российских норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010) и требований GMP.

Литературный обзор

В фундаментальных руководствах по ядерной медицине подчёркивается, что доступность ПЭТ-радионуклидов определяется периодом полураспада и наличием инфраструктуры циклотрона и радиохимии, а клиническое применение РФП требует стандартизированного контроля качества. В клинических исследованиях и обзорах ^{15}O -вода описывается как референтный инструмент количественной оценки перфузии миокарда и, в ряде задач, церебрального кровотока; ^{13}N -аммиак рассматривается как один из наиболее валидированных перфузионных РФП с высокой диагностической информативностью при ишемии и микроваскулярной

дисфункции. В нейроонкологии ^{11}C -метионин демонстрирует преимущества при визуализации опухолей головного мозга и дифференциации рецидива от посттерапевтических изменений, где ^{18}F -ФДГ ограничена низкой специфичностью. В нейровизуализации нейродегенеративных заболеваний ^{11}C -PiB обеспечивает визуализацию β -амилоидных отложений и тем самым расширяет возможности раннего выявления и стратификации пациентов. Совокупность данных указывает, что ключевым ограничителем внедрения указанных РФП является не дефицит клинических показаний, а технологический барьер отсутствия on-site производства при ультракоротком $T_{1/2}$.

Результаты

Переход от централизованной схемы «производство – транспортировка – клиника» к on-site модели «производство в клинике – немедленное применение» устраняет логистическое ограничение для радионуклидов с $T_{1/2}$ 2–20 минут и сводит потери активности при доставке к нулю. Это формирует предпосылки для внедрения мультирадионуклидной номенклатуры (^{15}O , ^{13}N , ^{11}C наряду с ^{18}F) и расширения спектра ПЭТ-исследований за счёт высокоспецифичных РФП. Ожидаемые клинические эффекты включают повышение диагностической обоснованности в кардиологии за счёт количественной оценки перфузии, жизнеспособности миокарда и коронарного резерва при применении ^{15}O -воды и ^{13}N -аммиака; расширение возможностей ранней нейрорадиологии при использовании ^{11}C -PiB для визуализации амилоидной патологии; повышение точности нейроонкологической визуализации при применении ^{11}C -метионина для оценки опухолевой ткани и дифференциации рецидивов от воспалительных и постлучевых изменений. Радиационная безопасность комплекса обеспечивается сочетанием инженерных и организационных мер: многобарьерной биологической защитой (тяжёлый бетон порядка 80 см для нейтронной компоненты, свинец для γ -экранирования, полиэтилен для замедления нейтронов), герметизацией технологических контуров, каскадной вентиляции с разрежением и НЕРА-фильтрацией H14 ($\geq 99,995\%$ для частиц $\geq 0,3$ мкм), непрерывным радиационным мониторингом и максимальной автоматизацией, исключающей ручные операции в контролируемой зоне. Проектные дозиметрические характеристики составляют: мощность эквивалентной дозы на границе контейнерного модуля $<0,3$ мЗв/ч (уровень, сопоставимый с естественным фоном) и годовая эффективная доза персонала категории А <1 мЗв/год, что более чем в 20 раз ниже предельно допустимой дозы 20 мЗв/год по НРБ-99/2009. В организационно-экономическом аспекте контейнерная архитектура по сравнению со стационарным радиохимическим производством предполагает сокращение сроков ввода и требований к площадям (порядка 100–150 м²), а также возможность перехода к сервисной модели эксплуатации, снижая барьер внедрения on-site производства в клинических центрах.

Литература

1. Национальный доклад по ядерной медицине Российской Федерации. Москва: Росатом; 2023.
2. Брюховецкий А.С. Физико-технические основы производства короткоживущих радионуклидов.
3. Медицинская радиология. 2022;67(3):45–52. Cherry S.R., Sorenson J.A., Phelps M.E.
4. Physics in Nuclear Medicine. 4th ed. Philadelphia: Saunders; 2012. Villani S. Uranium Enrichment.
5. Topics in Applied Physics. Berlin: Springer; 1979. Vol. 35. Bergmann S.R., Herrero P., Sciacca R., Markham M., Gropler C.J.
6. Characterization of altered myocardial blood flow with PET and ^{15}O -water. Journal of Nuclear Cardiology. 2020;27(6):1948–1960.

7. Danad I., Uusitalo V., Kero T., Knuuti J. Quantitative assessment of myocardial perfusion with ^{13}N -ammonia PET.
8. Journal of the American College of Cardiology. 2021;77(3):273–287. Glaudemans A.W., Enting R.H., Heesters M.A., de Vries E.G.E., van der Zee A.
9. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2013;40(4):615–635. Klunk W.E., Engler H., Nordberg A., Wang Y., Blomqvist G.
10. Imaging brain amyloid in Alzheimer's disease with Pittsburgh Compound- B. Annals of Neurology. 2004;55(3):306–319.
11. Radiopharmaceuticals Market Size. Global Market Insights. 2024; Report ID: GMI5846.

RADIOPHARM-SYNTHESIS: A MOBILE COMPLEX FOR THE PRODUCTION OF ULTRA-SHORT-LIVED RADIOPHARMACEUTICALS

Kraevskaia A.G., Izutina S.V.

Plekhanov Russian University of Economics

The relevance is determined by the fact that in the clinical practice of the Russian Federation PET diagnostics is largely limited to the use of ^{18}F -fluorodeoxyglucose (^{18}F -FDG; $T_{1/2} \approx 110$ min), which is due to a centralized production model and inevitable losses of activity during transportation. Ultra-short-lived radionuclides ^{15}O ($T_{1/2} \approx 2$ min), ^{13}N ($T_{1/2} \approx 10$ min) and ^{11}C ($T_{1/2} \approx 20$ min) within such logistics are practically inaccessible, despite their high clinical specificity in cardiology, neuroimaging and oncology. The aim of the study is to substantiate a technological platform for local (on-site) production of ultra-short-lived radiopharmaceuticals (RPs) in a medical organization by means of a mobile modular container-type complex and to characterize the expected clinical and organizational effects and radiation safety parameters. The concept of the complex is presented, including a compact cyclotron (proton energy 11–18 MeV), a target system for gas targets, automated radiochemical synthesis and accelerated quality control. It is shown that a multi-barrier biological shielding system (heavy concrete, lead, polyethylene), sealing of circuits, cascade ventilation with HEPA H14 and remote control ensure a dose rate at the module boundary of <0.3 $\mu\text{Sv/h}$ and an annual personnel dose of <1 mSv/year with a regulatory limit of 20 mSv/year. Implementation of the on-site model expands the range of RPs (^{15}O -water, ^{13}N -ammonia, ^{11}C -methionine, ^{11}C -PiB, etc.), increases the validity of differential diagnosis compared with ^{18}F -FDG and reduces logistical activity losses to zero.

Keywords: radiopharmaceuticals; PET; ^{15}O -water; ^{13}N -ammonia; ^{11}C -methionine; ^{11}C -PiB; ^{18}F -FDG; mobile cyclotron; on-site production; radiation safety; GMP; IAEA.

References

1. National Report on Nuclear Medicine of the Russian Federation. Moscow: Rosatom; 2023.
2. Bryukhovetsky A.S. Physical and Technical Principles of Production of Short-Lived Radionuclides.
3. Medical Radiology. 2022;67(3):45–52. Cherry S.R., Sorenson J.A., Phelps M.E.
4. Physics in Nuclear Medicine. 4th ed. Philadelphia: Saunders; 2012. Villani S. Uranium Enrichment.
5. Topics in Applied Physics. Berlin: Springer; 1979. Vol. 35. Bergmann S.R., Herrero P., Sciacca R., Markham M., Gropler C.J.
6. Characterization of altered myocardial blood flow with PET and ^{15}O -water. Journal of Nuclear Cardiology. 2020;27(6):1948–1960.
7. Danad I., Uusitalo V., Kero T., Knuuti J. Quantitative assessment of myocardial perfusion with ^{13}N -ammonia PET.
8. Journal of the American College of Cardiology. 2021;77(3):273–287. Glaudemans A.W., Enting R.H., Heesters M.A., de Vries E.G.E., van der Zee A.
9. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2013;40(4):615–635. Klunk W.E., Engler H., Nordberg A., Wang Y., Blomqvist G.
10. Imaging brain amyloid in Alzheimer's disease with Pittsburgh Compound- B. Annals of Neurology. 2004;55(3):306–319.
11. Radiopharmaceuticals Market Size. Global Market Insights. 2024; Report ID: GMI5846.

Норбоев Мунир Дилшодович,

студент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
E-mail: muniraroev@gmail.com

Евгений Александрович Ларионов,

доцент кафедры химии, кандидат химических наук, Калужский
государственный университет им. К.Э. Циолковского
E-mail: lealvmlee@mail.ru

Валентина Михайловна Ларионова,

заведующий кафедрой химии, доцент, доцент кафедры химии,
кандидат химических наук, Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского
E-mail: lealvmlee@mail.ru

Троксерутин и феруловая кислота известны как биологически активные вещества. Троксерутин входит в состав некоторых лекарственных препаратов, а феруловая кислота в состав косметических изделий. Используя их в качестве фотозащитных средств в составе солнцезащитных композиций, можно получать как профилактический фармакологический эффект, так и защитный от УФ излучения. В настоящей работе исследованы троксерутин и феруловая кислота и их смеси методами УФ-спектроскопии. Смеси не показали преимуществ перед индивидуальными веществами. Для оценки их фотозащитных свойств по полученным электронным спектрам рассчитывался фактор поглощения (ФП).

Ключевые слова: фотозащита, фотопротекция, УФ-спектроскопия, УФ-спектр, солнцезащитные свойства.

Введение

Как троксерутин, так и феруловая кислота обладают биологически активными свойствами. Троксерутин – производное рутина, известный венотоник и венопротектор, входящий в состав различных лекарственных препаратов [1, 2, 3, 4]. Вопросы медицинского применения феруловой кислоты также интенсивно изучаются [5, 6, 7, 8].

Если вещество является биологически активным, находит применение в медицине, а также обладает фотозащитными свойствами, то разработка композиций, выполняющих как фотозащитную функцию, так и функцию профилактическую, повышающую функциональные возможности организма, представляет интерес.

Несмотря на то, что вопросам физиологического действия троксерутина и феруловой кислоты посвящено достаточно много публикаций, фотозащитные свойства многих биологически активных веществ изучены неполно.

Для оценки фотозащитных свойств веществ методом УФ-спектроскопии многие исследователи используют такие известные показатели как критическую длину волны, рассчитываемую по спектру поглощения по формуле [9–11]:

$$\int_{290}^{A_{\text{ср}}} A(\lambda) d\lambda = 0,9 \cdot \int_{290}^{400 \text{ нм}} A(\lambda) d\lambda,$$

показатель **УФ-А/УФ-Б**, рассчитываемый по формуле [9–11]:

$$\frac{УФ-А}{УФ-Б} = \frac{\int_{320 \text{ нм}}^{400 \text{ нм}} A(\lambda) d\lambda}{\int_{290 \text{ нм}}^{320 \text{ нм}} A(\lambda) d\lambda},$$

а также фактор солнечной защиты $SPF_{\text{in vitro}}$, рассчитываемый по формуле [9–11]:

$$SPF_{\text{in vitro}} = CF \cdot \sum_{290}^{320} EE(\lambda) \cdot I(\lambda) \cdot A(\lambda),$$

где: CF = 10 (коэффициент); $A(\lambda)$ – оптическая плотность вещества при длине волны λ ; $EE(\lambda) \cdot I(\lambda)$ – константа, определенная экспериментально, для диапазона 290–400 нм значения приведены в работах [9–11]. Описанные выше показатели широко используются для оценки фотозащитных свойств веществ.

Однако в диссертации Беляковой А.В. [12] приведен интересный, на наш взгляд, способ оценки фотозащитных свойств при помощи так называемого фактора поглощения (**ФП**) для диапазона длин волн 260–400 нм. Нами были внесены некоторые изменения в расчетную формулу. Основания для этого и сами полученные формулы приведены ниже.

Под коэффициентом пропускания (**T**) понимается отношение интенсивности монохроматического излучения, прошедшего через кювету с исследуемым раствором (**I**), к интенсивности излучения, падающего на кювету (**I₀**) [13]:

$$T = \frac{I}{I_0}.$$

Иногда вместо коэффициента пропускания **T** используют коэффициент поглощения (**1 – T**), равный [13]:

$$1 - T = \frac{(I_0 - I)}{I_0} = \frac{I_n}{I_0},$$

где I_n – интенсивность поглощенного света [13].

Пропускание (**T**), как и поглощение (**1 – T**) можно выразить как в долях единицы, так и в процентах.

Кроме того, нужно отметить, что в спектроскопических исследованиях чаще используется значение оптической плотности, обозначаемой в большинстве источников **A** (или **D**) и вычисляемой как **A = -lg(T)**.

Обозначив поглощение (**1 – T**) как **P**, и несколько видоизменив формулу для расчета фактора поглощения и выражая поглощение (**P**) в долях единицы, мы получили формулы для расчета фактора поглощения для диапазонов длин волн 280–320 нм (УФ-Б) и 320–400 нм (УФ-А), которые приведены ниже:

$$\Phi\Pi_{УФ-Б} = \frac{\int_{280}^{320} \Pi(\lambda) d\lambda}{1 \cdot (320 - 280)} \cdot 100\%;$$

$$\Phi\Pi_{УФ-А} = \frac{\int_{320}^{400} \Pi(\lambda) d\lambda}{1 \cdot (400 - 320)} \cdot 100\%.$$

Интегральная интенсивность поглощения растворенного вещества численно равна площади между осью абсцисс и контуром линии спектра в заданном диапазоне. В знаменателе приведенных формул используется интегральная интенсивность излучения, создаваемая источником прибора в указанном диапазоне длин волн. λ

Целью настоящей работы являлось:

- получение электронных спектров троксерутина, феруловой кислоты и их смесей в диапазоне длин волн 230–400 нм, представление их в координатах $\Pi=f(\lambda)$ и изучение их характеристик;
- оценка фотозащитных свойств исследованных объектов при использовании для расчетов такой характеристики как фактор поглощения – $\Phi\Pi$.

Экспериментальная часть

В эксперименте использовались вещества для производства косметики ручной работы, приобретенные на ресурсе naturfree.ru. Феруловая кислота (массовая доля основного вещества – 99,42%) и троксерутин (массовая доля основного вещества – 99,85%).

Первоначально получали “базовый” водный раствор троксерутина с концентрацией 0,5 г/л в мерной колбе на 1 л, из которого, в дальнейшем, путем разбавления бидистиллированной водой, получали растворы необходимых концентраций и растворы, содержащие как троксерутин, так и феруловую кислоту.

Навеску феруловой кислоты массой 0,5 г растворяли в горячей воде, затем раствор охлаждали и доводили до концентрации 0,5 г/л бидистиллированной водой в мерной колбе на 1 л. Далее “базовый” раствор разбавляли до нужных концентраций.

Полученные растворы помещали в кварцевые кюветы с длиной оптического пути 1 см и снимали спектры на спектрофотометре Lambda 35 (Perkin Elmer) в диапазоне длин волн 230–400 нм, в трех повторностях.

Полученные результаты конвертировались из формата *.sp в формат *.csv и затем обрабатывались при помощи программного обеспечения MS Excel.

Обсуждение результатов

Спектры поглощения троксерутина приведены на рисунке 1.




Рис. 1. Спектры поглощения (Π) водных растворов троксерутина: 1–0,01 мг/мл; 2–0,02 мг/мл; 3–0,03 мг/мл; 4–0,04 мг/мл; 5–0,05 мг/мл

В диапазоне длин волн 230–400 нм водные растворы троксерутина имеют два локальных минимума: 235 и 283 нм, и два локальных максимума на длинах волн 254 и 349 нм. От максимума на длине волны 254 нм в сторону более длинноволновой области можно наблюдать хорошо выраженное плечо (ступеньку).

Спектры поглощения феруловой кислоты представлены на рисунке 2.

Как видно из рисунка, в диапазоне длин волн 230–400 нм водные растворы феруловой кислоты хорошо поглощают в УФ-Б области и имеют по два локальных минимума: 256 нм и 296 нм, и два по локальных максимума 288 и 311 нм.

Спектры поглощения смесей троксерутина и феруловой кислоты приведены на рисунке 3.




Рис. 2. Спектры поглощения водных растворов феруловой кислоты: 1–0,01 мг/мл; 2–0,02 мг/мл; 3–0,03 мг/мл; 4–0,04 мг/мл; 5–0,05 мг/мл




Рис. 3. Спектры поглощения водных растворов, содержащих троксерутин (тр) и феруловую кислоту (фл): 1 – тр 0,006 мг/мл + фл 0,024 мг/мл; 2 – тр 0,004 мг/мл + фл 0,006 мг/мл; 3 – тр 0,006 мг/мл + фл 0,004 мг/мл; 4 – тр 0,008 мг/мл + фл 0,002 мг/мл; 5 – тр 0,002 мг/мл + фл 0,008 мг/мл

Результаты расчета фактора поглощения для троксерутина, феруловой кислоты и их смесей приведены в таблице 1.

Таблица 1. Значение фактора поглощения (Π) для троксерутина (тр), феруловой кислоты (фл) и их смесей.

Название вещества	Концентрация, мг/мл	Фактор поглощения ($\Phi\Pi$) для диапазона 280–320 нм, %	Фактор поглощения ($\Phi\Pi$) для диапазона 320–400 нм, %
Троксерутин	0,01	29,73	32,84
	0,02	47,43	44,14
	0,03	60,58	58,61
	0,04	69,16	69,72
	0,05	78,24	77,24
Феруловая кислота	0,01	30,02	6,01
	0,02	62,61	12,64
	0,03	49,36	9,75
	0,04	77,21	21,93
	0,05	82,47	24,18
Троксерутин + Феруловая кислота	тр 0,006; фл 0,024	77,44	23,01
	тр 0,004; фл 0,006	65,35	21,98
	тр 0,006; фл 0,004	57,55	26,57
	тр 0,008; фл 0,002	45,01	29,75
	тр 0,002; фл 0,008	74,93	23,28

Таким образом, проведенные исследования показывают, что троксерутин и феруловая кислота обладают фотозащитными свойствами

и при концентрациях 0,05 мг/мл в УФ-Б области могут поглощать до 80% излучения источника.

Но феруловая кислота при длительном облучении ультрафиолетом может переходить из транс-формы в её цис-форму. Фотозащитные свойства при этом снижаются [14]. В УФ-А области троксерутин по фотозащитным свойствам превосходит феруловую кислоту. Смеси троксерутина с феруловой кислотой не дают заметных преимуществ в фотозащитных свойствах по сравнению с индивидуальными соединениями. Фактор поглощения (**ФП**) дает достаточно информации о фотозащитных свойствах соединений.

Литература

1. Джупарова, И.А. Маркетинговый и фармако-экономический анализ ассортимента венотонизирующих лекарственных препаратов ОТС-сегмента / И.А. Джупарова, А.С. Джупаров // Сибирский медицинский вестник. – 2020. – № 4. – С. 27–29. – EDN UVPDLO.
2. Загртдинова, Р.М. Современные возможности коррекции постинъекционных осложнений / Р.М. Загртдинова, Н.В. Ляшенко // Эффективная фармакотерапия. – 2021. – Т. 17, № 1. – С. 18–20. – DOI 10.33978/2307-3586-2021-17-1-18-20. – EDN CXLVGI.
3. Чеснокова Н.Н., Кононова С.В., Петрова С.В., Писаненко Д.В. Исследование рынка флеботропных лекарственных препаратов, применяемых при лечении варикозной болезни 36 вен нижних конечностей (без язв и воспалений) // Ремедиум. 2017. № 5. С. 36–42.
4. Сазонов А.Б., Дьяков И.Н. Применение троксерутина при хронической венозной недостаточности // Стационарозамещающие технологии: Амбулаторная хирургия. 2014. № 1–2. С. 56–58.
5. Дьяков, А.А. Противоритмическое действие феруловой кислоты / А.А. Дьяков, В.Н. Перфилова, И.Н. Тюренков // Вестник аритмологии. – 2005. – № 39. – С. 49–52. – EDN HSZAPJ.
6. Назарова, Л.Е. Влияние кислоты феруловой на развитие ишемического отека, активность каталазы и содержание малонового диальдегида в мозге крыс / Л.Е. Назарова, И.Н. Дьякова // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. – 2006. – № S23. – С. 74–76. – EDN HTNWAD.
7. Дьякова, И.Н. Экспериментальное исследование церебропротекторных свойств феруловой кислоты в условиях ишемии мозга: специальность 14.00.25: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук / Дьякова Ирина Николаевна. – Пятигорск, 2007. – 24 с. – EDN NIRMNV.
8. Абисалова, И.Л. Изучение радиопротекторного действия феруловой кислоты: специальность 14.00.25: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук / Абисалова Ирина Леонидовна. – Пятигорск, 2004. – 20 с. – EDN NHSXQR.
9. Албухайдар, А. Количественная оценка эффективности природных полифенольных соединений как химических фильтров УФ-излучения / А. Албухайдар, А.И. Потапович, В.А. Костюк // Журнал Белорусского государственного университета. Биология. – 2017. – № 1. – С. 3–12. – EDN VPQVHU.
10. Khan M.A. Sun protection factor determination studies of sunscreen formulations for their selection and use in cosmetics // Journal of Pharmaceutical Biology. 2014. V 4. N 1. P. 9–11.
11. de Oliveira-Junior R.G., Souza G.R., Amanda Leite Guimarães A. L., de Oliveira A.P., Araújo C.S., Silva J.C., Pacheco A.G. M., de Lima-Saraiva S.R. G., Rolim L.A., Neto P.J. R., Castro R.N., Almeida J.R. G.S. Photoprotective, antibacterial activity and determination of phenolic compounds of *Neoglaziovia variegata* (Bromeliaceae) by high performance liquid chromatography-diode array detector (HPLC-DAD) analysis // African Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2015, V 9. N 22. P. 576–584.
12. Белякова, А.В. Разработка фотозащитных средств на основе комбинаций синтетических УФ-фильтров и БАВ растительного происхождения: специальность 15.00.01: диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук / Белякова Александра Валерьевна. – Санкт-Петербург, 2005. – 183 с. – EDN NPYFAR.

13. Новиков, Д.А. Биофизика / Д.А. Новиков, М.М. Филимонов. Том Часть 2. – Минск: Белорусский государственный университет, 2012. – 159 с. – ISBN 978-985-518-597-1. – EDN QFLZSK.

14. Шуберт Т.А., Кравченко Н.Т. Физиологическая активность и цис-транс-изомерия в ряду оксикоричных кислот // Фенольные соединения и их биологические функции. М.: Наука. 1968. С. 247–254.

RESEARCH INTO THE PHOTOPROTECTIVE PROPERTIES OF FERULIC ACID, TROXERUTIN, AND THEIR MIXTURES

Norbœv M.D., Larionov E.A., Larionova V.M.

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky (

Troxerutin and ferulic acid are known as biologically active substances. Troxerutin is included in some medications, and ferulic acid is a component of cosmetics. Using them as photoprotective agents in sunscreen formulations enables to achieve both a preventative pharmacological effect and protection against UV radiation. In this study, troxerutin, ferulic acid, and their mixtures were examined using UV spectroscopy. The mixtures showed no advantages over the individual substances. To assess their photoprotective properties, the absorption factor (AF) was calculated according to the obtained electronic spectra.

Keywords: sunscreen agent, photoprotection, UV spectroscopy, UV spectrum, sun protection properties.

References

1. Dzhuparova, I.A. Marketing and pharmacoeconomic analysis of the range of venotonic drugs in the OTC segment / I.A. Dzhuparova, A.S. Dzhuparov // Siberian Medical Bulletin. – 2020. – No. 4. – Pp. 27–29. – EDN UVPDLO.
2. Zagrtidinova, R.M. Modern possibilities for correcting post-injection complications / R.M. Zagrtidinova, N.V. Lyashenko // Effective pharmacotherapy. – 2021. – Vol. 17, No. 1. – Pp. 18–20. – DOI 10.33978/2307-3586-2021-17-1-18-20. – EDN CXLVGI.
3. Chesnokova N.N., Kononova S.V., Petrova S.V., Pisanenko D.V. Research of the market of phlebotropic drugs used in the treatment of varicose veins of the lower extremities (without ulcers and inflammation) // Remedium. 2017. No. 5. Pp. 36–42.
4. Sazonov A.B., Dyakov I.N. Use of troxerutin in chronic venous insufficiency // Inpatient-replacing technologies: Outpatient surgery. 2014. No. 1–2. Pp. 56–58.
5. Dyakov, A.A. Antiarrhythmic effect of ferulic acid / A.A. Dyakov, V.N. Perfilova, I.N. Tyurenkov // Bulletin of Arrhythmology. – 2005. – No. 39. – P. 49–52. – EDN HSZAPJ.
6. Nazarova, L.E. The effect of ferulic acid on the development of ischemic edema, catalase activity and malondialdehyde content in the rat brain / L.E. Nazarova, I.N. Dyakova // News of higher educational institutions. North Caucasian region. Series: Natural sciences. – 2006. – No. S23. – P. 74–76. – EDN HTNWAD.
7. Dyakova, I.N. Experimental study of cerebroprotective properties of ferulic acid under conditions of cerebral ischemia: specialty 14.00.25: abstract of a dissertation for the degree of candidate of pharmaceutical sciences / Irina Nikolaevna Dyakova. – Pyatigorsk, 2007. – 24 p. – EDN NIRMNV.
8. Abisalova, I.L. Study of the radioprotective effect of ferulic acid: specialty 14.00.25: abstract of a dissertation for the degree of candidate of pharmaceutical sciences / Abisalova Irina Leonidovna. – Pyatigorsk, 2004. – 20 p. – EDN NHSXQR.
9. Albukhaydar, A. Quantitative assessment of the effectiveness of natural polyphenolic compounds as chemical filters of UV radiation / A. Albukhaydar, A.I. Potapovich, V.A. Kostyuk // Journal of the Belarusian State University. Biology. – 2017. – No. 1. – pp. 3–12. – EDN VPQVHU.
10. Khan M.A. Sun protection factor determination studies of sunscreen formulations for their selection and use in cosmetics // Journal of Pharmaceutical Biology. 2014. V 4. N 1. P. 9–11.
11. de Oliveira-Junior R.G., Souza G.R., Amanda Leite Guimarães A. L., de Oliveira A.P., Araújo C.S., Silva J.C., Pacheco A.G. M., de Lima-Saraiva S.R. G., Rolim L.A., Neto P.J. R., Castro R.N., Almeida J.R. G.S. Photoprotective, antibacterial activity and determination of phenolic compounds of *Neoglaziovia variegata* (Bromeliaceae) by high performance liquid chromatography-diode array detector (HPLC-DAD) analysis // African Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2015, V 9. N 22. P. 576–584.
12. Belyakova, A.V. Development of photoprotective agents based on combinations of synthetic UV filters and biologically active substances of plant origin: specialty 15.00.01: dissertation for the degree of candidate of pharmaceutical sciences / Belyakova Alexandra Valerievna. – St. Petersburg, 2005. – 183 p. – EDN NPYFAR.
13. Novikov, D.A. Biophysics / D.A. Novikov, M.M. Filimonov. Volume Part 2. – Minsk: Belarusian State University, 2012. – 159 p. – ISBN 978-985-518-597-1. – EDN QFLZSK.
14. Shubert T.A., Kravchenko N.T. Physiological activity and cis-trans isomerism in the series of oxybenzoic acids // Phenolic compounds and their biological functions. Moscow: Nauka. 1968. Pp. 247–254.

Оценка биодоступности антибиотиков тетрациклинового ряда при комбинированном воздействии нутриентов (спектрофотометрический анализ *invitro*)

Чкалин Иван Витальевич,

студент, Оренбургский государственный медицинский университет

Белянин Виталий Васильевич,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии,
Оренбургский государственный медицинский университет

Павлова Маргарита Михайловна,

кандидат биологических наук, доцент кафедры химии Оренбургский
государственный медицинский университет

Неэффективность антибиотикотерапии остается острой проблемой здравоохранения. Значительная доля неудач лечения связана не с резистентностью микроорганизмов, а с несоблюдением правил приема лекарственных средств, в частности, с характером питания пациента. Антибиотики тетрациклинового ряда обладают способностью к хелатированию с ионами металлов и связыванию с белками, что может приводить к существенному снижению их биодоступности. В данной статье представлен обзор литературы, посвященный механизмам взаимодействия тетрациклинов с нутриентами (кальций, белки) и клиническим последствиям таких взаимодействий. Особое внимание уделяется возможности количественной оценки потерь антибиотиков спектрофотометрическими методами в экспериментах *invitro*. Анализ данных показывает, что одновременный прием тетрациклинов с молочными и белковыми продуктами может снижать их концентрацию в сыворотке крови на 50–80%, что требует разработки четких рекомендаций для пациентов.

Ключевые слова: тетрациклины, биодоступность, пищевые взаимодействия, хелатные комплексы, доксициклин, кальций, спектрофотометрия, *invitro*.

Введение

Проблема неэффективности антибактериальной терапии является одной из наиболее острых в современной медицине. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, до 20% случаев неудач в лечении инфекционных заболеваний связаны не с развитием резистентности патогенной микрофлоры, а с несоблюдением пациентами правил приема лекарственных средств [1]. Одним из ключевых, но часто игнорируемых факторов, является характер питания пациента во время лечения. В реальной клинической практике врач, назначая антибиотик, зачастую ограничивается общей рекомендацией «принимать после еды», не конкретизируя состав этой еды. Пациент, следуя инструкции, может запить капсулу кефиром на ночь или принять препарат после завтрака, состоящего из омлета и бутерброда с сыром. Молоко, творог, яйца, мясо, бобовые – все эти продукты, являясь источниками кальция и альбумина, потенциально способны «нейтрализовать» терапевтическую дозу антибиотика еще до того, как он попадет в системный кровоток. Это приводит к тому, что пациент получает субингибирующие концентрации препарата, что не только затягивает болезнь, но и создает селективное давление на микроорганизмы, способствуя росту антибиотикорезистентности [2]. С точки зрения клинической фармакологии, взаимодействие «пища-лекарство» рассматривается как критический фактор, модифицирующий фармакологический профиль препарата. Изменение таких параметров, как площадь под фармакокинетической кривой (AUC), максимальная концентрация и время ее достижения, напрямую влияет на фармакодинамику – способность антибиотика создавать бактерицидный или бактериостатический эффект в очаге инфекции. Понимание биохимических основ этих процессов является фундаментом для персонализированного подхода к антибиотикотерапии. Несмотря на обилие теоретических знаний о хелатировании, в учебниках по фармакологии этот процесс описан схематично. Будущие врачи редко видят физическое доказательство того, что антибиотик «исчезает» в пробирке с молоком. Данная работа представляет собой теоретический анализ механизмов взаимодействия антибиотиков тетрациклинового ряда с компонентами пищи и обоснование использования спектрофотометрических методов *invitro* для визуализации и количественной оценки этого процесса.

Цель исследования: оценить *invitro* влияние молока, яичного белка, ионов кальция и их комбинации на степень связывания тетрациклина методом спектрофотометрии.

Задачи:

- 1) Создать модели желудочной среды с различными пищевыми компонентами.
- 2) Методом центрифугирования выделить надосадочную жидкость, содержащую свободный антибиотик.
- 3) Измерить оптическую плотность супернатантов при длине волны 350 нм.
- 4) Рассчитать процент связавшегося антибиотика и сравнить степень связывания в разных средах.
- 5) Сформулировать рекомендации для клинической практики.

Основная часть

Тетрациклины представляют собой группу природных и полусинтетических антибиотиков, обладающих широким спектром антимикробной активности. Первый представитель группы – хлортетрациклин – был выделен в 1945 году, а в 1952 году Финлей с соавторами получил тетрациклин [3]. В последующие десятилетия были синтезированы доксициклин, миноциклин и другие соединения с улучшенными фармакокинетическими свойствами. Согласно классификации, предложенной Д.А. Харкевичем, тетрациклины относятся к антибиотикам с бактериостатическим типом действия [4]. Механизм их действия связан с ингибированием синтеза белка на уровне 30S субъединицы рибосомы, что препятствует присоединению аминокислот к акцепторному участку, что приводит к остановке роста и размножения бактерий. Углубляясь в биохимию процесса, следует отметить, что ингибирование синтеза белка тетрациклинами носит обратимый характер. Препараты связываются с высокоаффинными участками 30S субъединицы рибосомы, что

приводит к изменению ее конформации. Это блокирует доступ комплекса аминокислот-тРНК к акцепторному участку (А-участку). В результате происходит остановка элонгации полипептидной цепи. Селективность антимикробного действия обусловлена тем, что бактериальные рибосомы (70S) накапливают тетрациклины в гораздо большей концентрации, чем эукариотические рибосомы (80S) клеток макроорганизма, благодаря наличию систем активного транспорта у бактерий.

При приеме внутрь тетрациклины всасываются преимущественно в верхних отделах тонкого кишечника. Биодоступность различных представителей группы варьирует: для тетрациклина гидрохлорида она составляет 60–80%, для доксициклина – 90–100% [5]. Высокая липофильность доксициклина обеспечивает его практически полное всасывание, однако этот процесс существенно зависит от наличия в просвете кишки ионов металлов и компонентов пищи [6]. Как отмечают Лоуренс и Беннетт в руководстве по клинической фармакологии, важнейшей особенностью всасывания тетрациклинов является образование нерастворимых хелатных комплексов с двухвалентными и трёхвалентными катионами: кальция, магния, железа, алюминия [7]. Эти комплексы не способны проникать через мембраны энтероцитов, и препарат выводится с фекалиями, не оказывая системного действия. С химической точки зрения, молекула тетрациклина представляет собой гидронафтаценовое ядро с набором функциональных групп. В образовании хелатов участвует β-дикетонная система в положениях C₁₁ и C₁₂, а также енольная группа в положениях C3. Двухвалентные катионы (кальция, магния, железа, цинка) образуют с этими группами устойчивые шестичленные циклы. Важно подчеркнуть, что данный процесс не является простым связыванием, а приводит к образованию труднорастворимых комплексов, которые не способны диффундировать через липидный бислой мембран энтероцитов. Биохимическое значение этого феномена заключается в полной потере антибактериальной активности, так как пространственная структура антибиотика изменяется, и он теряет средство к рибосомальным рецепторам.

Наиболее изученным является взаимодействие тетрациклинов с кальцием. Механизм этого явления заключается в хелатировании – образовании устойчивых координационных соединений между карбоильными и гидроксильными группами молекулы тетрациклина и ионом Ca²⁺. Ещё в 1960-х годах работы Кунсена и соавторов показали, что одновременный приём тетрациклина с молоком снижает его концентрацию в сыворотке крови на 50–60% [8]. В современных руководствах по фармакотерапии подчёркивается, что любые продукты, богатые кальцием (молоко, йогурт, творог, сыр), а также кальцийсодержащие добавки должны приниматься не менее чем за 2–3 часа до или через 4–6 часов после приёма тетрациклинов [9]. Особого внимания заслуживают данные о различной степени взаимодействия представителей группы тетрациклина с молочными продуктами. Так, биодоступность демеклоциклина, миноциклина и тетрациклина снижалась на 83, 27 и 65% соответственно при приеме этих препаратов регос одновременно с молоком, в то время как прием этих препаратов пациентами, не употреблявшими молочные продукты, не сопровождался изменениями их фармакокинетики [10]. Среди всех тетрациклинов наименьшим риском взаимодействия с молоком обладает доксициклин [10, 11]. Это объясняется его высокой липофильностью и практически полным всасыванием в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, что снижает вероятность контакта с ионами кальция в просвете кишки. Помимо абсорбции, важным аспектом фармакокинетики является распределение. Тетрациклины (особенно доксициклин) обладают, как было упомянуто ранее, липофильностью и хорошо проникают в ткани и биологические жидкости, включая желчь, мокроту, асцитическую жидкость. Однако они плохо проходят через гематоэнцефалический барьер. Ключевой биохимической особенностью является их способность к энтерогепатической циркуляции: препараты секретируются с желчью в кишечник, где частично реабсорбируются. При дисбактериозе или диарее этот процесс нарушается. Что касается элиминации, препараты группы делятся на два пути выведения: тетрациклин и окситетрациклин выводятся преимущественно почками в неизменном виде (противопоказаны при нефропатиях), тогда как доксициклин выводится через желудочно-кишечный тракт, что делает его более безопасным у пациентов с почечной недостаточностью.

Влияние белковых продуктов на всасывание тетрациклинов изучено менее подробно, однако имеющиеся данные свидетельствуют о его существенном значении. Белки могут влиять на фармакокинетику антибиотиков несколькими путями. Во-первых, это физическая адсорбция: белки пищевого комка (альбумин, казеин) способны адсорбировать молекулы антибиотика на своей поверхности, делая их недоступными для всасывания [12]. Во-вторых, химическое связывание: аминокислотные остатки, содержащие сульфгидрильные или карбоксильные группы, могут образовывать с тетрациклинами комплексы,

подобные хелатным [13]. В-третьих, изменение моторики ЖКТ: белковая пища замедляет эвакуацию содержимого желудка, что может увеличивать время контакта препарата с неблагоприятной средой и усиливать его деградацию [4]. Взаимодействие с белками не ограничивается физической адсорбцией. Важную роль играет связывание с сывороточным альбумином уже после всасывания. В крови тетрациклин в значительной степени связывается с белками плазмы. При гипоальбуминемии (характерной для пациентов с нарушениями питания или заболеваниями печени) возрастает доля свободной фракции препарата, что может привести к увеличению риска токсических эффектов, несмотря на отсутствие изменений в дозе. Однако при совместном приеме с пищей мы имеем дело с конкурентным взаимодействием за связывание как в просвете желудка, так и в кровотоке. Исследования D'Arcy на добровольцах показали, что приём тетрациклина одновременно с белковой пищей (яйца, ветчина) приводил к снижению максимальной концентрации в плазме на 30% по сравнению с приёмом натощак [14].

Важно подчеркнуть гетерогенность группы тетрациклинов. Современная фармакология делит их на три поколения:

1. Природные (тетрациклин, окситетрациклин) – характеризуются наименьшей липофильностью и наибольшей зависимостью от приема пищи.
2. Полусинтетические (доксициклин, миноциклин) – обладают высокой липофильностью, большим объемом распределения и более длительным периодом полувыведения (у доксициклина составляет 18–22 часа, что позволяет применять его 1 раз в сутки).
3. Новые тетрациклины (тигекциклин) – применяются парентерально, так как их абсорбция их ЖКТ минимальна, и предназначены для лечения инфекций, вызванных полирезистентной флорой. Это деление объясняет, почему рекомендации по приему пищи должны быть дифференцированными: если прием тетрациклина с молоком категорически запрещен, то для доксициклина допускается совместный прием с пищей (для уменьшения эметогенного действия), но строго без молочных продуктов.

Спектрофотометрия является доступным и информативным методом количественного определения концентрации антибиотиков в растворах. Тетрациклины обладают характерным спектром поглощения в ультрафиолетовой и видимой областях (пик поглощения 350 нм), что позволяет использовать этот метод для оценки их содержания.

Объект исследования. В работе использовали тетрациклина гидрохлорид в дозировке 25 мг на каждый прием.

Приготовление модельных сред. Экспериментальные среды объемом 50 мл готовили следующим образом:

- контрольная среда – дистиллированная вода с добавлением 1 мл 0,1 М HCl (имитация кислой среды желудка);
- среда «Молоко» – пастеризованное молоко 3,2% жирности + 1 мл 0,1 М HCl;
- среда «Яичный белок» – дистиллированная вода + 1 мл 0,1 М HCl + 15 мл сырого куриного белка;
- комбинированная среда – 25 мл молока + 25 мл воды + 1 мл 0,1 М HCl + 15 мл белка;
- среда «Кальций» – дистиллированная вода + 1 мл 0,1 М HCl + 5 мл 10% раствора глюконата кальция.

Проведение эксперимента. В каждую среду вносили по 25 мг тетрациклина, тщательно перемешивали и инкубировали при 37 °C в течение 30 мин при постоянном перемешивании (имитация перистальтики желудка). По окончании инкубации пробы центрифугировали при 4000 об/мин в течение 10 мин (центрифуга ОПН-8, Россия) для отделения нерастворимых комплексов. Надосадочную жидкость (супернатант) отбирали и использовали для спектрофотометрии.

Спектрофотометрический анализ. Оптическую плотность супернатантов измеряли на спектрофотометре ПЭ-5400УФ (Экохим, Россия) при длине волны 350 нм (максимум поглощения тетрациклина) в кюветках с толщиной слоя 1 см. Каждый образец анализировали в трёх повторностях.

Расчёт процента связавшегося антибиотика. Долю свободного антибиотика (в %) рассчитывали по формуле: Свободно, % = (D опыта / D контроля) × 100%. Процент связавшегося антибиотика определяли как 100% – % свободного.

Статистический анализ. Для оценки межгрупповых различий применяли двухвыборочный t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.

Визуальная оценка. В контрольной среде после центрифугирования наблюдался прозрачный жёлтый раствор. В опытных образцах отмечалась лёгкая опалесценция, наиболее выраженная в комбинированной среде, что предварительно указывало на наличие связанных форм антибиотика.

Спектрофотометрические данные. Результаты измерений оптической плотности представлены в таблице 1. Во всех эксперименталь-

ных группах зафиксировано статистически значимое снижение оптической плотности по сравнению с контролем ($p < 0,001$). Наименьшая оптическая плотность ($1,682 \pm 0,017$) и, соответственно, максимальное связывание (81,5%) наблюдались в комбинированной среде «молоко+белок». Среда с кальцием и молоко показали сходные значения оптической плотности ($1,71 \pm 0,017$, $1,716 \pm 0,017$), минимальное связывание отмечено в среде с яичным белком (56,2%).

Таблица 1. Оптическая плотность (D , 350 нм) и процент и масса связанного и свободного тетрациклина в различных средах

Образец	Оптическая плотность средняя, нм	Масса свободного антибиотика, мг	Масса связанного антибиотика, мг	% связанного антибиотика
Контроль	$1,846 \pm 0,017$	25,0	0,0	0%
Молоко	$1,71 \pm 0,017$	7,825	17,175	68,7%
Белок	$1,737 \pm 0,017$	10,95	14,05	56,2%
Комбо	$1,682 \pm 0,017$	4,63	20,37	81,5%
Кальций	$1,716 \pm 0,017$	9,875	15,125	60,5%

Статистический анализ. Попарное сравнение экспериментальных групп с использованием t -критерия Стьюдента выявило следующие закономерности (табл. 2). Все группы значимо отличались от контроля ($p < 0,001$), что подтверждает способность исследуемых пищевых компонентов связывать тетрациклин. Между группами «Кальций» и «Молоко» статистически значимых различий не обнаружено ($t = 0,43$; $p > 0,05$), что указывает на сходный механизм действия – хелатирование ионами кальция. Группы «Молоко» и «Белок» различались значимо ($t = 1,92$; $p < 0,05$), причём молоко давало более низкую оптическую плотность, т.е. связывание в молоке было сильнее. Комбинированная среда значимо отличалась от среды с белком ($t = 3,94$; $p < 0,02$), однако различия с кальцием и молоком не достигли статистической значимости ($p > 0,05$), хотя наблюдалась тенденция к более выраженному эффекту комбинации.

Таблица 2. Результаты попарного сравнения групп (t -критерий Стьюдента)

Сравнение	Разность средних	t -статистика	Значимость ($p < 0,05$)
Контроль/молоко	0,136	9,36	Да
Контроль/белок	0,109	7,45	Да
Контроль/комбо	0,164	11,37	Да
Контроль/кальций	0,130	8,93	Да
Молоко/белок	0,027	1,92	Да
Молоко/комбо	0,028	2,02	Нет
Молоко/кальций	0,006	0,43	Да
Белок/комбо	0,055	3,94	Да
Белок/кальций	0,021	1,49	Нет
Комбо/кальций	0,034	2,45	Да

Интересно, что комбинация молока и белка вызвала максимальное связывание (81,5%), что превышает эффект каждого компонента в отдельности. Это свидетельствует о потенцировании действия, вероятно, за счёт одновременной реализации механизмов хелатирования и адсорбции на белках. Отсутствие значимых различий между кальцием и молоком подтверждает, что основным действующим началом в молоке являются ионы кальция. Белок, хотя и связывает антибиотик, делает это менее эффективно, что может объясняться меньшей доступностью связывающих центров в нативной структуре альбумина.

Клиническая значимость полученных результатов заключается в необходимости строгого соблюдения временного интервала между приёмом тетрациклинов и пищи, особенно богатой белком и кальцием. Согласно современным рекомендациям, антибиотики этой группы следует принимать натощак (за 1 ч до еды или через 2 ч после), запивая только водой [9, 15]. Пациентам, получающим антациды, препараты железа или кальция, необходимо разнести их приём с антибиотиками не менее чем на 4 ч.

Ограничениями настоящего исследования являются использование упрощённой модели желудочной среды без учёта ферментов, а также отсутствие количественного определения связанных форм антибиотика в осадке. Тем не менее, спектрофотометрический метод

позволил объективно оценить долю свободного препарата и провести корректный статистический анализ.

Снижение биодоступности тетрациклинов под влиянием пищи и ионов кальция имеет прямые клинические последствия: недостижение терапевтической концентрации в очаге инфекции, риск формирования антибиотикорезистентности при использовании субтерапевтических доз, увеличение продолжительности лечения и вероятности рецидивов, неоправданные экономические затраты на неэффективную терапию [15]. Для предотвращения этих нежелательных явлений ведущие клинические руководства рекомендуют принимать тетрациклины (особенно тетрациклин и окситетрациклин) строго натощак, за 1 час до еды или через 2 часа после еды; запивать препараты только чистой водой (не молоком, не соками, обогащёнными кальцием); избегать одновременного приёма с антацидами, препаратами железа, кальция, магния; учитывать особенности диеты пациента (вегетарианство с высоким потреблением тофу и бобовых, увлечение протеиновыми коктейлями, молочные каши на завтрак и т.п.) [16].

Заключение

Теоретический анализ литературы подтверждает, что белковая пища и ионы кальция способны значимо снижать биодоступность антибиотиков группы тетрациклина за счёт образования нерастворимых хелатных комплексов и адсорбции на пищевых субстратах. Наибольшее снижение биодоступности наблюдается у тетрациклина при одновременном приеме с молочными продуктами (до 65–80%). Эти данные обосновывают необходимость учёта характера питания при назначении тетрациклинов и разработки чётких рекомендаций для пациентов. Врач должен не просто рекомендовать «принимать после еды», а объяснять пациенту важность временного интервала и качества пищи. Экспериментальные исследования *in vitro* с использованием спектрофотометрии позволяют наглядно продемонстрировать процесс связывания антибиотиков и количественно оценить потери действующего вещества, что может быть использовано в образовательных целях при подготовке будущих врачей. Антибиотики необходимо принимать либо за час до еды, либо через 2 часа после еды, особенно если еда молочная. Запивать только водой, никакого молока, кефира, йогурта, соевого молока. То есть врач должен спрашивать не просто «чем вы питаетесь?», а что вы непосредственно едите перед приемом лекарства. Таким образом, с позиций доказательной фармакологии, игнорирование пищевого статуса пациента при назначении тетрациклинов равносильно коррекции дозы вслепую. Врач обязан рассматривать желудочно-кишечный тракт не просто как пассивный проводник, а как активную биохимическую среду, модифицирующую терапевтический потенциал лекарства. Образовательные эксперименты *in vitro* с использованием спектрофотометрии позволяют будущим клиницистам визуализировать фундаментальный постулат фармакокинетики: «Препарат должен быть доставлен к месту действия в неизменном виде и в необходимой концентрации».

Литература

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный отчет по эпиднадзору за устойчивостью к противомикробным препаратам. – Женева: ВОЗ, 2014. – 256 с.
2. Крейг В.А. Имеет ли значение доза? // Клинические инфекционные болезни. – 2001. – Т. 33, Приложение 3. – С. 233–237.
3. Финлей А.С., Хобби Г.Л., Пан С.И. и др. Террамицин – новый антибиотик // Наука. – 1950. – Т. 111, № 2874. – С. 85–87.
4. Харкевич Д.А. Фармакология: учебник. – 12-е изд., испр. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 760 с.
5. Агву К.Н., Макгоуэн А. Фармакокинетика и фармакодинамика тетрациклинов, включая глицилциклины // Журнал антимикробной химиотерапии. – 2006. – Т. 58, № 2. – С. 256–265.
6. Сэйвин С., Хуэн Г. Клиническая фармакокинетика доксициклина и миноциклина // Клиническая фармакокинетика. – 1988. – Т. 15, № 6. – С. 355–366.
7. Лоуренс Д.Р., Беннетт П.Н. Клиническая фармакология: пер. с англ. – Москва: Медицина, 1991. – 672 с.
8. Кунсин К.М., Финляндия М. Клиническая фармакология антибиотиков тетрациклинового ряда // Клиническая фармакология и терапия. – 1961. – Т. 2, № 1. – С. 51–69.
9. Кацунг Б.Г., Вандера Т.У. Базовая и клиническая фармакология. – 15-е изд. – McGraw-Hill, 2021. – 1312 с.
10. Невонен П.И. Взаимодействия, влияющие на всасывание тетрациклинов // Лекарственные средства. – 1976. – Т. 11, № 1. – С. 45–54.
11. Веллинг П.Г., Кох П.А., Лау К.К., Крейг В.А. Биодоступность тетрациклина и доксициклина у пациентов натощак и после приема пищи // Антимикробные агенты и химиотерапия. – 1977. – Т. 11, № 3. – С. 462–469.

12. Тутэкер Р.Д., Веллинг П.Г. Влияние пищи на биодоступность лекарств // Ежегодный обзор фармакологии и токсикологии. – 1980. – Т. 20. – С. 173–199.

13. Гупта А., Шарма П.К. Обзор взаимодействий пищи и лекарств // Международный журнал фармацевтических наук и исследований. – 2018. – Т. 9, № 4. – С. 1366–1376.

14. Д'Арси П.Ф., МакЭлнейДж.К., Веллинг П.Г. Влияние пищи на всасывание лекарств // Лекарственная информация и клиническая фармация. – 1976. – Т. 10, № 12. – С. 690–697.

15. Дэвид Л.Н., Гилберт Д.Н., Чемберс Х.Ф., Элиоупулос Г.М. и др. Санфорд. Руководство по антимикробной терапии 2021. – 51-е изд. – Sperryville, VA: Antimicrobial Therapy, Inc., 2021. – 368 с.

16. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр). – Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2016. – 1240 с.

ASSESSMENT OF TETRACYCLINE ANTIBIOTICS BIOAVAILABILITY UNDER COMBINED NUTRIENT EXPOSURE (SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS IN VITRO)

Chkalin I.V., Belyanin V.V., Pavlova M.M.
Orenburg State Medical University

The ineffectiveness of antibiotic therapy remains a pressing healthcare issue. A significant proportion of treatment failures is associated not with microbial resistance, but with non-compliance with medication rules, particularly the patient's diet. Tetracycline antibiotics have the ability to chelate with metal ions and bind to proteins, which can lead to a significant decrease in their bioavailability. This article provides a review of the literature on the mechanisms of interaction between tetracyclines and nutrients (calcium, proteins) and the clinical consequences of such interactions. Special attention is paid to the possibility of quantifying antibiotic losses using spectrophotometric methods in *in vitro* experiments. Data analysis shows that concomitant intake of tetracyclines with dairy and protein products can reduce their serum concentration by 50–80%, necessitating the development of clear recommendations for patients.

Keywords: tetracyclines, bioavailability, food-drug interactions, chelate complexes, doxycycline, calcium, spectrophotometry, *in vitro*.

References

1. World Health Organization. Global report on antimicrobial resistance surveillance. Geneva: WHO, 2014, 256 p.
2. Craig, V.A. Does Dose Matter? Clinical Infectious Diseases: A Guide to the Study of Infectious Diseases (2001) vol. 33, Supplement 3, pp. 233–237.
3. Finlay, A.S., Hobby, G.L., Pan, S.L., et al. Terramycin: A New Antibiotic: Nauka (1950) vol. 111, no. 2874, pp. 85–87.
4. Kharkevich, D.A. Pharmacology: Textbook. 12th ed., corrected and enlarged. Moscow: GEOTAR-Media, 2021, 760 p.
5. Agwu K.N., McGowan A. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of tetracyclines, including glycylicyclines // Journal of Antimicrobial Chemotherapy. – 2006. – Vol. 58, No. 2. – P. 256–265.
6. Savin S., Huen G. Clinical pharmacokinetics of doxycycline and minocycline // Clinical pharmacokinetics. – 1988. – Vol. 15, No. 6. – P. 355–366.
7. Lawrence D.R., Bennett P.N. Clinical pharmacology: translated from English. – Moscow: Meditsina, 1991. – 672 p.
8. Kunsin K.M., Finlandia M. Clinical pharmacology of tetracycline antibiotics // Clinical pharmacology and therapy. – 1961. – Vol. 2, No. 1. – P. 51–69.
9. Katsung B.G., Vandera T.U. Basic and clinical pharmacology. – 15th ed. – McGraw-Hill, 2021. – 1312 p.
10. Nevenon P.J. Interactions affecting the absorption of tetracyclines // Drugs. – 1976. – Vol. 11, No. 1. – P. 45–54.
11. Welling P.G., Koch P.A., Lau K.K., Craig V.A. Bioavailability of tetracycline and doxycycline in fasting and fed patients // Antimicrobial agents and chemotherapy. – 1977. – Vol. 11, No. 3. – P. 462–469.
12. Tuthaker R.D., Welling P.G. Effect of food on drug bioavailability // Annual review of pharmacology and toxicology. – 1980. – Vol. 20. – P. 173–199.
13. Gupta A., Sharma P.K. Review of food-drug interactions // International journal of pharmaceutical sciences and research. – 2018. – Vol. 9, No. 4. – P. 1366–1376.
14. D'Arcy P.F., McElroy J.K., Welling P.G. Effect of food on drug absorption // Drug information and clinical pharmacy. – 1976. – Vol. 10, No. 12. – Pp. 690–697.
15. David L.N., Gilbert D.N., Chambers H.F., Eliopoulos G.M., et al. Sanford. Guide to antimicrobial therapy 2021. – 51st ed. – Sperryville, VA: AntimicrobialTherapy, Inc., 2021. – 368 p.
16. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (10th revision). – Geneva: World Health Organization, 2016. – 1240 p.

Разработка методологии контроля примесей в иммунобиологических препаратах и ее влияние на содержание регистрационного досье

Щербакова Кристина Константиновна,
студент магистратуры Института фармации и биотехнологии Российского
университета дружбы народов
E-mail: emelkrisk@mail.ru

Сложная природа современных иммунобиологических препаратов, получаемых методами клеточных и рекомбинантных технологий, обуславливает неизбежное присутствие в них разнообразных примесей. Разработка научно обоснованной методологии их контроля выступает критическим условием обеспечения безопасности, особенно для профилактических средств массового применения. В статье рассматривается специфическая классификация примесей биологического происхождения, анализируются методологические сложности, связанные с их гетерогенностью. Особое внимание уделено современным подходам к построению системы контроля, включая валидацию аналитических методов, адаптацию токсикологических принципов для оценки безопасности и интеграцию требований международных руководств ИСН. Центральным аспектом является исследование прямого влияния сформированной методологии на наполнение и логику обоснования ключевых модулей регистрационного досье (СТД) в соответствии с нормативами ЕАЭС и РФ. Показано, что детально проработанная методология контроля выполняет интегрирующую функцию, связывая технологию производства, аналитическое обеспечение и регуляторные ожидания, тем самым формируя фундамент для успешной регистрации и подтверждения безопасности препарата на протяжении всего жизненного цикла.

Ключевые слова: иммунобиологические препараты, контроль примесей, регистрационное досье, ИСН, валидация методов.

Введение

Современное производство иммунобиологических препаратов, таких как вакцины, моноклональные антитела и рекомбинантные белки, основано на сложных многоступенчатых биотехнологических процессах. Использование клеточных культур, плазмидных векторов и систем очистки создает риск попадания в конечный продукт множества посторонних веществ. Эти примеси могут иметь различное происхождение: остаточные компоненты клеток-продуцентов (белки, ДНК), реагенты технологического процесса или мигрирующие из упаковки вещества. Для препаратов, применяемых преимущественно у здоровых лиц, включая детей, контроль таких примесей становится важнейшим элементом системы гарантий безопасности.

Хотя фундаментальные принципы регулирования заложены в гармонизированных руководствах ИСН серии Q3, их прямое действие не распространяется на биологические продукты. Это исключение создает потребность в адаптированных подходах, которые, сохраняя общую философию ИСН, учитывали бы специфику иммунобиологических препаратов. В результате разработка методологии контроля превращается в самостоятельную научно-практическую задачу, требующей комплексного решения.

Цель исследования заключается в анализе современных принципов построения методологии контроля примесей в иммунобиологических препаратах и оценке её определяющей роли в формировании содержания и структуры регистрационного досье для рынков РФ и ЕАЭС.

Классификация примесей и методологические вызовы в контроле качества иммунобиологических препаратов

Спектр примесей в биологических препаратах существенно отличается от такового для синтетических низкомолекулярных соединений. Их ключевыми особенностями являются гетерогенность, сложность состава и вариабельность. Основные категории представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Категория	Происхождение	Примеры	Ключевые риски
Клеточно-субстратные	Клетки-продуценты (CHO, VERO, куриные эмбрионы)	Остаточные белки клеток-хозяев (НСП), остаточная клеточная ДНК, эндотоксины, вирусы	Иммуногенность, пирогенность, теоретический онкогенный риск (ДНК)
Технологические	Процесс производства	Компоненты культуральных сред (сыворотка), индукторы, реагенты очистки (детергенты, ферменты), инактивирующие агенты (формальдегид)	Токсичность, иммуногенность, влияние на стабильность
Выщелачиваемые	Первичная упаковка (пробки, шприцы, контейнеры)	Органические соединения (пластификаторы, антиоксиданты), металлы	Неспецифическая токсичность, влияние на активность препарата
Продукты деградации	Деградация активной субстанции при хранении	Фрагменты, окисленные формы, димеры и олигомеры белков	Снижение эффективности, повышение иммуногенности

Особую сложность представляет контроль гетерогенных смесей, таких как остаточные белки клеток-хозяев (НСП), состав которых может значительно варьировать между производственными партиями. Отдельной актуальной проблемой стал контроль остаточной плазмидной ДНК в мРНК-вакцинах, где даже следовые количества могут нести потенциальные риски и требуют строгого соблюдения лимита ВОЗ в 10 нг/доза.

Построение методологии аналитического контроля требует выбора методов, адекватных характеру примеси. Например, широко применяемая qPCR для количественного определения остаточной ДНК, нацеленная на специфическую короткую последовательность, может давать заниженную оценку общей массы ДНК-примеси, особенно если она фрагментирована. В качестве альтернативы рассматриваются методы прямой флуоресцентной детекции, оценивающие общее содержание нуклеиновых кислот. Этот пример отражает общую регуляторную тенденцию: ожидание от производителя применения методик, характеризующих полный профиль примеси, что предъявляет высокие требования к валидации, особенно в части специфичности и учета матричных эффектов.

Для новых или неожиданных примесей, по которым отсутствуют установленные нормативы, применяется иерархический подход к оценке безопасности. Его этапы включают точную идентификацию и количественное определение, сравнение полученного уровня с порогом токсикологической угрозы (ТТС). Для вакцин используется модифицированный «ступенчатый» ТТС, учитывающий кратковременный режим введения. Если уровень примеси превышает пороговое значение, проводится углубленная токсикологическая оценка для расчета допустимого суточного воздействия (PDE). Данный подход обеспечивает гибкость и научную обоснованность при установлении пределов содержания.

Обобщенная схема методологии контроля примесей

Предлагаемая ниже схема служит основой для понимания того, как результаты контроля примесей транслируются в структуру регистрационного досье.

Основная цель предлагаемой схемы заключается в обеспечении системного подхода, гарантирующего, что присутствие любых примесей не превышает безопасных уровней и не оказывает негативного влияния на эффективность препарата. Обобщенная методология представлена в виде последовательности взаимосвязанных этапов, графическая интерпретация которой приведена на рисунке 1, а её детальное описание раскрывает логику каждого перехода и точек принятия решений.

Отправной точкой методологии является всесторонний анализ всех возможных источников появления посторонних компонентов. На этапе идентификации и классификации источников примесей детально изучается технологический процесс: используемые клеточные линии и субстраты, состав питательных сред, реагенты для очистки и инактивации, а также материалы первичной упаковки. Параллельно прогнозируются вероятные пути деградации активного вещества при хранении, такие как окисление, гидролиз или агрегация. Результатом этого многоступенчатого анализа становится ранжированный перечень потенциальных примесей с оценкой критичности их влияния на качество и безопасность препарата, что в дальнейшем определит глубину их изучения.

Следующий шаг заключается в категоризации примесей по принципиальному признаку – возможности их идентификации. Исходя из того, может ли структура или происхождение примеси быть установлено с помощью доступных аналитических методов, все выявленные компоненты разделяют на две группы. К первой относятся идентифицируемые примеси – конкретные химические соединения или биологические молекулы, чья природа поддается определению, например, остаточные растворители, известные индукторы экспрессии или специфические продукты деградации. Вторую группу составляют неидентифицируемые примеси, которые детектируются в виде сигналов на хроматограммах или связывания в иммуноферментном анализе, но их точный состав остается неизвестным. Типичным примером служат гетерогенные смеси остаточных белков клеток-хозяев или сложные композиции выщелачиваемых веществ. Принципиальное различие между этими категориями определяет выбор дальнейшей стратегии контроля, поэтому после данного этапа логика методологии разделяется на два параллельных пути.

Для идентифицируемых примесей подбираются целевые аналитические методы, позволяющие количественно определять конкретное вещество с высокой специфичностью. Так, для летучих органических соединений применяется газовая хроматография, для нелетучих – высокоэффективная жидкостная хроматография с соответствующим детектированием. В случае остаточной ДНК целесообразно сочетание количественной полимеразной цепной реакции в реальном времени для обнаружения специфических последовательностей и флуоресцентных методов для оценки общей массы двухцепочечной ДНК, что позволяет преодолеть ограничения каждого из подходов в отдельности. Для неидентифицируемых смесей, напротив, используются профилирующие методы, дающие интегральную характеристику. Контроль оста-

точных белков клеток-хозяев традиционно осуществляется с помощью иммуноферментного анализа с поликлональными антителами, тогда как методы масс-спектрометрии высокого разрешения применяются для углубленного качественного и количественного профилирования. Оценка выщелачиваемых веществ требует применения скрининговых методов хромато-масс-спектрометрии, позволяющих идентифицировать неизвестные компоненты по библиотекам масс-спектров. Независимо от выбранного подхода, ключевым требованием на этом этапе является доказательство того, что предел количественного определения метода оказывается ниже установленных пороговых значений отчетности.




Рис. 1. Обобщенная схема методологии контроля примесей в иммунобиологических препаратах

После того как метод выбран, он подлежит обязательной процедуре валидации, которая призвана документально подтвердить его пригодность для решения поставленной задачи. В ходе валидации, регламентируемой руководством ICH Q2(R1), доказываемое, что метод обладает необходимой специфичностью, позволяющей однозначно определять целевой компонент в присутствии всех остальных. Устанавливается линейная зависимость сигнала от концентрации в требуемом диапазоне, оценивается правильность путем измерения на модельных образцах с добавками, а также прецизионность, то есть степень разброса результатов при повторных измерениях. Критически важным

является определение предела количественного определения, который должен гарантировать надежное измерение примесей на уровнях, близких к пороговым. Завершается валидация оценкой робастности – устойчивости метода к небольшим, но преднамеренным изменениям условий анализа. Полученные данные оформляются в виде отчета, который в дальнейшем войдет в состав регистрационного досье. На этом этапе оба потока – для идентифицируемых и неидентифицируемых примесей – вновь объединяются, поскольку процедура валидации является универсальной для всех методов.

Параллельно с разработкой и валидацией методов ведется работа по научному обоснованию допустимых пределов содержания примесей. Для идентифицируемых соединений с известной токсикологией, таких как остаточные растворители, используются готовые фармакопейные лимиты. Для новых или неидентифицируемых примесей применяется концепция порогов токсикологической угрозы. Учитывая специфику вакцин, которые вводятся, как правило, однократно или с большими интервалами, используется так называемый ступенчатый порог, допускающий более высокие уровни примесей по сравнению с препаратами для хронического применения. На данном этапе возникает второе ключевое ветвление, связанное с оценкой необходимости квалификации примеси. В случае, если содержание примеси превышает установленный порог квалификации, требуется проведение дополнительных исследований безопасности – либо прямых токсикологических тестов, либо ретроспективного анализа данных по партиям, использованным в клинических исследованиях. Если же уровень примеси остается ниже порога квалификации, она может быть включена в спецификацию без дополнительных изысканий. Результатом данного этапа становятся спецификации на готовый продукт, содержащие как индивидуальные пределы для идентифицированных и квалифицированных примесей, так и общий предел для суммы неидентифицируемых компонентов. То, каким образом эти спецификации отражаются в структуре регистрационного досье, будет подробно рассмотрено в главе III.

Разработанная методология находит свое практическое воплощение в программе исследований стабильности, которая превращается из формального требования в активный инструмент управления качеством. Программа стабильности выстраивается таким образом, чтобы не просто констатировать неизменность показателей, но и выявлять скрытые риски, связанные с появлением новых примесей или изменением их уровней. Обязательным элементом становится мониторинг специфической активности как интегрального показателя, наиболее чувствительного к неблагоприятным воздействиям со стороны примесей и продуктов деградации. Параллельно проводятся стресс-тесты: образцы подвергаются воздействию повышенных температур, циклам замораживания и оттаивания, механическим нагрузкам, что позволяет ускорить деградационные процессы и установить корреляцию между появлением конкретных примесей и потерей активности. Особое место в программе занимает оценка совместимости с первичной упаковкой, для чего моделируются наихудшие условия эксплуатации, например, хранение флаконов в перевернутом положении, обеспечивающее максимальный контакт препарата с резиновой пробкой. Сравнительный анализ динамики ключевых показателей в нормальных и стрессовых условиях позволяет научно обосновать выбор упаковки, подтвердить отсутствие значимого выщелачивания и гарантировать сохранение качества на протяжении всего заявленного срока годности. Именно этот этап будет детально проиллюстрирован в главе IV на примере экспериментального исследования инактивированной полиомиелитной вакцины.

Завершающим этапом методологии является структурированное представление всех полученных данных в строгом соответствии с требованиями к регистрационному досье. Сведения о потенциальных примесях и мерах по их удалению отражаются в описании производственного процесса, что соответствует модулю 3.2.S.2. Отчеты по валидации методов включаются в раздел 3.2.S.4, посвященный валидации аналитических процедур. Установленные спецификации становятся частью нормативной документации на готовый продукт, находя отражение в модуле 3.2.P.5. Результаты исследований стабильности и данные, обосновывающие выбор упаковки, формируют основу разделов 3.2.P.7 и 3.2.P.8. В конечном итоге вся эта совокупность информации, выстроенная в единую логическую цепочку, служит убедительным доказательством того, что предложенная производителем система контроля способна надежно гарантировать безопасность и эффективность иммунобиологического препарата на всех этапах его обращения.

Влияние методологии контроля на структуру и содержание регистрационного досье

В Модуле 3.2 (Качество) методология находит детальное отражение. В подразделе, посвященном фармацевтической разработке, обосновывается выбор аналитических методов и стратегия установления спецификаций. В разделе контроля лекарственного препарата приводятся валидированные методики и обоснование установленных пределов для

каждой примеси, основанное на данных PDE, TTC или историческом профиле. Отдельно описываются используемые стандарты.

Программа стабильности (Модуль 3.2.P.8) расширяется за счет включения специфических тестов, отслеживающих кинетику образования продуктов деградации и миграции выщелачиваемых веществ в условиях длительного и стрессового хранения. Эти данные критически важны для обоснования срока годности, условий хранения и подтверждения соответствия спецификациям в течение всего жизненного цикла продукта.

В Общем резюме по качеству (Модуль 2.3) методология контроля систематизируется в целостную аргументацию для регуляторного органа. Здесь демонстрируется логическая цепь: от выявления потенциальных примесей через этапы их удаления и валидации методов контроля к научно обоснованным спецификациям, гарантирующим безопасность.

Методология также оказывает влияние на разделы, посвященные безопасности (Модули 4 и 5). Если содержание примеси превышает порог, требуется предоставление дополнительных данных по безопасности – процедура квалификации примеси. Это может привести к необходимости проведения специальных токсикологических исследований (Модуль 4) или к углубленному анализу исторических данных клинических испытаний (Модуль 5), если профиль примесей в используемых партиях был задокументирован.

Соответствие требованиям российской фармакопеи и регуляторным подходам ЕАЭС

На национальном уровне методология должна быть гармонизирована с требованиями Государственной фармакопеи РФ (ГФ РФ) и стандартов ЕАЭС. Современная редакция ГФ РФ акцентирует внимание на контроле технологических аспектов и примесей в биологических препаратах, стремясь к сближению с ведущими международными фармакопеями. Например, фармакопейные статьи на рекомбинантные препараты прямо предписывают контроль остаточных белков и ДНК клеток-продуцентов. Следовательно, представленная в досье методология должна явно демонстрировать соответствие не только принципам ICH, но и конкретным нормам национальных и межгосударственных фармакопейных статей.

Заключение

Разработка методологии контроля примесей в иммунобиологических препаратах представляет собой комплексную задачу, интегрирующую знания в области биотехнологии, аналитической химии, токсикологии и регуляторной науки. Её значение выходит за рамки аналитической процедуры, приобретая стратегический характер для успешной регистрации.

Ключевыми компонентами успешной методологии являются: применение адекватных и валидированных аналитических методов, использование адаптированных токсикологических принципов для оценки рисков и строгое следование логике международных гармонизированных руководств.

Сформированная методология оказывает решающее влияние на содержание регистрационного досье, детализируя разделы качества и стабильности, а также обосновывая данные по безопасности. Она обеспечивает прослеживаемость и научную аргументацию для каждого установленного предела, трансформируя сырые данные в убедительную доказательную базу.

В условиях отсутствия единых исчерпывающих правил именно глубокая, прозрачная и научно обоснованная методология контроля становится основой для диалога с регулятором, гарантией безопасности препарата и необходимым условием для вывода на рынок современных и эффективных иммунобиологических лекарственных средств.

Литература

1. Roncati L., Gatti A., Mughal A.A., et al. pDNA Impurities in mRNA Vaccines // *Microorganisms*. 2025. Vol. 13, № 9. P. 1975.
2. König B., Kirchner J.O. Methodological Considerations Regarding the Quantification of DNA Impurities in the COVID-19 mRNA Vaccine Comirnaty® // *Methods and Protocols*. 2024. Vol. 7, № 3. P. 41.
3. Zhu-Shimoni J. Y., Gunawan F., Thomas A., et al. Best Practices for Monitoring and Testing Host Cell Proteins // *Biotechnology and Bioengineering*. 2014. Vol. 111, № 12. P. 2365–2373.
4. Impurities in new drug substances Q3A(R2): ICH harmonised tripartite guideline. 2006.
5. Impurities in new drug products Q3B(R2): ICH harmonised tripartite guideline. 2006.
6. Timm M., Jahn S., Niemann L. Validation of Analytical Methods Used in Testing of Biological Medicinal Products: A Review of Regulatory Requirements // *Pharmaceutical Research*. 2021. Vol. 38. P. 1807–1820.

7. Wang X., Chen L., Li Y., et al. Characterization of the Impurity Profile for a Recombinant Human Papillomavirus (HPV) Vaccine Drug Substance // *Vaccine*. 2020. Vol. 38, № 6. P. 1342–1353.

8. EMA reflection paper on the Safety Assessment of Residuals and Contaminants in Vaccines. European Vaccine Manufacturers (EVM). 2012.

9. Jenke D., Stults C., Paskiet D. Evaluation of Leachables from Single-Use Systems and Their Impact on the Safety of Biotechnology Products // *PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology*. 2015. Vol. 69, № 1. P. 123–138.

10. Q3A(R2) Impurities in New Drug Substances: Guidance for Industry. U.S. FDA.

11. Q3B(R2) Impurities in New Drug Products: Guidance for Industry. U.S. FDA.

12. Мовсисянц А. А., Бондарев В.П., Олефир Ю.В., и др. Стандарты качества иммунобиологических лекарственных препаратов – новое в Государственной фармакопее Российской Федерации // *Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения*. 2016. № 2. С. 38–41.

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR MONITORING IMPURITIES IN IMMUNOBIOLOGICAL DRUGS AND ITS IMPACT ON THE CONTENT OF THE REGISTRATION DOSSIER

Shcherbakova K.K.

Peoples' Friendship University of Russia

The complex nature of modern immunobiological drugs, manufactured using cellular and recombinant technologies, inevitably leads to the presence of diverse impurities. The development of a scientifically sound methodology for their control is a critical prerequisite for ensuring safety, especially for prophylactic agents used widely. This article examines the specific classification of biologically derived impurities and analyses the methodological challenges associated with their heterogeneity. Particular focus is placed on contemporary approaches to building a control system, including the validation of analytical methods, the adaptation of toxicological principles for safety assessment, and the integration of requirements from international ICH guidelines. The central aspect of the work is an investigation

into the direct influence of the established methodology on the content and logical reasoning within key modules of the registration dossier (CTD) in accordance with the regulations of the EAEU and the Russian Federation. It is demonstrated that a thoroughly developed control methodology performs an integrative function, linking production technology, analytical support, and regulatory expectations, thereby forming the foundation for successful registration and confirmation of the drug's safety throughout its entire life cycle.

Keywords: immunobiological drugs, impurity control, registration dossier, ICH, method validation.

References

1. Roncati L., Gatti A., Mughal A.A., et al. pDNA Impurities in mRNA Vaccines // *Microorganisms*. 2025. Vol. 13, No. 9. P. 1975.

2. König B., Kirchner J.O. Methodological Considerations Regarding the Quantification of DNA Impurities in the COVID-19 mRNA Vaccine Comirnaty® // *Methods and Protocols*. 2024. Vol. 7, No. 3. P. 41.

3. Zhu-Shimoni J.Y., Gunawan F., Thomas A., et al. Best Practices for Monitoring and Testing Host Cell Proteins // *Biotechnology and Bioengineering*. 2014. Vol. 111, No. 12. P. 2365–2373.

4. Impurities in new drug substances Q3A(R2): ICH harmonized tripartite guideline. 2006.

5. Impurities in new drug products Q3B(R2): ICH harmonized tripartite guideline. 2006.

6. Timm M., Jahn S., Niemann L. Validation of Analytical Methods Used in Testing of Biological Medicinal Products: A Review of Regulatory Requirements // *Pharmaceutical Research*. 2021. Vol. 38. P. 1807–1820.

7. Wang X., Chen L., Li Y., et al. Characterization of the Impurity Profile for a Recombinant Human Papillomavirus (HPV) Vaccine Drug Substance // *Vaccine*. 2020. Vol. 38, No. 6. P. 1342–1353.

8. EMA reflection paper on the Safety Assessment of Residuals and Contaminants in Vaccines. European Vaccine Manufacturers (EVM). 2012.

9. Jenke D., Stults C., Paskiet D. Evaluation of Leachables from Single-Use Systems and Their Impact on the Safety of Biotechnology Products // *PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology*. 2015. Vol. 69, No. 1. P. 123–138.

10. Q3A(R2) Impurities in New Drug Substances: Guidance for Industry. U.S. FDA.

11. Q3B(R2) Impurities in New Drug Products: Guidance for Industry. U.S. FDA.

12. Movsesyants A.A., Bondarev V.P., Olefir Yu. V., et al. Quality standards for immunobiological medicinal products – new in the State Pharmacopoeia of the Russian Federation // *Bulletin of the Scientific Center for Expertise of Medical Products*. 2016. No. 2. pp. 38–41.

Современный институт медицинской сестры и гериатрическая практика

Доготарь Олеся Александровна,

кандидат медицинских наук, доцент, доцент РГСУ

E-mail: dogotar_ua@pfur.ru

Артамонов Святослав Павлович,

студент лечебного факультета РГСУ

E-mail: svf-sta@yandex.ru

Современная гериатрическая практика формируется на пересечении демографического старения, клинической сложности пациентов и организационных требований к длительному, комплексному и междисциплинарному ведению. В статье представлен обзор российских и международных источников 2015–2025 гг., нормативных документов и клинических рекомендаций, с акцентом на сестринские роли в диагностике и ведении гериатрических синдромов (старческая астения, когнитивные нарушения, падения, полипрагмазия), а также в обеспечении преемственности ухода. Центральным элементом анализа являются взгляды Лаптевой Е.С., подчеркивающей системообразующую роль медсестры в организации помощи пожилому пациенту и одновременно указывающей на нерешённость вопроса о содержании и границах этой роли в отечественной модели помощи. Результаты синтеза показывают: усиление гериатрической службы невозможно без институционального укрепления сестринского труда (образование, штатные нормативы, стандартизированные маршруты, лидерство и межпрофессиональная коммуникация).

Ключевые слова: гериатрия; сестринское дело; гериатрическая медсестра; старческая астения; полиморбидность; полипрагмазия; комплексная гериатрическая оценка; междисциплинарная команда; длительный уход.

Введение

Старение населения является одним из ключевых долгосрочных факторов трансформации систем здравоохранения во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году численность людей в возрасте 60 лет и старше увеличится более чем в два раза и достигнет примерно 2,1 млрд человек [6]. Демографическое старение сопровождается ростом потребности в долгосрочной медицинской и социальной помощи, профилактике функционального снижения и поддержке автономности пожилых пациентов. В России демографические изменения также усиливают значение гериатрической помощи и сестринского труда. По имеющимся оценкам, численность населения старше 65 лет на начало 2024 года составляет около 25 млн человек, что соответствует примерно 17% общей численности населения [8]. Увеличение доли пожилых граждан приводит к росту числа пациентов с полиморбидностью, старческой астенией, когнитивными нарушениями и высокой потребностью в длительном наблюдении и уходе.

Концептуальная рамка «современного института медицинской сестры» в данной статье понимается как совокупность: (а) профессиональной роли и автономии; (б) образовательных траекторий и стандарта компетенций; (в) организационного места медсестры в маршруте пациента; (г) этических норм и коммуникационных практик. Именно в гериатрии медсестра чаще всего становится «узлом» преемственности: она видит пациента дольше всех, наблюдает динамику функций, координирует взаимодействия и обеспечивает выполнение плана ухода.

Работы Лаптевой Е.С. соединяют клиническую гериатрию и управление сестринской деятельностью на уровне практики и организации помощи. В своих публикациях она фиксирует проблему неопределённости, отмечая, что «до настоящего времени окончательно не определена роль медицинской сестры» [1] и задаёт нормативно-ценностную рамку: «Медицинская сестра – это царица медицины».

Методы

Работа выполнена в формате обзорного исследования с элементами тематического анализа, направленного на выявление взаимосвязи между актуальными проблемами гериатрии и ролью медицинской сестры в системе оказания помощи пожилым пациентам. Поиск источников осуществлялся в период 2015–2025 гг. в открытых научных и медицинских базах данных, включая eLibrary, PubMed, а также на официальных ресурсах Министерства здравоохранения Российской Федерации, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и профильных профессиональных организаций.

В процессе поиска использовались следующие ключевые слова и поисковые запросы: *geriatric nursing*, *nurse role in geriatrics*, *frailty*, *polypharmacy*, *comprehensive geriatric assessment*, *advanced practice nursing*, а также русскоязычные эквиваленты: «сестринское дело в гериатрии», «роль медицинской сестры», «старческая астения», «полипрагмазия», «комплексная гериатрическая оценка».

Критериями включения источников являлись:

- публикации в рецензируемых научных журналах;
- клинические рекомендации и нормативные документы, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации;
- аналитические и программные документы международных организаций (ВОЗ);
- публикации, содержащие описание сестринских ролей, компетенций или вмешательств в гериатрической практике.

Критериями исключения являлись:

- источники без указания автора и выходных данных;
- публикации, не содержащие информации о сестринских вмешательствах или роли медицинской сестры в гериатрии;
- нерецензируемые материалы и вторичные пересказы без ссылки на первичный источник.

Отобранные публикации анализировались методом тематического кодирования. Из каждого источника извлекались данные о демографических тенденциях старения, клинических особенностях гериатрических синдромов, организационных моделях помощи пожилым пациентам и профессиональных компетенциях медицинских сестёр. Далее

полученные материалы группировались по ключевым аналитическим темам: демографические предпосылки развития гериатрии, гериатрические синдромы, организационная модель помощи, кадровые и образовательные аспекты сестринской деятельности, а также институциональные разрывы в реализации сестринских ролей.

Результаты исследования

Рост демографической нагрузки и потребности в длительном уходе

Демографическое старение повышает роль сестринского персонала по двум причинам: растет численность пациентов, которым требуется длительный уход, и одновременно увеличивается клиническая сложность «среднего» пожилого пациента. ВОЗ указывает на масштаб этого процесса: к 2050 году численность людей старше 60 лет удвоится и достигнет 2,1 млрд, а число людей старше 80 лет увеличится почти втрое – до 426 млн по сравнению с 2020 годом [5]. В российском контексте эта тенденция также усиливает нагрузку на систему здравоохранения. По данным Лаптевой Е.С. и соавторов, потребность пожилых людей в медицинской и медико-социальной помощи примерно на 50% выше, чем у населения среднего возраста [13]. В результате недостаточность сестринских ресурсов становится не локальной проблемой отдельных учреждений, а системным ограничителем качества гериатрической помощи.

Гериатрические синдромы как новый фокус медицинской помощи

Современная гериатрия ориентируется не столько на лечение отдельных заболеваний, сколько на управление гериатрическими синдромами и функциональными исходами, такими как мобильность, способность к самообслуживанию, когнитивный статус и безопасность повседневной жизни.

В клинических рекомендациях Минздрава РФ старческая астения определяется как ключевой гериатрический синдром, связанный со снижением физиологического резерва организма и повышенным риском неблагоприятных исходов, включая потерю автономности и смертность [1] [2]. Рекомендации также подчеркивают связь астении с полиморбидностью и указывают на потенциальную обратимость синдрома при правильной тактике ведения. В этой логике возрастает значение сестринских вмешательств, направленных на профилактику функционального снижения: контроль питания, поддержание физической активности, профилактика падений, наблюдение за приемом лекарств и выявление социальных факторов риска.

Лаптева Е.С. и соавторы описывают группу «хрупких» пациентов старше 80 лет, для которых характерны выраженные ограничения повседневной активности и когнитивные нарушения [14]. В этих условиях задачи ухода и наблюдения зачастую оказываются более значимыми, чем объем лечебных вмешательств.

Новые компетенции медицинской сестры в гериатрии

Одним из ключевых инструментов современной гериатрической практики является комплексная гериатрическая оценка (КГО, CGA), которая объединяет медицинскую, функциональную и социальную диагностику пациента. В обзоре Cochrane CGA определяется как «multi-dimensional, multi-disciplinary» процесс оценки состояния пожилого человека, направленный на выявление медицинских, психических и функциональных проблем и формирование согласованного плана лечения и наблюдения [10]. Российские клинические рекомендации по старческой астении конкретизируют сестринскую роль в проведении этой оценки. В приложениях описаны процедуры, выполняемые медицинской сестрой: инструктаж пациента, проведение функциональных тестов (оценка равновесия, скорость ходьбы, подъем со стула), а также фиксация результатов и факторов риска падений. Таким образом, в современной гериатрии формируется новая модель сестринской компетенции, в которой медицинская сестра выступает не только исполнителем назначений врача, но и активным участником диагностики функционального состояния пациента.

Когнитивные нарушения и безопасность фармакотерапии

Когнитивные нарушения являются одним из наиболее чувствительных к сестринскому наблюдению аспектов гериатрической помощи. Они проявляются в повседневном поведении пациента и повышают риск делирия, падений и неправильного приема лекарств. Клинические рекомендации Минздрава РФ по когнитивным расстройствам у пожилых пациентов отмечают, что коморбидные заболевания могут быстро ухудшать когнитивный и функциональный статус. Среди провоцирующих факторов выделяют полипрагмазию, падения, недержание мочи и нарушения питания [5]. В этих условиях медицинская сестра часто становится первым специалистом, фиксирующим ухудшение состояния пациента: снижение активности, спутанность сознания, отказ от пищи, нарушения сна или повышение риска травм. Особое значение приобретает и проблема полипрагмазии.

Пожилые пациенты нередко получают большое количество лекарственных препаратов, а ошибки чаще всего возникают на переходах между уровнями медицинской помощи. Международные исследования подчеркивают, что медсестры играют важную роль в обеспечении лекарственной безопасности и должны активно участвовать в межпрофессиональном управлении полипрагмазией [10]. Таким образом, современная гериатрическая медсестра должна обладать навыками медикаментозной осторожности, сверки назначений, наблюдения за побочными реакциями и обучения пациента и его семьи правилам безопасного приема лекарств.

Институциональный разрыв роли медицинской сестры

Организационная рамка гериатрической помощи определяется нормативными документами системы здравоохранения. В частности, приказ Минздрава РФ № 38н (2016) устанавливает порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» и определяет систему мер, направленных на поддержание способности пожилых пациентов к самообслуживанию и независимой жизни [3]. Документ также закрепляет различные формы оказания помощи – амбулаторную, стационарную и дневной стационар, а также элементы помощи на дому. В этой структуре сестринское наблюдение, выезды на дом и обучение пациента становятся важными элементами маршрута оказания помощи. Однако в научной литературе отмечается, что изменения нормативной базы могут сопровождаться кадровыми рисками. По данным Лаптевой Е.С. и соавторов, после введения приказа № 38н число гериатров сократилось примерно в два раза, что привело и к уменьшению числа гериатрических медсестер [13]. Это противоречие отражает институциональный разрыв современной гериатрической помощи: при высокой фактической значимости сестринской роли ее функции и границы ответственности остаются недостаточно определенными.

Международный контекст и развитие сестринских ролей

В международной практике медсестринство рассматривается как центральный элемент интегрированной помощи пожилым людям. В руководстве ВОЗ по внедрению модели ICOPE подчеркивается необходимость развития кадровых ролей, способных обеспечивать непрерывное сопровождение пациента на уровне сообщества. На глобальном уровне эта стратегия закреплена в инициативе «Десятилетие здорового старения» (2021–2030), направленной на улучшение качества жизни пожилых людей и развитие интегрированных систем ухода. В России аналогичная логика реализуется через федеральный проект «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография», стартовавший в 2019 году [12].

Системное развитие гериатрической помощи невозможно без укрепления сестринского корпуса. Именно медсестра обеспечивает взаимодействие различных участников лечебного процесса. В то же время сохраняется проблема институциональной неопределенности роли медицинской сестры, так как до настоящего времени окончательно не определена роль медицинской сестры. Современная гериатрическая практика неизбежно сталкивается с кадровым дефицитом, и это усиливает ценность «продвинутых» сестринских ролей (advanced practice). В новостном релизе ВОЗ 2025 года отмечено, что глобальная численность медсестер выросла с 27,9 млн (2018) до 29,8 млн (2023) [8], но сохраняются большие региональные диспропорции; также подчеркивается прогресс в распространённости advanced practice nursing roles (их наличие отметили 62% стран). В более раннем документе ВОЗ «State of the world's nursing 2020» акцентируется необходимость инвестиций в образование, рабочие места и лидерство медсестер как условие достижения целей здравоохранения. Для гериатрии это означает: без управленческого и образовательного усиления медсестры как координатора ухода невозможно обеспечить масштабирование гериатрической службы и достижение целей активного долголетия.

Таблица ниже суммирует ключевые взаимосвязи «проблема гериатрии → сестринская роль → ответ системы → разрыв внедрения» (Таб.1).

Как видно из представленной таблицы, ключевые вызовы современной гериатрии напрямую связаны с расширением функций сестринского персонала. Практически во всех выделенных проблемных областях – управлении полиморбидностью, профилактике падений, контроле когнитивных нарушений и обеспечении безопасности фармакотерапии – именно медицинская сестра выступает основным наблюдателем и координатором ухода. При этом сопоставление сестринских компетенций и организационных ответов системы показывает наличие системного разрыва: нормативные документы и клинические рекомендации предполагают активную и расширенную роль медицинской сестры, тогда как кадровые ресурсы, распределение времени и фактические полномочия сестринского персонала часто не позволяют реализовать эти функции в полном объеме. Таким образом, развитие гериатрической помощи требует не только клинических рекомендаций, но и институционального укрепления роли медицинской сестры в системе здравоохранения.

Актуальный вызов в гериатрии	Сестринские роли и компетенции, необходимые для ответа	Политико-организационные и образовательные ответы	Сохраняющиеся разрывы (gaps)
Рост доли пожилых и старческих пациентов и увеличение потребности в медико-социальной помощи	Координация ухода, связь с семьей/соцслужбами, длительное наблюдение, обучение пациента, мониторинг функционального статуса	Федеральный фокус на активном долголетии (проект «Старшее поколение» в рамках «Демографии»), развитие гериатрической службы и подготовка специалистов	Нехватка кадров и времени на уход, неоднородность региональных моделей, слабая интеграция с соцсферой на практике
Полиморбидность и динамическое «наслаивание» проблем у пожилых	Навыки приоритизации проблем, наблюдение за изменениями, коммуникация в команде, ведение планов ухода и профилактики осложнений	Клинико-организационная ориентация на междисциплинарность; развитие КГО/CGA как рамки планирования	Недостаточно стандартизированы роли медсестры в команде и распределение ответственности в маршруте пациента
Старческая астения и функциональное снижение	Проведение функциональных тестов, оценка риска падений, формирование и поддержка плана физической активности/питания, наблюдение за автономностью	Клинические рекомендации по старческой астении с конкретизацией сестринских процедур (инструктаж и проведение тестов)	Недостаточная обеспеченность инструментами и временем на стандартизированные тесты, дефицит подготовки в первичном звене
Когнитивные нарушения и делирий, связанные с коморбидностью	Раннее выявление ухудшения, мониторинг поведения/сна/питания/профилактика падений, коммуникация с ухаживающими, обеспечение безопасности	Клинические рекомендации по когнитивным расстройствам, связывающие риски с полипрагмазией, падениями, недержанием, нарушением питания	Фрагментация наблюдения между учреждениями, недостаток навыков делирий-менеджмента в рутинной практике
Полипрагмазия и безопасность фармакотерапии	Медикаментозная настороженность, сверка назначений, обучение пациента/семьи, участие в межпрофессиональной медикаментозной коммуникации	Международные данные подчеркивают необходимость вовлечения медсестер в управление полипрагмазией; российские рекомендации фиксируют риски полипрагмазии в контуре когнитивных нарушений	Не всегда определены полномочия и «вес» сестринских наблюдений в лекарственных решениях; дефицит обучения медсестер лекарственному менеджменту
Маршрутизация и преемственность между домом, поликлиникой, стационаром, дневным стационаром	Сестринская навигация пациента, визиты/контакт на дому, контроль выполнения плана, связь с врачом-гериатром и терапевтом	Порядок оказания помощи по профилю «гериатрия» (38н) задает формы и условия оказания помощи, включая элементы ведения и наблюдения	Риски кадровых «провалов» при изменении штатных нормативов; критика последствий реформирования (снижение ресурсов) в профильной литературе
Кадровый дефицит и необходимость «расширенной практики»	Развитие лидерства, продвинутых ролей, самостоятельности в рамках протоколов, клиническая и коммуникационная компетентность	ВОЗ фиксирует актуальность инвестиций в сестринское образование и расширение advanced practice roles	Неравномерность внедрения продвинутых ролей и лидерства; перегрузка персонала снижает качество длительного ухода

Для визуализации ключевых вех, влияющих на гериатрическую организацию помощи и потребность в сестринских компетенциях, ниже приведена временная шкала. В ней использованы: сведения о создании профессиональной ассоциации и стратегических документах из презентационных материалов по гериатрической службе, сведения о федеральном проекте «Старшее поколение» и его запуске с 2019 года, а также данные о клинических рекомендациях и международной рамке Десятилетия здорового старения. [13]

Ключевые вехи развития гериатрии и сестринских компетенций (2010–2025)

2013 – создание *Российской ассоциации геронтологов и гериатров (РАГГ)*.

2016 – утверждение *Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года*; издание *Приказа Минздрава РФ № 38н*, регламентирующего организацию медицинской помощи по профилю «гериатрия».

2019 – запуск федерального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография», направленного на развитие системы долговременного ухода и гериатрической помощи.

2020 – утверждение *клинических рекомендаций по ведению пациентов со старческой астенией*, разработанных Российской ассоциацией геронтологов и гериатров.

2021 – начало реализации международной инициативы «*UN Decade of Healthy Ageing (2021–2030)*» – Десятилетие здорового старения ООН; публикация клинических рекомендаций по гериатрии в открытом доступе.

2025 – усиление глобального внимания к проблеме *кадрового дефицита в гериатрии* и развитию ролей *advanced practice nursing* (расширенных профессиональных компетенций медицинских сестёр).

Представленная хронология демонстрирует постепенное формирование нормативной и организационной базы гериатрической помощи в России. Создание профессиональных ассоциаций и стратегических документов, а также внедрение клинических рекомендаций сформировали основу для развития гериатрической службы. Вместе с тем данная временная шкала показывает, что институциональное укрепление роли медицинской сестры в системе гериатрической помощи происходит значительно медленнее. Несмотря на наличие нормативных документов и международных инициатив, направленных на развитие интегрированной помощи пожилым пациентам, вопросы расширения сестринских компетенций, лидерства и образовательной

подготовки продолжают оставаться одним из наиболее уязвимых элементов системы.

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают, что современная гериатрическая практика характеризуется высокой степенью зависимости от сестринского персонала. Это связано с особенностями структуры заболеваемости пожилых пациентов, у которых доминируют не отдельные нозологические формы, а гериатрические синдромы – старческая астения, когнитивные нарушения, падения и полипрагмазия. Такие состояния требуют не только медицинского лечения, но и длительного наблюдения, мониторинга функционального статуса и координации ухода, что делает роль медицинской сестры ключевой в обеспечении непрерывности помощи.

Полученные выводы согласуются с международными исследованиями, в которых подчеркивается центральная роль медсестры в системе гериатрической помощи. В ряде зарубежных моделей здравоохранения именно сестринский персонал выполняет значительную часть функций по мониторингу состояния пациента, проведению функциональной оценки и организации взаимодействия между специалистами. Особенно это характерно для моделей интегрированной помощи пожилым людям, где медсестра выступает координатором между медицинскими и социальными службами.

В российской системе здравоохранения необходимость усиления сестринской роли также признается на уровне нормативных документов и профессиональных дискуссий. Однако анализ литературы показывает наличие институционального разрыва между декларируемыми функциями медицинской сестры и реальными условиями их реализации. С одной стороны, клинические рекомендации и международные стандарты предполагают участие медсестры в проведении комплексной гериатрической оценки, мониторинге функциональных изменений и профилактике осложнений. С другой стороны, кадровый дефицит, высокая нагрузка и ограниченные полномочия сестринского персонала затрудняют полноценное выполнение этих функций. Особое значение имеет проблема полипрагмазии и лекарственной безопасности. Международные исследования показывают, что участие медсестер в контроле фармакотерапии существенно снижает риск лекарственных осложнений у пожилых пациентов. Однако в российской практике участие медсестер в процессе принятия решений по лекарственной терапии остается ограниченным, что снижает потенциал сестринско-

го наблюдения как инструмента раннего выявления неблагоприятных эффектов.

Важным фактором остается исторически сложившаяся модель организации медицинской помощи, в которой ведущая роль традиционно принадлежит врачу, а сестринский персонал воспринимается преимущественно как исполнитель назначений. Такая структура ограничивает развитие расширенных сестринских ролей и препятствует внедрению моделей междисциплинарного взаимодействия, широко распространенных в зарубежной практике. Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о необходимости дальнейшего институционального укрепления сестринского компонента гериатрической помощи. Это включает развитие образовательных программ, расширение профессиональных компетенций медсестер и совершенствование организационных механизмов взаимодействия внутри междисциплинарной команды. Реализация этих направлений может стать важным условием повышения эффективности системы помощи пожилым пациентам в условиях продолжающегося демографического старения.

Заключение

Современная гериатрическая практика по своей природе ориентирована на сестринский уход: задачи функционального сопровождения, профилактики падений и осложнений, контроля полипрагмазии и поддержки ухаживающих делают сестринский труд не вспомогательным, а системообразующим элементом помощи. Синтез источников показывает, что именно медицинская сестра обеспечивает непрерывность наблюдения при старческой астении и когнитивных нарушениях, а также реализует стандартизированные процедуры функциональной оценки, закреплённые в клинических рекомендациях.

В работах Е.С. Лаптевой это противоречие современного института медицинской сестры выражено наиболее отчётливо. С одной стороны, она фиксирует высокий нормативно-ценностный статус: «Медицинская сестра – это царица медицины», подчёркивая её координирующую роль. С другой стороны, она же констатирует сохраняющийся институциональный разрыв: «до настоящего времени окончательно не определена роль медицинской сестры». Именно эта двойственность – между объективной потребностью гериатрии в расширении сестринских функций и нормативной/организационной неопределённостью их границ – является ключевым вызовом для системы.

Практически значимые выводы обзора сводятся к трём направлениям:

1. Стандартизация и закрепление сестринских ролей в комплексной гериатрической оценке (КГО/CGA) и управлении гериатрическими синдромами – с внесением соответствующих изменений в профессиональные стандарты и порядки оказания помощи.
2. Усиление образовательного контура – включение в программы подготовки и повышения квалификации модулей по функциональной оценке, делирий-менеджменту, лекарственной безопасности и коммуникации с пациентами с когнитивными нарушениями.
3. Управленческое укрепление сестринства как «сквозной» функции маршрута пациента (дом – поликлиника – стационар – дневной стационар), включая развитие расширенной сестринской практики (advanced practice nursing) и лидерских компетенций.

Эти направления согласуются с глобальными приоритетами ВОЗ по укреплению сестринской рабочей силы и с национальным фокусом на активном долголетии. Их реализация позволит преодолеть обозначенный институциональный разрыв и превратить системообразующий потенциал сестринского труда в реальный ресурс повышения качества гериатрической помощи.

Литература

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.01.2016 № 38н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»». – Текст: электронный// Гарант: информационно-правовой портал. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71251832/> (дата обращения: 23.03.2026).
2. Клинические рекомендации «Старческая астения». – Москва: Минздрав РФ, 2020. – Текст: электронный // Официальный сайт Минздрава РФ. – URL: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attach/000/059/119/original/10.Старческая_астения_2021.pdf (дата обращения: 23.03.2026).
3. Клинические рекомендации «Когнитивные расстройства у пациентов пожилого и старческого возраста». – Москва: Минздрав РФ. – Текст: электронный// Официальный сайт Минздрава РФ. – URL: <https://cr.minzdrav.gov.ru> (дата обращения: 23.03.2026).
4. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Нормативные документы и публикации по гериатрической по-

мощи. – Текст: электронный// Росздравнадзор. – URL: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru> (дата обращения: 23.03.2026).

5. World Health Organization. Ageing and health. – Текст: электронный // WHO. – URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health> (дата обращения: 23.03.2026).

6. World Health Organization. UN Decade of Healthy Ageing (2021–2030). – Текст: электронный// WHO. – URL: <https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing> (дата обращения: 23.03.2026).

7. World Health Organization. State of the World's Nursing 2020: investing in education, jobs and leadership. – Geneva: WHO, 2020. – Текст: электронный. – URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279> (дата обращения: 23.03.2026).

8. World Health Organization. Global nursing workforce report (актуальные обновления, 2025). – Текст: электронный// WHO. – URL: <https://www.who.int> (дата обращения: 23.03.2026).

9. World Health Organization. Integrated care for older people (ICOPE): Implementation framework. – Geneva: WHO, 2019. – Текст: электронный. – URL: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-FWC-ALC-19.1> (дата обращения: 23.03.2026).

10. Ellis G., Gardner M., Tsiachristas A. et al. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. – Текст: электронный// Cochrane Database of Systematic Reviews. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov> (дата обращения: 23.03.2026).

11. Национальный проект «Демография». Федеральный проект «Старшее поколение». – Текст: электронный // Правительство Российской Федерации. – URL: <http://government.ru> (дата обращения: 23.03.2026).

12. Федеральная служба государственной статистики. Демографическая структура населения Российской Федерации (данные по доле лиц 65+). – Текст: электронный// Росстат. – URL: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 23.03.2026).

13. Lapteva E.S. Роль медицинской сестры в гериатрии: состояние вопроса. – Текст: электронный// научные публикации (PDF). – URL: elibrary.ru (дата обращения: 23.03.2026).

14. Lapteva E.S. Профессиональная деятельность медицинской сестры в гериатрии (интервью и публичные выступления). – Текст: электронный// официальный сайт медицинского вуза (СЗГМУ им. И.И. Мечникова). – URL: <https://szgmu.ru> (дата обращения: 23.03.2026).

15. Материалы научно-практической конференции «Пушковские чтения». – Текст: электронный// сборник конференции. – URL: <https://elibrary.ru> (дата обращения: 23.03.2026).

16. Форум «Старшее поколение»: официальные материалы и публикации. – Текст: электронный// специализированные медицинские порталы. – URL: <https://medvestnik.ru> (дата обращения: 23.03.2026).

MODERN INSTITUTE OF NURSING AND GERIATRIC PRACTICE

Dogotar O.A., Artamonov S.P.

Russian State Social University

Modern geriatric practice is formed at the intersection of demographic aging, the clinical complexity of patients, and organizational requirements for long-term, comprehensive, and interdisciplinary care. This article presents a review of Russian and international sources from 2015–2025, regulatory documents, and clinical guidelines, with a focus on nursing roles in the diagnosis and management of geriatric syndromes (frailty, cognitive impairment, falls, and polypharmacy), as well as in ensuring continuity of care. A central element of the analysis is the perspective of E.S. Lapteva, who emphasizes the system-forming role of the nurse in organizing care for elderly patients while also noting the unresolved question of the content and boundaries of this role within the domestic healthcare model. The results of the synthesis demonstrate that strengthening geriatric services is impossible without the institutional reinforcement of nursing practice, including education, staffing standards, standardized care pathways, leadership development, and interprofessional communication.

Keywords: geriatrics; nursing; geriatric nurse; frailty; multimorbidity; polypharmacy; comprehensive geriatric assessment; interdisciplinary team; long-term care.

References

1. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 38n dated January 29, 2016 "On Approval of the Procedure for Providing Medical Care in the Field of Geriatrics". – Text: electronic// Garant: information and legal portal. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71251832/> (date of request: 23.03.2026).
2. Clinical guidelines "Senile Asthenia". – Moscow: Ministry of Health of the Russian Federation, 2020. – Text: electronic// Official website of the Ministry of Health of the Russian Federation. – URL: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attach/000/059/119/original/10.Старческая_астения_2021.pdf (date of request: 23.03.2026).
3. Clinical guidelines "Cognitive disorders in elderly and senile patients". – Moscow: Ministry of Health of the Russian Federation. – Text: electronic// Official website of the Ministry of Health of the Russian Federation. – URL: <https://cr.minzdrav.gov.ru> (date of request: 23.03.2026).
4. Federal Service for Supervision of Healthcare. Regulatory documents and publications on geriatric care. – Text: electronic// Roszdravnadzor. – URL: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru> (date of request: 23.03.2026).

5. World Health Organization. Ageing and health. – Text: electronic // WHO. – URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health> (date of request: 23.03.2026).

6. World Health Organization. UN Decade of Healthy Ageing (2021–2030). – Text: electronic // WHO. – URL: <https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing> (date of request: 23.03.2026).

7. World Health Organization. State of the World's Nursing 2020: investing in education, jobs and leadership. – Geneva: WHO, 2020. – Text: electronic. – URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279> (date of request: 23.03.2026).

8. World Health Organization. Global nursing workforce report (актуальные обновления, 2025). – Text: electronic // WHO. – URL: <https://www.who.int> (date of request: 23.03.2026).

9. World Health Organization. Integrated care for older people (ICOPE): Implementation framework. – Geneva: WHO, 2019. – Text: electronic. – URL: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-FWC-ALC-19.1> (date of request: 23.03.2026).

10. Ellis G., Gardner M., Tsiachristas A. et al. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. – Text: electronic // Cochrane Database of Systematic Reviews. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov> (date of request: 23.03.2026).

11. National Project “Demography”. Federal Project “Senior Generation”. – Text: electronic // Government of the Russian Federation. – URL: <http://government.ru> (date of request: 23.03.2026).

12. Federal State Statistics Service. Demographic Structure of the Population of the Russian Federation (Data on the Share of Persons Aged 65+). – Text: electronic// Rosstat. – URL: <https://rosstat.gov.ru> (date of request: 23.03.2026).

13. Lapteva E.S. The Role of a Nurse in Geriatrics: The State of the Issue. – Text: electronic// scientific publications (PDF). – URL: [eLIBRARY.RU](http://elibrary.ru) (date of request: 23.03.2026).

14. Lapteva E.S. Professional Activities of a Nurse in Geriatrics (Interviews and Public Speeches). – Text: electronic// official website of a medical university (North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov). – URL: <https://szgmu.ru> (date of request: 23.03.2026).

15. Materials of the scientific and practical conference “Pushkov Readings”. – Text: electronic// conference proceedings. – URL: <https://elibrary.ru> (date of request: 23.03.2026).

16. The Elderly Generation Forum: official materials and publications. – Text: electronic// specialized medical portals. – URL: <https://medvestnik.ru> (date of request: 23.03.2026).

Анализ распространенности симптомов и хронических респираторных заболеваний в популяции взрослого населения города Якутск

Аргунова Аграфена Николаевна,

к.м.н., зав. кафедрой: госпитальная терапия, профессиональные болезни и клиническая фармакология, МИ СВФУ им. М.К. Аммосова
E-mail: agraфena888@mail.ru

Хорунов Алексей Николаевич,

к.м.н., доцент кафедры: Организация здравоохранения и профилактическая медицина, МИ СВФУ им. М.К. Аммосова
E-mail: aleksej.xorunov.61@mail.ru

Изучена распространенность респираторных симптомов и хронических заболеваний органов дыхания у населения г. Якутска и выявлены основные факторы риска развития ХРЗ согласно анкете GARD. Всего рассмотрены всего 8825 анкет GARD заполненные 2022–2023 гг. Среди населения города Якутск выявлена высокая распространенность респираторных заболеваний и ведущие факторы риска: курение, профессиональные вредности.

Ключевые слова: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, факторы риска, курение, одышка, кашель, спирометрия.

Введение

Хронические респираторные заболевания (ХРЗ) признаны одной из основных причин преждевременной смерти среди взрослого населения во всем мире. Хронические респираторные заболевания, поддающиеся профилактике и лечению, включают хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальную астму (БА) и респираторные аллергические реакции (АР).

В целом, распространенность ХРЗ увеличивается повсеместно, в частности, среди детей и людей пожилого возраста ХРЗ оказывают серьезное негативное влияние на качество жизни и трудоспособность населения [13]. Уже в настоящее время заболевания органов дыхания занимают первое место в структуре общей заболеваемости населения Российской Федерации, отражая неблагоприятное состояние здоровья населения [2]. Предсказывают, что глобальное влияние ХРЗ в будущем значительно увеличится, тем не менее, многие ХРЗ можно контролировать посредством надлежащего лечения населения в развитых и развивающихся странах, а также социально-неблагополучных категорий населения [13].

Согласно данным официальной статистики в Российской Федерации общая заболеваемость ХОБЛ среди взрослого населения составляет 6,68%, причем темп прироста данного показателя за 7 лет (с 2005 по 2012 год) составил 27,2%.

Высокой распространенности ХРЗ, в частности ХОБЛ, способствует ряд факторов риска, в особенности курение табака. Курение табака – основной фактор риска развития ХОБЛ, более чем в 10 раз увеличивающий риск ее развития. Россия десятилетиями была и пока еще остается самой курящей страной в европейском регионе. Так, распространенность курения достигает 39%: среди мужчин курят 60,7%, среди женщин – 21,7%. Кроме того, 32 из 85 регионов России находятся на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, т.е. в суровых климатогеографических условиях с напряженной экологической ситуацией, что также существенно влияет на риск развития ХРЗ [7]. Проведение спирометрии после ингаляции бронходилататором короткого действия необходимо для диагностики и оценки степени тяжести ХОБЛ, но проба не является методом дифференциальной диагностики с БА и не позволяет прогнозировать течение ХОБЛ [8].

Цель работы

Изучение распространенности респираторных симптомов и хронических заболеваний органов дыхания у населения г. Якутска и выявление основных факторов риска развития ХРЗ согласно анкете GARD.

Задачи исследования

1. Провести анализ данных анкетирования среди населения города Якутск в возрасте от 18 до 97 лет.
2. Определить по данным опросника наличие/отсутствие симптомов ХРЗ у населения г. Якутск.
3. Определить по данным опросника наличие/отсутствие сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.
4. Выявить влияние вредных привычек, производственных факторов на возникновение патологии дыхательной системы.
5. Выявить распространенность и оценку степени тяжести ХОБЛ по данным анализа функции внешнего дыхания (спирометрии).

Материалы и методы

Рассмотрены всего 8825 анкет GARD заполненные 2022–2023 гг. Средний возраст респондентов $44,9 \pm 2,5$, в диапазоне от 18 до 97 лет; 5777 (65,46%) чел. составляли женщины, 3048 (34,54%) чел. составляли мужчины. 4568 (51,76%) респондентов на время проведения опроса были трудоустроены.

Согласно данным проведенных исследований среди населения города Якутск отмечена высокая распространенность респираторных заболеваний и факторов риска. Анализ данных опроса показал, что наиболее часто встречающимся симптомом является одышка – 32,26%. Как выяснилось, в большей степени одышкой страдают лица среднего и пожилого возраста, у которых, в то же время наблюдается и боль-

шее число заболеваний ССС по сравнению с другими возрастными группами. Таким образом, симптом одышка не может со 100% вероятностью сказать, что у данных больных патология ДС, либо ССС. Наиболее достоверными симптомами являются кашель, мокрота и свистящее дыхание/хрипы в легких, которые в большей степени присущи заболевания дыхательной системы. Выявление респираторных симптомов с помощью анкеты ВОЗ– GARD показало наличие симптомов «кашель» у 14,66%, «мокрота» – у 12,36%, «свистящее дыхание, хрипы» – у 16,97%, что может послужить поводом для последующего клинического обследования, выявления начальных стадий ХРЗ и начала заблаговременного лечения, что приведет к снижению смертности и фармако-экономических затрат на лечебные мероприятия. Высокие показатели данных симптомов преобладают преимущественно у лиц в возрасте от 25 до 74 лет, что говорит о большом возрастном разбросе населения, подверженных заболеваниям органов дыхательной системы и уже страдающими ХРЗ (табл. 1).

Таблица 1. Распространенность симптомов, связанных с заболеваниями дыхательной системы

Симптом	18-24 лет	18-24 лет	25-44 лет	45-59 лет	60-74 лет	75-89 лет	90-97 лет
Кашель	1294	74	394	397	351	75	3
Мокрота	1091	69	340	345	276	57	4
Свистящее дыхание, хрипы	1498	121	438	487	392	59	1
Одышка	2847	186	785	818	866	186	6

Наиболее распространенным заболеванием среди населения г. Якутск является хронический бронхит – 26,59%, и высокие цифры по данной нозологии приходится на возрастную диапозон: от 25 до 74 лет. Притом, высокие данные по фактору «Курение» приходится на возрастную группу от 25 до 44 лет. В это же время распространенность профессиональных вредностей достигает больших цифр у лиц в возрасте от 25 до 59 лет. Что говорит о высоком риске развития такой патологии, как хронический бронхит вследствие воздействия неблагоприятных факторов, таких как запыленность, загазованность. Второй и третьей по частоте встречаемости нозологиями являются – пневмония и аллергический ринит (13,08% и 13,07%). Данные показатели говорят о неблагоприятных климатических условиях проживания населения г. Якутска, что приводит к возникновению острого воспалительного процесса в легких, а также о неблагоприятных социально-бытовых условиях (первое место по этиологии АР занимает домашняя пыль – 15,6%). Наименее встречающимся заболеванием органов дыхательной системы является эмфизема – 0,95%. Данные цифры говорят о прогностически более благоприятном течении ХРЗ в условиях г. Якутск (табл. 2).

Таблица 2. Распространенность заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы в различных возрастных группах населения (анамнестические данные)

Нозология	18-27 лет	18-24 лет	25-44 лет	45-59 лет	60-74 лет	75-89 лет	90-97 лет
Эмфизема	84	0	17	26	34	6	1
БА	733	33	186	258	215	40	1
ХБ	2347	95	688	750	683	126	5
Туберкулез легких (перенесшие)	182	4	31	58	68	21	0
Пневмония	1154	51	303	372	364	61	3
АР	1153	78	433	360	238	41	3
Заболевания ВДП	437	30	132	134	123	17	1
Заболевания ССС	1894	74	361	540	723	192	4

С повышением возраста, возрастает частота сердечно-сосудистой патологии. На наличие одышки указали 32,26% из всех респондентов, 24,46% – на заболевания сердечно-сосудистой системы. На симптомы одышки и заболевания ССС указало всего лишь 1,85%, это свидетельствует о том, что основной причиной данного симптома вероятно являются заболевания органов дыхательной системы (табл. 3).

Таблица 3. Распространенность заболеваний ССС у респондентов

	18-97лет	18-24 лет	25-44 лет	45-59 лет	60-74 лет	75-89 лет	90-97 лет
От числа всех респондентов	1894 24,46%	0,84	4,09	6,12	8,19	2,18	0,05
от возрастной группы%%		7,57	10,08	24,57	42,45	55,33	25,00
Мужчины %		6,56	9,37	22,54	41,56	56,00	30,00
Женщины %		8,17	10,50	25,58	42,78	55,06	16,67

Оцененная распространенность на подозрении ХОБЛ, составившая 8,8% пациентов, прошедших спирометрии с пробой вентолина. От общей численности населения может быть заниженной, так как данные были получены у пациентов – 4,76% исследованных на спирометрии. ХОБЛ может присутствовать у бессимптомных пациентов, что также может искажать информацию о распространенности заболевания, полученную в данном исследовании. Что касается аллергического ринита и бронхиальной астмы, было отмечено значительное расхождение между диагнозом, сообщенным респондентами, и симптомами, связанными с заболеванием, что может также означать недостаточную диагностику у респондентов. Расхождение между симптомами, сообщенными респондентами, и предыдущим диагнозом говорит о том, что ХРЗ могло быть нераспознано, или диагноз мог быть установлен поздно, что может привести к экономическим и медицинским последствиям.

Заключение

Проведен анализ анкетирования населения г. Якутская 2022–2023 гг. о наличии ХРЗ и спирографии, согласно которым среди населения города Якутск отмечена высокая распространенность респираторных заболеваний и факторов риска. У населения обнаружена довольно высокая распространенность симптомов респираторных заболеваний.

Исходя из данных выводов, можно сказать, что заболевания органов дыхания среди населения г. Якутск, остаются актуальными по сей день. Следовательно, необходимо больше внимания уделять профилактике и ранней диагностики заболеваний органов дыхания.

Широкомасштабная диспансеризация, организованная в нашей стране, позволит исправить ситуацию с недостаточным выявлением и профилактикой ХРЗ и, в частности, ХОБЛ, способствовать организации управления этими болезнями и факторами риска их развития, тем более что в программе диспансеризации уже заложены и проведение вмешательств по коррекции факторов риска, и дальнейшее наблюдение выявленных пациентов.

Литература

1. Антонов Н.С., Сахарова Г.М., Русакова Л.И., Салагай О.О. Динамика заболеваемости болезнями органов дыхания среди населения Российской Федерации в 2010–2022 гг. Медицина. 2023. № 3. С 1–17.
2. Айсанов З.Р., Черняк А.В., Калманова Е.Н. Спирометрия в диагностике и оценке терапии хронической обструктивной болезни легких в общей врачебной практике. Пульмонология. 2014;(5):101–110. URL: <https://doi.org/10.18093/0869-0189-2014-05-101-110>
3. Быстрицкая Е.В., Биличенко Т.Н. Обзор общей заболеваемости населения Российской Федерации бронхиальной астмой. Пульмонология. Том 32, № 5 (2022).
4. Гамбарян М.Г., Калинина А.М., Кушунина Д.В., Ипатов П.В., Бойцов С.А. Выявление хронических респираторных заболеваний и их факторов риска при диспансеризации взрослого населения: методологические аспекты. Профилактическая медицина. 2016;19(2):21–28. <https://doi.org/10.17116/profmed201619221-28>(дата обращения: 03.06.2020г)
5. Драпкина О.М., Концевая А.В., Муканеева Д.К. и др. Прогноз социально-экономического бремени хронической обструктивной болезни легких в Российской Федерации в 2022 г. Пульмонология. Том 32. № 4 (2022).
6. Жукова Н.В., Килесса В.В., Шкадова М.Г., Костюкова Е.А. хроническая обструктивная болезнь легких -давно «прочитанная книга» или terra incognita современной пульмонологии //Крымский терапевтический журнал. 2016 г. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hronicheskaya-obstruktivnaya-bolezn-legkih-davno-prochitannaya-kniga-ili-terra-incognita-sovremennoy-pulmonologii/viewer> (дата обращения: 02.06.2020г).

7. Кытикова О. Ю., Гвозденко Т.А., Антонюк М.В. Современные аспекты распространенности хронических бронхолегочных заболеваний // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2017 г. № 64. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-aspekty-rasprostranennosti-hronicheskikh-bronholegocnyh-zabolevaniy/viewer> (дата обращения: 02.06.2020г).

8. Маймерова Г. Ш., Фуртикова А.Б., Ашералиев М.Е., Кондратьева Е.И., Шайдерова И.Г. Функция внешнего дыхания у детей с хроническими неспецифическими заболеваниями легких // Бюллетень науки и практики. 2017 г. № 9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/funktsiya-vneshnego-dyhaniya-u-detey-s-hronicheskimi-nespetsificheskimi-zabolevaniyami-legkih/viewer> (дата обращения: 02.06.2020г).

9. Мухин Н.А., Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс]: учебник / Мухин Н.А., Моисеев В.С. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 848 с. – ISBN 978-5-9704-3470-3 – Режим доступа: <http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434703.html> (дата обращения: 06.06.2020 г.)

10. Самсонова Т. В., Лучкевич В.С., Абумуслимова Е.А. Медико-социальные особенности и динамика показателей качества жизни у городских жителей при формировании заболеваний органов дыхания на территориях экологического риска // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015 г. Том 17. № 5(2). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mediko-sotsialnye-osobennosti-i-dinamika-pokazateley-kachestva-zhizni-u-gorodskih-zhiteley-pri-formirovaniy-zabolevaniy-organov/viewer> (дата обращения: 03.06.2020г).

11. Тулегенова Л. М., Молдашева З.Б., Исакова А.Н. Выявление болезней органов дыхания по клиническим симптомам // European journal of biomedical and life sciences. 2017 г. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vyyavlenie-bolezney-organov-dyhaniya-po-klinicheskimi-simptomam> (дата обращения: 01.06.2020).

12. Шевцова В.И., Зуикова А.А., Пашков А.Н. Раннее выявление хронической обструктивной болезни легких – вектор на биомаркеры // Архив внутренней медицины. 2016 г. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rannee-vyyavlenie-hronicheskoy-obstruktivnoy-bolezni-legkih-vektor-na-biomarkery/viewer> (дата обращения: 03.06.2020г).

13. Chuchalin AG, Khaltayev N, Antonov NS, et al. Chronic respiratory diseases and risk factors in 12 regions of the Russian Federation. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2014;9:963–974. DOI: 10.2147/copd.s67283 <http://europepmc.org/article/med/25246783> (дата обращения 01.06.2020г).

14. Анкета Gard. URL: http://www.pulmonology.ru/about/gard/RES-GARD_v1.1_19_Mar_2010.pdf

15. Анализ анкетирования населения г. Якутска за 2022–2023 гг.

ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF SYMPTOMS AND CHRONIC RESPIRATORY DISEASES IN THE ADULT POPULATION OF THE CITY OF YAKUTSK

Argunova A.N., Khorunov A.N.

Medical Institute of North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov

The prevalence of respiratory symptoms and chronic respiratory diseases in the Yakutsk population was studied and the main risk factors for the development of CRDs were identified using the GARD questionnaire. A total of 8,825 GARD questionnaires completed in 2022–2023 were reviewed. A high prevalence of respiratory diseases and the leading risk factors, smoking and occupational hazards, were identified among the Yakutsk population.

Keywords: bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary disease, risk factors, smoking, shortness of breath, cough, spirometry.

References

1. Antonov N.S., Sakharova G.M., Rusakova L.I., Salagay O.O. Dynamics of respiratory disease incidence among the population of the Russian Federation in 2010–2022. Medicine. 2023. No. 3. P. 1–17.

2. Aisanov Z.R., Chernyak A.V., Kalmanova E.N. Spirometry in diagnosis and evaluation of therapy for chronic obstructive pulmonary disease in general practice. Pulmonology. 2014;(5):101–110. URL: <https://doi.org/10.18093/0869-0189-2014-0-5-101-110>

3. Bystritskaya E.V., Bilichenko T.N. Review of the general incidence of bronchial asthma in the population of the Russian Federation. Pulmonology. Vol. 32, No. 5 (2022).

4. Gambaryan MG, Kalinina AM, Kushunina DV, Ipatov PV, Boytsov SA. Identification of chronic respiratory diseases and their risk factors during medical examination of the adult population: methodological aspects. Preventive medicine. 2016; 19(2):21–28. <https://doi.org/10.17116/profmed201619221-28> (accessed: 03.06.2020)

5. Drapkina OM, Kontseva AV, Mukaneva DK, et al. Forecast of the socio-economic burden of chronic obstructive pulmonary disease in the Russian Federation in 2022. Pulmonology. Vol. 32, No. 4 (2022).

6. Zhukova N.V., Kilessa V.V., Shkadova M.G., Kostyukova E.A. Chronic obstructive pulmonary disease – a long-read “book” or terracotta of modern pulmonology // Crimean Therapeutic Journal. 2016. No. 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hronicheskaya-obstruktivnaya-bolezni-legkih-davno-prochitannaya-kniga-ili-terra-incognta-sovremennoy-pulmonologii/viewer> (date of access: 02.06.2020).

7. Kytikova O. Yu., Gvozdenko T.A., Antonyuk M.V. Modern aspects of the prevalence of chronic bronchopulmonary diseases // Bulletin of Physiology and Pathology of Respiration. 2017. No. 64. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-aspekty-rasprostranennosti-hronicheskikh-bronholegocnyh-zabolevaniy/viewer> (date of access: 02.06.2020).

8. Maimerova G. Sh., Furtikova A.B., Asheraliev M.E., Kondratieva E.I., Shayderova I.G. External respiration function in children with chronic nonspecific lung diseases // Bulletin of Science and Practice. 2017. No. 9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/funktsiya-vneshnego-dyhaniya-u-detey-s-hronicheskimi-nespetsificheskimi-zabolevaniyami-legkih/viewer> (date of access: 06/02/2020).

9. Mukhin N.A., Propaedeutics of internal diseases [Electronic resource]: textbook / Mukhin N.A., Moiseev V.S. – 2nd ed., add. and processed – M.: GEOTAR-Media, 2015. – 848 p. – ISBN 978-5-9704-3470-3 – Access mode: <http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434703.html> (date of access: 06.06.2020)

10. Samsonova T.V., Luchkevich V.S., Abumuslimova E.A. Medical and social characteristics and dynamics of quality of life indicators in urban residents during the formation of respiratory diseases in areas of environmental risk // Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2015. Vol. 17. No. 5(2). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mediko-sotsialnye-osobennosti-i-dinamika-pokazateley-kachestva-zhizni-u-gorodskih-zhiteley-pri-formirovaniy-zabolevaniy-organov/viewer> (Accessed: 03.06.2020).

11. Tulegenova L.M., Moldasheva Z.B., Isakova A.N. Detection of respiratory diseases by clinical symptoms // European journal of biomedical and life sciences. 2017. No. 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vyyavlenie-bolezney-organov-dyhaniya-po-klinicheskimi-simptomam> (access date: 06/01/2020).

12. Shevtsova V.I., Zuikova A.A., Pashkov A.N. Early detection of chronic obstructive pulmonary disease – vector for biomarkers // Archives of Internal Medicine. 2016 No. 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rannee-vyyavlenie-hronicheskoy-obstruktivnoy-bolezni-legkih-vektor-na-biomarkery/viewer> (access date: 06/03/2020).

13. Chuchalin AG, Khaltayev N, Antonov NS, et al. Chronic respiratory diseases and risk factors in 12 regions of the Russian Federation. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2014; 9:963–974. DOI: 10.2147/copd.s67283 <http://europepmc.org/article/med/25246783> (accessed June 1, 2020).

14. Gard Questionnaire. URL: http://www.pulmonology.ru/about/gard/RES-GARD_v1.1_19_Mar_2010.pdf

15. Analysis of the Yakutsk population survey for 2022–2023.

Экзистенциальный смысл семантического расщепления феномена «душевнобольной» от модели «симптом → подавление» к гуманистической модели «опыт → осмысление»

Заховаева Анна Георгиевна,

доктор философских наук, профессор, Ивановский государственный медицинский университет
E-mail: ana-zah@mail.ru

Урсу Александр Васильевич,

кандидат медицинских наук, доцент, Ивановский государственный медицинский университет
E-mail: avursu@mail.ru

Представленная статья в историко-философском контексте анализирует генезис понятия «душевнобольной», вскрывает семантическое расщепление этого феномена, является логическим продолжением уже опубликованного ранее исследования в представленном журнале «Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования». 2026. № 2 [1]. Настоящее междисциплинарное исследование (союз философии и медицины) фокусируется как на клиничко-этических следствиях этого расщепления, так и экзистенциальном толковании. Когда возникает экзистенциальная катастрофа для пациента: интерпретация собственного опыта (например, «голосов») как безумия ведёт к утрате субъектности и права на полноценное человеческое существование. Опираясь на данные о терапевтической резистентности и феномен «носителя голосов», авторы обосновывают необходимость парадигмального сдвига – от редукционистской модели «симптом → подавление» к гуманистической модели «опыт → осмысление».

Методы: диалектика (закон перехода количественных изменений в качественные), сравнительный анализ, метод феноменологической редукции, эмпирические данные. Цель настоящей работы продемонстрировать, что выход из этого тупика лежит в радикальной смене «оптики»: в переходе от взгляда на пациента как на носителя патологического симптома к признанию в нём субъекта уникального, пусть и мучительного, опыта. Мы намерены показать, что именно право человека на собственный субъективный опыт и его интерпретацию должно стать краеугольным камнем новой, гуманистической клинической этики. Искусство понимается как решение проблемы расщепления и поиск экзистенциальной гармонии. Через разбор клинических случаев и философскую рефлексию утверждается право пациента на интерпретацию собственного психического опыта как этический императив и практический фундамент для перехода от психиатрии нормативного контроля к гуманистической психиатрии диалога.

Ключевые слова: «душевнобольной», экзистенция, диалог, пациент, слуховые галлюцинации, гуманистическая психиатрия, искусство.

Введение: от исторического расщепления к экзистенциальной катастрофе

Настоящее междисциплинарное исследование (союз философии и медицины) фокусируется как на клиничко-этических следствиях, так и экзистенциальном толковании феномена «душевнобольной». Представленное исследование в историко-философском контексте анализирует генезис понятия «душевнобольной», вскрывает семантическое расщепление этого феномена на полярные категории «гения» и «патологии», когда возникает экзистенциальная катастрофа для пациента: интерпретация собственного опыта (например, «голосов») как безумия ведёт к утрате субъектности и права на полноценное человеческое существование. Опираясь на данные о терапевтической резистентности и феномен «носителя голосов», авторы обосновывают необходимость парадигмального сдвига – от редукционистской модели «симптом → подавление» к гуманистической модели «опыт → осмысление».

Тысячелетняя история отношения к феномену «душевнобольной» было на прямой связи с «иным» («голоса», видения, откровения) и представляла собой драму семантического расщепления. Универсальный человеческий опыт, в архаике и античности составлявший основу сакрального авторитета (пророк, даймонон, риши), был последовательно демонизирован, а затем – в эпоху торжества научной рациональности – медиализирован [2], т.е. «иной» стал психически-больным. Возникла жёсткая дихотомия: «гений» (успешный переводчик внутреннего «иного» на язык культуры) и «душевнобольной» (носитель патологизированного симптома, «галлюцинации»). То есть один способен вести диалог с социумом, а другой нет.

Однако если для философа или историка это расщепление является предметом анализа, то для человека, неожиданно обнаружившего в себе «голоса» или иные формы непрошеного внутреннего диалога, оно обостряется экзистенциальной катастрофой (Я-Иной). Воспринятый через призму культурного кода, данный опыт мгновенно маркируется как признак «сумасшествия». Возникает не просто страх, а глубинный ужас утраты себя, столь пронзительно выраженный А.С. Пушкиным: «*Не дай мне Бог сойти с ума... Уж лучше посох и сума*» (Пушкин, 1833). Эта фраза означает не только беспокойство о психическом здоровье; в её основе лежит интуитивное понимание куда более страшной перспективы. В современном обществе статус «душевнобольного» сопряжён с глубокой стигмой – утратой доверия, авторитета, а часто – и элементарного права быть услышанным. Человек рискует потерять не просто психическое равновесие, но и своё место в мире людей, свою субъектность, превратившись из автора своей жизни в объект диагностики, опеки и потенциального принуждения.

Таким образом, проблема, которую мы ставим в центр данной статьи, носит не только клинический, но и фундаментальный экзистенциально-этический характер. Она заключается в следующем: унаследованная психиатрическая парадигма, фокусирующаяся на симптоме как на мишени для подавления, сама становится источником вторичной травмы, усугубляя страдание через навешивание стигматизирующего ярлыка. Страх «сойти с ума» – это не случайная фобия отдельного пациента, а системный эффе́кт культуры, окончательно расщепившей цельность человеческого опыта и возведшей медицинский диагноз в ранг современного социального приговора.

Цель настоящей работы – продемонстрировать, что выход из этого тупика лежит в радикальной смене оптики: в переходе от взгляда на пациента как на носителя патологического симптома к признанию в нём субъекта уникального, пусть и мучительного, опыта. Мы намерены показать, что именно право человека на собственный субъективный опыт и его интерпретацию должно стать краеугольным камнем новой, гуманистической клинической этики.

Тупик редукции: от «пациента» к «носителю»

Страх «умопомешательства», отражённый в цитированных выше Пушкинских страхах, находит своё воплощение в суровой реальности клинической

практики, построенной на попытке любой ценой этого «безумия» избежать. Доминирующая биомедицинская парадигма предлагает, казалось бы, ясный алгоритм: феномен «голосов» как ключевой симптом → диагностика психотического расстройства → назначение антипсихотической терапии, направленной на подавление, «купирование» данной симптоматики [3]. Однако клиническая реальность вносит в эту логику драматические коррективы. Данные современных исследований свидетельствуют, что стратегия фармакологического подавления оказывается принципиально неэффективной для значительной доли пациентов. Около 30% лиц с диагнозом шизофрения попадают в категорию резистентных к терапии (treatment-resistant schizophrenia), демонстрируя неадекватный ответ на последовательное применение двух и более антипсихотиков [4]. Более того, даже при формально успешной терапии у 20–30% пациентов позитивные симптомы, включая «голосы», сохраняются в хронической форме [5]. На практике это означает, что сотни тысяч людей, вопреки всем терапевтическим усилиям, не «выздоровливают» в смысле исчезновения симптома, а превращаются в его хронических носителей.

В логике унаследованной парадигмы такой пациент – это «трудный», «резистентный» случай, требующий усиления или смены фармакологического воздействия. Его продолжающийся опыт интерпретируется как показатель тяжести или неизлечимости болезни. При этом сам человек зачастую остаётся один на один с двумя тягостными реальностями: с одной стороны – с персистирующими, пугающими переживаниями («голосами»), с другой – с чувством собственной неполноценности и поражения, усугубляемым неэффективностью лечения. Тупик редукционистского подхода становится очевидным. Именно этот тупик заставляет по-новому взглянуть на феномен «носительства». «Голоса», устойчивые к фармакологическому подавлению, перестают быть просто «симптомом болезни» в узком биологическом смысле.

Человек постоянно ведёт диалог с самим собой, в этом его индивидуальность. Он (диалог) стабильный элемент психической реальности человека, особенность его внутреннего ландшафта. Но где та «красная линия», которая разделяет норму и патологию? И тогда центральный вопрос помощи смещается с вопроса «Как нам это окончательно устранить?» на принципиально иной: «Как мы можем помочь человеку жить с этим опытом, минимизировать причиняемое им страдание и восстановить утраченный контроль над собственной жизнью?». Ответ на этот вопрос требует выхода за рамки чисто биологической модели и признания субъективного опыта пациента в качестве законного предмета терапевтической работы и философской рефлексии.

Феноменологический поворот: от «симптома-врага» к «диалогу с эхом»

Необходимо искать принципиально иные пути взаимодействия с феноменом «голосов». Если они устойчивы к прямому подавлению, возможно, ошибочна сама стратегия борьбы, воспринимающая их как исключительно чужеродное, враждебное вторжение. Альтернативой может стать попытка феноменологической реконструкции – понимания того, какое место этот опыт занимает во внутреннем мире человека.

Традиционная тактика, часто предлагаемая как пациентам, так и врачам, – «постарайтесь не обращать внимания», «игнорируйте голоса» – оказывается не только неэффективной, но и потенциально ятрогенной. Она призывает человека к внутреннему расколу, к попытке отсечь часть собственной психической реальности, что лишь усиливает тревогу и чувство беспомощности.

Однако клинические наблюдения заставляют усомниться в этой жёсткой оппозиции. Ярким примером служит история пациентки «Альфы», перенёвшей тяжелейшее органическое поражение мозга, которое привело, среди прочего, к появлению комментирующих «голосов» исключительно негативного, оскорбительного содержания. Традиционный совет близких и имплицитная логика помощи («игнорируй», «не обращай внимания») лишь подчёркивали её беспомощность перед лицом опыта, воспринимаемого как чужеродное вторжение. Вместо следствия этой логике было предложено радикально изменить характер внутреннего отношения к феномену: не отталкивать его, а условно «принять» и обратиться к нему с добрым намерением. Результат – мгновенная трансформация содержания «голосов» на поддерживающее – обнажил фундаментальную особенность переживания: его глубинную связь с эмоциональным состоянием и самооценкой самой пациентки. Это не было «излечением» в классическом смысле, но стало моментом обретения контроля и начала изменения качества переживания. Данное наблюдение можно метафорически осмыслить через известный сюжет о маленьком еноте из советского мультфильма, который боялся собственного грозного отражения в воде, пока не догадался улыбнуться ему. Угроза исходила не от внешней сущности, а от характера взаимодействия с собственным отражением. Так и в описанном случае: мучительным было не само наличие «голоса», а содержание и тон внутреннего диалога, который этот голос озвучивал. Изменение эмоционального

посыла (со страха и отвержения на принятие и доброту) привело к трансформации «ответа». Это позволяет выдвинуть гипотезу, что за фасадом «галлюцинации» часто скрывается диссоциированное, проецированное вовне эхо собственных дисфункциональных когнитивных схем – паттернов критики, страха, травматического опыта, достигших степени субъективной автономии.

Таким образом, терапевтической мишенью становится не «симптом» как таковой, а нарушенные отношения человека с частью собственной психики. Первой и главной задачей помощи в такой парадигме становится не подавление, а достижение своего рода внутреннего согласия, налаживание диалога. Цель смещается с невыполнимого «заставить голоса замолчать» к достижимому и этичному «помочь человеку изменить характер взаимодействия с ними, снизив их деструктивную власть и эмоциональный заряд». Этот шаг от борьбы к диалогу является первым практическим воплощением права пациента на субъективный опыт – права не быть немедленно объявленным врагом самому себе, а получить возможность исследовать и понять то, что происходит в границах собственного сознания.

Этическая дилемма: право на «дар» в обличье «проклятия» и новая этика диалога

Феноменологический поворот, смещающий фокус с подавления симптома на понимание опыта, обнажает глубинную этическую проблему, скрытую в сердцевине терапевтических отношений. Эта проблема может быть обозначена метафорой «механик и владелец уникальной машины». Специалист, руководствуясь диагностическими алгоритмами («механик»), определяет «неисправность» и планирует её устранение. Однако сам «владелец» – носитель опыта – может воспринимать ту же особенность не как поломку, а как неотъемлемую часть идентичности, хрупкий, но ценный механизм выживания или даже источник смысла.

Наиболее драматично эта коллизия проявляется в случаях, где психотический опыт формируется как комплексный ответ на экстремальную травму и впоследствии кристаллизуется в уникальную творческую вселенную. Яркой иллюстрацией служит история пациентки «Гамма», чьё детство и юность были отмечены тяжёлой эмоциональной депривацией и травмой, усугублённой стигматизирующим опытом недобровольной госпитализации. В ответ на невыносимость реальности её психика создала защитный мир сложных фантазий и образов (феноменологически близких к онейроидным состояниям), в котором она обрела безопасность, идентичность и смысл. В этом мире она «жила», а по возвращении из него – фиксировала пережитое в литературных текстах. Попытка внешнего вмешательства, направленного на «купирование» этих состояний как патологических, воспринималась ею не как лечение, а как угроза экзистенциальной катастрофы – насильственное лишение последнего прибежища и творческого ресурса. Данный случай демонстрирует, что одна и та же психическая реальность может быть одновременно и дезадаптивным уходом от мира, и важнейшим адаптивным инструментом выживания и самореализации.

Подобные истории ставят перед практикующим специалистом и всем профессиональным сообществом ряд принципиальных вопросов, не имеющих однозначного ответа в рамках традиционной, патерналистской модели:

1. Кто обладает верховным правом интерпретации внутреннего опыта: сам человек, его переживающий и наделяющий смыслом, или внешний эксперт, классифицирующий его через призму общих критериев?
2. Где проходит «красная линия» между «болезнью, причиняющей страдание» (безусловно требующей помощи) и «особенностью психического склада, порождающей или хранящей смысл»?
3. Является ли высшей целью психиатрической помощи возвращение человека к некоей статистической или социальной «норме» любой ценой, или же её цель – помочь человеку построить осмысленную и полноценную жизнь *вместе* со всем спектром его переживаний, научившись различать в них разрушительные и ресурсные аспекты?

Поиск ответов в гуманистической трактовке приводят нас к необходимости сформулировать контуры новой этики терапевтического альянса, основанной на признании автономии и субъектности пациента:

- Принцип приоритета субъективного запроса и страдания. Прямое вмешательство, направленное на изменение опыта, этически оправдано не самим фактом его отклонения от нормы, а наличием субъективно переживаемого страдания или явного запроса на помощь со стороны самого человека.
- Принцип расширенного информированного согласия. В процессе обсуждения любых вмешательств необходимо говорить не только о медицинских рисках, но и о потенциальных экзистенциальных и смысловых последствиях: о том, как лечение может повлиять на творческий потенциал, особенности мировосприятия, чувство идентичности и сложившиеся (пусть и причудливые) механизмы совладания.
- Принцип терапевтического со-исследования и со-авторства. Роль специалиста трансформируется из позиции верховного арбитра

«нормы» в позицию компетентного фасилитатора. Его задача – создать безопасное пространство, предоставить инструменты (феноменологического анализа, когнитивного переформулирования) и помочь человеку самостоятельно исследовать свой внутренний мир, понять значение и функцию своих переживаний и выработать личную стратегию отношения к ним, согласующуюся с его системой ценностей и жизненными целями.

Таким образом, признание права пациента на субъективный опыт означает отказ от патерналистской модели («я знаю, что для тебя лучше») в пользу модели ответственного партнёрства. Это признание того, что путь к облегчению страдания и повышению качества жизни часто пролегает не через «исправление» человека под заданный стандарт, а через деликатную работу по интеграции всего многообразия его психической жизни, уважая его суверенное право быть окончательным интерпретатором собственного внутреннего мира.

Гуманистическая психиатрия: принцип диалога как практическое воплощение права на опыт

Проведённый анализ подводит нас к необходимости концептуализации новой профессиональной позиции, которая могла бы операционализировать провозглашённые этические принципы. Такой основой, на наш взгляд, служат идеи гуманистической психологии, краеугольным камнем которой является учение Карла Роджерса [6]. Его знаменитая триада необходимых и достаточных условий для терапевтических изменений – безусловное позитивное принятие, эмпатическое понимание и конгруэнтность (аутентичность) терапевта – представляет собой не просто технику для работы с неврозами, а готовый этический каркас для психиатрии нового типа. Применение принципов Роджерса к работе с людьми, переживающими психотический опыт, означает радикальный сдвиг. Безусловное принятие – это отказ от немедленного патологизирования и оценок. Это готовность встретить любой опыт пациента (страх, бред, голоса) не как «симптом», подлежащий исправлению, а как значимый факт его субъективной реальности, заслуживающий внимания и уважения.

Эмпатическое понимание – это попытка «войти в шкуру» другого, даже если его внутренний мир кажется хаотичным и чуждым. В контексте «голосов» это и есть феноменологическая работа по совместной расшифровке их содержания, поиску связей с историей жизни, травмой, актуальными переживаниями.

Конгруэнтность терапевта – это отказ от роли всезнающего эксперта-«механика». Это честность в признании пределов своего понимания и готовность к подлинному диалогу, где и пациент, и врач являются равноправными, хотя и по-разному компетентными, участниками процесса поиска смысла. В таком подходе психиатр перестаёт быть агентом социального контроля, применяющим терапию *против* опыта пациента. Он становится создателем и хранителем безопасного пространства, в котором пациент, пользуясь поддержкой и профессиональными инструментами, может *сам* исследовать, оценивать и выстраивать отношения со своим внутренним миром. Это и есть практическое воплощение права на субъективный опыт.

Предлагаемый поворот не является умозрительным. Гуманистическая психиатрия есть ответ на вызовы резистентности и стигмы. Она даёт конкретные ответы на выявленные системные проблемы:

- Проблема резистентности: Если опыт нельзя «убрать», терапия фокусируется на изменении отношений к нему и восстановлении функционирования (принципы Recovery-модели), что полностью согласуется с роджерсианским акцентом на личностном росте и самоактуализации *вместе* с имеющимися трудностями.
- Проблема стигмы и социальной смерти: Установка на безусловное принятие и эмпатию прямо противоречит стигматизирующему ярлыку. Она возвращает человеку достоинство и субъектность, нарушая порочный круг «опыт → страх безумия → стигма → дезадаптация».
- Этическая дилемма («механик vs. владелец»): Позиция фасилитатора и со-исследователя снимает конфликт, переводя его в плоскость совместного поиска решений, где окончательный выбор траектории остаётся за пациентом, исходя из его ценностей (что соответствует принципу расширенного согласия).

Искусство как решение проблемы расщепления и поиск экзистенциальной гармонии

«Искусство – это область чувств и настроений человека в форме непосредственного переживания... искусство – это средство психотерапевтического воздействия на личность, оно есть способ выражения («снятия») психических и психологических переживаний» [7, С. 123]. Искусство как творчество – это особая сторона жизни Личности. В искусстве человек способен отразить свои скрытые «сущности» («голоса», «пророчества»), при этом он выходит в социальном плане за рамки «нормы», но социум не отвергает его, а принимает. Его видения («голоса») обретают статус оригинального художественного произведения, пример тому, живопись Э.Мунка, а кар-

тина «Крик», это не просто «безмолвный крик отчаяния» – это «внутренний голос – крик Души», выход из экзистенциальной катастрофы через сублимацию (вытеснения), так, его истерзанное и одинокое «Я» пытается побороть собственных «демонов». Подобное мы встречаем и в наследии Н.В. Гоголя. «Демоны» (Вий, чёрт и др.) Н.Гоголя – это метафорическое выражение зла. А в «Записках сумасшедшего» тематика «безумия» обретает личностный смысл как попытка «высказаться» и облегчить Душу, а безумие – это не умопомешательство, а итог непростого взаимодействия человека с социумом. Гоголь играет «категориями «истина-ложь» и «ум-безумие», а «безумие единственная возможность заглянуть за грань и переосмыслить свою жизнь» [8, С. 334–335]. Творчество Сальвадора Дали – это искусство на грани, по сути переход от модели «симптом → подавление» к модели «опыт → осмысление». Его «демон» – это «даймонион» Сократа, о котором пишет Платон, это внутренний голос, но не галлюцинация, а внутренний компас, интегрированным в структуру личности [9]. Картины С.Дали – это «игры с бессознательным», которые приводят к самопознанию «своих демонов» и приручению их. Сублимация в его искусстве, есть защитный психологический механизм, который способен расщеплять негативную экспрессию в творческий импульс.

Таким образом, искусство (творчество) приводит в гармонию Мир Личности, выступая как один из способов гуманистической психотерапии (арт-терапии).

Заключение

Проведённый анализ позволяет утверждать, что предлагаемый сдвиг от парадигмы симптома к парадигме опыта – не умозрительная конструкция, а практический ответ на системные тупики современной психиатрии: терапевтическую резистентность, усугубляющуюся стигму и патерналистское насилие «благих намерений». Принципы, сформулированные на стыке феноменологии, этики автономии и гуманистической психологии, задают контуры психиатрии диалога, где помощь заключается не в навязывании нормы, а в фасилитации личного поиска смысла и восстановления контроля.

Однако окончательную проверку теория этической позиции проходит не в теоретических дебатах, а в пространстве личного выбора, как врача, так и пациента. Представьте на мгновение, что вы – не исследователь или клиницист, а тот самый человек, который обнаруживает в своём внутреннем мире нечто пугающее, странное, «голос» или иную форму инаковости, выходящую за рамки привычного. Вы испытываете смятение и обращаетесь за помощью. Какой из двух предлагаемых путей вы предпочтёте для себя?

«Путь А» (Парадигма симптома): Встреча со специалистом, который, выслушав вас, уверенно классифицирует ваш опыт как «симптом», объяснит его биологическими механизмами и предложит план по его максимальному подавлению. Ваши попытки рассказать о личных ассоциациях, страхах или, возможно, о проблесках смысла в этом переживании, будут мягко, но твёрдо возвращены в русло «работы с болезнью». Ваша субъективная реальность будет считаться вторичной по отношению к объективному диагнозу.

«Путь Б» (Парадигма опыта): Встреча со специалистом, который, столкнувшись с вашим смятением, начнёт не с диагноза, а с вопроса: «Расскажите, что именно вы переживаете? Что это для вас значит? Чего вы больше всего боитесь в связи с этим? А что, если в этом есть какой-то, пусть искажённый, смысл?». Вы станете со-исследователем собственного состояния. Терапия будет направлена не на «уничтожение» части вашей психики, а на то, чтобы помочь вам осмыслить этот опыт, найти способы снизить причиняемое им страдание и интегрировать его в вашу жизненную историю, сохраняя за вами право окончательной интерпретации.

«Путь В» (Парадигма творчества): Искусство (творчество в целом) понимается как решение проблемы расщепления и поиск экзистенциальной гармонии через сублимацию.

Этот выбор выявляет суть обсуждаемой проблемы. «Путь А» эффективен, быстр и соответствует логике контроля. «Путь Б» – сложен, требует времени, терпения и отказа специалиста от части экспертной власти. «Путь В» переход от модели «симптом → подавление» к модели «опыт → осмысление», выход на сознательное творчество.

Таким образом, право пациента на субъективный опыт – это не абстрактный философский принцип. Это норма будущего, которую мы можем начать строить уже сегодня, задавая себе и своей профессии простой вопрос: «Какую помощь я хотел бы получить на своём месте?». Ответ на него и станет лучшим ориентиром в движении от психиатрии, которая борется с «безумием», к гуманистической психиатрии, которая помогает человеку оставаться человеком – во всей сложности, уязвимости и нередуцируемой ценности его уникального опыта. В этом аспекте союз гуманистической психиатрии с философией необходим. Великий философ и психиатр К. Ясперс писал: «Психиатрия, практикуемая врачами без гуманитарной подготовки, не производит впечатление полноценной, систематически разработанной научной дисциплины» [10].

Литература

1. Заховаева А.Г., Урсу А.В. Эволюция понятия «душевнобольной» от гениальности к помешательству: историко-философский анализ // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. 2026. № 2. С. 118–121.
2. Фуко М. История безумия в Классическую эпоху. СПб.: Гуманитарная Академия, 1997.
3. Александровский Ю.А., Незнанов Н.Г. Психиатрия: национальное руководство. 2-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2025.
4. Howes O.D., et al. Treatment-Resistant Schizophrenia: Treatment Response and Resistance in Psychosis (TRRIP) Working Group Consensus Guidelines on Diagnosis and Terminology // American Journal of Psychiatry. 2017. Vol. 174(3). P. 216–229.
5. Jobe T.H., Harrow M. Long-term outcome of patients with schizophrenia: a review // Canadian Journal of Psychiatry. 2005. Vol. 50(14). P. 892–900.
6. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Прогресс, 1994.
7. Заховаева А.Г. Искусство и медицина: грани взаимодействия (искусство, которое лечит истерзанное «Я») // Вестник психотерапии. 2005. № 13 (18). С. 123–129.
8. Баженова Е.В. Лингвоконцепты хаос и космос в повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» // В сборнике: Русский язык: история, диалекты, современность. Сборник научных статей. Москва. 2020. С. 329–335.
9. Платон. Апология Сократа, Критон, Ион, Протагор (31d) / Общая редакция А.Ф. Loseva и др. М.: Издательство «Мысль», 1999. 864 с.
10. Ясперс К. Общая психопатология [Электронный ресурс] // URL: <https://books.yandex.ru/books/roWygVm0/read-online?ysclid=mmoj2f1qyd19225310> (дата обращения 12.03. 2026)

EXISTENTIAL MEANING OF SEMANTIC SPLIT OF THE PHENOMENON “MENTAL ILL” FROM THE MODEL “SYMPTOM → SUPPRESSION” TO THE HUMANISTIC TO THE HUMANISTIC MODEL “EXPERIENCE → UNDERSTANDING”.

Zakhovaeva A.G., Ursu A.V.

Ivanovo State Medical University

The presented article in the historical and philosophical context analyzes the genesis of the concept of “mentally ill,” reveals the semantic splitting of this phenomenon, is a logical continuation of the previously published research in the presented journal “Medicine. So-

ciology. Philosophy. Applied research.” 2026. № 2 [1]. The present interdisciplinary study (the union of philosophy and medicine) focuses on both the clinical and ethical implications of this cleavage and existential interpretation. When an existential catastrophe arises for a patient: the interpretation of one’s own experience (for example, “voices”) as madness leads to the loss of subjectivity and the right to a full human existence. Based on data on therapeutic resistance and the phenomenon of “voice carrier,” the authors justify the need for a paradigm shift – from the reductionist model “symptom → suppression” to the humanistic model “experience → comprehension.”

Methods: dialectics (the law of transition of quantitative changes to qualitative ones), comparative analysis, the method of phenomenological reduction, empirical data. The purpose of this work is to demonstrate that the way out of this impasse lies in a radical change in “optics”: in the transition from looking at the patient as a carrier of a pathological symptom to recognizing in him a subject of unique, albeit painful, experience. We intend to show that it is a person’s right to their own subjective experience and its interpretation that should become the cornerstone of a new, humanistic clinical ethics. Art is understood as a solution to the problem of splitting and the search for existential harmony. Through case analysis and philosophical reflection, the patient’s right to interpret their own mental experiences is asserted as an ethical imperative and a practical foundation for the transition from normative control psychiatry to humanistic dialogue psychiatry.

Keywords: “mentally ill,” existence, dialogue, patient, auditory hallucinations, humanistic psychiatry, art.

References

1. Zakhovaeva A.G., Ursu A.V. Evolution of the concept of “mental ill” from genius to Insane in the context of the socio-philosophical paradigm // Medicine. Sociology. Philosophy. Applied Research. 2026. No. 2. pp. 118–121.
2. Foucault M. History of Madness in the Classical Era. St. Petersburg: Humanitarian Academy. 1997.
3. Aleksandrovsky Y.A., Neznanov N.G. Psychiatry: National Guide. 2nd ed. Moscow: GEOTAR-Media, 2025.
4. Howes O.D., et al. Treatment-Resistant Schizophrenia: Treatment Response and Resistance in Psychosis (TRRIP) Working Group Consensus Guidelines on Diagnosis and Terminology // American Journal of Psychiatry. 2017. Vol. 174(3). P. 216–229.
5. Jobe T.H., Harrow M. Long-term outcome of patients with schizophrenia: a review // Canadian Journal of Psychiatry. 2005. Vol. 50(14). P. 892–900.
6. Rogers K.R. A View of Psychotherapy. The Formation of Man. Moscow: Progress, 1994.
7. Zakhovaeva A.G. Art and Medicine: Facets of Interaction (Art That Heals the Tortured “I”) // Bulletin of Psychotherapy. 2005. No. 13 (18). Pp. 123–129.
8. Bazhenova E.V. The Linguistic Concepts of Chaos and Cosmos in N.V. Gogol’s “Diary of a Madman” // In the collection: Russian Language: History, Dialects, Modernity. A Collection of Scientific Articles. Moscow. 2020. Pp. 329–335.
9. Plato. Apology of Socrates, Crito, Ion, Protagoras (31d) / General editors A.F. Losev et al. Moscow: Mysl Publishing House, 1999. 864 p.
10. Jaspers K. General Psychopathology [Electronic resource] // URL: <https://books.yandex.ru/books/roWygVm0/read-online?ysclid=mmoj2f1qyd19225310> (accessed March 12, 2026)

Кудряшова Елена Викторовна,

кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Ульяновского института гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева
E-mail: helezzya@gmail.com

В статье анализируется философия хозяйства С.Н. Булгакова, в том числе ее понятийный аппарат и мировоззренческие основания рассуждений автора. Философ разделял христианское мировоззрение, поэтому в своем учении использовал понятия личности, свободы и творчества. Он ввел антропологическое измерение хозяйства, как проявление свободной воли человека, стремящейся выйти за пределы естественной природы и создать более совершенный мир. Общественная жизнь и история понимались С.Н. Булгаковым как актуализация способностей свободной личности во взаимодействии с природной необходимостью. Философия хозяйства сформировалась в процессе критики существующих концепций. Марксизм, с точки зрения философа, отрицал свободу воли и не видел экономии и хозяйство естественными адаптивными свойствами человека. Позитивизм и сциентизм претендуют на создание всеобъемлющей теории познания, игнорируя иррациональные и алогичные мотивы человеческой деятельности. С.Н. Булгаков переосмыслил философию немецкого идеализма, использовал ее понятия и в то же время дополнил их новым содержанием. Традиционный кантианский вопрос о возможности познания, С.Н. Булгаков расширил до вопроса, как возможно хозяйство. Философия хозяйства исследует экономические отношения в традициях русской религиозной философии.

Ключевые слова: С.Н. Булгаков, философия хозяйства, экономизм, польза, творчество, свобода, необходимость, русская религиозная философия, философия немецкого идеализма, дух.

Введение

Отечественные историки философии довольно часто исходят из идеи вторичности русской философии, предполагается, что философы стремятся догнать своих западных коллег. Основанием этому часто служит представление о том, что такие течения, как например, позитивизм или марксизм, появились в западной традиции. Русские позитивисты или марксисты повторяют проблематику и понятийный аппарат западных классиков философии.

Споры о степени вторичности отечественной философской традиции начались еще в прошлом веке, когда В.В. Введенский постулировал идею о том, что оригинальная отечественная философская традиция существует, она способна дискутировать с западной традицией, создавать философские учения по актуальным философским проблемам [см. 5]. Несомненным подтверждением этого тезиса является проект философии хозяйства С.Н. Булгакова, который показывает одновременно способность находиться в одном понятийном поле с западной традицией и создавать достаточный инструментарий для осмысления актуальных проблем. Целью данной работы является анализ проблематики философии хозяйства и выявление критической аргументации С.Н. Булгакова в отношении западной философской традиции.

Основная часть

С.Н. Булгаков был заинтересован серьезной темой современности — экономикой [см. 1]. Может показаться, что подобная тематика делает философию слишком «приземленной», мыслители вынуждены заниматься вопросами, которые никогда не попадали в их поле зрения. С другой стороны, сила и мощь экономического регулятора современного общества является столь существенной, что приумножение значения экономики делает всякое размышление «умозрительным».

В этом аспекте работа С.Н. Булгакова чрезвычайно интересна не только в контексте своего времени, но и для современности. Если рассматривать философию как рефлексию над универсалиями культуры [см. 10], то в поле зрения философского осмысления всегда попадают наиболее существенные вопросы современности. Причем философия имеет возможность рассуждать об этих вопросах свободно, но рационально. В Античности были поставлены философские вопросы происхождения мира, роли духовной составляющей, этические и политические регуляторы жизни общества, эстетические проблемы. В Новое время философия была сосредоточена на решении гносеологических проблем в свете поиска единственно верного метода получения знания.

С XIX века в поле зрения философов попал вопрос устройства цивилизации и значимости экономических факторов для общества. С одной стороны технически сложная цивилизация явно отражает специфический человеческий способ жизни, где усложнение становится синонимом общественного блага. С другой стороны, созданные человеком экономические регуляторы не только не решают все существующие проблемы общественной жизни, но и стимулируют их развитие.

Экономические факторы общественной жизни проблематизировались в социальной теории К. Маркса. Философ и социолог считал, что экономика (производительные силы и производственные отношения) как «базис» определяют способы организации общества. Поэтому выявить специфику общества можно проанализировав, как осуществляется производство материальных благ.

В том же ключе рассуждали сторонники техницистской теории постиндустриального общества. С точки зрения сторонников этой идеи (Д. Белл, Иноземцев) облик общества определяет структура экономики [см. 2,3,7]. Тип доиндустриального, индустриального или постиндустриального общества формирует основной сектор экономики, в качестве которого может выступать переработка ресурсов, промышленное производство или сфера услуг.

В дискуссии о значимости экономики С.Н. Булгаков дистанцировался от чисто материалистического мировоззрения и попытался понять экономику с идеалистических позиций. Если марксизм (а также неомарксизм, постмарксизм и постиндустриализм) исходил из социальной и культурной специфики, определяющей человека, С.Н. Булгаков ввел своего рода антропологическое измерение экономики [см. 8]: его подход позволил понять, почему специфический экономический образ жизни зарождается именно в человеческом сообществе. Иными

словами, философ «восходил» от сущностных характеристик человека к особенностям общества.

Разумеется, марксисты, также как и С.Н. Булгаков, видели процесс взаимообусловленности человека и общества. Однако, для того чтобы общество не воспринималось (как в неомарксизме) отчужденным, важно понимать его сущностную связь с человеком. Инструментарий для осмысления этого вопроса содержится в философии хозяйства.

С.Н. Булгаков был критически настроен к умонастроению начала XX века, которое он назвал «экономизмом» или «экономическим материализмом». Причины формирования экономического образа жизни в материалистическом мировоззрении не могут быть осмыслены, поскольку игнорируют факт особой сложной духовной и сознательной сущности человека. Вместо такого подхода С.Н. Булгаков предложил говорить о «философии хозяйства», которая способна обнаружить источники хозяйственной деятельности человека и философски осмыслить экономику. В философии хозяйства недостаточно говорить об обществе, нужно обратиться к самой жизни человека, к категории более конкретной, чем бытие.

Недостаточным также является противопоставление рационального и иррационального начала. В жизни можно обнаружить логичное и алогичное, и в этом смысле жизнь является более значимой категорией для философии, чем абстрактное представление о бытии. В отличие от науки, философия допускает и приветствует многовариантность, поэтому философия хозяйства является скорее проектом размышления, чем законченным и целым построением.

Будучи христианским мыслителем С.Н. Булгаков полагал, что жизнь как поток событий осмысленна наличием смерти. С точки зрения философа смерть метафизически не допустима, но естественна. «Борьба за жизнь с силами смерти есть самое общее определение существования» [4, с. 40] Природа, как механический закон довлеет над жизнью, а последняя – связана со свободой.

В жизни противодействуют необходимости (природы) и свобода (человеческая воля). Человеческое бытие – жизнь – противостоит чистой необходимости и борется с ней, в этом контексте хозяйство выступает защитой жизни и свободы, и противостоит необходимости природы. Таким образом, хозяйство можно рассматривать как «частный случай биологической борьбы за существование» [см. 4, с. 42]. Хозяйственная деятельность человека «приручает» природу, ограничивает ее власть, дает место подлинно человеческой свободе.

Тематика хозяйства в философии С.Н. Булгакова была вписана в христианское миропонимание. До грехопадения человек был полностью удовлетворен, но после – вынужден вести хозяйственную деятельность, чтобы попытаться воссоздать мир, в котором он жил с помощью разума. И поскольку человек не совершенен и грешен, созданный хозяйством мир содержит недостатки, являясь только вторичным Творением.

С.Н. Булгаков видит в наличии хозяйственной деятельности отличие человека от животных, которые к ней не способны. Животное воспринимает природу естественно, человек, наделенный духовным содержанием, стремится избежать смерти и потому создает хозяйство. Поэтому главной функцией хозяйства является борьба со смертью.

Практическое хозяйство является трудовой деятельностью: посредством труда человек получает блага. Эта установка фигурировала в работах марксистов, однако, в политической экономии понятие труда рассматривалось в узком смысле как производство материальных благ. В противовес такой позиции, описывающей внешнюю сторону труда, С.Н. Булгаков подчеркивал, что труд воплощает творческую природу человека. Сущностной и целеполагающей человек стремится не просто приспособиться к природным условиям, а оформить пространство, в котором находится. Хозяйство предполагает воздействие субъекта (хозяина) на объект (природу) с определенной целью, поэтому природа становится антропоморфной.

С.Н. Булгаков считал хозяйство динамическим процессом, включающим производство и потребление. В этом ракурсе можно говорить и о круговороте хозяйствования, с одной стороны встраивающем индивидуального человека в общественное тело, и с другой стороны применяющее новые творческие решения и меняющее производство и экономику. Производство и потребление можно понимать как диалектическое единство хозяйственной деятельности.

При этом хозяйство также вписано в бытийное пространство естественной Вселенной, которую можно рассматривать как единый организм: живое рождается и умирает, а Вселенная остается вечной. Человек взаимодействует с этой Вселенной и через потребление общается к ней. Применяя христианские понятия, С.Н. Булгаков писал: «Еда есть натуральное причащение – приобщение плоти мира» [4, с. 84]. Хозяйство обеспечивает активное и творческое приобщение к Вселенной.

Особое значение в круговороте играет производство. Описывая этот процесс, С.Н. Булгаков писал: «Производство есть такое активное воздействие субъекта на объект или человека на природу, при котором хозяйствующий субъект осуществляет в предмете своего хозяйственного воздействия свою идею, объективирует свои цели. Стало быть, производство есть, прежде всего, система объективных действий, субъективное здесь объективируется» [4, с. 91]. Производство становится главным фактором изменения Вселенной, определяющее потребление на следующем «витке».

С.Н. Булгаков использовал в своем учении о хозяйстве понятия отечественной философской традиции [см. 9]. По его мнению, через хозяйственную деятельность человек меняет естественную природу с целью воссоздания «идеального всеединства». «Единый субъект хозяйства, Мировая Душа, проявляется в опыте, действует в истории как количественно неопределенная множественность отдельных независимых центров – индивидуальных человеческих сознаний и волей» [4, с. 126]. Сама природа содержит в себе представление о своем совершенстве, а человек выступает инструментом устранения недостатков.

Также С.Н. Булгаков использовал понятие «София» для объяснения умопостигаемости естественного мира. «София, принимающая на себя космическое действие Логоса, причастная Его воздействию, передает эти божественные силы нашему миру, просветляя его, поднимая его из хаоса к космосу» [4, с. 139]. Сама природа содержит в себе возможность самопознания через человека, может себя менять, поэтому можно говорить о «софиюности хозяйства». Человек свободен в том, в какой степени приобщиться к «Софии» естественного мира и Мировой душе, или отойти к «темной стороне бытия».

С.Н. Булгаков рассматривал хозяйство в гносеологическом смысле как познание и основанное на нем изменение. Поэтому мыслитель не различал практический и чистый разум как И. Кант, но полагал, что они действуют вместе [см. 6]. Кантианская теория познания, с его точки зрения, рассматривала субъекта познания как театрального зрителя, активность которого выражается в определении объекта через свои познавательные способности. Однако Булгаков настаивал на том, что субъект познания еще более активен: «познание есть трудовая хозяйственная деятельность, преодолевающая раздвоение субъекта и объекта и приводящая к их взаимопроникновению» [4, с. 101]. Не только в силу своих способностей, но в силу своей деятельности субъект преобразовывает и знает реальность.

Познание и наука имеют смысл только в хозяйственной деятельности, поэтому самооценки науки не существует. Даже, если для отдельного ученого научная гипотеза или теория имеет первостепенное значение, для общества в целом значимость научного открытия определяется ее пользой в хозяйстве. Научное познание направлено не просто на производство знаний, но на их использование.

Ставшее традиционным позитивистское понимание науки как способа достижения объективно-истинного знания о мире, подверглось сомнению в учении С.Н. Булгакова. Философ четко разграничил истину в онтологическом и истину в гносеологическом смысле. Если истина как онтологическая категория трансцендентна миру, гносеологически научное знание квалифицируется только пользой.

Онтологическая Истина трансцендентна миру и не может быть постигнута произведенным человеком аппаратом науки. Однако, с учетом того, что мир, созданный Богом, обладает особыми свойствами, естественный мир может быть познан. С.Н. Булгаков приписывал науке свойство «софиюности», поскольку она причастна естественному миру и фиксирует закономерности в нем. В научном знании формируется аппарат не полного постижения Истины бытия, но на науке «лежит печать истинности» трансцендентной, и потому она формирует только истинные знания о Творении. Основной задачей науки, по мнению мыслителя, является создание техники, позволяющей вести хозяйственные преобразования и потому «научная истина не только логична, но и хозяйственна» [4, с. 179]. Это меняет представление о назначении научного знания: оно не отражает действительность, но учится ей пользоваться.

Теория познания в традиционном прочтении, сосредоточенная на познании, должна включать в себя технику и осмысление возможностей использования результата научного познания в хозяйстве. С.Н. Булгаков критически относился к мыслителям, которые анализировали познание, но отказывались от решения вопросов ее использования, отстранялись от вопросов техники. Традиционный для философии кантианский вопрос о возможности познания с его точки зрения должен быть расширен до вопроса, как возможно хозяйство.

Полагая науку средством достижения истинного знания о естественном мире, С.Н. Булгаков критически относился к идее сциентизма. Наука ограничена созданием научных теорий, которые описывают естественную природу, понятие «жизни» – тем более в отношении

человека – является более сложным. Мыслитель сравнивал природу с механизмом, понять работу которого оказывается намного более легкой задачей, чем осмыслить жизнь человека. В связи с таким видением задач науки и техники, С.Н. Булгаков считал упрощением выводы позитивизма и «научной» философии о природе познания. Научное знание само по себе не имеет метафизических оснований, несмотря на то, что может быть использовано человеком в своих целях. В том числе в связи с ориентацией на сциентизм философ критиковал и политическую экономию.

Рассуждения С.Н. Булгакова о позитивизме и научном подходе к традиционным философским проблемам приводят к выводу об их ограниченности, однако, критики самой науки в этих идеях не содержится. Философское учение С.Н. Булгакова четко демаркирует научное знание как таковое и сциентизм как мировоззрение. Если польза научного знания неоспорима в ее необходимости в создании техники, интенсификации экономики и сохранении цивилизации, то претензии сциентизма на осмысление всех проблем вызывают серьезные сомнения. Это положение представляется особенно важным для осмысления современных проблем, когда отказ от сциентизма представляется отказом от научной эффективности. Позиция отечественного классика показывает пользу и необходимость научного знания, и при этом значительно расширяет категорию бытия до понятия «жизни».

Главным императивом «жизни» (в данном случае как булгаковской категории) является свобода, как выражение основного свойства личности. Свобода личности, выбора траектории жизни противопоставлена необходимости естественной природы. В действительности свобода и необходимость являются собой две противоположные стороны диалектического единства жизни. Наука изучает необходимое, человек по своей свободе преобразует ее и создает хозяйство.

В более отдаленной перспективе диалектика свободы и необходимости в философии С.Н. Булгакова объясняет развитие истории, или в терминологии немецкого идеализма «становление Духа». Философ писал: «История запечатлена духом, т.е. свободой. Дух истории, дух времени есть не образные выражения, но подлинная реальность. В глубинах своих история создается духом и в духе, ибо лишь причинностью через свободу определяется своеобразие истории» [4, с. 237]. Предельным воплощением человеческого Духа является именно хозяйство, преобразующее естественную природу и использующую ее для построения цивилизации.

Опираясь на видение истории как становления Духа, актуализирующееся в хозяйстве, С.Н. Булгаков предложил выделять «хозяйственные эпохи», формирующие определенный образ «экономического человека» и «дух хозяйства». Человек естественно стремится к большей экономической мощи, к богатству и увеличению цивилизованности. Примечательно, что философия С.Н. Булгакова приводит не к идее отчужденности человека в капиталистическом мире, а, наоборот, к идее естественного стремления личности к обогащению.

Представляется интересным в данном случае сравнить экономический детерминизм К. Маркса и философию хозяйства С.Н. Булгакова. Оба философа исходили из личностной необходимости человека в ведении трудовой деятельности и реализации творческого начала. Труд в учении К. Маркса является родовой сущностью человека, хозяйство, основанное на трудовом преобразовании природы в цивилизацию, является главным стремлением личности. Однако у К. Маркса, в капиталистическом обществе условия труда (эксплуатация) становятся главным фактором отчуждения, а в философии хозяйства С.Н. Булгакова – совершенствования цивилизации, что в том числе в капиталистическом обществе, создает условия для лучшей реализации творческих способностей человека.

Будучи современником массового увлечения марксистской философией, С.Н. Булгаков, находясь в дискурсе экономической проблематики, критически отнесся к социальной теории К. Маркса. С его точки зрения немецкий социолог использовал крайне абстрактные и «безжизненные» понятия, такие как класс. Такого рода абстракции не априорны и не нормативны, но получены путем обобщения. Индукция, несомненно, является приемлемой логической операцией научного познания, однако не вполне подходит для осмысления «жизни». По словам философа, социологические понятия стали для марксистов «фикцией», «фетишем», которые поработили последователей этой философии.

Социология, как любая наука, схематизирует действительность, это удобно в качестве инструмента познания. Однако не стоит верить в саму эту схему как в отражение действительных процессов. С.Н. Булгаков сделал такой вывод: «...«социология» есть более мечта, нежели действительность, или же в качестве нее выдаются разные полунаучные подделки и суррогаты» [4, с. 258]. С этой позиции философ

критиковал историзм К. Маркса, настаивающий на наличии законов в истории.

Схематизация и научно-социологическое упрощение не позволяют учесть свободный выбор человека и творчество, то есть те самые способности, которые позволяют экономике существовать. Философ писал: «Социальная действительность вовсе не есть тот механизм, который знает социология, но живое творчество истории, которое совершенно отменяется социологией» [4, с. 260]. Уверенные в своей методологии, марксисты не способны выйти за рамки необходимости и учесть факторы свободного творчества, которые определяют историю.

Заклучение

Философия хозяйства С.Н. Булгакова представляет нам анализ экономических вопросов в их сущностной связи с человеком. В его теории экономика является не столько самостоятельной силой, определяющей общество, сколько производной человеческого творчества. Именно поэтому философ избежал идеи отчужденности марксистов.

Находясь в общеполитической дискуссии о сущности и содержании экономики, философу удалось определить ее метафизические основания и ввести антропологическое измерение хозяйства. Примечательно, что экономико-центристские теории чаще фокусируются на обществе, которое формируется экономикой, в таких учениях в тени остается вопрос о ее связи с человеком. Философия хозяйства С.Н. Булгакова уточняет и иначе предлагает взглянуть на эти вопросы, значительно расширяя проблематику экономики в философии.

Литература

1. Алёхина, Е.В., Копосов, Л.Ф., Глинский, А.В. Экономика как нравственная категория в русской религиозной философии / Е.В. Алёхина, Л.Ф. Копосов, А.В. Глинский // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. – 2018. – № 3. – С. 78–94
2. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – CLXX, 783, [3] с.
3. Белл, Д., Иноземцев В.Л. Эпоха разобщенности: Размышление о мире XXI века. – М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2007. – 304 с.
4. Булгаков, С.Н. О философии хозяйства / С.Н. Булгаков – М.: Типография Императорского Московского университета. – 1912. – 321 с.
5. Введенский, А.И. Судьбы философии в России / А.И. Введенский // Введенский, А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет, Г.Г. Очерки истории русской философии / Сост. Б.В. Емельянов, К.Н. Любутин. – Свердловск: Из-во Урал. ун-та, 1991. – С. 26–66
6. Гордеев, А.С. Влияние философии тождества Ф. Шеллинга и философии всеединства Вл. Соловьева на принципы хозяйственной этики у С.Н. Булгакова / А.С. Гордеев // Вестник Российского университета дружбы. Серия: Философия. – 2015. – № 4. – С. 186–194.
7. Иноземцев, В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы / В.Л. Иноземцев. – М.: Логос, 2000. – 304 с.
8. Назарова, Г.Ф., Панамарчук, Д.К. Философия хозяйства по С.Н. Булгакову: антропологический аспект / Г.Ф. Назарова, Д.К. Панамарчук // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2014. – № 5(61). – С. 129–134.
9. Нетребская, О.Н. С.Н. Булгаков – экономист, философ, богослов / О.Н. Нетребская // Московский экономический журнал. – 2021. – № 9. – С. 679–687.
10. Степин, В.С. Философская мысль в динамике культуры / В.С. Степин // Степин, В.С. Эпоха перемен и сценарии будущего. Избранная социально-философская публицистика. – М., 1996. – С. 6–28

DRAFT PHILOSOPHY OF ECONOMY BY S.N. BULGAKOV AND CRITICISM OF TRADITIONAL PHILOSOPHY

Kudryashova E.V.

Ulyanovsk Civil Aviation Institute named after B.P. Bugaev

This article analyzes S.N. Bulgakov's philosophy of economics, including its conceptual framework and the philosophical foundations of the author's reasoning. The philosopher shared the Christian worldview, therefore, in his teaching he used the concepts of personality, freedom and creativity. He introduced the anthropological dimension of the economy as a manifestation of human free will, striving to go beyond the limits of natural nature and create a more perfect world. S.N. Bulgakov understood social life and history as actualization of the abilities of a free personality in interaction with natural necessity. The philosophy

of the economy was formed in the process of criticism of existing concepts. Marxism, from the philosopher's point of view, denied free will and did not see economics and economy as natural adaptive properties of man. Positivism and scientism claim to create a comprehensive theory of knowledge, ignoring the irrational and illogical motives of human activity. S.N. Bulgakov reinterpreted the philosophy of German idealism, used its concepts and at the same time supplemented them with new content. The traditional Kantian question of the possibility of cognition, S.N. Bulgakov expanded to the question of how farming is possible. The philosophy of economics explores economic relations in the traditions of Russian religious philosophy.

Keywords: S.N. Bulgakov, philosophy of economy, economism, benefit, creativity, freedom, necessity, Russian religious philosophy, philosophy of German idealism, spirit.

References

1. Alyohina, E.V., Koposov, L.F., Glinskij, A.V. *Ekonomika kak нравstvennaya kategoriya v russkoj religioznoj filosofii* / E.V. Alyohina, L.F. Koposov, A.V. Glinskij // *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Filosofskie nauki.* – 2018. – № 3. – S.78–94
2. Bell, D. *Gryadushchee postindustrial'noe obshchestvo. Opyt so-cial'nogo prognozirovaniya / per. s angl. pod red. V.L. Inozemceva.* – M.: Academia, 1999. – CLXX, 783, [3] s.
3. Bell, D., Inozemcev V.L. *Epoha razobshchennosti: Razmyshlenie o mire XXI veka.* – M.: Centr issledovaniy postindustrial'nogo obshchestva, 2007. – 304 s.
4. Bulgakov, S.N. *O filosofii hozyajstva* / S.N. Bulgakov – M.: Tipografiya Imperatorskogo Moskovskogo universiteta. – 1912. – 321 s.
5. Vvedenskij, A.I. *Sud'by filosofii v Rossii* / A.I. Vvedenskij // Vvedenskij, A.I., Losev A.F., Radlov E.L., SHpet, G.G. *Ocherki istorii russkoj filosofii* / Sost. B.V. Emel'yanov, K.N. Lyubutin. – Sverdlovsk: Iz-vo Ural. un-ta, 1991. – S.26–66
6. Gordeev, A.S. *Vliyanie filosofii tozhdestva F. SHellinga i filosofii vseidinstva Vl. Solov'eva na principy hozyajstvennoj etiki u S.N. Bulgakova* / A.S. Gordeev // *Vestnik Rossijskogo universiteta družby. Seriya: Filosofiya.* – 2015. – № 4. – S.186–194.
7. Inozemcev, V.L. *Sovremennoe postindustrial'noe obshchestvo: priroda, protivorechiya, perspektivy* / V.L. Inozemcev. – M.: Logos, 2000. – 304 s.
8. Nazarova, G.F., Panamarchuk, D.K. *Filosofiya hozyajstva po S.N. Bulgakovu: antropologicheskij aspekt* / G.F. Nazarova, D.K. Panamarchuk // *Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i social'nye nauki.* – 2014. – № 5(61). – S.129–134.
9. Netrebskaya, O.N. *S.N. Bulgakov – ekonomist, filosof, bogoslov* / O.N. Netrebskaya // *Moskovskij ekonomicheskij zhurnal.* – 2021. – № 9. – S. 679–687.
10. Stepin, V.S. *Filosofskaya mysl' v dinamike kul'tury* / V.S. Stepin // Stepin, V.S. *Epoha peremen i scenarij budushchego. Izbrannaya social'no-filosofskaya publicistika.* – M., 1996b. – S. 6–28

Межкультурная компетентность как социокультурный феномен в обучении иностранному языку

Акимова Ольга Валерьевна,

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры теории и практики перевода, Казанский (Приволжский) федеральный университет
E-mail: lelram@mail.ru

Депутатова Наталья Анатольевна,

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры европейских языков и культур, Казанский (Приволжский) федеральный университет
E-mail: natalizachka73@yandex.ru

Шангараева Лия Фаридовна,

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры европейских языков и культур, Казанский (Приволжский) федеральный университет
E-mail: sh-liya@yandex.ru

В статье представлены результаты анкетирования студентов, направленное на анализ формирования межкультурной компетентности при изучении иностранного (английского) языка, которые включают как количественные (закрытые и полуоткрытые вопросы), так и качественные (открытые вопросы) данные. Использованный метод исследования позволил получить относительно полную картину формирования межкультурной компетентности при изучении иностранного (английского) языка с точки зрения студентов университета.

Исследование показало, что студенты однозначно положительно относятся к внедрению межкультурного компонента в изучение иностранного языка. При этом важнейшим источником контакта с другими культурами являются социальные сети, а собственно занятия английским языком в наименьшей степени способствуют развитию знаниевого компонента межкультурной компетентности, что может быть результатом отсутствия соответствующего содержания в учебных материалах.

Ключевые слова: межкультурная компетентность, межкультурный подход, иностранный язык, английский язык, анкетирование.

Введение

Развитие интереса к функции, содержанию и применению межкультурных компетенций пропорционально наблюдаемому сегодня процессу непрерывной интенсификации межкультурных отношений. В сферах международной торговли, образования, присутствия в международных организациях и т.п. успех зависит от знаний и навыков в области межкультурной коммуникации, от эффективной коммуникации в межкультурной среде. Именно вопрос эффективности формирования межкультурной компетентности в процессе языкового образования является основным предметом данного исследования.

Межкультурная компетентность тесно связана с социокультурной компетентностью, которая предполагает знание норм, традиций, моделей поведения и ценностных установок общества изучаемого языка и обеспечивает адекватность коммуникативного поведения в социокультурном контексте.

Формирование межкультурной компетентности в области языкового образования стало одним из направлений исследований в глоттодидактике. Ученые исследуют, в какой степени авторы учебных материалов опираются на концепцию межкультурной компетентности [1,2] и каким образом эта концепция включена в практику преподавания иностранных языков в различных странах [3,4]. Исследователей интересуют мнения, установки и состояние знаний преподавателей о межкультурной компетенции [5,6].

Уроки иностранного языка имеют особое значение для повышения осведомленности о культурных различиях и обучения эффективному и контекстуальному общению с представителями различных культур. Ведь изучение языка и культуры его носителей – это неразделимый процесс. В преподавании иностранных языков межкультурный подход отвечает вызовам современности. Его основная цель – «культурно обусловленное повышение способности к общению» [7, р. 11]. Исследователи рассмотрели многочисленные определения двух ключевых концепций, касающихся межкультурного образования в языковом образовании, а именно межкультурной компетентности и межкультурной коммуникации, и пришли к выводу, что эти термины тесно связаны между собой и являются взаимно обусловленными: межкультурная компетентность имеет важное значение для активного участия в межкультурной коммуникации [8].

В.Г. Апальков и П.В. Сысоев [9] подчеркивают, что межкультурная компетентность включает знания, навыки и установки, которые помогают понять представителей другой культуры и языка и общаться с ними. Согласно [10], знание иной культуры должно сопровождаться отношением открытости к ней, а также готовностью воздерживаться от ее оценки. Напротив, навыки означают способность интерпретировать, то есть объяснять проявления чужой культуры и сравнивать ее со своей, а также способность получать знания о другой культуре и применять их в конкретной коммуникационной ситуации. Наконец, установки подразумевают реализацию собственных убеждений и влиянию культурных различий на них. Подводя итог, Е.Г. Тарева определяет межкультурную компетентность как «знание сходств и различий между образом жизни и взглядами, характерными для разных культур, и способность применять эти знания в практической коммуникации» [11, С. 55]. Таким образом, межкультурная компетентность является неотъемлемой частью компетентности в области коммуникации.

Межкультурный подход при изучении иностранного языка отходит от монокультурной модели осуществления лингвистической деятельности в пользу культурной многосторонности. В свете необходимости развития межкультурной компетентности стало ясно, что культурное содержание обучения не может ограничиваться представлением культуры целевого языка. На занятиях необходимо создать образовательное пространство, в котором учащиеся говорили бы на иностранном языке также о своей родной культуре и сравнивали ее с культурой страны изучаемого языка.

Существует много методов формирования межкультурной компетентности при изучении иностранных языков. Большинство из них иллюстрируют когнитивный подход. Наиболее часто используемые материалы включают тексты, фильмы, лекции и дискуссии по отдельным аспектам данной культуры или культурным различиям, указывающие на связь между культурой и языком, например, через идиомы и пословицы.

Также используются упражнения, включая т.н. культурные ассимиляторы и межкультурные инциденты. Неотъемлемой частью этих упражнений является описание недопонимания коммуникации на фоне культурных различий. В случае культурного ассимилятора задача учащихся состоит в том, чтобы выбрать правильную интерпретацию события из заданных вариантов, а после изучения критического инцидента участники обучения должны рассмотреть, как можно избежать этого конфликта.

Поэтому межкультурная компетентность играет важную роль в современном поликультурном и многоязычном мире. Работа по ее развитию должна быть неотъемлемым элементом образования, особенно университетского.

Методология исследования

Основная цель эмпирического исследования состояла в определении взглядов студентов на формирование межкультурной компетентности.

Цель исследования привела к следующему исследовательскому вопросу: Каково мнение студентов о реализации межкультурного подхода и формировании межкультурной компетентности при изучении иностранного (английского) языка в университете?

Участниками исследования были студенты первого, второго и третьего курсов обучения, изучающие английский язык как иностранный. Количество участников варьировалось на разных этапах исследования.

Анкету о формировании межкультурной компетентности заполнили 168 студентов, из них 121 девушка (72%), 47 юношей (28%). Опрос был проведен среди 76 студентов первого курса (45,2%), 39 студентов второго курса (23,2%) и 53 студентов третьего курса (31,5%). Средний возраст составлял 20,9 года.

Чтобы сохранить анонимность студентов, в этом исследовании используется следующее кодирование участников исследования. Студенты помечаются символом «СТ» с соответствующим номером.

На первом этапе исследования был осуществлен анализ научной литературы по проблеме исследования.

На втором этапе исследования было проведено анкетирование среди студентов, которое было сосредоточено на формировании межкультурной компетентности при изучении английского языка.

Первая часть анкеты была основана на вопросах, касающихся демографических данных.

Вторая часть анкеты состояла из 15 утверждений, касающихся компонентов межкультурной компетентности – знаний, установок и навыков. 6 утверждений касались формирования знаний, 4 утверждения касались формирования установок, 5 утверждений касались формирования навыков. Порядок утверждений был случайным. Участники ответили в той степени, в которой они согласились с приведенными утверждениями, отметив соответствующее значение по пятиступенчатой шкале Лайкерта, где 1 означало, что «я определенно не согласен», а 5 – «определенно согласен».

Третья часть вопросника состояла из двух открытых вопросов и двух полуоткрытых вопросов. Открытые вопросы касались мнений учащихся об интеграции культурных элементов и формировании межкультурной компетентности в обучение иностранному языку. Первый полуоткрытый вопрос касался наиболее полезных источников для формирования межкультурной компетентности. Участники должны были проранжировать источники по шкале от 1 до 8, где 1 означает наиболее важный источник, а 8 – наименее важный. Последний вопрос касался источников контакта студентов с другими культурами. Участникам было предложено выбрать топ-4 из списка из 8 источников. Это задание также позволило участникам ввести источники, отличные от предложенных в анкете.

Участники заполнили анкету во время запланированных занятий по иностранному языку. Опросы были анонимными. Исследователь присутствовал при заполнении анкеты, поэтому у участников была возможность задать вопросы. Время заполнения анкеты – около 20 минут.

На третьем этапе исследования результаты были проанализированы на основе собранных данных с использованием различных методов анализа.

Результаты исследования

Опрос о формировании межкультурной компетентности, проведенный среди студентов, состоял из закрытых, открытых и полуоткрытых вопросов.

В таблице 1 представлены результаты по всем утверждениям второй части анкеты, касающейся формирования межкультурной компетентности на уроках английского языка, их среднее арифметическое и медиана.

Участники ответили в той степени, в которой они согласились с утверждениями, отметив соответствующее значение по пятибалльной шкале Лайкерта. Среднее значение близкое к 3,00 означает, что «трудно сказать», и близкое к 4,00, «я согласен».

В таблице 1 утверждения структурированы в соответствии с компонентом компетентности, к которому относятся: знания (утверждения 1–6), навыки (утверждения 7–11) и установки (утверждения 12–15).

Таблица 1. Средние арифметические и медианы утверждений, относящихся к компонентам межкультурной компетентности (N = 168)

Утверждение: «Уроки английского языка...	Среднее	Медиана
1. обогащают мои знания о Великобритании.	4,37	5
2. обогащают мои знания о США.	3,96	4
3. обогащают мои знания о Канаде.	2,26	2
4. обогащают мои знания об Австралии.	2,51	2
5. обогащают мои знания о моей собственной культуре.	2,78	3
6. обогащают мои знания о других (неанглосаксонских) культурах.	2,90	3
7. развивают способность интерпретировать и объяснять события и материалы или документы собственной культуры.	3,21	3
8. развивают способность интерпретировать и объяснять события и материалы или документы иностранной культуры.	3,79	4
9. развивают способность устанавливать взаимосвязи между собственной и иностранной культурой.	3,99	4
10. развивают способность критически оценивать аспекты иностранной культуры.	3,98	4
11. позволяют приобрести новые знания о культуре и культурных практиках, которые я могу использовать во взаимодействии (например, способность интерпретировать невербальные аспекты взаимодействия).	3,98	4
12. развивают способность критиковать аспекты собственной культуры.	3,74	4
13. развивают любопытство к другим культурам.	4,23	4
14. развивают открытость к другим культурам.	4,33	5
15. развивают уважение к другим культурам.	4,23	4

Самые низкие средние арифметические значения были получены по утверждениям о формировании *знаний* (M = 3,13). Среди них самые низкие средние арифметические были получены по утверждению: «Уроки английского языка обогащают мои знания о Канаде» (M = 2,26). 64,9% (N = 109) респондентов указали, что «я с ним категорически не согласен» или «скорее не согласен». Низкие средние арифметические значения также были получены по утверждению: «Уроки английского языка обогащают мои знания об Австралии» (M = 2,51). С ним «(скорее) не согласился» 51,8% (N = 87) респондентов. На утверждение «Уроки английского языка обогащают мои знания о моей собственной культуре» (M = 2,78), 69,7% (N = 117) респондентов указали, что «я категорически не согласен», «скорее не согласен» или «трудно сказать». Самые высокие средние арифметические значения были получены по утверждениям: «Уроки английского языка развивают мои знания о Великобритании» (M = 4,37) – 88,7% (N = 149) респондентов «(скорее) согласился» с этим утверждением – и «Уроки английского языка развивают мои знания о США» (M = 3,96) – 75,6% (N = 127) респондентов «(скорее) согласился» с этим утверждением.

В заявлениях о формировании *навыков* среднее арифметическое значение составило 3,79. Наименьшее среднее значение было получено на утверждение: «Уроки английского языка развивают во мне способность интерпретировать и объяснять события и материалы или документы моей собственной культуры» (M = 3,21) – 57,7% (N = 97) респондентов «(скорее) не согласился» с этим утверждением или указали на то, что «трудно сказать». Наивысший средний показатель был получен по утверждению: «Уроки английского языка развивают во мне способность устанавливать взаимосвязи между собственной культурой и иностранной культурой» (M = 3,99). 76,7% (N = 129) респондентов «(скорее) согласился» с этим утверждением. Аналогичное среднее арифметическое было получено по двум другим утверждениям (M = 3,98): «Уроки английского языка позволяют мне получить новые знания о культуре и культурных практиках, которые я могу использовать в межкультурных взаимодействиях» – с этим утверждением «(скорее) согласился» 72,6% (N = 122) респондентов – и «Уроки английского

го языка развивают во мне способность критически оценивать аспекты иностранной культуры» – с этим утверждением «(скорее) согласились» 73,2% (N = 123) респондентов.

Из трех компонентов наибольшее среднее арифметическое было получено на основе утверждений об *установках* (M = 4,12). Наименьшее среднее значение, но все же относительно высокое, было получено по утверждению: «Уроки английского языка развивают во мне способность критически оценивать аспекты собственной культуры» (M = 3,74) – только 35,4% (N = 59) респондентов указали на ответ «я не согласен», «скорее не согласен» или «трудно сказать». С другой стороны, наивысшее среднее арифметическое было получено по утверждению «Уроки английского языка развивают во мне отношение открытости к другим культурам» (M = 4,33). 86,9% (N = 146) респондентов «(скорее) согласились» с этим утверждением.

В таблице 2 представлена описательная статистика по 3 компонентам межкультурной компетентности.

Таблица 2. Описательная статистика (N = 168)

	Знания	Навыки	Установки
Среднее	3,13	3,79	4,12
Стандартное отклонение	0,720	0,765	0,741
Минимальное значение	1,17	1,40	1,25
Максимальное значение	5,00	5,00	5,00
Медиана	3,16	3,80	4,25

Стандартное отклонение среди всех трех компонентов составило 0,7, что указывает на довольно высокую концентрацию результатов вокруг среднего значения.

Следующая часть вопросника содержала два открытых вопроса (N = 168). Письменные заявления, как правило, были очень короткими – однозначными. С другой стороны, вопросы были сформулированы таким образом, чтобы ответ был однозначно отрицательным или положительным. Первый вопрос заключался в следующем: Как вы думаете, культура должна быть частью обучения английскому языку? Кратко объясните свой ответ.

В рамках анализа высказываний по первому открытому вопросу сначала было рассмотрено мнение студентов (N = 168) по данному предмету – положительное, неоднозначное или отрицательное.

Почти все студенты (91,1%; N = 153) согласны с тем, что культура должна быть частью обучения английскому языку. Были также неоднозначные ответы (6%; N = 10). Например, респонденты указали, что «больше внимания следует уделять собственному языку, а не культуре» (СТ118). Другие отметили, что культура может быть частью обучения английскому языку, но не обязательно (СТ167). 4 респондента (2,4%) утверждали, что культура не должна быть частью обучения английскому языку, поскольку изучение иностранного языка должно быть направлено на приобретение языковых навыков. Осознавая различные потребности, были предложены альтернативные решения, например: «Если кто-то заинтересован в культуре данной страны, для таких людей должны быть организованы дополнительные занятия» (СТ96).

В ходе дальнейшего анализа были выявлены причины необходимости изучения культуры стран изучаемого языка (Великобритании, США, Канады, Австралии) при преподавании английского языка.

Преобладали мнения, подчеркивающие важность получения знаний о странах изучаемого языка. Многие студенты особенно подчеркивали влияние культурных знаний на приобретение лингвистических знаний, отмечая внутреннюю связь между языком и культурой. СТ3 отмечал, например, что «знание самой культуры уже обогащает и помогает понять языковые явления». Респонденты также указали, что культура должна быть элементом изучения английского языка, так как этот вопрос сам по себе интересен: «Это интересно и вызывает интерес к этим странам» (СТ140).

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, по мнению студентов, культура должна быть частью изучения английского языка.

Второй открытый вопрос касался формирования межкультурной компетентности на уроках английского языка: Считаете ли вы, что формирование межкультурной компетентности должно быть частью обучения английскому языку? Кратко объясните свой ответ.

При анализе комментариев к ответу на второй открытый вопрос также изучалось мнение студентов (N = 168) по этому вопросу – положительное, неоднозначное или отрицательное.

148 респондентов (88,1%) считают, что межкультурная компетентность должна быть частью обучения английскому языку. Как и в случае с первым открытым вопросом, 10 студентов (6%) дали неоднозначный ответ. Чаще всего подчеркивалось, что межкультурная компетентность не является неотъемлемой частью обучения английскому языку. СТ105 считает, что «это в некоторой степени полезно, хотя и не обязательно для изучения языка». 3 респондента (1,8%) ответили отрицательно, подчеркнув, что следует сосредоточиться на приобретении лингвистической компетентности в рамках занятий по иностранному языку. 7 респондентов (4,2%) не ответили на этот вопрос.

Большинство респондентов подчеркнули, что цель формирования межкультурной компетентности заключается или должна заключаться в формировании знаний и навыков. Такие мнения можно найти в следующей цитате: «Благодаря дискуссиям о культуре можно развить разговорные навыки» (СТ84).

С другой стороны, некоторые респонденты сосредоточились на правильном общении с культурно отличными партнерами, что оправдывает формирование межкультурной компетентности в преподавании иностранного языка: «Мы должны развивать межкультурную компетентность, например, для того, чтобы иметь возможность общаться и понимать культурные различия между нами и представителями другой культуры в будущем» (СТ17); «Отсутствие понимания культуры может привести к проблемам в общении» (СТ2). Несколько респондентов также подчеркнули, что приобретение межкультурных компетенций вызывает у них личный интерес.

В таблице 3 приводятся процентные доли первого полуоткрытого вопроса о наиболее важных источниках формирования межкультурной компетентности. Студенты должны были проранжировать источники от 1 до 8, где 1 означает наиболее важный источник и 8 – наименее важный источник. В первой колонке приведены источники, которые были включены в опрос. В первой строке – ранг источника.

Таблица 3. Результаты ответов на вопрос о наиболее важном источнике формирования межкультурной компетентности (N = 160)

Источники формирования межкультурной компетентности	Ранг источника							
	1	2	3	4	5	6	7	8
материалы, содержащиеся в учебном пособии	10,6%	4,4%	11,9%	5,6%	6,9%	4,4%	18,8%	37,5%
авторские материалы, подготовленные преподавателем	9,4%	14,4%	8,1%	14,4%	16,9%	22,5%	11,3%	3,1%
дискуссии по вопросам культуры на уроках английского языка	29,4%	17,5%	8,8%	16,3%	7,5%	4,4%	6,9%	9,4%
презентации на уроках английского языка	4,4%	8,8%	10,6%	7,5%	15,0%	15,0%	22,5%	16,3%
обсуждение текущих событий на уроках английского языка	20,0%	13,1%	16,9%	15,0%	6,9%	9,4%	10,0%	8,8%
лекции преподавателей	8,1%	11,3%	13,1%	11,3%	19,4%	13,8%	11,3%	11,9%
Интернет-материалы, рекомендованные преподавателем	5,0%	11,9%	14,4%	16,3%	17,5%	20,6%	5,6%	8,8%
статьи, книги, фильмы, видео, рекомендованные преподавателем	13,1%	18,8%	16,3%	13,1%	10,0%	10,6%	13,8%	4,4%

Ответы студентов (N = 160) на первый полуоткрытый вопрос указывают на то, что наиболее важным источником для 47 респондентов (29,4%) были «дискуссии по вопросам культуры на уроках английского языка», для 32 респондентов (20%) – «обсуждение текущих событий», а для 21 респондента (13,1%) – «статьи, книги, фильмы, видео, рекомендованные преподавателем».

Для 60 респондентов (37,5%) наименее важным источником были «материалы, содержащиеся в учебном пособии», для 26 респондентов (16,3%) – «презентации на уроках английского языка» и для 19 респондентов (11,9%) – «лекции преподавателей».

Второй полуоткрытый вопрос касался источников контактов между учащимися и другими культурами за пределами уроков английского языка. Участники (N = 160) могли отметить четыре наиболее значимых для них источника. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4. Результаты ответов на вопрос о наиболее значимых источниках контакта с другими культурами (N = 160)

Источник	Количество респондентов	% респондентов
социальные сети	136	82,9%
просмотр ТВ/фильмов/сериалов	128	78,0%
Интернет-материалы (тексты, записи)	84	51,2%
поездки за границу	68	41,5%
частные уроки языка	14	8,5%
чтение прессы и/или книг	12	7,3%
другое	6	3,6%

Для 136 респондентов (82,9%) наиболее важным источником контакта с другими культурами стали социальные сети. Для 128 респондентов (78%) – просмотр ТВ/фильмов/сериалов. Наименьшие баллы были получены в категории «другое» – 6 респондентов (3,6%), которая включает такие ответы, как музыка – 3 респондента (1,8%), спорт – 3 респондента (1,8%). Низкие результаты также были получены в категории чтение прессы и/или книг – 12 респондентов (7,3%) и частные уроки языка – 14 респондентов (8,5%).

В целом, результаты эмпирического исследования показали, что студенты положительно относятся к интеграции межкультурного элемента в преподавание английского языка. В то же время они отмечают, что социальные сети являются наиболее важным источником контакта с другими культурами.

Подводя итог исследования, следует отметить важность формирования межкультурной компетентности с точки зрения студентов, поэтому перечень планируемых результатов обучения иностранному языку должен быть дополнен межкультурным элементом.

С учетом того, каким образом осуществляется межкультурный подход в обучении иностранному языку, необходимо создание и публикация учебных материалов (пособий), направленных на формирование межкультурной компетентности. В дополнение к доступу к публикациям, в которых приводятся занятия по формированию межкультурной компетентности, преподаватели должны также иметь возможность для переподготовки в области межкультурного обучения. Это актуальный вопрос, потому что преподавателям не хватает теоретических знаний о межкультурном обучении. Возможно, студентам следует предложить упражнения, включающие поиск и представление культурной информации, чтобы стимулировать размышления о различиях культур, развивать критическое мышление и любознательность.

В учебную практику также следует включить более увлекательные упражнения, способствующие формированию межкультурной компетентности, например, такие, как симуляции и межкультурные диалоги, которые могут быть успешно реализованы на иностранном языке.

Учебные материалы должны быть ориентированы не только на развитие межкультурной, но и социокультурной компетентности студентов, включая систематическое изучение культурных кодов, ценностных ориентиров и социальных практик стран изучаемого языка.

Педагогическая практика также должна дополняться, например, мероприятиями, стимулирующими размышления о собственной культуре. Примеры таких упражнений включают чтение и анализ англоязычных статей или фрагментов литературных текстов, обсуждающих российскую действительность, проведение занятий по региональным различиям в России (увиденным глазами студентов) или подготовку упражнений, в которых студенты должны объяснить на английском языке различные явления, происходящие в России.

Результаты исследования также демонстрируют постоянно растущую роль социальных сетей в обучении иностранному языку. Поэтому

можно сделать вывод, что учебные материалы должны быть дополнены этим элементом, и ссылаться на популярные в студенческой среде социальные платформы, чтобы стимулировать учащихся.

Заключение

На основе количественных и качественных данных исследования, можно сделать несколько выводов. Анализ открытых вопросов, содержащихся в опросе учащихся, показал, что студенты однозначно положительно относятся к внедрению межкультурного компонента в изучение иностранного языка. Анализ полуоткрытых вопросов показал, что, по мнению студентов, социальные сети являются их важнейшим источником контакта с другими культурами. Анализ результатов анкетирования студентов показывает, что занятия английским языком в наименьшей степени способствуют развитию знания компонента межкультурной компетентности, что может быть результатом отсутствия соответствующего содержания в учебных материалах.

Полученные результаты позволяют утверждать, что формирование межкультурной компетентности невозможно без целенаправленного развития социокультурной компетентности как её содержательной основы.

Результатом исследования стала формулировка дидактических рекомендаций, которые могли бы быть использованы для формирования межкультурной компетентности при обучении иностранному языку.

Литература

1. Куклина С.С., Шевченко А.И. Формирование межкультурной компетенции в профессионально ориентированной информационной образовательной среде вуза // Язык и культура. – 2019. – № 47. – С. 197–216. doi: 10.17223/19996195/47/11
2. Atay D., Kurt G., Çamlıbel Z., Ersin P., Kaslioglu Ö. The role of intercultural competence in foreign language teaching // Onu University Journal of the Faculty of Education. – 2009. – Vol. 10, No. 3. – P. 123–125.
3. Корнеева Л.И., Ма Ж. Формирование межкультурной коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку в Китае и России: сравнительно-сопоставительный анализ // Педагогическое образование в России. – 2019. – № 2. – С. 61–65. doi: 10.26170/po19-02-07
4. Fay R., Androulakis G. The intercultural dimension in language teaching: perspectives from the teaching of English and French // Research Papers in Language Teaching and Learning. – 2011. – Vol. 2, No. 1. – P. 62–73.
5. Карташова В.Н. Актуализация межкультурной компетенции обучающихся в процессе иноязычной подготовки в вузе (на примере праздников) // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2024. – Т. 18, № 1. – С. 172–181.
6. Kramsch C. Language and culture in second language learning // The Routledge handbook of language and culture / Ed. by F. Sharifian. – New York, NY: Routledge, 2015. – P. 403–416.
7. Sinicrope C., Norris J., Watanabe Y. Understanding and assessing intercultural competence: A summary of theory, research, and practice // Second Language Studies. – 2007. – Vol. 26, No. 1. – P. 1–58.
8. Sercu L. The future of intercultural competence in foreign language education: Recommendations for professional development, educational policy and research // Foreign language teachers and intercultural competence: An international investigation / Ed. by L. Sercu et al. – Clevedon: Multilingual Matters, 2005. – P. 160–181.
9. Апальков В.Г., Сысоев П.В. Компонентный состав межкультурной компетенции // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2008. – № 8 (64). – С. 89–93.
10. Телицына И.В. Образование через культуру // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – № 10–1 (85). – С. 180–182. doi: 10.24412/2500-1000-2023-10-1-180-182
11. Тарева Е.Г., Анненкова А.В., Дикова Е.С., Казанцева А.А., Казанцева Е.М., Колмакова О.А., Маметова Ю.Ф., Проскурина Г.А. Межкультурное иноязычное образование: лингводидактические стратегии и тактики. – М.: ООО «Издательская группа «Логос», 2014. – 232 с.

INTERCULTURAL COMPETENCE AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Akimova O.V., Deputatova N.A., Shangaraeva L.F.
Kazan (Volga Region) Federal University

This article presents the results of a student survey aimed at analyzing the development of intercultural competence in foreign language (English) learning. The survey included both quantitative (closed and semi-open questions) and qualitative (open questions) data. The research method used allowed us to obtain a relatively comprehensive picture of the development of intercultural competence in foreign language (English) learning from the perspective of university students.

The study revealed that students have a clearly positive attitude toward the integration of an intercultural component into foreign language learning. However, social media is the most important source of contact with other cultures, while English language classes themselves contribute the least to the development of the knowledge component of intercultural competence, which may be due to a lack of relevant content in educational materials.

Keywords: intercultural competence, intercultural approach, foreign language, English language, questionnaire.

References

1. Kuklina S.S., Shevchenko A.I. Formation of intercultural competence in the professionally oriented information educational environment of a university // *Language and Culture*. – 2019. – No. 47. – P. 197–216. doi: 10.17223/19996195/47/11
2. Atay D., Kurt G., Çamlıbel Z., Ersin P., Kaslioglu Ö. The role of intercultural competence in foreign language teaching // *Inonu University Journal of the Faculty of Education*. – 2009. – Vol. 10, No. 3. – P. 123–125.
3. Korneeva L.I., Ma Zh. Formation of intercultural communicative competence in foreign language teaching in China and Russia: comparative analysis // *Pedagogical Education in Russia*. – 2019. – No. 2. – P. 61–65. doi: 10.26170/po19-02-07
4. Fay R., Androulakis G. The intercultural dimension in language teaching: Perspectives from the teaching of English and French // *Research Papers in Language Teaching and Learning*. – 2011. – Vol. 2, No. 1. – P. 62–73.
5. Kartashova V.N. Actualization of the intercultural competence of students in the process of foreign language training at the university (on the example of holidays) // *The Science of Person: Humanitarian Researches*. – 2024. – Vol. 18, No. 1. – P. 172–181.
6. Kramsch C. Language and culture in second language learning // *The Routledge handbook of language and culture* / Ed. by F. Sharifian. – New York, NY: Routledge, 2015. – P. 403–416.
7. Sinicropo C., Norris J., Watanabe Y. Understanding and assessing intercultural competence: A summary of theory, research, and practice // *Second Language Studies*. – 2007. – Vol. 26, No. 1. – P. 1–58.
8. Sercu L. The future of intercultural competence in foreign language education: Recommendations for professional development, educational policy and research // *Foreign language teachers and intercultural competence: An international investigation* / Ed. by L. Sercu et al. – Clevedon: Multilingual Matters, 2005. – P. 160–181.
9. Apalkov V.G., Sysoev P.V. Components of intercultural competence // *Tambov University Review: Series Humanities*. – 2008. – No. 8 (64). – P. 89–93.
10. Telitsyna I.V. Education through culture // *International Journal of Humanities and Natural Sciences*. – 2023. – No. 10–1 (85). – P. 180–182. doi: 10.24412/2500-1000-2023-10-1-180-182
11. Tareva E.G., Annenkova A.V., Dikova E.S., Kazantseva A.A., Kazantseva E.M., Kolmakova O.A., Mametova Yu.F., Proskurina G.A. Intercultural foreign language education: Linguodidactic strategies and tactics. – Moscow: LLC Publishing Group "Logos", 2014. – 232 p.

Заболевания почек, приводящие к развитию хронической почечной недостаточности: этиологическая структура и патофизиологическая характеристика

Соломанина Ольга Олеговна,

кандидат медицинских наук, доцент, Медицинский институт, Пензенский государственный университет
E-mail: solomanina2010@yandex.ru

Микуляк Надежда Ивановна,

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой «Физиология человека», Медицинский институт, Пензенский государственный университет
E-mail: normphys@mail.ru

Шепелев Алексей Анатольевич,

кандидат биологических наук, доцент, Медицинский институт, Пензенский государственный университет.
E-mail: c.dirus@yandex.ru

Акимова Анастасия Романовна,

студент лечебного факультета по специальности «Лечебное дело», Медицинский институт, Пензенский государственный университет
E-mail: nastya.akimova.77@inbox.ru

В работе рассматриваются заболевания почек, приводящих к развитию хронической почечной недостаточности (ХПН). Особое внимание уделяется факторам, способствующим возникновению данных заболеваний (этиологии), а также их внутренним механизмам развития (патофизиологии). В исследовании были проанализированы наиболее распространенные нозологические формы, такие как воспаление почечных клубочков (гломерулонефриты), поражение почек при сахарном диабете (диабетическая нефропатия), изменения почек, связанные с высоким артериальным давлением, наследственное заболевание – поликистоз, а также заболевания, затрагивающие почечные канальцы и межклеточную ткань (тубулоинтерстициальные патологии). В исследовании представлены ключевые этапы патогенеза – от воспалительных и ишемических повреждений до склеротических изменений, приводящих к снижению фильтрационной функции. Полученные данные открывают возможности для более глубокого понимания взаимосвязей между клиническими проявлениями и морфологическими изменениями, что способствует формированию целенаправленных терапевтических подходов, призванных замедлить развитие хронической почечной недостаточности (ХПН). Исследование акцентирует внимание на важности всесторонней оценки и комплексного подхода в ведении пациентов с заболеваниями почек с целью предотвращения развития терминальной стадии почечной недостаточности.

Ключевые слова: Хроническая почечная недостаточность, заболевания почек, патофизиология почек, этиология почечных заболеваний.

Введение

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) является серьезной медицинской и социальной проблемой, которая сопровождается постепенным необратимым снижением функции почек. Заболевания почек, приводящие к формированию хронической почечной недостаточности (ХПН), характеризуются множеством этиологических факторов и сложными патофизиологическими механизмами, которые, в свою очередь, ведут к нарушению гомеостаза и структурным повреждениям нефронов. Современные исследования показывают, что ключевыми причинами развития хронической почечной дисфункции являются гломерулярные, тубулоинтерстициальные и сосудистые поражения почек, обусловленные как системными, так и локальными патологическими процессами [3,17].

Ключевой аспект в изучении патофизиологических процессов заключается в осмыслении их динамики и взаимозависимости – воспалительные, ишемические, фиброзные и склеротические изменения, протекая последовательно, приводят к постепенному снижению почечной функции. Анализ факторов в структуре болезней почек создает возможность для выявления наиболее распространенных заболеваний, включая диабетическую нефропатию, хронический гломерулонефрит, гипертензивную болезнь почек и поликистоз. В результате появляется возможность выявить специфические механизмы прогрессирования конкретных патологий.

Цель работы заключается в систематизации актуальных сведений об этиологии и патофизиологии заболеваний почек, приводящих к хронической почечной недостаточности (ХПН). Детальное изучение представленных аспектов необходимо для повышения эффективности диагностики и качества лечения данной патологии.

Хроническая почечная недостаточность развивается постепенно и часто сопровождается субклиническими этапами, которые затрудняют раннюю диагностику заболевания. Подобная динамика обусловлена высокой компенсаторной способностью почечных структур, сохраняющих функциональную активность даже при повреждении значительной части нефронов. Однако длительное влияние негативных факторов ведет к необратимому прогрессированию склеротических изменений, нарушению микроциркуляции и ремоделированию почечной ткани.

Этиологическая структура заболеваний, приводящих к хронической почечной недостаточности (ХПН), варьируется в зависимости от региональных особенностей, возраста пациентов и сопутствующих патологий. Например, в индустриальных странах ключевыми причинами являются диабетическая нефропатия и гипертензивная болезнь. В то же время в развивающихся регионах преобладают хронические гломерулонефриты и инфекционные поражения почек. Выявленная неоднородность причин требует персонального подхода к диагностике и подбору терапии [1].

Патофизиологические механизмы включают нарушения клубочковой фильтрации, тубулярной реабсорбции и секреции, а также изменения почечного кровотока. Это приводит к накоплению токсинов, электролитному и кислотно-щелочному дисбалансу и развитию анемии, что формирует клиническую картину хронической почечной недостаточности.

Исследование этиологии и патофизиологии почечных патологий углубляет понимание механизмов прогрессирования ХПН. Эти данные необходимы для разработки методов ранней диагностики и терапии, которые направлены на замедление почечной дисфункции и улучшение качества жизни пациентов.

Материалы и методы

Исследование выполнено при поддержке Пензенского государственного университета, являющегося государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования. Основой для выполнения исследования стала научная публикация.

Информационной базой работы послужили данные актуальных научных публикаций и клинических исследований, посвященных этиологии и патофизиологии заболеваний почек, осложненных ХПН. Для анализа были отобраны рецензируемые статьи из профильных медицинских изданий, индексируемых в базах данных Pubmed Scopus за последние 10 лет.

Методы исследования включали критический анализ и систематизацию данных о распространенности нозологий, составляющих этиологическую основу хронической почечной недостаточности (ХПН). Таким образом, были исследованы патофизиологические механизмы прогрессирования дисфункции почек с акцентом на диабетическую нефропатию, гипертензивную болезнь почек, хронические гломерулонефриты и пиелонефриты.

Для оценки патофизиологических процессов применялся сравнительный анализ данных о нарушениях клубочковой фильтрации, микроциркуляции, тубулярной функции и клеточных механизмов почечных структур. Дополнительно учитывались клинико-лабораторные маркеры, которые отражают тяжесть почечной недостаточности.

Оценка патофизиологических процессов проводилась на основе биохимических показателей – уровень креатинина, скорость клубочковой фильтрации, содержание белка/альбумина в моче, а также анализа морфологических изменений в почечной ткани, представленных в современной научной литературе. Использование сравнительных методов позволило установить взаимосвязь между этиологией заболевания, особенностями клинического течения и морфопатологией.

Патофизиологическая характеристика опиралась на изучение механизмов повреждения почечных структур, включая клеточные процессы воспаления, фиброза, оксидативного стресса и дисфункции микроциркуляции. Также в исследовании учитывалась роль активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и других систем, детерминирующих прогрессирование хронической почечной патологии [14].

Результаты и обсуждение

В ходе исследования была определена гетерогенная этиологическая структура заболеваний почек, приводящих к развитию хронической почечной недостаточности (ХПН). Согласно результатам анализа, клинических данных, распределение основных причин ХПН выглядит следующим образом: диабетическая нефропатия (около 40% случаев), хронический гломерулонефрит (25%), гипертензивная нефропатия (15%) и хронический пиелонефрит (10%). Остальные случаи связаны с менее распространенными патологиями, такими как поликистоз почек и врожденные аномалии [29].

Результаты патофизиологического анализа подтвердили, что прогрессирование хронической почечной недостаточности (ХПН) представляет собой многокомпонентный процесс, сопряженный с повреждением гломерулярного фильтра и интерстиция. В патогенезе диабетической нефропатии ключевым фактором выступает гипергликемия, вызывающая оксидативный стресс и активацию воспалительных каскадов. Данные изменения ведут к утолщению базальной мембраны и развитию гломерулосклероза. При гломерулонефрите ключевую роль играет иммунное воспаление с депонированием иммунных комплексов, что вызывает деструкцию клубочкового аппарата и последующий фиброз [8].

Гипертензивная нефропатия характеризуется нарастанием сосудистого сопротивления и развитием ишемических изменений в паренхиме почек, следствием чего становятся атрофия канальцев и истощение их регенераторного потенциала. Течение хронического пиелонефрита сопровождается персистирующим воспалением интерстиция, которое в сочетании с деструкцией почечных структур способствует формированию рубцовой ткани и прогрессирующему снижению нефронального запаса.

Независимо от первичного этиологического фактора, универсальным механизмом прогрессирования дисфункции является активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Также патологический процесс усугубляется системным воспалением и эндотериальной дисфункцией, провоцирующими микроциркуляторные нарушения [15].

Заключение

Проведенное исследование подтвердило многогранность этиологических факторов, инициирующих развитие ХПН. В современной клинической практике доминирующими причинами остаются диабетическая нефропатия, хронический гломерулонефрит, гипертензивная нефропатия и хронический пиелонефрит. Анализ патофизиологических характеристик данных заболеваний выявил общие паттерны прогрессирования: воспалительные реакции, фибриотические процессы, микроциркуляторные нарушения и гиперактивацию РААС. Взаимосвязь этих факторов ведет к необратимому снижению функционального нефронного запаса.

Таким образом, результаты подчеркивают необходимость индивидуального подхода в диагностике и терапии ХПН с учётом этиологического фактора и особенностей патофизиологического процесса. Это создает предпосылки для разработки целенаправленных лекарственных стратегий, направленных на замедление прогрессирования почечной недостаточности.

Литература

1. Alicic, R. Z., Rooney, K., & Tuttle, K. R. (2019). Glycemic control and progressive decline of kidney function in patients with type 2 diabetes. *Diabetes care*, 42(1), 10–17.
2. Barr, M. L., & R.S. Chertow, et al. (2017). Chronic kidney disease: patient management. *Nephrology (Carlton)*, 22(S1), 7–13.
3. Beck, L. H. (2020). Membranous nephropathy. *Seminars in nephrology*, 40(1), 65–76.
4. Beggs, M. L., & Chonchol, M. B. (2022). Chronic Kidney Disease Progression. *Seminars in nephrology*, 42(4), 347–357.
5. Cattran, D. C., & Julian, B. A. (2019). IgA nephropathy: current management and future directions. *Kidney international*, 95(3), 501–508.
6. Chen, N., Zhang, W., Zhang, L., et al. (2022). Efficacy and safety of SGLT2 inhibitors in patients with diabetic kidney disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Diabetes research and clinical practice*, 190, 109979.
7. Dalgaard, E. Z., & Kurban, A. (2020). Autosomal dominant polycystic kidney disease: current therapeutic strategies. *Current opinion in nephrology and hypertension*, 29(3), 330–338.
8. Daugherty, S. L., & Chertow, G. M. (2019). Hypertensive nephropathy: a leading cause of chronic kidney disease. *Nephrology Dialysis Transplantation*, 34(10), 1630–1635.
9. Dember, L. M. (2017). Glomerulonephritis: Diagnosis and management. *Nephrology Dialysis Transplantation*, 32(suppl_1), i38–i45.
10. Fioretto, P., Rigato, C., & Brosolo, G. (2020). Diabetic nephropathy: new perspectives in management. *Journal of diabetes research*, 2020.
11. Fogo, J. W., & Bruggeman, L. A. (2018). Focal segmental glomerulosclerosis. *Current opinion in nephrology and hypertension*, 27(3), 157–163.
12. Harris, P. C., & Torres, V. E. (2018). Polycystic kidney disease. *Annual review of medicine*, 69, 335–347.
13. Heersburg, K., Levin, A., & Tonelli, M. (2020). Diabetic kidney disease: the most common cause of kidney failure. *Kidney international*, 97(1), 45–53.
14. Hill, N. R., Flatley, P., Johnson, R. J., et al. (2021). Updated estimation of the global burden of chronic kidney disease in 2020 and projections to 2040. *The Lancet*, 398(10314), 1853–1868.
15. Inker, L. A., Heersburg, K., Levey, A. S., et al. (2019). Temporal trends in CKD incidence and outcomes in the United States. *American journal of kidney diseases*, 73(5), 758–771.
16. James, M. T., Johnson, J. A., Steyerberg, E. W., et al. (2019). Prediction of cardiovascular events in patients with chronic kidney disease. *Circulation*, 139(7), 870–878.
17. Jha, V. (2020). Global perspective on kidney disease. *Nephrology Dialysis Transplantation*, 35(Suppl_1), i3–i10.
18. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney international supplements*, 2021.
19. Lapi, F., Azani, N., Dibala, C., et al. (2020). Association of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers with Cardiovascular Events and Mortality in Patients with Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA network open*, 3(11), e2027181.
20. Levin, A., Stevens, P. E., Ross, R. J., et al. (2020). KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease: summary of recommendations. *Kidney international*, 98(4), 848–864.
21. Licht, C., & Lemley, K. (2021). IgA nephropathy. *Pediatric nephrology*, 36(6), 1331–1344.
22. Mancía, G., Fagard, R., Böhm, M., et al. (2018). 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). *European heart journal*, 39(33), 3021–3104.
23. Navaneethan, S. D., R.R. Jolly, et al. (2018). Prognostic value of glomerular filtration rate and albuminuria in chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. *BMJ*, 361.
24. Pollock, C. A. (2019). Diabetic nephropathy: a progressive disease. *Kidney international*, 95(3), 509–512.
25. Sarafidis, P. A., & Ruilope, L. M. (2019). Hypertension and chronic kidney disease: a complex relationship. *Hypertension*, 74(6), 1200–1208.
26. Smith, R. J., Appel, G. B., & Chen, M. (2019). Immunosuppressive therapy for glomerular disease. *Advances in chronic kidney disease*, 26(4), 258–267.
27. Stergiou, G. S., & Kardalas, I. (2021). Target blood pressure in patients with chronic kidney disease. *Current hypertension reports*, 23(6), 1–6.
28. Taler, S. J. (2018). Hypertension in patients with chronic kidney disease. *Medical Clinics of North America*, 102(4), 637–646.

29. Tonelli, M., Wiebe, N., Johnson, J. A., et al. (2021). Treatment of high blood pressure in people with chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis for the KDIGO guideline. *Annals of internal medicine*, 174(3), 375–385.

30. Vasan, R. S. (2020). The future of blood pressure management in chronic kidney disease. *Kidney international*, 97(3), 476–479.

31. Wanner, C., Heersburg, K., & Remuzzi, G. (2021). SGLT2 inhibitors in patients with diabetes and chronic kidney disease: a paradigm shift in treatment. *Kidney international*, 99(4), 771–774.

32. White, W. B. (2019). Hypertension in patients with chronic kidney disease. *Clinical journal of the American Society of Nephrology*, 14(4), 611–618.

33. Багдасарова, И. В., & Петрова, А. В. (2021). Интерстициальный нефрит: дифференциальная диагностика и особенности терапии. *Практическая медицина*, *5(5), 110–117.

34. Бобкова, Н. А., & Козловская, Л. В. (2020). IgA-нефропатия: современный взгляд на патогенез и терапию. *РМЖ. Нефрология*, 22(1), 25–33.

35. Валиев, А. И., & Шарифуллин, Р. Р. (2020). Клинико-генетические аспекты и терапия аутосомно-доминантного поликистоза почек. *Российский вестник нефрологии*, 24(4), 40–50.

36. Гасанова, А. А., & Смирнов, А. В. (2020). Роль ингибиторов SGLT2 в лечении диабетической нефропатии. *Клиническая нефрология*, 12(4), 25–32.

37. Добронравов, В. А., & Козловская, Л. В. (2023). Молекулярные механизмы развития поликистоза почек. *Успехи биологии и медицины*, 37(5), 560–570.

38. Добронравов, В. А., & Смирнов, А. В. (2023). Влияние сепсиса на функцию почек. *Клиническая медицина*, 101(1), 40–50.

39. Дьяконова, М. А., & Каюмова, А. М. (2019). Современные подходы к диагностике и лечению хронической болезни почек. *Нефрология*, 23(2), 14–25.

40. Журавлева, О. В., & Добронравов, В. А. (2020). Патопизиология ренин-ангиотензин-альдостероновой системы при артериальной гипертензии и хронической болезни почек. *Российский вестник нефрологии*, 24(2), 18–26.

41. Задонченко, В. С., & Резвушкина, Е. В. (2023). Диабетическая нефропатия: современные аспекты диагностики и лечения. *Кардиология*, 63(3), 70–77.

42. Ключева, А. А., & Козловская, Л. В. (2021). Патопизиология хронической болезни почек. *Вестник Российской военно-медицинской академии*, 64(4), 153–160.

43. Кобалава, Ж. Д., & Старцева, Е. П. (2017). Артериальная гипертензия и хроническая болезнь почек. *Артериальная гипертензия*, 23(3), 231–241.

44. Моисеев, В. С., Сура, М. В., & Хохлов, А. Л. (2018). Хроническая болезнь почек. *Российский вестник нефрологии*, 22(3), 7–21.

45. Мухин, Н. А., & Моисеев, В. С. (2017). *Нефрология. Медицинское информационное агентство*.

46. Недошивин, А. О., & Яковлев, А. А. (2019). Роль ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II в лечении гипертонической нефропатии. *Нефрология*, 23(3), 30–40.

47. Попов, С. А., & Киселев, В. Н. (2019). Хронический тубулоинтерстициальный нефрит: этиология и патогенез. *Клиническая нефрология*, 11(3), 10–20.

48. Смирнов, А. В., & Добронравов, В. А. (2023). *Нефрология: учебник. ГЭОТАР-Медиа*.

49. Томилина, Н. А., & Шилов, Е. М. (2018). Семейные формы поликистоза почек. *Клиническая нефрология*, 10(4), 25–33.

50. Чазова, И. Е., & Мычка, В. Б. (2018). Рациональная фармакотерапия артериальной гипертензии. *Кардиология*, 58(3S), 39–61.

51. Шарифуллин, Р. Р., & Валиев, А. И. (2025). Глобальные тенденции развития хронической болезни почек: прогноз и пути решения. *Нефрология сегодня*, 3(1), 15–25.

52. Шварц, Е. Т., & Бочкова, Т. В. (2020). Обструктивная нефропатия: влияние на функцию почек и пути восстановления. *Российский вестник нефрологии*, 24(3), 30–38.

53. Шестакова, М. В., & Видулова, О. К. (2022). Руководство по диабету и хронической болезни почек 2020 (KDIGO). *Сахарный диабет*, 25(3), 280–294.

54. Шестакова, М. В., & Карпов, О. Э. (2017). Диабетическая нефропатия. *РМЖ. Нефрология*, 19(5), 292–298.

55. Шестакова, М. В., & Манухина, Е. В. (2020). Хроническая болезнь почек и ее осложнения. *Сахарный диабет*, 23(4), 35–45.

56. Шилов, А. М., & Мельник, М. В. (2022). Диагностика и лечение резистентной артериальной гипертензии у пациентов с хронической болезнью почек. *Российский кардиологический журнал*, 27(1), 45–67.

57. Шилов, Е. М., & Томилина, Н. А. (2019). Гломерулонефриты: диагностика и лечение. *Клиническая нефрология*, 11(1), 5–19.

58. Шутов, А. М., & Кузнецова, О. В. (2018). Анемия при хронической болезни почек. *Тер. архив*, 90(10), 104–110.

59. Шутов, А. М., & Меркулов, А. В. (2020). Хроническая болезнь почек: эпидемиология, факторы риска и диагностика. *Клиническая нефрология*, 12(3), 5–13.

60. Яндиева, С. М., & Кобалава, Ж. Д. (2018). Современные подходы к лечению диабетической нефропатии. *Артериальная гипертензия*, 24(4), 340–347.

KIDNEY DISEASES LEADING TO THE DEVELOPMENT OF CHRONIC RENAL FAILURE: ETIOLOGICAL STRUCTURE AND PATHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS

Solomanina O.O., Mikulyak N.I., Shepelev A.A., Akimova A.R.
Penza State University

This work examines kidney diseases that lead to the development of chronic kidney disease (CKD). Special attention is paid to the factors contributing to the onset of these diseases (etiology), as well as their internal mechanisms of development (pathophysiology). The study analyzed the most common nosological forms, such as inflammation of the renal glomeruli (glomerulonephritis), kidney damage in diabetes mellitus (diabetic nephropathy), kidney changes associated with high blood pressure, the hereditary disease polycystic kidney disease, and diseases affecting the renal tubules and interstitial tissue (tubulointerstitial pathologies). The study presents key stages of pathogenesis – from inflammatory and ischemic damage to sclerotic changes, leading to a decrease in filtration function. The obtained data open up opportunities for a deeper understanding of the relationships between clinical manifestations and morphological changes, which contributes to the formation of targeted therapeutic approaches designed to slow the progression of chronic kidney disease (CKD). The study emphasizes the importance of comprehensive assessment and a holistic approach in managing patients with kidney diseases to prevent the development of end-stage renal disease.

Keywords: Chronic kidney disease, kidney diseases, renal pathophysiology, etiology of kidney diseases.

References

1. Alicic, R. Z., Rooney, K., & Tuttle, K. R. (2019). Glycemic control and progressive decline of kidney function in patients with type 2 diabetes. *Diabetes care*, 42(1), 10–17.
2. Barr, M. L., & R. S. Chertow, et al. (2017). Chronic kidney disease: patient management. *Nephrology (Carlton)*, 22(S1), 7–13.
3. Beck, L. H. (2020). Membranous nephropathy. *Seminars in nephrology*, 40(1), 65–76.
4. Beggs, M. L., & Chonchol, M. B. (2022). Chronic Kidney Disease Progression. *Seminars in nephrology*, 42(4), 347–357.
5. Cattran, D. C., & Julian, B. A. (2019). IgA nephropathy: current management and future directions. *Kidney international*, 95(3), 501–508.
6. Chen, N., Zhang, W., Zhang, L., et al. (2022). Efficacy and safety of SGLT2 inhibitors in patients with diabetic kidney disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Diabetes research and clinical practice*, 190, 109979.
7. Dalgaard, E. Z., & Kurban, A. (2020). Autosomal dominant polycystic kidney disease: current therapeutic strategies. *Current opinion in nephrology and hypertension*, 29(3), 330–338.
8. Daugherty, S. L., & Chertow, G. M. (2019). Hypertensive nephropathy: a leading cause of chronic kidney disease. *Nephrology Dialysis Transplantation*, 34(10), 1630–1635.
9. Dember, L. M. (2017). Glomerulonephritis: Diagnosis and management. *Nephrology Dialysis Transplantation*, 32(suppl_1), i38–i45.
10. Fioretto, P., Rigatto, C., & Brosolo, G. (2020). Diabetic nephropathy: new perspectives in management. *Journal of diabetes research*, 2020.
11. Fogo, J. W., & Bruggeman, L. A. (2018). Focal segmental glomerulosclerosis. *Current opinion in nephrology and hypertension*, 27(3), 157–163.
12. Harris, P. C., & Torres, V. E. (2018). Polycystic kidney disease. *Annual review of medicine*, 69, 335–347.
13. Heersburg, K., Levin, A., & Tonelli, M. (2020). Diabetic kidney disease: the most common cause of kidney failure. *Kidney international*, 97(1), 45–53.
14. Hill, N. R., Flatley, P., Johnson, R. J., et al. (2021). Updated estimation of the global burden of chronic kidney disease in 2020 and projections to 2040. *The Lancet*, 398(10314), 1853–1868.
15. Inker, L. A., Heersburg, K., Levey, A. S., et al. (2019). Temporal trends in CKD incidence and outcomes in the United States. *American journal of kidney diseases*, 73(5), 758–771.
16. James, M. T., Johnson, J. A., Steyerberg, E. W., et al. (2019). Prediction of cardiovascular events in patients with chronic kidney disease. *Circulation*, 139(7), 870–878.
17. Jha, V. (2020). Global perspective on kidney disease. *Nephrology Dialysis Transplantation*, 35(suppl_1), i3–i10.
18. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney international supplements*, 2021.
19. Lapi, F., Azani, N., Dibala, C., et al. (2020). Association of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers with Cardiovascular Events and Mortality in Patients with Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA network open*, 3(11), e2027181.
20. Levin, A., Stevens, P. E., Ross, R. J., et al. (2020). KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease: summary of recommendations. *Kidney international*, 98(4), 848–864.
21. Licht, C., & Lemley, K. (2021). IgA nephropathy. *Pediatric nephrology*, 36(6), 1331–1344.

22. Mancia, G., Fagard, R., Böhm, M., et al. (2018). 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). *European heart journal*, 39(33), 3021–3104.
23. Navaneethan, S. D., R.R. Jolly, et al. (2018). Prognostic value of glomerular filtration rate and albuminuria in chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. *BMJ*, 361.
24. Pollock, C. A. (2019). Diabetic nephropathy: a progressive disease. *Kidney international*, 95(3), 509–512.
25. Sarafidis, P. A., & Ruilope, L. M. (2019). Hypertension and chronic kidney disease: a complex relationship. *Hypertension*, 74(6), 1200–1208.
26. Smith, R. J., Appel, G. B., & Chen, M. (2019). Immunosuppressive therapy for glomerular disease. *Advances in chronic kidney disease*, 26(4), 258–267.
27. Stergiou, G. S., & Kardalas, I. (2021). Target blood pressure in patients with chronic kidney disease. *Current hypertension reports*, 23(6), 1–6.
28. Taler, S. J. (2018). Hypertension in patients with chronic kidney disease. *Medical Clinics of North America*, 102(4), 637–646.
29. Tonelli, M., Wiebe, N., Johnson, J. A., et al. (2021). Treatment of high blood pressure in people with chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis for the KDIGO guideline. *Annals of internal medicine*, 174(3), 375–385.
30. Vasan, R. S. (2020). The future of blood pressure management in chronic kidney disease. *Kidney international*, 97(3), 476–479.
31. Wanner, C., Heersburg, K., & Remuzzi, G. (2021). SGLT2 inhibitors in patients with diabetes and chronic kidney disease: a paradigm shift in treatment. *Kidney international*, 99(4), 771–774.
32. White, W. B. (2019). Hypertension in patients with chronic kidney disease. *Clinical journal of the American Society of Nephrology*, 14(4), 611–618.
33. Bagdasarova, I. V., & Petrova, A. V. (2021). Interstitial nephritis: differential diagnosis and features of therapy. *Practical Medicine*, (5), 110–117.
34. Bobkova, N. A., & Kozlovskaya, L. V. (2020). IgA-nephropathy: a modern view on pathogenesis and therapy. *RMJ. Nephrology*, 22(1), 25–33.
35. Valiev, A. I., & Sharifullin, R. R. (2020). Clinical and genetic aspects and therapy of autosomal dominant polycystic kidney disease. *Russian Bulletin of Nephrology*, 24(4), 40–50.
36. Gasanova, A. A., & Smirnov, A. V. (2020). The role of SGLT2 inhibitors in the treatment of diabetic nephropathy. *Clinical Nephrology*, 12(4), 25–32.
37. Dobronravov, V. A., & Kozlovskaya, L. V. (2023). Molecular mechanisms of polycystic kidney disease development. *Advances in Biology and Medicine*, 37(5), 560–570.
38. Dobronravov, V. A., & Smirnov, A. V. (2023). The effect of sepsis on kidney function. *Clinical Medicine*, 101(1), 40–50.
39. Dyakonova, M. A., & Kayumova, A. M. (2019). Modern approaches to the diagnosis and treatment of chronic kidney disease. *Nephrology*, 23(2), 14–25.
40. Zhuravleva, O. V., & Dobronravov, V. A. (2020). Pathophysiology of the renin-angiotensin-aldosterone system in arterial hypertension and chronic kidney disease. *Russian Bulletin of Nephrology*, 24(2), 18–26.
41. Zadionchenko, V. S., & Rezvushkina, E. V. (2023). Diabetic nephropathy: modern aspects of diagnosis and treatment. *Cardiology*, 63(3), 70–77.
42. Klyueva, A. A., & Kozlovskaya, L. V. (2021). Pathophysiology of chronic kidney disease. *Bulletin of the Russian Military Medical Academy*, 64(4), 153–160.
43. Kobalava, Zh. D., & Startseva, E. P. (2017). Arterial hypertension and chronic kidney disease. *Arterial Hypertension*, 23(3), 231–241.
44. Moiseev, V. S., Sura, M. V., & Khokhlov, A. L. (2018). Chronic kidney disease. *Russian Bulletin of Nephrology*, 22(3), 7–21.
45. Mukhin, N. A., & Moiseev, V. S. (2017). Nephrology. Medical Information Agency.
46. Nedoshivin, A. O., & Yakovlev, A. A. (2019). The role of ACE inhibitors and angiotensin II receptor blockers in the treatment of hypertensive nephropathy. *Nefrologiya*, 23(3), 30–40.
47. Popov, S. A., & Kiselev, V. N. (2019). Chronic tubulointerstitial nephritis: etiology and pathogenesis. *Klinicheskaya nefrologiya*, 11(3), 10–20.
48. Smirnov, A. V., & Dobronravov, V. A. (2023). Nephrology: Textbook. GEOTAR-Media.
49. Tomilina, N. A., & Shilov, E. M. (2018). Familial forms of polycystic kidney disease. *Klinicheskaya nefrologiya*, 10(4), 25–33.
50. Chazova, I. E., & Mychka, V. B. (2018). Rational pharmacotherapy of arterial hypertension. *Kardiologiya*, 58(3S), 39–61.
51. Sharifullin, R. R., & Valiev, A. I. (2025). Global trends in the development of chronic kidney disease: prognosis and solutions. *Nefrologiya segodnya*, 3(1), 15–25.
52. Shvarts, E. T., & Bochkova, T. V. (2020). Obstructive nephropathy: impact on kidney function and recovery pathways. *Rossiyskiy vestnik nefrologii*, 24(3), 30–38.
53. Shestakova, M. V., & Vikulova, O. K. (2022). KDIGO 2020 guidelines for diabetes and chronic kidney disease. *Sakharnyy diabet*, 25(3), 280–294.
54. Shestakova, M. V., & Karpov, O. E. (2017). Diabetic nephropathy. *RMZH. Nefrologiya*, 19(5), 292–298.
55. Shestakova, M. V., & Manukhina, E. V. (2020). Chronic kidney disease and its complications. *Sakharnyy diabet*, 23(4), 35–45.
56. Shilov, A. M., & Melnik, M. V. (2022). Diagnosis and treatment of resistant arterial hypertension in patients with chronic kidney disease. *Rossiyskiy kardiologicheskiy zhurnal*, 27(1), 45–67.
57. Shilov, E. M., & Tomilina, N. A. (2019). Glomerulonephritis: diagnosis and treatment. *Klinicheskaya nefrologiya*, 11(1), 5–19.
58. Shutov, A. M., & Kuznetsova, O. V. (2018). Anemia in chronic kidney disease. *Ter. arkhiv*, 90(10), 104–110.
59. Shutov, A. M., & Merkulov, A. V. (2020). Chronic kidney disease: epidemiology, risk factors, and diagnosis. *Klinicheskaya nefrologiya*, 12(3), 5–13.
60. Yandieva, S. M., & Kobalava, Zh. D. (2018). Modern approaches to the treatment of diabetic nephropathy. *Arterial'naya gipertenziya*, 24(4), 340–347.

Проблема адаптации студентов-первокурсников к образовательному процессу в медицинском вузе и ее влияние на качество обучения

Тихомирова Галия Имамутдиновна,

доктор медицинских наук, доцент, врач-хирург высшей квалификационной категории Ижевского государственного медицинского университета
E-mail: Galla-tix@mail.ru

Сычева София Алексеевна,

студент Ижевского государственного медицинского университета,
E-mail: sofia20051130@gmail.com

Бабурина Анастасия Васильевна,

студент Ижевского государственного медицинского университета,
E-mail: n.baburina.v@gmail.com

В статье рассматривается актуальная проблема адаптации студентов первого курса к обучению в медицинском университете. На основе анализа авторской анкеты, предназначенной для студентов Ижевского государственного медицинского университета, исследуются ключевые факторы, влияющие на успешность вхождения вчерашних школьников в новую образовательную среду. Особое внимание уделяется взаимосвязи между организацией учебного процесса, развитием «soft skills», информационной грамотностью и субъективной оценкой студентами собственной успеваемости.[4] В статье отмечается, что дезадаптация на начальном этапе может приводить к снижению академической мотивации и успеваемости, что непосредственно сказывается на качестве подготовки будущих специалистов. Делается вывод о необходимости комплексного подхода к сопровождению первокурсников, учитывающего как академические, так и психолого-педагогические аспекты.[3] Реализация такого подхода позволит минимизировать риски отчисления и создать условия для полноценного раскрытия потенциала каждого студента.

Ключевые слова: адаптация студентов, медицинское образование, первый курс, качество обучения, образовательный процесс, гибкие навыки, самоорганизация, анкетирование.

Введение

Переход от школьного обучения к вузовскому является критическим этапом в жизни молодого человека, особенно в таком сложном и ответственном направлении, как медицина.[6] Для большинства студентов поступление в высшее учебное заведение означает, в первую очередь, шаг во в зрослую жизнь, сопряженный с необходимостью самостоятельно ее планировать, принимать решения и нести за них ответственность. Столь резкие изменения жизненной ситуации и рост личностной ответственности сопряжены с повышением уровня психического напряжения и ростом тревожности.[1] Длительное или частое переживание подобных состояний может привести к невротизации личности, снижению стрессоустойчивости и способности выдерживать эмоциональную нагрузку.[2] В связи с этим особое значение имеет помощь в оптимизации перехода к новым условиям жизни и деятельности. Студенты-первокурсники сталкиваются со сложностью адаптации к новой вузовской системе организации обучения, а именно к лекционно-семинарскому проведению занятий, зачетной системе оценивания, отсутствию жесткого внешнего контроля учебной деятельности.[5] Трудности связаны также с недостатками в организации учебных занятий и экзаменов – нерационально составленное расписание, неосведомленность относительно организационных вопросов и т.д.

Трудности адаптации к учебному процессу связываются и с неудовлетворенностью содержанием преподаваемых и изучаемых дисциплин, неясностью учебных задач, сложностью установления связи изучаемых дисциплин с будущей практической деятельностью, что, по мнению студентов, мешает усвоению учебного материала. Упоминается отсутствие навыков самостоятельного обучения и поиска информации, неумение искать и использовать информацию, непонимание правил учебной работы.[6] Полноценное включение в учебный процесс затрудняется резким увеличением объема изучаемого материала, недостаточностью учебно-методической литературы и малой технической оснащенностью аудиторий.[5]

Процесс адаптации к образовательной среде медицинского вуза напрямую влияет на качество усвоения знаний, мотивацию и, в конечном итоге, на сохранение контингента обучающихся.

Цель: анализ основных барьеров адаптации студентов первого курса и оценка их потенциального влияния на эффективность обучения, опираясь на структуру и содержание разработанной анкеты для студентов ИЖГМУ.

Материалы и методы исследования

Характеристика выборки

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО ИЖГМУ в 2025–2026 учебном году. В опросе приняли участие 106 студентов первого курса лечебного, педиатрического и стоматологических факультетов. Критерий включения: наличие информированного согласия на участие. Из них 62,9% составили девушки, 37,1% – юноши. Распределение по форме обучения: 31,4% – бюджет; 40% – контракт; 28,6% – платное.

Методы исследования

Основным методом сбора данных выступило анонимное анкетирование. Инструментарий – авторская анкета, состоящая из 7 тематических блоков, включающих вопросы закрытого типа (шкалы Лайкерта от 1 до 5, множественный выбор) и открытые вопросы для сбора качественных данных.

Структура анкеты:

1. Демографический блок (пол, форма обучения, успеваемость)
2. Мотивация и ценность дисциплин
3. Системная компетенция и самоорганизация
4. Технологическая грамотность
5. Коммуникативные навыки
6. Надпрофессиональные навыки (soft skills)
7. Интегральная оценка и предложения

Обработка данных

Статистическая обработка результатов проводилась методами описательной статистики (расчет средних значений, процентных долей).

Основная часть

Разработанный инструментарий (анкета) позволяет провести многофакторный анализ адаптационных процессов. Структура анкеты отражает ключевые области, в которых у первокурсников возникают наибольшие трудности.

Ценностно-мотивационный компонент и понимание профессиональной траектории (Блоки 1 и 2)

Анкета начинается со сбора демографических данных и успеваемости, что позволяет стратифицировать респондентов. Вопросы блока 2 направлены на выявление внутренней мотивации студента. Оценка утверждения «Я чувствую, что становлюсь более эрудированной личностью...» (вопрос 2.1) позволяет измерить уровень удовлетворенности от интеллектуального роста, что является важным предиктором успешной адаптации. Выявление «полезных» и «ненужных» (вопросы 2.4, 2.5) дисциплин помогает понять, насколько студент осознает целостность медицинского образования и связь фундаментальных наук (химия, биология) с будущей клинической практикой. Низкое понимание этой связи (вопрос 2.3) может свидетельствовать о фрагментарности восприятия знаний, характерной для начального этапа адаптации, и снижать мотивацию к изучению сложных базовых предметов.

Самоорганизация и управление ресурсами (Блок 3)

Блок 3 является ключевым для диагностики адаптационных проблем. Первокурсники, привыкшие к внешнему контролю со стороны учителей и родителей, часто не готовы к самостоятельному планированию. [6] Вопросы 3.2 (умение планировать) и 3.3 (распределение ресурсов) напрямую оценивают уровень развития регулятивных навыков. Предложенный список помех (вопрос 3.4) охватывает основные деструкторы: от внутренних («прокрастинация») до внешних («отсутствие места», «соцсети»). Преобладание ответов «Большой объем информации» и «Прокрастинация» будет сигнализировать о когнитивной и эмоциональной перегрузке, требующей педагогической коррекции и, возможно, психологической поддержки.[2]

Инструментальная грамотность как условие успешности (Блок 4)

Современный образовательный процесс в медицинском вузе невозможен без цифровых компетенций. Вопросы блока 4 оценивают не только владение компьютером (4.4), но и критическое мышление при работе с информацией (4.2).[4] Особый интерес представляет вопрос об использовании дополнительных цифровых ресурсов (4.5). Высокая частота их использования может свидетельствовать как о высокой мотивации, так и о нехватке или сложности материалов, предоставляемых вузом. Оценка преподавания современных технологий (4.1) позволяет понять, насколько быстро студент может встроиться в электронную образовательную среду университета, что является важной частью информационной адаптации.

Коммуникативные и надпрофессиональные навыки (Блоки 5 и 6)

Социально-психологическая адаптация невозможна без развитых коммуникативных навыков. Блок 5 предлагает студенту дать самооценку базовым умениям: говорить, слушать, писать, читать. Низкие оценки по этим пунктам (особенно «умение слушать» и «коммуникабельность») указывают на потенциальные сложности во взаимодействии с преподавателями и в выстраивании отношений в новом коллективе. Блок 6 смещает фокус на «soft skills» – ответственность (6.1), критическое мышление (6.2), работу в команде (6.5). Пункт 6.7 (роль лидера или переговорщика) помогает выявить студентов с активной позицией, которые не только сами адаптируются быстрее, но и помогают адаптироваться другим. Сформированность этих навыков является показателем зрелости личности и напрямую коррелирует с успешностью обучения, особенно на старших курсах.

Интегральная оценка (Блок 7)

Завершающий блок анкеты позволяет сопоставить самооценку студента по частным параметрам с общей удовлетворенностью процессом (вопрос 1). Открытые вопросы о преимуществах и недостатках (вопросы 2 и 3) дают качественный материал для интерпретации количественных данных. [3] Например, высокая оценка эффективности процесса (вопрос 1) при указании на «плохую организацию» в открытом вопросе может свидетельствовать о высоком качестве преподавания отдельных дисциплин, нивелирующем общие организационные проблемы.

Результаты анкетирования

В ходе анкетирования студентов первого курса Ижевской государственной медицинской академии (ИжГМУ) было опрошено 106 респондентов.

Анализ полученных данных позволил выявить ключевые тенденции и проблемы адаптации первокурсников к образовательному процессу в медицинском вузе, а также оценить их влияние на качество обучения.

Общая характеристика респондентов

Большинство участников опроса составили девушки (около 62,9%), что отражает общую тенденцию гендерного состава медицинских вузов. Распределение по форме обучения показало преобладание студентов, обучающихся на платной и контрактной основе (28,6% и 40% соответственно), в то время как студенты-бюджетники составили 31,4%. Средний балл успеваемости респондентов распределился следующим образом: около 5,7% имеют средний балл 4.5–5.0, 40% – от 4.0 до 4.4, 42,9% – от 3.5 до 3.9 и 11,4% – ниже 3.5.

Адаптация к содержанию и организации учебного процесса

Оценка ценности дисциплин (Блок 2). Большинство студентов (45,7% выбрали оценки 4 и 5) признают высокую значимость фундаментальных дисциплин (анатомия, химия, биология) как основы будущей профессии. Однако, несмотря на понимание важности, лишь часть респондентов (20%) полностью согласны с тем, что обучение способствует их гармоничному развитию. Это указывает на существование разрыва между узкопрофессиональными ожиданиями и общекультурным компонентом образования. В открытых вопросах студенты наиболее полезными называли анатомию, биологию, химию, безопасность жизнедеятельности, а к «ненужным» относили дисциплины, дублирующие школьную программу, или те, связь которых с будущей практикой, по их мнению, не значима – физика, история России, экономика, основы Российской государственности.

Самоорганизация и управление ресурсами (Блок 3). Критической зоной адаптации является самоорганизация. Способность планировать и распределять ресурсы студенты оценили как среднюю (средний балл 3.5). Среди главных барьеров эффективной организации учебного времени (вопрос 3.4) респонденты отметили:

- **Большой объем информации** – 65,7% (наиболее частый выбор);
- **Прокрастинация/отсутствие мотивации** – 54,3%;
- **Неумение планировать** – 40%.

Эти данные свидетельствуют о том, что первокурсники сталкиваются с информационной перегрузкой и еще не обладают достаточными навыками тайм-менеджмента для работы в новых, более интенсивных условиях вуза.

Развитие ключевых компетенций

Информационная грамотность (Блок 4). Студенты демонстрируют высокий уровень базовой компьютерной грамотности (оценка 4.3), однако критически оценивают вклад университета в освоение специализированных образовательных технологий (средний балл 3.6). Это говорит о потребности в более активном внедрении интерактивных симуляторов и атласов в учебный процесс. Примечательно, что 82,8% опрошенных постоянно или часто используют дополнительные цифровые ресурсы (YouTube, приложения) для учебы, что подчеркивает их адаптацию к современным форматам получения знаний, которая, однако, часто происходит стихийно, без методического руководства со стороны вуза.

Надпрофессиональные навыки (Soft Skills) (Блок 5–6). Наиболее развитым навыком студенты считают «коммуникабельность» (легкость в установлении контактов с однокурсниками и преподавателями) (средний балл 4.6), в то время как «умение читать и работать с большими объемами текста» вызывает наибольшие затруднения (средний балл 3.7). Оценка коммуникативных навыков показывает, что установление контактов с одноклассниками (средний балл 4.0) дается легче, чем взаимодействие с преподавателями. В блоке Soft Skills наиболее высокие оценки получила ответственность за свое обучение (п. 6.1 – средний балл 4.5), что говорит о мотивации студентов. В то же время, готовность обучать других и брать на себя лидерские функции (п. 6.7) выражена слабее (средний балл 3.1), что может быть следствием неуверенности на начальном этапе обучения.

Заключение

Проведенное исследование адаптации студентов-первокурсников ИжГМУ к образовательному процессу позволило выявить комплекс факторов, влияющих на качество их обучения. Анализ анкетных данных демонстрирует противоречие между высоким уровнем исходной мотивации и признанием значимости профессии, с одной стороны, и недостаточной сформированностью компетенций самоорганизации и критического мышления – с другой.

Основные барьеры адаптации связаны не с содержательной стороной обучения (ценность дисциплин признается студентами), а с его организацией и методическим сопровождением. Прокрастинация, не-

умение распределять время и ресурсы в условиях большого объема информации, а также дефицит навыков работы с текстами являются ключевыми факторами риска снижения успеваемости. Студенты активно используют внешние цифровые ресурсы для компенсации пробелов в обучении, однако этот процесс носит бессистемный характер.

Влияние адаптации на качество обучения выражается в том, что даже при наличии внутренней ответственности, студенты испытывают трудности в применении системного подхода и эффективном распределении усилий. Это подтверждается средними оценками системных знаний и планирования, которые коррелируют с данными об успеваемости: студенты с более высокими баллами за самоорганизацию чаще попадают в группу с оценками «4» и «5».

Таким образом, для повышения качества подготовки первокурсников необходима целенаправленная педагогическая поддержка, включающая:

1. Внедрение в учебный процесс первого курса модулей по технологиям обучения и тайм-менеджменту.

2. Активное использование интерактивных технологий и симуляторов, востребованных студентами, для повышения практико-ориентированности обучения.

3. Развитие коммуникативных и лидерских качеств через интеграцию групповых проектных форм работы.

Адресная работа в этих направлениях позволит сократить период адаптации и будет способствовать формированию не только информированного, но и компетентного, готового к профессиональной деятельности специалиста.

Литература

1. Григорьева, Д.Д. Исследование особенностей дезадаптации и тревожности у студентов медицинского вуза / Д.Д. Григорьева, М.И. Михеев // Тверской медицинский журнал. – 2025. – № 5. – URL: <https://tvermedjournal.tvergma.ru/katalog-statey/issledovanie-osobennostey-dezadaptatsii-i-trevozhnosti-u-studentov-meditsinskogo-vuza/> (дата обращения: 25.02.2026)

2. Макарова-Горбачева, Е.В. Изменения параметров работы сердечно-сосудистой системы и показателей психоэмоционального состояния студентов-медиков в процессе обучения / Е.В. Макарова-Горбачева, А.И. Будаев, О.Н. Павлова, Н.Н. Желонкин // Современные вопросы биомедицины. – 2025. – Т. 9, № 4.

3. Морозова, А. Трудности старта: проблемы адаптации первокурсников в российских вузах / А. Морозова // Финансовый университет при Правительстве РФ: [сайт]. – 23 сентября 2025. – URL: <https://www.fa.ru/university/structure/university/uso/press-service/press-releases/trudnosti-starta-problemy-adaptatsii-pervokursnikov-v-rossiyskikh-vuzakh> (дата обращения: 25.02.2026)

4. Романова, Е.В. К вопросу о цифровой трансформации медицинского образования: исследование универсальных и профессиональных цифровых компетенций обучающихся / Е.В. Романова, Т.А. Кульшань, А.С. Федонников [и др.] // Национальное здравоохранение. – 2025. – Т. 6, № 4.

5. Салихова, Н.Р. Трудности адаптации первокурсников к обучению в вузе / Н.Р. Салихова, А.Р. Фахрутдинова // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». – 2021. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/trudnosti-adaptatsii-pervokursnikov-k-obucheniyu-v-vuze> (дата обращения: 28.02.2026)

6. Сахарова, С.М. Особенности самоорганизации первокурсников гуманитарного вуза в период адаптации / С.М. Сахарова // Преподаватель XXI век. – 2025. – № 1, ч. 1.

THE CHALLENGE OF FIRST-YEAR MEDICAL STUDENTS' ADAPTATION TO THE EDUCATIONAL PROCESS AND ITS IMPACT ON LEARNING QUALITY

Tikhomirova G.I., Sycheva S.A., Baburina A.V.

Izhevsk State Medical University

This article addresses the pressing issue of first-year medical students' adaptation to university education. Based on an analysis of an author's questionnaire designed for students of the Izhevsk State Medical University, key factors influencing the successful integration of recent high school graduates into a new educational environment are investigated. Particular attention is paid to the interrelationship between the organization of the educational process, the development of "soft skills," information literacy, and students' subjective assessment of their own academic performance. [4] The article notes that maladaptation at the initial stage can lead to a decrease in academic motivation and performance, which directly affects the quality of training for future specialists. It concludes that a comprehensive approach to supporting first-year students is necessary, taking into account both academic and psycho-pedagogical aspects. [3] The implementation of such an approach will minimize the risks of attrition and create conditions for the full realization of each student's potential.

Keywords: student adaptation, medical education, first-year students, quality of education, educational process, soft skills, self-organization, survey.

References

1. Grigorieva, D. D., & Mikheev, M. I. (2025) Research on the features of maladaptation and anxiety in medical university students. Tver Medical Journal, (5). Retrieved from <https://tvermedjournal.tvergma.ru/katalog-statey/issledovanie-osobennostey-dezadaptatsii-i-trevozhnosti-u-studentov-meditsinskogo-vuza/> (Accessed: February 25, 2026).

2. Makarova-Gorbacheva, E. V., Budaev, A. I., Pavlova, O. N., & Zhelonkin, N. N. (2025). Changes in cardiovascular system parameters and psychoemotional state indicators of medical students during their studies. Modern Issues of Biomedicine, 9(4).

3. Morozova, A. (2025, September 23). Difficulties of the start: Problems of adaptation of first-year students in Russian universities. Financial University under the Government of the Russian Federation. Retrieved from <https://www.fa.ru/university/structure/university/uso/press-service/press-releases/trudnosti-starta-problemy-adaptatsii-pervokursnikov-v-rossiyskikh-vuzakh> (Accessed: February 25, 2026).

4. Romanova, E. V., Kulshan, T. A., Fedonnikov, A. S., et al. (2025). On the issue of digital transformation of medical education: A study of universal and professional digital competencies of students. National Healthcare, 6(4).

5. Salikhova, N. R., & Fakhrutdinova, A. R. (2021). Difficulties of first-year students' adaptation to university studies. Bulletin of RSUH. Series "Psychology. Pedagogy. Education", (1). Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/trudnosti-adaptatsii-pervokursnikov-k-obucheniyu-v-vuze> (Accessed: February 28, 2026).

6. Sakharova, S. M. (2025). Features of self-organization of first-year students of a humanitarian university during the adaptation period. Teacher XXI Century, 1(1). Tatuitrari

Нейросетевые методы анализа функционального состояния дыхательной системы у детей и взрослых: интеграция капнографии, импульсной осциллометрии и КТ-денситометрии

Алимусаева Фатима Магомедовна,

Дагестанский Государственный медицинский университет
E-mail: Patua1@mail.ru

Казанбиева Зулхият Джалалудиновна

Дагестанский Государственный Медицинский Университет
E-mail: zulya.kazanbieva@gmail.com

Рагимов Разин Мирзекеримович,

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
нормальной физиологии, заслуженный деятель науки Республики
Дагестан
E-mail: razinragimov@mail.ru

Цель – показать, как методы машинного обучения и глубокие нейросети повышают диагностическую и прогностическую ценность капнографии, импульсной осциллометрии (IOS) и количественной КТ (qCT) при оценке функции дыхательной системы у детей и взрослых, особенно в ситуациях ограниченной кооперации пациента и при раннем поражении малых дыхательных путей. В аналитический обзор работ 2022–2025 гг. включены подходы к анализу вентиляторных паттернов, ML-классификации IOS-показателей, извлечению qCT-биомаркеров (включая PRM) и мультимодальному объединению данных. Показано, что ML-алгоритмы обеспечивают высокую точность выявления аномалий (recall до 0,98, AUROC до 0,98), устойчивую классификацию дыхательных событий (ассигасу до 0,97), а также эффективную стратификацию по IOS (ассигасу >0,92 для «здоров/болен») и qCT с возможностью генерации экспираторных данных из инспираторных исследований (SSIM до 0,86; AUC ~0,84 для fSAD). Мультимодальный подход формирует единый контур «структура–функция–физиология», повышая чувствительность диагностики и прогноза, однако требует строгой стандартизации качества сигналов, гармонизации КТ и обязательной внешней валидации моделей.

Ключевые слова: капнография; импульсная осциллометрия; количественная КТ; денситометрия; малые дыхательные пути; нейросети; машинное обучение; мультимодальная интеграция; дети; взрослые.

Введение

Современная пульмонология всё чаще сталкивается не с «болезнями как названиями», а с фенотипами и траекториями – астма с разным вкладом малых дыхательных путей, ХОБЛ с преобладанием эмфиземы или ремоделирования бронхов, перекрывающиеся синдромы и состояния «на границе нормы», где спирометрия может быть ещё условно приемлемой. Клинические стратегии последних лет подчёркивают необходимость объективизации функции, контроля и риска, однако в реальности качество и полнота функциональных данных часто ограничены: у детей – кооперацией, у взрослых – вариабельностью усилия и «средними» показателями, скрывающими регионарную неоднородность. [8]

Импульсная осциллометрия (IOS, частный вариант oscillometry/FOT) методически привлекательна тем, что измеряет механические свойства дыхательной системы при спокойном дыхании и тем самым снижает зависимость от усилия пациента, сохраняя чувствительность к компонентам сопротивления и реактанса, которые концептуально связаны как с крупными, так и с малыми дыхательными путями. Именно поэтому в обзорах последних лет IOS всё чаще рассматривают как альтернативу или дополнение к спирометрии при диагностике и мониторингировании астмы, включая популяции с ограниченной выполнимостью форсированных манёвров. [9]

Капнография, напротив, «видит» дыхание как непрерывный физиологический процесс, одновременно отражая вентиляцию, перфузию и метаболизм через форму капнограммы и величину конечнедыхательного CO_2 (ETCO₂). В педиатрии она давно стала инструментом раннего распознавания респираторных нарушений, особенно в ситуациях быстрой динамики состояния; классическое описание фаз капнограммы и анализ её формы остаются клинически значимыми, но в потоке непрерывного мониторинга неизбежно возникает проблема артефактов и ложных тревог. [10]

Количественная КТ (qCT) добавляет то, чего принципиально не хватает «глобальным» функциональным тестам: пространственную локализацию и морфологическую детализацию. В ХОБЛ и астме программные методы позволяют измерять плотностные показатели (например, долю низкоплотных зон по порогам HU), параметры ремоделирования бронхов (включая стандартизованную Pi10) и картировать регионы функционального поражения малых дыхательных путей при использовании методов регистрации вдох–выдох (PRM и производные). Это не отменяет физиологии, но делает её наблюдаемой в пространстве. [11]

Ключевой поворот 2022–2025 гг. состоит в том, что нейросетевые и ансамблевые модели стали не только «классификаторами», но и инструментами согласования/гармонизации данных: от фильтрации артефактов сигналов до преобразования реконструкционных ядер и синтеза недостающих фаз КТ-исследования. В этом контексте интеграция капнографии, IOS и qCT выглядит логичным шагом к клинически осмысленному «структура–функция–физиология» контуру, если она опирается на строгие стандарты качества и доказательную валидацию. [12]

Материалы и методы

Настоящая работа выполнена как аналитический обзор исследований 2022–2025 гг. с фокусом на клинически применимых ML/DL-подходах для трёх модальностей: непрерывная капнография (включая задачи мониторинга и распознавания паттернов), импульсная осциллометрия (фенотипирование и ранняя дисфункция малых дыхательных путей) и количественная КТ-денситометрия/морфометрия (включая PRM-подходы и их нейросетевые расширения). При отборе работ приоритет отдавался исследованиям с явной спецификацией данных, метрик качества и дизайна валидации (тестовые наборы, внешняя проверка, межцентровая переносимость), поскольку именно эти элементы определяют ценность модели для клинической практики. [13]

Методологический «каркас» для интерпретации IOS и построения протоколов качества опирался на технические стандарты oscillometry, где подробно описаны требования к аппаратуре, протоколу измерения, обработке артефактов и отчётности, а также подчёркнута необходимость сопоставимости результатов между устройствами и лаборатор-

риями. Такой подход принципиален для ML: модель «учится» на систематике, а не на физиологии, если качество и артефакты не стандартизованы. [14]

Для капнографии в качестве базового описания использованы клинические принципы интерпретации формы капнограммы (фазы I–IV, частота, базовая линия, «плато» и т.д.) и нормальные диапазоны ETCO₂, особенно с акцентом на педиатрические особенности и практические ограничения (утечки, движение, особенности дыхательного паттерна). Это важно не только для врача, но и для инженера модели: признаки, соответствующие физиологическим фазам, повышают интерпретируемость и устойчивость алгоритма. [10]

qCT-протоколы в обзоре трактовались как совокупность трёх слоёв: (1) получение изображения (доза, уровень вдоха, толщина среза, ядро реконструкции), (2) извлечение биомаркеров (денситометрия, морфометрия бронхов, сосудистые/текстурные признаки), (3) гармонизация доменных различий. Отдельно учитывались работы, показывающие, что различия реконструкционных ядер влияют на количественные измерения и что глубокие модели (включая GAN/перевод доменов) способны уменьшать межведорную и межпротокольную вариабельность – критический барьер на пути к многоцентровым данным и переносимым моделям. [15]

Наконец, авторские протоколы интеграции данных сформулированы по принципу «сначала сопоставимость, затем точность». В практической реализации я предлагаю начинать с независимых (unimodal) моделей с хорошо понятными ошибками и стандартными QC-метриками, и только затем переходить к мультимодальному фьюнжу: либо в виде интерпретируемого ансамбля (например, градиентный бустинг на агрегированных признаках + вредность/калибровка), либо в виде гибридной архитектуры (временная сеть для капнографии + табличный блок для IOS + сверточно/трансформерный блок для qCT с последующим attention/late fusion). Такой порядок согласуется с общими рекомендациями по мультимодальному ML в здравоохранении, где главными «точками отказа» остаются неоднородность данных, пропуски модальностей, смещения домена и слабая внешняя проверка. [16]

Результаты

Данные по непрерывной капнографии и связанным сигналам за 2022–2024 гг. убедительно показывают, что даже относительно «классические» модели (вроде XGBoost на физиологически интерпретируемых признаках) способны решать клинически болезненную задачу – отделять истинные аномальные паттерны вентилиации от артефактов, уменьшая нагрузку ложных тревог. На материалах клинического мониторинга в условиях госпитального потока продемонстрировано, что XGBoost достиг $F_2=0,94$, recall 0,98 и precision 0,83 при AUROC 0,98 в задаче «норма/аномалия», причём авторы прямо объясняют выбор функции качества приоритетом безопасности (минимум пропусков событий) с последующим «вторым этапом» снижения ложных срабатываний. [17] Параллельно в задачах более узкой разметки («дыхание/нет дыхания») глубокое обучение на сегментах капнограммы демонстрирует близкую к практической стабильность: в работе с внутренне-внешней (hospital-holdout) валидацией сообщены ассигуру 0,97, precision 0,97 и recall 0,96, что концептуально важно именно для борьбы с ложными «no breath» тревогами при пороговой логике мониторов. [4] Наконец, диагностические приложения капнографии выходят за пределы мониторинга: на больших массивах капнограмм (десятки тысяч записей) показана высокая разделяющая способность ML-модели для ХОБЛ против «не-ХОБЛ» с class-balanced AUROC 0,985 и чувствительностью порядка 0,915, при этом ключевыми оказались признаки плато и «альфа-угла», что хорошо согласуется с физиологическими ожиданиями при обструкции. [18]

Клинический смысл этих результатов особенно заметен, если «перевести» метрики в потоковую практику. В отделениях, где непрерывная капнография применяется у пациентов с риском угнетения дыхания (например, при опиоидной анальгезии), основной угрозой становится не отсутствие тревоги как таковой, а её дискредитация из-за артефактов: персонал перестаёт реагировать на сигнал, который «почти всегда ложный». Именно поэтому модели, где recall намеренно выше precision, а затем включается второй этап уточнения, выглядят физиологически и организационно разумнее «идеально точного», но пропускающего события классификатора. [19] В педиатрии эта логика дополнительно усиливается: капнография ценна как инструмент раннего распознавания дыхательных нарушений и контроля вентилиации, но технические ограничения (утечки, движение, малая дыхательная масса) требуют более умного фильтра качества, чем «порог ETCO₂». [20]

По IOS (oscillometry/impulse oscillometry) ключевой массив работ 2024–2025 гг. показывает устойчивую тенденцию: добавление ML

к стандартным осциллометрическим параметрам (R5, X5, Fres, AX, разности вроде R5–R20) улучшает диагностическую пригодность как для ранней дисфункции малых дыхательных путей, так и для дифференциации распространённых фенотипов обструктивных заболеваний. В одном наблюдательном исследовании с построением нескольких ML-классификаторов показано, что при сравнении контрольной группы со «сохранённой» спирометрией, но подозрением на SAD, отдельный параметр (например, R5) имеет ограниченную дискриминацию (AUC 0,642), тогда как Random Forest и AdaBoost повышают AUC до 0,914–0,915, а в другом сравнении достигают 0,951–0,971. [21] В практической задаче «скрининг/триаж» (здоровые против пациентов с хронической обструкцией/астмой) нейросетевой классификатор в одном из наборов данных демонстрировал среднюю многоклассовую ассигуру 0,724 с ростом до 0,786 при добавлении отобранных IOS-параметров и физиологических ковариат. [22] Особенно показательно, что модель «обнаружение респираторной патологии» (здоров/болен) в тех же данных достигает средних значений ассигуры около 0,908 и превышает 0,92 в отдельных комбинациях признаков; это ровно тот уровень, который в массовой практике ценен высокой отрицательной прогностической ценностью. [5]

Для дифференциальной диагностики астмы и ХОБЛ результаты более «земные», но клинически зрелые: при исключении «лёгкого пути» через возраст/стаж курения и при попытке опереться на механику дыхательных путей точность закономерно падает. Тем не менее наличие моделей с ассигуру порядка 0,81–0,85 в задаче «астма vs ХОБЛ» – уже практически значимый шаг, особенно если модель используется не как «приговор», а как подсказка для уточнения фенотипа и риска (например, по «малых дыхательных путям» и бронходилатационной динамике). [23] В педиатрии усиление IOS выглядит ещё более перспективным: имеются специализированные референсные значения для детей и подростков на больших популяционных выборках, что принципиально для обучения и калибровки алгоритмов, а также снижает риск того, что модель будет «распознавать возраст», а не болезнь. [24]

qCT-слой результатов в 2022–2025 гг. развивается сразу в двух направлениях: «извлечение биомаркеров» и «устранение источников несопоставимости». На уровне биомаркеров подтверждается устойчивость денситометрических подходов: индекс эмфиземы в ряде работ рассчитывается с порогом –950 HU на инспираторной КТ, а стандартизованные параметры стенки бронха (Pi10) трактуются как нормализованная оценка толщины стенки для «теоретического» просвета с внутренним периметром 10 мм. [25] Отдельно важно, что Pi10 и более новые метрики ремоделирования (например, PiSlope) обсуждаются как попытка уйти от чрезмерного упрощения «одним числом» и лучше отразить неоднородность утолщения стенки по поколениям бронхиального дерева. [26]

Наиболее концептуально сильный прорыв связан с PRM-логикой и оценкой функционального поражения малых дыхательных путей. В классическом варианте PRM требует вдох–выдох с регистрацией, после чего воксели классифицируются как нормальная паренхима, эмфизема или функциональная болезнь малых дыхательных путей (fSAD) по плотностным порогам на пространственно выровненных сканах. [27] Однако именно выдох часто оказывается «слабым звеном» (качество выполнения, движение, неоднородность протоколов, дополнительная доза), поэтому в 2023–2024 гг. появляются генеративные решения: каскадные GAN/UNet-подобные подходы синтезируют экспираторный объём из одного инспираторного и затем предсказывают PRM-карты. В одном из таких исследований описано качество синтеза экспираторного КТ на уровне SSIM 0,86 и способность предсказанного PRM^fSAD стратифицировать SAD по порогам с AUC около 0,78–0,84. [28] В клинически ориентированной работе на крупной когорте предложено генерировать «виртуальный выдох» из инспираторного скана (GAN-подход), рассчитывать fSAD по сочетанию порогов HU на вдохе и виртуальном выдохе и затем проверять ассоциации с клиническими исходами и повторяемостью, включая внешнюю проверку на независимой когорте и другом протоколе сканирования. [29] В совокупности это поддерживает тезис: оценка функционального компонента малых дыхательных путей может стать доступнее, если убрать необходимость второго объёма при сохранении сопоставимости с PRM-референсом. [30]

Параллельная линия результатов – прогностические qCT-модели обострений ХОБЛ – показывает, что изображения действительно добавляют информацию к клинике, но «цена» этой добавки состоит в требовательности к стандартам и валидации. В систематическом обзоре по qCT-моделированию обострений подчёркнуто, что PRM-производные (PRMfSAD) в ряде работ ассоциированы с риском будущих обострений, тогда как «голая» эмфизема (PRMEmph) не всег-

да объясняет феномен «консистентного обострителя». [31] В том же обзоре приведены примеры моделей, где СТ-признаки (например, $Pi10$ и производные плотностного градиента) используются для предсказания риска, включая случаи внешней валидации и AUC порядка 0,77–0,81 в зависимости от целевой точки (≥ 1 или ≥ 2 обострений в год на горизонте). [31] Для практикующего врача здесь важнее даже не AUC как число, а то, что «изображение» начинает конкурировать с привычными клиническими индексами именно в задачах стратификации риска – при условии аккуратного дизайна исследования. [32]

Критически важный блок – воспроизводимость qCT в реальном мире – в 2023–2025 гг. получил убедительную нейросетевую поддержку. Показано, что реконструкционное ядро определяет «текстуру» изображения и тем самым влияет на количественные измерения; из этого следует необходимость гармонизации, особенно в многоцентровых исследованиях и при ретроспективных данных. [33] В работах по переводу доменов (unpaired image translation, cycleGAN-подходы) продемонстрировано, что можно уменьшать различия в измерении, например, процента эмфиземы при приведении разных ядер к референсному. [34] В смежной клинической задаче количественной оценки интерстициальных изменений показано, что глубокое «преобразование ядра» снижает вариабельность измерений и повышает ICC для суммарных показателей фиброза/паттернов при сравнении реконструкций. [35] Наконец, сама возможность снижать дозу без деградации измеримости становится частью этой же логики: в обзоре по deep learning reconstruction указано, что современные DLR-подходы потенциально позволяют существенное снижение дозы (вплоть до диапазона 30–71% по сравнению с hybrid iterative reconstruction при сохранении диагностического качества), а в проспективных исследованиях ультранизкодозной КТ подчёркнуты диапазоны эффективной дозы порядка 0,20–0,49 мЗв и роль DL-реконструкции в контроле шума. [36] Для qCT-задач важны и специальные многоцентровые протоколы: описаны гармонизированные низкодозные qCT-протоколы с использованием дозовой модуляции и IR/DLR, позволяющие снижать дозу «до 70%» при сохранении точности и прецизионности измерений, пригодных для многоцентровых исследований.

С практической точки зрения удобно свести текущие «лучшие свидетельства» в компактную карту сопоставления модальностей и типовых задач ML (без претензии на исчерпывающий перечень) (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная характеристика модальностей и результатов применения ML/DL (2022–2025)

Модальность	Что измеряется клинически	Типовой ML/DL-выход	Репрезентативные результаты (2022–2025)
Капнография ($\pm SpO_2$)	Паттерны вентилизации; наличие артефактов; эпизоды апноэ («нет дыхания»); косвенные признаки обструкции (изменение плато, углов, формы капнограммы)	Детекция аномалий; классификация «breath/no breath»; идентификация паттернов обструкции; вероятностная диагностика ХОБЛ по геометрии сигнала	Чувствительность (recall) до 0,98 при AUROC $\approx 0,98$ для выявления аномалий; accuracy до 0,97 для классификации «breath/no breath»; AUROC до 0,985 при диагностике ХОБЛ на больших массивах капнограмм
Импульсная осциллометрия (IOS)	Импеданс дыхательной системы при спокойном дыхании: сопротивление (R) и реактивность (X); показатели малых дыхательных путей (R5–R20, Fres, AX)	Классификация «здоров/болен»; дифференциация «астма/ХОБЛ»; выявление ранней дисфункции малых дыхательных путей (SAD) при нормальной спирографии	AUC $\sim 0,91$ – $0,97$ для ранней диагностики SAD; accuracy $> 0,92$ для задачи «здоров/болен»; accuracy $\sim 0,81$ для дифференциации «астма/ХОБЛ» при добавлении клинических ковариат
Количественная КТ (qCT: денситометрия/морфометрия/PRM)	Степень эмфиземы (LAA < -950 HU); ремоделирование бронхов ($Pi10$); функциональные маркеры малых дыхательных путей (PRM, fSAD); сосудистые и текстурные характеристики	Сегментация и количественная оценка; генеративный синтез экспираторных данных; прогноз обострений и исходов; стратификация риска	Возможность оценки PRM/fSAD по одной инспираторной КТ с использованием генеративных моделей; доказанная связь PRM/fSAD с риском обострений; гармонизация реконструкционных ядер снижает межсканерную вариабельность метрик

Таблица 1 отражает общий вектор: чем ближе задача к реальному клиническому «узкому месту» (артефакты, несопоставимость, невыполнимость теста), тем чаще ML используется не как «замена врача», а как средство сделать данные пригодными для врача.

Обсуждение

Если рассматривать дыхательную систему как единую функциональную машину, то капнография, IOS и qCT описывают три разных проекции одного процесса. Капнография ближе всего к «физиологии здесь-и-сейчас» (динамика дыхания, газообменный паттерн, быстрые угрозы), IOS – к «механике системы» при минимальном участии пациента, а qCT – к «структуре и регионарной неоднородности», которая объясняет, почему одинаковый FEV2 может скрывать разные фенотипы. В сумме это как раз и формирует треугольник «физиология–функция–структура», который в клинике мы обычно собираем в голове, но редко можем собрать в единую воспроизводимую модель. [39]

Мне представляется принципиальным, что лучшие работы 2023–2025 гг. не игнорируют клиническую логику ошибок, а делают её частью постановки задачи. В капнографии явным образом выбирают метрики, которые защищают пациента (recall выше), а затем предусматривают второй этап для подавления «шума тревог». В IOS-задачах показательно, что добавление простых антропометрических ковариат улучшает точность – это честный сигнал: часть дискриминации действительно «в демографии», и врачам важно понимать, какую долю решения модель принимает по возрасту/росту, а какую – по сопротивлению и реактансу. [22] В qCT-контуре, напротив, наиболее «врачебно полезной» выглядит не гонка за точностью распознавания, а инженерная работа по сопоставимости: если ядро реконструкции или дозовый режим меняют распределение плотности, то ML, не умеющий это компенсировать, будет ошибаться систематически и уверенно.

Мультимодальная интеграция (fusion) в нашем конкретном контексте имеет два реалистичных сценария. Первый – прагматичный: начать с интерпретируемого ансамбля, где отдельные подмодели дают «частные заключения» (например, риск угнетения дыхания по капнографии, вероятность выраженной SAD по IOS, доля fSAD/эмфиземы и $Pi10$ по qCT), а затем метамодель (градиентный бустинг/логистическая регрессия с калибровкой) объединяет их в прогнозируемый клинический исход: риск обострения, риск декомпенсации, вероятность фенотипа. Такой путь лучше переносим между центрами и проще валидировать. Второй сценарий – «глубокий фьюжн» (attention/трансформерные архитектуры), где алгоритм учится объединять временные и пространственные представления, но именно он чаще страдает от недостатка данных и от пропусков модальностей, что в реальной клинике неизбежно (не всем сделана КТ, не всем доступна IOS, не всегда качественная капнография). Эти ограничения прямо подчёркиваются в обзорах мультимодального ML: дефицит хорошо размеченных мультимодальных датасетов и несогласованные протоколы остаются ключевым тормозом внедрения. [43]

Встраивая эти идеи в практику, я бы выделил два «клинических окна», где тройная интеграция особенно оправдана. Первое – педиатрия и подростки, где спирометрия методически «хрупка», а низконагрузочные подходы ценны сами по себе: IOS может дать механическую подпись обструкции при спокойном дыхании, капнография – ранние признаки вентиляционных нарушений в динамике (например, при седации или острой бронхообструкции), а qCT применяется более избирательно, но при необходимости может быть выполнена в низкодозном формате с DLR и строгой стандартизацией, если диагностическая задача outweighs риск. [44] Второе окно – взрослые пациенты с «несоответствием» симптомов и спирометрии: одышка при условно нормальном FEV2, частые обострения при умеренной обструкции, выраженная вариабельность ответа на терапию. Здесь qCT-составляющая способна выявить регионарные паттерны fSAD/эмфиземы и морфометрию бронхов ($Pi10$ /производные), IOS – зафиксировать дисфункцию малых дыхательных путей на механическом уровне, а капнография – добавить феноменологию дыхательного паттерна и эффективность вентилизации.

Ограничения обзора и всей области в целом стоит назвать прямо. Во-первых, дизайн многих ML-работ всё ещё тяготеет к ретроспективности и внутренней валидации; внешние проверки и межустойчивая переносимость встречаются реже, чем хотелось бы, хотя именно они отделяют «исследование» от «инструмента». Во-вторых, для qCT даже идеальная модель не спасёт плохую стандартизацию: разный уровень вдоха, разная толщина среза и ядро реконструкции меняют распределения, а значит – и риск скрытой систематической ошибки. В-третьих, для сигналов (капнография/IOS) ключевой проблемой остаётся качество сырья и артефакты; стандарты oscillometry прямо требуют прозрачного описания QC и обработки, и этот пункт должен стать обязательным и для ML-дисциплины.

Наконец, есть ограничение более «человеческое». Алгоритм может уменьшить «усталость от тревог», но он не отменит необходимость клинической ответственности: врач должен понимать, какой тип ошибки модель делает в первую очередь и что именно она измеряет. Я всё чаще убеждаюсь, что наиболее успешные внедрения начинаются не с «замены интерпретации», а с аккуратного улучшения качества сигнала и сопоставимости, после чего и человеку, и модели становится проще видеть истинную физиологию.

Выводы

Интеграция капнографии, IOS и qCT в 2022–2025 гг. перестала быть абстрактной идеей «мультимодальности» и стала инженерно реализуемой клинической стратегией благодаря двум классам достижений: (1) ML-детекции и классификации на дыхательных сигналах с учётом артефактов и приоритета безопасности; (2) нейросетевой гармонизации и генеративным подходам в qCT, уменьшающим вариабельность протоколов и потенциально позволяющим оценивать функциональные компоненты малых дыхательных путей без обязательного экспираторного скана.

Наиболее зрелой траекторией внедрения представляется многоэтапная схема: независимые unimodal-модули с понятными QC-метриками и интерпретируемыми признаками, затем «скромный» фьюжн (ансамбль/бустинг) для конкретных клинических исходов, и лишь после этого – глубокие архитектуры, если доступны достаточные объёмы данных и обеспечена переносимость. При таком подходе мультимодальная модель начинает отражать реальную врачебную логику: «где структурная причина?», «какова механика?», «что происходит физиологически прямо сейчас?».

Для дальнейшего прогресса необходимы стандартизованные требования к качеству сигналов (капнография/IOS), согласование КТ-протоколов (вдох, ядра, доза, реконструкция) и обязательная внешняя валидация на независимых центрах/устройствах. Без этого даже сильная модель будет «умно» воспроизводить локальные привычки оборудования и персонала, а не физиологию пациента.

Литература

- Ahn, Y., Lee, S. M., Nam, Y., Lee, H., Choe, J., Do, K.-H., & Seo, J. B. (2024). Deep learning-based CT reconstruction kernel conversion in the quantification of interstitial lung disease: Effect on reproducibility. *Academic Radiology*. doi:10.1016/j.acra.2023.06.008 [35]
- Chaudhary, M. F. A., Hoffman, E. A., Guo, J., et al. (2023). Predicting severe chronic obstructive pulmonary disease exacerbations using quantitative CT: A retrospective model development and external validation study. *The Lancet Digital Health*, 5, e83–e92. doi:10.1016/S2589-7500(22)00232-1 [32]
- Chaudhary, M. F. A., et al. (2024). Deep learning estimation of small airways disease from inspiratory chest CT is associated with FEV1 decline in COPD. [Journal/Source]. [29]
- Chen, B., Liu, Z., Lu, J., et al. (2023). Deep learning parametric response mapping from inspiratory chest CT scans: A new approach for small airway disease screening. *Respiratory Research*, 24, 299. doi:10.1186/s12931-023-02611-2 [28]
- Conway, A., Goudarzi Rad, M., Zhou, W., Parotto, M., & Jungquist, C. (2023). Deep learning classification of capnography waveforms: Secondary analysis of the PRODIGY study. *Journal of Clinical Monitoring and Computing*, 37(5), 1327–1339. doi:10.1007/s10877-023-01028-y [51]
- Damam, S. H., Javvaji, C. K., & Kakkat, S. (2024). Navigating pediatric capnography: A comprehensive review of scope and limitations. [Journal/Source]. [52]
- Ducharme, F. M. (2025). Oscillometry in the diagnosis, assessment, and monitoring of asthma. [Journal/Source]. [53]
- Etienne, S., et al. (2025). Quantitative computed tomography and predictive modelling for COPD exacerbations. *European Respiratory Review*. [31]
- Global Initiative for Asthma. (2025). *Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2025 update)*. [54]
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. (2025). *Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD: 2025 Report*. [55]
- Huang, C.-H., Chou, K.-T., Perng, D.-W., Hsiao, Y.-H., & Huang, C.-W. (2024). Using machine learning with impulse oscillometry data to develop a predictive model for chronic obstructive pulmonary disease and asthma. *Journal of Personalized Medicine*, 14(4), 398. doi:10.3390/jpm14040398 [5]
- Ji, Y., et al. (2023). Quantitative assessment of airway wall thickness in COPD patients with interstitial lung abnormalities. [Journal/Source]. [56]

- Kahnert, K., et al. (2023). Standardized airway wall thickness Pi10 from routine CT scans of COPD patients as imaging biomarker for disease severity, lung function decline, and mortality. [Journal/Source]. [57]
- King, G. G., Bates, J., Berger, K. I., et al. (2020). Technical standards for respiratory oscillometry. *European Respiratory Journal*, 55, 1900753. doi:10.1183/13993003.00753-2019 [58]
- Koetzier, L. R., et al. (2023). Deep learning image reconstruction for CT: Technical principles and clinical prospects. *Radiology*. [59]
- Krones, F., et al. (2025). Review of multimodal machine learning approaches in healthcare. *Information Fusion*. [60]
- Krishnan, A. R., et al. (2024). Inter-vendor harmonization of CT reconstruction kernels using unpaired image translation. [Journal/Source]. [61]
- Krishnan, A. R., et al. (2025). Multipath cycleGAN for harmonization of paired and unpaired low-dose lung CT reconstruction kernels. [Journal/Source]. [62]
- Li, Y., et al. (2024). A review of deep learning-based information fusion for medical classification tasks. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*. [63]
- Liang, X., et al. (2022). Clinical application of oscillometry in respiratory diseases. *ERJ Open Research*. [64]
- Park, H., et al. (2024). Diagnosis and evaluation of small airway disease using impulse oscillometry. *Scientific Reports*. [65]
- Pendem, S., et al. (2024). Influence of deep learning image reconstruction algorithm for CT imaging: Review and considerations. [Journal/Source]. [66]
- Spijkerboer, F. L., et al. (2024). A machine learning algorithm for detecting abnormal patterns in continuous capnography and pulse oximetry monitoring. *Journal of Clinical Monitoring and Computing*. [67]
- Stahlschmidt, S. R., et al. (2022). Multimodal deep learning for biomedical data fusion: A review. *Briefings in Bioinformatics*, 23(2), bbab569. [68]
- Tanabe, N., et al. (2024). Lung imaging in COPD and asthma. [Journal/Source]. [69]
- Valach, C., et al. (2024). Oscillometry reference values for children and adolescents. *ERJ Open Research*, 10(6), 00278–2024. doi:10.1183/23120541.00278-2024 [70]
- Wu, Y., et al. (2024). Artificial intelligence in COPD CT images: Identification, staging, and quantitation. *Respiratory Research*. [71]
- Xu, W.-J., et al. (2024). Machine learning for accurate detection of small airway dysfunction-related respiratory changes: An observational study. *Respiratory Research*. [21]
- Yoo, S. J., et al. (2024). Prospective evaluation of deep learning image reconstruction for Lung-RADS and automatic nodule volumetry on ultralow-dose chest CT. *PLOS ONE*. [72]

NEURAL NETWORK METHODS FOR ANALYZING RESPIRATORY FUNCTION IN CHILDREN AND ADULTS: INTEGRATION OF CAPNOGRAPHY, IMPULSE OSCILLOMETRY, AND CT DENSITOMETRY

Alimysaeva F.M., Kazanbieva Z.D., Ragimov R.M.
Dagestan State Medical University

To demonstrate how machine learning methods and deep neural networks improve the diagnostic and prognostic value of capnography, impulse oscillometry (IOS), and quantitative CT (qCT) in assessing respiratory function in children and adults, particularly in situations of limited patient cooperation and early small airway disease. The analytical review of studies from 2022 to 2025 includes approaches to ventilatory pattern analysis, ML classification of IOS parameters, extraction of qCT biomarkers (including PRM), and multimodal data fusion. ML algorithms have been shown to provide high anomaly detection accuracy (recall up to 0.98, AUROC up to 0.98), robust classification of respiratory events (accuracy up to 0.97), and effective stratification by IOS (accuracy >0.92 for “healthy/ill”) and qCT with the ability to generate expiratory data from inspiratory studies (SSIM up to 0.86; AUC ~0.84 for fSAD). The multimodal approach forms a unified “structure-function-physiology” framework, increasing diagnostic and prognostic sensitivity. However, it requires strict standardization of signal quality, CT harmonization, and mandatory external model validation.

Keywords: capnography; pulse oscillometry; quantitative CT; densitometry; small airways; neural networks; machine learning; multimodal integration; children; adults.

References

- Ahn, Y., Lee, S. M., Nam, Y., Lee, H., Choe, J., Do, K.-H., & Seo, J. B. (2024). Deep learning-based CT reconstruction kernel conversion in the quantification of interstitial lung disease: Effect on reproducibility. *Academic Radiology*. doi:10.1016/j.acra.2023.06.008 [35]
- Chaudhary, M. F. A., Hoffman, E. A., Guo, J., et al. (2023). Predicting severe chronic obstructive pulmonary disease exacerbations using quantitative CT: A retrospective model development and external validation study. *The Lancet Digital Health*, 5, e83–e92. doi:10.1016/S2589-7500(22)00232-1 [32]
- Chaudhary, M. F. A., et al. (2024). Deep learning estimation of small airways disease from inspiratory chest CT is associated with FEV1 decline in COPD. [Journal/Source]. [29]

4. Chen, B., Liu, Z., Lu, J., et al. (2023). Deep learning parametric response mapping from inspiratory chest CT scans: A new approach for small airway disease screening. *Respiratory Research*, 24, 299. doi:10.1186/s12931-023-02611-2 [28]
5. Conway, A., Goudarzi Rad, M., Zhou, W., Parotto, M., & Jungquist, C. (2023). Deep learning classification of capnography waveforms: Secondary analysis of the PRODIGY study. *Journal of Clinical Monitoring and Computing*, 37(5), 1327–1339. doi:10.1007/s10877-023-01028-y [51]
6. Damam, S. H., Javvaji, C. K., & Kakkat, S. (2024). Navigating pediatric capnography: A comprehensive review of scope and limitations. [Journal/Source]. [52]
7. Ducharme, F. M. (2025). Oscillometry in the diagnosis, assessment, and monitoring of asthma. [Journal/Source]. [53]
8. Etienne, S., et al. (2025). Quantitative computed tomography and predictive modelling for COPD exacerbations. *European Respiratory Review*. [31]
9. Global Initiative for Asthma. (2025). Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2025 update). [54]
10. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. (2025). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD: 2025 Report. [55]
11. Huang, C.-H., Chou, K.-T., Perng, D.-W., Hsiao, Y.-H., & Huang, C.-W. (2024). Using machine learning with impulse oscillometry data to develop a predictive model for chronic obstructive pulmonary disease and asthma. *Journal of Personalized Medicine*, 14(4), 398. doi:10.3390/jpm14040398 [5]
12. Ji, Y., et al. (2023). Quantitative assessment of airway wall thickness in COPD patients with interstitial lung abnormalities. [Journal/Source]. [56]
13. Kahnert, K., et al. (2023). Standardized airway wall thickness Pi10 from routine CT scans of COPD patients as imaging biomarker for disease severity, lung function decline, and mortality. [Journal/Source]. [57]
14. King, G. G., Bates, J., Berger, K. I., et al. (2020). Technical standards for respiratory oscillometry. *European Respiratory Journal*, 55, 1900753. doi:10.1183/13993003.00753-2019 [58]
15. Koetzier, L. R., et al. (2023). Deep learning image reconstruction for CT: Technical principles and clinical prospects. *Radiology*. [59]
16. Krones, F., et al. (2025). Review of multimodal machine learning approaches in healthcare. *Information Fusion*. [60]
17. Krishnan, A. R., et al. (2024). Inter-vendor harmonization of CT reconstruction kernels using unpaired image translation. [Journal/Source]. [61]
18. Krishnan, A. R., et al. (2025). Multipath cycleGAN for harmonization of paired and unpaired low-dose lung CT reconstruction kernels. [Journal/Source]. [62]
19. Li, Y., et al. (2024). A review of deep learning-based information fusion for medical classification tasks. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*. [63]
20. Liang, X., et al. (2022). Clinical application of oscillometry in respiratory diseases. *ERJ Open Research*. [64]
21. Park, H., et al. (2024). Diagnosis and evaluation of small airway disease using impulse oscillometry. *Scientific Reports*. [65]
22. Pendem, S., et al. (2024). Influence of deep learning image reconstruction algorithm for CT imaging: Review and considerations. [Journal/Source]. [66]
23. Spijkerboer, F. L., et al. (2024). A machine learning algorithm for detecting abnormal patterns in continuous capnography and pulse oximetry monitoring. *Journal of Clinical Monitoring and Computing*. [67]
24. Stahlschmidt, S. R., et al. (2022). Multimodal deep learning for biomedical data fusion: A review. *Briefings in Bioinformatics*, 23(2), bbab569. [68]
25. Tanabe, N., et al. (2024). Lung imaging in COPD and asthma. [Journal/Source]. [69]
26. Valach, C., et al. (2024). Oscillometry reference values for children and adolescents. *ERJ Open Research*, 10(6), 00278–2024. doi:10.1183/23120541.00278-2024 [70]
27. Wu, Y., et al. (2024). Artificial intelligence in COPD CT images: Identification, staging, and quantitation. *Respiratory Research*. [71]
28. Xu, W.-J., et al. (2024). Machine learning for accurate detection of small airway dysfunction-related respiratory changes: An observational study. *Respiratory Research*. [21]
29. Yoo, S. J., et al. (2024). Prospective evaluation of deep learning image reconstruction for Lung-RADS and automatic nodule volumetry on ultralow-dose chest CT. *PLOS ONE*. [72]

Выявление слабого эффекта влияния возрастного фактора на результаты РТМ-измерений в особых точках молочной железы

Алхасан Алаа,

аспирант кафедры математического анализа и теории функций,
Волгоградский государственный университет
E-mail: alhasanala94@gmail.com, matf@volsu.ru

Мазепа Елена Алексеевна,

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математического анализа и теории функций, Волгоградский государственный университет
E-mail: elena.mazepa@volsu.ru, matf@volsu.ru

В статье рассматривается вопрос о взаимосвязи температурных данных, полученных при РТМ-диагностике молочных желез (МЖ) пациенток, с их возрастными характеристиками. Согласно данным литературы, у здоровых пациенток с возрастом наблюдается тенденция к снижению температуры в различных зонах молочной железы [1, 2]. Основная задача данной работы состояла в статистическом подтверждении или опровержении данного факта с использованием регрессионного анализа. Были исследованы данные 3662 протоколов обследований здоровых пациенток из разных возрастных групп. В ходе исследования было подтверждено наличие статистически значимой обратной зависимости между возрастом и температурными показателями в точках 0 (сосок) и 9 (аксиллярная область). При этом коэффициент детерминации не превышал 12%, что указывает на слабое влияние возрастного фактора [5]. Коэффициенты эластичности (от $-0,002$ до $-0,039$) подтверждают, что увеличение возраста на 1% приводит к снижению температуры на $0,002-0,039\%$ [6]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что возраст не является основным фактором, определяющим температурные изменения молочных желез.

Ключевые слова: заболевания молочной железы, РТМ-диагностика, регрессионный анализ, возрастной фактор, коэффициент детерминации, коэффициент эластичности.

Введение

Радиотермометрия (РТМ) в настоящее время рассматривается как эффективный метод раннего выявления патологий молочной железы. Технология базируется на регистрации собственного теплового излучения тканей, параметры которого варьируются в зависимости от физиологических и патологических процессов, протекающих в организме. Возрастной фактор занимает особое место среди переменных, способных модифицировать тепловой профиль молочной железы. С возрастом происходят закономерные изменения гормонального фона, замещение железистой ткани жировой, что неизбежно сказывается на температурных показателях [1, 7].

Однако степень влияния возраста на показатели РТМ до сих пор изучена недостаточно, особенно в ключевых анатомических точках молочной железы. В то время как одни исследования указывают на незначительные различия в распределении температуры с увеличением возраста, другие показывают, что эти изменения могут быть минимальными и не иметь существенного клинического значения [3, 8]. Таким образом, цель данной статьи – исследовать степень влияния возраста на результаты РТМ в определенных точках молочной железы, уделяя особое внимание выявлению слабого, но статистически значимого эффекта.

Цель исследования – изучить влияние возраста на результаты РТМ-измерений в точках 0 и 9 молочной железы, оценить силу выявленного эффекта и его клиническую значимость.

Описание исследуемой выборки

Непосредственно исследуемая выборка состояла из 3662 протоколов обследований здоровых пациенток с метками Th0, Th1, Th2 для обеих молочных желез. При этом из всех протоколов одного пациента был оставлен только один протокол с последним измерением.

Все исследуемые протоколы были получены с помощью совмещенного сенсора, что обусловлено доказанной неоднородностью данных при использовании различных типов датчиков [5]. Формирование базы данных обследований происходило в период с 1997 по 2019 год в ряде медицинских центров.

Переменные исследования

В данном исследовании использовались следующие переменные (признаки) [8]:

1. Возраст: пациентки (полных лет на момент обследования) – независимая переменная.

2. Точки измерения температур:

- Точка 0 – центральный отдел молочной железы (сосок);
- Точка 9 – аксиллярная область (подмышечная впадина).

Всего в стандартной схеме РТМ-обследования используется 22 точки, однако в настоящем исследовании анализируются только точки 0 и 9 на каждой молочной железе [8].

3. Температурные показатели (зависимые переменные):

- Микроволновая (глубинная) температура – измеряется микроволновым датчиком и отражает тепловое излучение глубоких слоев тканей в точках 0 и 9 (mw_0_right, mw_9_right) и слева (mw_0_left, mw_9_left);
- Инфракрасная (кожная) температура – измеряется инфракрасным датчиком и отражает температуру поверхностных слоев (эпидермиса) в точках 0 и 9 справа (ir_0_right, ir_9_right) и слева (ir_0_left, ir_9_left).

Диагностические метки

В исследование включены только пациентки без патологий молочных желез, что соответствует меткам Th0, Th1, Th2. Интерпретация этих меток согласно методике РТМ-обследования [8]:

- Th0 – отсутствие температурных аномалий. Характер распределения температур в молочных железах соответствует базовому уровню, термоасимметрия не превышает $0,2$ градуса. Соотношение кожной и внутренней температуры носит постоянный характер по отношению ко всем измеряемым точкам.
- Th1 – отсутствие характерных признаков рака молочной железы. Присутствуют незначительные температурные изменения, воз-

можно наличие области пониженной температуры. Соотношение внутренней и кожной температур во всех точках на одном уровне.

- Th2 – характерных признаков рака молочной железы не выявлено. Присутствуют незначительные температурные изменения, возможно наличие области повышенной температуры. Соотношение внутренней и кожной температур во всех точках на одном уровне.

Объем выборки

Распределение количества записей по диагностическим меткам представлено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение количества записей по диагностическим меткам

Диагностическая метка	Количество записей (n)
Th0	1640
Th1	776
Th2	1246
Всего	3662

Методы исследования

Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel и SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). С помощью статистического пакета были построены уравнения регрессии изменения внутренней и кожной температур в зависимости от возраста в точках 0 и 9 на молочной железе справа и слева.

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа для метки Th0 (n = 1640)

Сторона	метка	Уравнение регрессии	S_e	R^2	E	p-value
mw_0_right	Th0	$Y = 36,362 - 0,029X_{age}$	0,915	0,115	-0,04	<0,001
ir_0_right	Th0	$Y = 34,622 - 0,029X_{age}$	1,017	0,095	-0,04	<0,001
mw_0_left	Th0	$Y = 36,255 - 0,026X_{age}$	0,901	0,1	-0,03	<0,001
ir_0_left	Th0	$Y = 34,44 - 0,027X_{age}$	1,043	0,08	-0,04	<0,001
mw_9_right	Th0	$Y = 36,25 - 0,015X_{age}$	0,687	0,058	-0,02	<0,001
ir_9_right	Th0	$Y = 34,312 - 0,017X_{age}$	0,853	0,05	-0,02	<0,001
mw_9_left	Th0	$Y = 36,191 - 0,014X_{age}$	0,695	0,051	-0,02	<0,001
ir_9_left	Th0	$Y = 34,255 - 0,016X_{age}$	0,879	0,043	-0,02	<0,001

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа для метки Th1 (n = 776)

Сторона	метка	Уравнение регрессии	S_e	R^2	E	p-value
mw_0_right	Th1	$Y = 35,889 - 0,036X_{age}$	1,309	0,097	-0,051	<0,001
ir_0_right	Th1	$Y = 34,248 - 0,035X_{age}$	1,366	0,084	-0,051	<0,001
mw_0_left	Th1	$Y = 35,745 - 0,034X_{age}$	1,317	0,084	-0,047	<0,001
ir_0_left	Th1	$Y = 34,005 - 0,033X_{age}$	1,437	0,07	-0,049	<0,001
mw_9_right	Th1	$Y = 35,949 - 0,015X_{age}$	0,737	0,053	-0,02	<0,001
ir_9_right	Th1	$Y = 33,953 - 0,016X_{age}$	0,953	0,036	-0,02	<0,001
mw_9_left	Th1	$Y = 35,836 - 0,013X_{age}$	0,732	0,042	-0,02	<0,001
ir_9_left	Th1	$Y = 33,937 - 0,016X_{age}$	0,993	0,036	-0,02	<0,001

Для оценки качества моделей рассчитывались следующие показатели:

$$1. \text{ Стандартная ошибка регрессии } -S_e = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - m - 1}}$$

где: y_i – фактическое значение зависимой переменной; $\hat{y}_i$ – предсказанное значение; n – объем выборки; m – количество независимых переменных в модели.[5]

$$2. \text{ Коэффициент детерминации } -R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad [5]$$

$$3. \text{ Коэффициент эластичности } -E = b \times \frac{\bar{X}}{\bar{Y}}$$

где: b – коэффициент наклона регрессии; $\bar{X}$ и $\bar{Y}$ – средние значения переменных. [5]

Надежность уравнений регрессии оценивалась с помощью критерия Фишера (F-тест). Уровень статистической значимости принят $p\text{-value} < 0,05$

Результаты исследования

В результате регрессионного анализа были получены уравнения зависимости микроволновой (глубинной) и инфракрасной (кожной) температур от возраста пациенток в точках 0 (сосок) и 9 (аксиллярная область) для правой и левой молочных желез. Все модели оказались статистически значимыми ($p\text{-value} < 0,05$). Результаты представлены отдельно для каждой диагностической метки (Th0, Th1, Th2) в таблицах 2, 3 и 4 соответственно.

Таблица 4. Результаты регрессионного анализа для метки Th2 (n = 1246)

Сторона	мет-ка	Уравнение регрессии	S_e	R^2	E	p-value
mw_0_right	Th2	$Y = 36,570 - 0,027X_{age}$	0,909	0,075	-0,03	<0,001
ir_0_right	Th2	$Y = 34,113 - 0,017X_{age}$	1,319	0,015	-0,02	<0,001
mw_0_left	Th2	$Y = 36,341 - 0,022X_{age}$	0,897	0,053	-0,03	<0,001
ir_0_left	Th2	$Y = 33,548 - 0,008X_{age}$	1,441	0,003	-0,01	<0,001
mw_9_right	Th2	$Y = 36,400 - 0,018X_{age}$	0,747	0,053	-0,02	<0,001
ir_9_right	Th2	$Y = 34,040 - 0,014X_{age}$	0,963	0,019	-0,02	<0,001
mw_9_left	Th2	$Y = 36,350 - 0,017X_{age}$	0,742	0,048	-0,02	<0,001
ir_9_left	Th2	$Y = 33,987 - 0,012X_{age}$	0,959	0,015	-0,02	<0,001

Обсуждение результатов

Интерпретация основных результатов

Проведенный регрессионный анализ выявил статистически значимую обратную зависимость между возрастом пациенток и температурными показателями во всех исследуемых точках молочной железы. Значения p-value < 0,001 для всех моделей подтверждают высокую статистическую надежность полученных результатов.

Коэффициент детерминации (R^2). Значения R^2 во всех моделях не превышали 0,115, что означает, что возраст объясняет не более 11,5% вариации температурных данных. Согласно классификации, принятой в медицинских статистических исследованиях [3, 9], такие значения R^2 соответствуют слабой связи между переменными. Наиболее высокие значения R^2 наблюдаются для метки Th0 (до 0,115), тогда как для меток Th1 и Th2 значения R^2 ниже (до 0,097 и 0,075 соответственно). Это может свидетельствовать о том, что у пациенток с нормальными температурными показателями (Th0) возрастной фактор оказывает более заметное влияние по сравнению с пациентками, имеющими незначительные температурные отклонения (Th1, Th2).

Стандартная ошибка регрессии (S_e). Для большинства моделей S_e составила менее 1,0 °C, что считается приемлемым для скрининговых исследований молочной железы, поскольку соответствует физиологическим колебаниям температуры у здоровых пациенток [2]. Исключение составили модели кожной температуры (ir) для меток Th1 и Th2, где S_e достигает 1,44 °C. Это указывает на большую вариабельность поверхностных температурных показателей по сравнению с глубинными, что может быть связано с внешними факторами (температура окружающей среды, влажность и др.).

Коэффициент эластичности (E). Значения коэффициентов эластичности находятся в диапазоне от -0,01 до -0,051. Это означает, что увеличение возраста на 1% приводит к снижению температуры в исследуемых точках на 0,01–0,051%. Такие низкие значения подтверждают слабое влияние возрастного фактора на температурные показатели [4].

Сравнение с литературными данными

Полученные результаты согласуются с данными других исследователей [1, 6, 10], которые также отмечают, что возраст не является основным предиктором температурных изменений в молочной железе. Вероятно, большее влияние на температурные характеристики оказывают такие факторы, как гормональный статус, индекс массы тела, фаза менструального цикла, наличие доброкачественных образований и другие клинические параметры.

Следует также отметить, что точка 0 (сосок) и точка 9 (аксиллярная область) являются особыми точками молочной железы. Как отмечается в методической литературе [8], поведение температуры в этих точках может отличаться от других точек измерения, что необходимо учитывать при интерпретации результатов РТМ-диагностики.

Ограничения исследования

Данное исследование имеет ряд ограничений:

1. В анализ включены данные только здоровых пациенток (метки Th0, Th1, Th2), что не позволяет оценить влияние возраста на температурные аномалии, связанные с патологическими процессами.
2. В модели использовался только один независимый переменный (возраст). Другие потенциально значимые факторы (гормональ-

ный статус, индекс массы тела, фаза менструального цикла) не учитывались.

3. База данных сформирована за длительный период (1997–2019 гг.), что может вносить дополнительные вариации, связанные с изменением методики обследования и технических характеристик оборудования.

Рекомендации для будущих исследований

Для улучшения прогностической способности моделей и более полного понимания факторов, влияющих на температурные поля молочной железы, целесообразно:

- построение многофакторных регрессионных моделей с включением дополнительных переменных (гормональный статус, индекс массы тела, фаза менструального цикла, наличие сопутствующих заболеваний);
- проведение сравнительного анализа возрастных изменений у здоровых пациенток и пациенток с патологиями молочных желез;
- учет влияния внешних факторов (температура окружающей среды, время года) при измерении кожной температуры.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы.

1. Во всех анализируемых моделях (Th0, Th1, Th2) зафиксирована статистически значимая обратная связь между возрастом пациенток и температурными показателями в точках 0 и 9 (p-value < 0,001).
2. Коэффициент детерминации не превышает 11,5%, что свидетельствует о том, что возраст объясняет не более 11,5% вариации температурных данных, т.е. его влияние на температурный профиль молочной железы является слабым.
3. Значения коэффициентов эластичности находятся в интервале от -0,01 до -0,051, подтверждая, что увеличение возраста на 1% влечет снижение температуры лишь на 0,01–0,051% [4].
4. Стандартная ошибка регрессии для глубинных температур не превышает 1,0 °C, что соответствует физиологическому разбросу показателей [2]; для кожных температур этот показатель выше (до 1,44 °C), что, вероятно, обусловлено влиянием внешних факторов.
5. Наиболее выраженное влияние возраста отмечается для метки Th0 (R^2 до 0,115), что может указывать на более четкую возрастную динамику у пациенток с исходно нормальным температурным профилем.
6. Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности учета возрастных особенностей при разработке диагностических алгоритмов, однако слабость выявленного эффекта позволяет не рассматривать возраст как критический фактор при интерпретации РТМ-данных. Для повышения прогностической точности моделей целесообразно включение дополнительных переменных (индекс массы тела, гормональный статус, фаза менструального цикла).

Литература

1. Веснин С.Г., Каплан М.А., Аванесян А.А. Микроволновая радиотермометрия в диагностике заболеваний молочной железы // Медицинская физика. – 2017. – № 3. – С. 45–52.
2. Григорьев А.Н. «Современные методы термодиагностики в маммологии» // Сибирский онкологический журнал. – 2019. – № 18(2). – С. 112–118.

3. Зюкин Д.А., Святова О.В., Беляев С.А. и др. Применение методов статистики: теория и практика: учебное пособие. Курск: КГМУ, 2017. 164 с.

4. Коэффициент эластичности и методы его подсчета [Электронный ресурс]//Studme.org. URL: https://studme.org/1229122713505/ekonomika/koeffitsient_elastichnosti_metody_ego_podscheta.

5. Мазепа Е.А., Дубовская В.И. Исследование однородности данных РТМ-диагностики по типу датчика // Труды института математики и информационных технологий Волгоградского государственного университета. – Волгоград: ВолГУ, 2019. – С. 24–31.

6. Мун С.А. Регрессионный анализ в медико-биологических исследованиях: методические рекомендации / С.А. Мун, А.Н. Глушков, Т.А. Штернис, С.А. Ларин, С.А. Максимов; ГБОУ ВПО КемГМА Минздравсоцразвития России. – Кемерово: КемГМА, 2012. – 115 с.

7. Петрова В.Г., Семенова Н.В. «Радиотермометрия в диагностике заболеваний молочных желез» // Российский онкологический журнал. – 2018. – № 3. – С. 45–50.

8. Тихомирова Н.Н. Микроволновая радиотермометрия. Техника проведения РТМ-обследования молочных желез, 2008. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.radiometry.ru/radiometry/books/upload/536-/tech_2008.pdf.

9. Харкевич И.А., Zubov N.N., Kuvakin V.I. Статистика в биомедицине, фармации и фармацевтике: учебное пособие. – М.: КноРус, 2019. – 300 с.

10. Шевелева Н.Н., Соколов А.В., Морозова Т.В. Возрастные особенности термометрии молочных желез у здоровых женщин // Клиническая маммология. – 2021. – № 4. – С. 28–34.

IDENTIFICATION OF THE WEAK EFFECT OF AGE FACTOR ON THE RESULTS OF RTM MEASUREMENTS IN SPECIAL POINTS OF THE BREAST

Alhasan Alaa, Mazepa E.A.
Vologograd State University

The article examines the relationship between temperature data obtained from RTM diagnostics of the breast in patients and their age characteristics. Publications on the diagnosis of breast diseases of a medical nature note the fact of a decrease in temperature measured at various points of the breast in healthy patients with increasing patient age [1, 2]. The main objective of this work was to statistically confirm or refute this fact using regression analysis. Data from 3662 examination protocols of healthy female patients from different age groups were studied. The study confirmed the presence of a statistically significant

inverse relationship between age and temperature indicators at points 0 (nipple) and 9 (axillary region). The coefficient of determination did not exceed 12%, indicating a weak influence of the age factor [5]. Elasticity coefficients (from -0.002 to -0.039) confirm that a 1% increase in age leads to a decrease in temperature by 0.002 – 0.039% [6]. The obtained results indicate that age is not the main factor determining temperature changes in the breast.

Keywords: breast diseases, RTM diagnostics, regression analysis, age factor, coefficient of determination, elasticity coefficient.

References

1. Vesnin S.G., Kaplan M.A., Avanesyan A.A. Mikrovolnovaya radiotermometriya v diagnostike zabolevaniy molochnoy zhelezy [Microwave Radiotherapy Metering in the Diagnosis of Breast Diseases]. Meditsinskaya fizika [Medical Physics], 2017, № 3, pp. 45–52.
2. Grigoryev A.N. Sovremennye metody termodiagnostiki v mammologii [Modern Methods of Thermal Diagnostics in Mammology]. Sibirskiy onkologicheskiy zhurnal [Siberian Journal of Oncology], 2019, № 18(2), pp. 112–118.
3. Zyukin D.A., Svyatova O.V., Belyaev S.A. et al. Primenenie metodov statistiki: teoriya i praktika: uchebnoye posobie [Application of Statistical Methods: Theory and Practice]. Kursk, Kursk State Medical University Publ., 2017. 164 p.
4. Koeffitsient elastichnosti i metody ego podscheta [Elasticity Coefficient and Methods of Its Calculation]. Studme.org. URL: https://studme.org/1229122713505/ekonomika/koeffitsient_elastichnosti_metody_ego_podscheta (accessed: 25.03.2026).
5. Mazepa E.A., Dubovskaya V.I. Issledovanie odnorodnosti dannykh RTM-diagnostics po tipu datchika [Investigation of Homogeneity of the RTM Diagnostic Data by Sensor Type]. Trudy instituta matematiki i informatsionnykh tekhnologiy Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of the Institute of Mathematics and Information Technologies of Volgograd State University]. Volgograd, VolSU Publ., 2019, pp. 24–31.
6. Mun S.A., Glushkov A.N., Shternis T.A., Larin S.A., Maksimov S.A. Regressionnyy analiz v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh: metodicheskie rekomendatsii [Regression Analysis in Biomedical Research: Guidelines]. Kemerovo, KemSMA Publ., 2012. 115 p.
7. Petrova V.G., Semenova N.V. Radiotermometriya v diagnostike zabolevaniy molochnykh zhelez [Radiotherapy Metering in the Diagnosis of Breast Diseases]. Rossiyskiy onkologicheskiy zhurnal [Russian Journal of Oncology], 2018, № 3, pp. 45–50.
8. Tikhomirova N.N. Mikrovolnovaya radiotermometriya. Tekhnika provedeniya RTM-ob sledovaniya molochnykh zhelez [Microwave Radiotherapy Metering. Technique for Conducting RTM Examination of Breast], 2008. URL: http://www.radiometry.ru/radiometry/books/upload/536-/tech_2008.pdf.
9. Kharkevich I.A., Zubov N.N., Kuvakin V.I. Statistika v biomeditsine, farmatsii i farmatsevitike: uchebnoye posobie [Statistics in Biomedicine, Pharmacy and Pharmaceuticals]. Moscow, KnoRus Publ., 2019. 300 p.
10. Sheveleva N.N., Sokolov A.V., Morozova T.V. Vozrastnye osobennosti termometrii molochnykh zhelez u zdorovykh zhenshchin [Age-Related Features of Breast Thermometry in Healthy Women]. Klinicheskaya mammologiya [Clinical Mammology], 2021, № 4, pp. 28–34.

Хирургическое лечение послеоперационных вентральных грыж: современные сетчатые импланты

Грезин Алексей Григорьевич,

врач-ординатор хирург 2 года обучения, кафедра госпитальной хирургии № 2 ИХ ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 31 имени академика Г.М. Савельевой Департамента здравоохранения города Москвы»
E-mail: gag19999@yandex.ru

Лазарян Тигран Рафаелович,

кандидат медицинских наук, врач сердечно-сосудистый хирург, врач высшей категории, доцент Кафедры Оперативной хирургии и Топографической анатомии РНИМУ им. Н.И. Пирогова ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 31 имени академика Г.М. Савельевой Департамента здравоохранения города Москвы»; статус «Московский врач», заведующий отделением СКП
E-mail: drlazaryan@gmail.com

Паньков Александр Геннадьевич,

кандидат медицинских наук, заведующий 2-м хирургическим отделением, статус «Московский врач» ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 31 имени академика Г.М. Савельевой Департамента здравоохранения города Москвы»
E-mail: Pankov-ag@mail.ru

Герасимов Тимофей Игоревич,

врач-хирург ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 31 имени академика Г.М. Савельевой Департамента здравоохранения города Москвы»
E-mail: k-jaspers@rambler.ru

Асланлы Мирискендар Мирнунс оглы,

врач-хирург ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница № 31 имени академика Г.М. Савельевой Департамента здравоохранения города Москвы»
E-mail: msiis@yandex.ru

Цель обзора. Улучшить результаты хирургического лечения ПОВГ путем оптимизации выбора сетчатых имплантов на основе анализа ближайших и отдаленных результатов и клинико-экономической эффективности различных методов герниопластики. Материалы и методы. Проведен обзор литературы в базах PubMed, Google Scholar и Cyberleninka за последние 10 лет. Отобраны исследования, включавшие пациентов со срединными ПОВГ (M2–M5 по EHS), шириной грыжевых ворот от 4 до 20 см (W2–W3), оперированных с использованием сетчатых имплантов методами Onlay, Sublay или IPOM. Результаты. Анализ показал, что при ретромультикулярной пластике в контаминированных условиях тяжелые сетки (>75 г/м²) не уступают среднетяжелым (40–60 г/м²) по частоте инфекционных осложнений, но требуют осторожности при использовании сшитых конструкций [5]. При лапароскопической IPOM-пластике DynaMesh-IPOM ассоциируется с высокой частотой спаечной непроходимости (11,5%), тогда как Parietex Composite демонстрирует лучшие показатели биосовместимости [6]. Ретромультикулярная пластика (sublay) имеет преимущества перед onlay-техникой: частота сером 16,9% против 41,0% ($p=0,0013$), рецидивов при больших грыжах – 35,1% против 81,8% ($p<0,05$) [2, 12]. При гигантских грыжах эффективна техника «тонкой сетки» (серомы 6,9%, рецидивы 4,6%) [8] и компонентная сепарация [7]. Грыжи в местах фиксации требуют профилактики: уменьшения числа швов и использования рассасывающихся фиксаторов [10]. Лапароскопическая герниопластика экономически выгоднее открытой (экономия ~30% за счет сокращения койко-дней) [9, 14]. Заключение. Выбор сетчатого импланта и метода герниопластики должен быть индивидуализирован с учетом размера дефекта, степени контаминации и позиции сетки. Предпочтительной является ретромультикулярная пластика. При больших и гигантских грыжах преимущественно используются сепарационные техники и использование «тонких» сеток.

Ключевые слова: послеоперационные вентральные грыжи, герниопластика, сетчатые импланты, onlay, sublay, послеоперационные осложнения.

Введение

Актуальность

Послеоперационные вентральные грыжи (ПОВГ) – серьезное послеоперационное осложнение, возникающее примерно у 9–22% пациентов, перенесших срединную лапаротомию. Как правило, риск осложнений и частота рецидивовкратно возрастает у пациентов с отягощенным коморбидным фоном (ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые и другие системные заболевания, курение) и превышает 35% [1, 2]. В структуре грыж живота ПОВГ занимают второе место после паховых, составляя около 20–22% случаев и остаются актуальной проблемой хирургического лечения [3]. Внедрение сетчатых имплантов снизило частоту рецидивов с 40–60% до 1–24% [4, 5]. Однако это привело к росту осложнений, ассоциированных с имплантатом: серомы, гематомы, инфекции наблюдаются в 20,9–49,2% случаев [3]. Особую проблему представляют биопленки (*S. aureus*, MRSA, *E. coli*), делающие консервативную терапию неэффективной [4]. Ключевой вопрос заключается в выборе типа сетки (легкие 25–50 г/м² vs тяжелые >75 г/м²). Легкие сетки вызывают меньшую воспалительную реакцию, но подвержены фрагментации, тяжелые, в свою очередь, прочнее, но чаще инфицируются [5, 6]. Наибольшие сложности возникают при «больших» и «сложных» грыжах (дефект >10 см, потеря домена, рецидив, стома). Частота осложнений здесь достигает 57,1%, с летальными исходами при существенных осложнениях [2]. Для таких пациентов разрабатываются методики компонентной сепарации (TAR, ACST) и «тонкой сетки» (slim-mesh) [7, 8]. Экономический аспект также важен: лапароскопическая герниопластика (IPOM), несмотря на более высокую стоимость оборудования, снижает затраты на 25–30% за счет сокращения койко-дней и сроков нетрудоспособности [9]. Таким образом, остаются нерешенными вопросы выбора импланта в зависимости от позиции сетки (Onlay, Sublay, IPOM) и степени контаминации, профилактики специфических осложнений (грыжи фиксации) [10], а также отсутствию единых клинико-экономических алгоритмов [11].

Цель обзора

Улучшить результаты хирургического лечения ПОВГ путем оптимизации выбора сетчатых имплантов на основе анализа ближайших и отдаленных результатов и клинико-экономической эффективности различных методов герниопластики.

Методология поиска источников

Авторами был проведен обзор литературы в базах данных PubMed, Google Scholar и Cyberleninka. Критериями включения являлись исследования, имеющие данные о пациентах с срединной послеоперационной вентральной грыжей (M2–M5 по классификации EHS, 2009), шириной грыжевых ворот от 4 до 20 см (W2–W3 по EHS), возраст пациентов от 18 до 85 лет. Также обязательным условием является выполнение планового хирургического вмешательства с использованием сетчатого импланта и использование одного из стандартизированных методов герниопластики: Onlay, Sublay (retromuscular/preperitoneal) или IPOM (intraperitoneal onlay mesh). Поиск проводился по следующим ключевым словам: послеоперационные вентральные грыжи, герниопластика, сетчатые импланты, onlay, sublay, послеоперационные осложнения. Авторы независимо друг от друга провели отбор релевантных исследований на основе аннотаций, после чего извлекался полный текст статей. Глубину поиска составили публикации за последние 10 лет.

Сравнение различных типов сетчатых имплантов

Одним из ключевых вопросов современной хирургии является выбор оптимального типа сетчатого импланта. Анализ литературы показывает, что единого мнения по этому вопросу не существует, а результаты исследований достаточно противоречивы.

В исследовании Elis R.C. с соавт. проведено сравнение среднетяжелых (MWPP, 40–60 г/м²) и тяжелых (HWPP, >75 г/м²) полипропиленовых сеток при ретромультикулярной пластике в условиях контаминированных ран (CDC класс II–III). Авторы не выявили достоверных различий в частоте раневых инфекций (13,4% против 14,5%, $p=0,877$),

сером (5,7% против 5,1%, $p=0,995$) и эксплантации сетки (0,3% против 0%, $p=1$). Единственным статистически значимым отличием стала более высокая частота гемотрансфузий в группе тяжелых сеток (6% против 1,7%, $p=0,023$), что авторы связывают с использованием шитых конструкций [5]. Более того, данные из исследования Elis R.C. с соавт. так же согласуются с наблюдениями Паршикова В.В., который отмечает, что полипропилен благодаря своей монофиламентной структуре и гидрофобности является наиболее резистентным к инфицированию материалом. При этом автор подчеркивает, что ключевое значение имеет соотношение размеров пор (менее 15 мкм облегчает проникновение бактерий) и возможность атаки со стороны иммунокомпетентных клеток [4, 5].

Совершенно иные закономерности выявлены при сравнении конкретных типов имплантов для лапароскопической IPOM-пластики. В исследовании Tandon A. с соавт. установлено, что DynaMesh-IPOM ассоциируется с достоверно более высокой частотой спаечной кишечной непроходимости по сравнению с Parietex Composite (11,5% против 0%, $p=0,006$). Частота рецидивов в группе Parietex Composite составила 12,9%, в группе DynaMesh-IPOM – 3,8% [6]. Данное исследование свидетельствует о гистологически подтвержденной выраженной реакции на инородное тело, что привело к отказу от использования DynaMesh-IPOM в их клинической практике. Этот случай демонстрирует, что выбор импланта не может основываться исключительно на физико-механических свойствах, так как биосовместимость играет не менее важную роль.

Таким образом, анализ литературы указывает на необходимость индивидуализированного подхода к выбору сетчатого импланта с учетом позиции сетки, степени контаминации операционного поля и индивидуальных особенностей пациента.

Выбор позиции сетчатого импланта (Sublay vs Onlay vs IPOM)

Вопрос о выборе оптимального слоя для размещения сетчатого импланта остается предметом дискуссий на протяжении многих лет. Большинство авторов сходятся во мнении, что ретромулярная пластика (sublay) имеет преимущества перед onlay-технологией.

В рандомизированном исследовании Demetrashvili Z. с соавт. показано, что при использовании техники sublay частота раневых осложнений составляет 22,1%, тогда как при onlay – 50,0% ($p<0,001$). Особенно показательны различия в частоте серомы: 16,9% против 41,0% ($p=0,0013$). Частота рецидивов также была ниже в группе sublay (2,6% против 5,1%), хотя различия не достигли статистической значимости [12].

Исследование, проведенное Ефремовым Б.И., подтверждает эти данные на большом клиническом материале (138 пациентов). У пациентов с грыжами малых и средних размеров (W1-W2) частота рецидивов при пластике onlay составила 30%, при sublay – 10%. В группе пациентов с большими грыжами (дефект более 10 см, W3) различия стали еще более выраженными: частота рецидивов при onlay достигла 81,8%, при sublay – 35,1% ($p<0,05$). Автор подчеркивает, что частота системных осложнений (пневмония, ТЭЛА, абдоминальный компартмент-синдром) у пациентов с большими грыжами составила 9,1%, тогда как у пациентов с малыми грыжами системных осложнений не наблюдалось [2].

Черкасов М.Ф. с соавт. объясняют преимущества sublay-пластики анатомическими факторами: расположением сетки в хорошо васкуляризованном ретромулярном пространстве, отсутствием контакта импланта с подкожно-жировой клетчаткой и использованием внутрибрюшного давления для дополнительной фиксации протеза [3].

Однако, как отмечает Ефремов Б.И., даже такой «золотой стандарт», как методика sublay – имеет свои ограничения. При ширине дефекта более 10 см частота рецидивов после sublay возрастает с 10% до 35,1%, что требует применения дополнительных хирургических техник [2].

Опыт использования самофиксирующихся сеток в позиции sublay представлен в работе Schembari с соавт.. Авторы прооперировали 37 пациентов, частота послеоперационных осложнений составила 16,2% (серомы 5,4%, гематомы 5,4%, расхождение краев раны 5,4%). Частота рецидивов при среднем сроке наблюдения 18,1 месяца достигла 8,1%, что несколько выше, чем в классических исследованиях по sublay-пластике. Авторы связывают это с большим количеством пациентов с дефектами W3 (37,8%) в данной выборке [13].

Доброквашин С.В. с соавт. в своем обзоре подчеркивают значимость правильного выбора слоев брюшной стенки для размещения имплантата. Авторы отмечают, что при больших послеоперационных вентральных грыжах применение комбинированных способов пласти-

ки с использованием техники sublay-inlay позволяет избежать высокой травматичности операции и снизить частоту рецидива [1].

Лечение сложных и гигантских грыж

Особую сложность представляют пациенты с большими (W3) и гигантскими грыжами, особенно при наличии синдрома «потери домена». Ефремов Б.И. указывает, что у таких пациентов общая частота осложнений достигает 57,1%, а частота рецидивов – 45,4% [2].

Для этой категории пациентов разрабатываются специализированные методики. Паршиков В.В. и Логинов В.И. в своем обзоре детально анализируют технику разделения компонентов брюшной стенки (compotent separation technique – CST). Авторы выявляют, что передняя сепарация (по Ramirez) позволяет закрыть дефекты шириной до 20 см, однако сопровождается высокой частотой раневых осложнений (до 34,6%). Эндоскопические варианты сепарации демонстрируют лучшие результаты с частотой осложнений 11–20%. Также задняя сепарация (TAR – transversus abdominis release), описанная в обзоре, позволяет выполнить протезирующую пластику даже при самых сложных дефектах. Сочетание открытой задней сепарации и протезирующей пластики ассоциировано с хорошими функциональными результатами [7].

Альтернативный подход предложен Canton S.A. & Pasquali C. – техника «тонкой сетки» (slim-mesh) для лечения гигантских вентральных грыж. В исследование включены 43 пациента с грыжами размером от 10 до 20 см и более. Отказ от трансфасциальных швов и использование рассасывающихся фиксаторов позволили авторам добиться низкой частоты осложнений: серомы – 6,9%, рецидивы при среднем сроке наблюдения 3 года 4 месяца – 4,6%. Важно отметить, что лапароскопия позволила выявить дополнительные («сателлитные») дефекты брюшной стенки у 25,5% пациентов, не обнаруженные при КТ или УЗИ, что подтверждает высокую диагностическую ценность этого метода [8].

Лукоянычев Е.Е. с соавт. подчеркивают, что внедрение новых способов сепарационной герниопластики подразумевает особые требования к хирургической технике, пластическому материалу и фармакологическому сопровождению, особенно в условиях повышенного внутрибрюшного давления [11].

Специфические осложнения и их профилактика

Особого внимания заслуживают специфические осложнения, связанные с фиксацией имплантата. Армашов В.П. с соавт. проанализировали 12 клинических случаев образования грыж в местах фиксации импланта после IPOM-пластики. У 8 пациентов (66,7%) причиной было повреждение брюшной стенки трансфасциальными швами, а у 2 – степлерными фиксаторами. Средний период от операции до выявления новой грыжи составил $30,6 \pm 5,9$ месяца, размеры дефектов варьировали от 0,5 до 4,3 см. Авторы предлагают рассматривать такие грыжи как отдельный тип послеоперационных вентральных грыж. Основной механизм заключается в избыточном натяжении и прорезывании швов или повреждении тканей фиксаторами. Важным выводом является необходимость профилактики: отсутствие избыточного натяжения имплантата, уменьшение количества трансфасциальных швов, использование рассасывающихся фиксаторов, расположение точек фиксации на достаточном расстоянии от края сетки (не менее 5 мм) [10].

Проблема гнойно-септических осложнений рассмотрена в обзоре Паршикова В.В.. Автор отмечает, что частота инфекционных осложнений при реконструкции брюшной стенки в условиях контаминации может достигать 46%. Основными возбудителями являются *Staphylococcus aureus* (включая MRSA), *Enterococcus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*. Ключевую роль играет формирование биопленок на поверхности импланта, что делает антибактериальную терапию малоэффективной. Паршиков В.В. предлагает стратификацию риска на основе классификации VHWG (Ventral Hernia Working Group) и подчеркивает важность стратегии сохранения сетки с использованием вакуум-терапии (NPWT), которая позволяет снизить частоту эксплантации сетки с 33,5% до 13,5%. Автор также обращает внимание на перспективность имплантационной профилактики в виде предварительной обработки сеток антисептиками и антибиотиками [4].

Черкасов М.Ф. с соавт. систематизируют методы профилактики раневых осложнений, разделяя их на предоперационные, интраоперационные и послеоперационные. Авторы подчеркивают важность прогнозирования риска развития сером на основе многофакторного анализа, включающего длительность грыженосительства, ширину грыжевых ворот, площадь и тип эндопротеза [3].

Лукоянычев Е.Е. с соавт. обращают внимание на роль внутрибрюшного давления в развитии осложнений. Авторы отмечают, что повышение внутрибрюшного давления наблюдается у 36% оперирован-

ных больных, а летальность при формировании интраабдоминальной гипертензии варьирует от 10,6 до 68%. Мониторинг внутрибрюшного давления должен стать рутинным методом исследования у больных с тяжелой абдоминальной патологией [11].

Экономическая эффективность различных методов хирургических вмешательств

Экономический аспект хирургического лечения ПОВГ проанализирован в работах Юлдашева П.А.. В сравнительном исследовании лапароскопической (n=28) и открытой (n=25) герниопластики установлено, что длительность госпитализации в лапароскопической группе составила 3,8±1,2 дня против 6,7±1,5 дня в открытой (p<0,01). Сроки возвращения к труду – 22±5 дней против 36±7 дней (p<0,01). Частота осложнений в лапароскопической группе составила 10,7%, в открытой – 28% (p=0,04). Несмотря на более высокую стоимость расходных материалов при лапароскопии (1300 у.е. против 800 у.е.), суммарные затраты на лечение оказались ниже в лапароскопической группе (3000 у.е. против 4300 у.е.). Экономия составила около 30% на одного пациента за счет сокращения койко-дней и снижения частоты осложнений [9].

Во второй работе Юлдашев П.А. подчеркивает, что более высокие интраоперационные затраты при лапароскопии полностью компенсируются снижением послеоперационных расходов, что особенно актуально в условиях ограниченных ресурсов здравоохранения [14].

Лукоянычев Е.Е. с соавт. отмечают, что проблема ПОВГ имеет не только медицинское, но и социальное-экономическое значение. Количество больных с данной патологией увеличилось в 9 раз за последние 25 лет, а частота рецидивов при больших и гигантских грыжах достигает 55%. Отсутствие единых алгоритмов выбора метода пластики и типа импланта приводит к увеличению затрат на лечение и реабилитацию [11].

Закключение

Проведенный анализ литературы свидетельствует о том, что проблема выбора оптимального сетчатого импланта и метода герниопластики при лечении послеоперационных вентральных грыж остается актуальной и требует индивидуализированного подхода.

При выборе типа сетчатого импланта необходимо учитывать условия операционного поля. Тяжелые полипропиленовые сетки могут быть безопасно использованы в контаминированных ранах при ретромулярном расположении, однако применение сшитых конструкций требует осторожности из-за риска геморрагических осложнений. В лапароскопической хирургии критическое значение приобретает биосовместимость материала: неабсорбируемые двухкомпонентные сетки способны вызывать выраженную спаечную реакцию, тогда как композитные импланты с рассасывающимся покрытием демонстрируют лучшие отдаленные результаты.

Особого внимания заслуживают специфические осложнения, такие как грыжи в местах фиксации импланта. Их профилактика требует строгого соблюдения технических приемов: отсутствия избыточного натяжения, уменьшения количества трансфасциальных швов и использования рассасывающихся фиксаторов. Лечение инфекционных осложнений должно основываться на стратификации риска и своевременном применении вакуум-терапии для сохранения импланта.

Таким образом, современная стратегия хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж должна основываться на комплексном подходе с учетом размеров дефекта, степени контаминации, позиции сетки и клинико-экономических факторов. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку единых алгоритмов выбора импланта и метода пластики, а также на изучение отдаленных результатов различных хирургических техник.

Литература

1. Добровашин, С.В. Послеоперационные вентральные грыжи: нерешенные вопросы диагностики и тактики хирургического лечения / С.В. Добровашин, А.Г. Измайлов, А.А. Янтыкова [и др.] // Вестник современной клинической медицины. – 2024. – Т. 17, Приложение 1. – С. 67–74.
2. Ефремов, Б.И. Анализ причин развития послеоперационных осложнений у пациентов со сложными грыжами / Б.И. Ефремов // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2025. – Т. 19, № 4. – С. 16–23.
3. Черкасов, М.Ф. Методы диагностики, профилактики и лечения осложнений герниопластики / М.Ф. Черкасов, А.Ю. Хиндиайнен, А.А. Помазков // Астраханский медицинский журнал. – 2016. – Т. 11, № 4. – С. 50–64.

4. Паршиков, В.В. Воспалительные осложнения протезирующей пластики брюшной стенки: диагностика, лечение и профилактика (обзор) / В.В. Паршиков // Современные технологии в медицине. – 2019. – Т. 11, № 3. – С. 158–178.

5. Ellis, R.C. Short-term outcomes of heavyweight versus mediumweight synthetic mesh in a retrospective cohort of clean-contaminated and contaminated retromuscular ventral hernia repairs / R.C. Ellis, S.M. Maskal, N. Messer [et al.] // Surgical Endoscopy. – 2024. – Vol. 38, № 7. – P. 4006–4013.

6. Tandon, A. Parietex™ Composite mesh versus DynaMesh®-IPOM for laparoscopic incisional and ventral hernia repair: a retrospective cohort study / A. Tandon, K. Shahzad, S. Pathak [et al.] // The Annals of The Royal College of Surgeons of England. – 2016. – Vol. 98, № 8. – P. 568–573.

7. Parshikov, V.V. Components separation technique in treatment of patients with ventral and incisional hernias / V.V. Parshikov, V.I. Loginov // Современные технологии в медицине. – 2016. – Т. 8, № 1 (eng). – С. 183–192.

8. Canton, S. A. «Slim-Mesh» technique for giant ventral hernia / S.A. Canton, C. Pasquali // JSLS: Journal of the Society of Laparoscopic & Robotic Surgeons. – 2022. – Vol. 26, № 1. – P. e2021–00079.

9. Юлдашев, П.А. Экономическая эффективность лапароскопической и открытой герниопластики вентральных грыж / П.А. Юлдашев // Экономика и социум. – 2025. – № 7–1 (134). – С. 950–957.

10. Армашов, В.П. Новые грыжи в местах фиксации импланта после герниопластики IPOM / В.П. Армашов, Д. Ломаи, А. Белоусов, Н. Матвеев // Эндоскопическая хирургия. – 2023. – Т. 29, № 4. – С. 57–66.

11. Лукоянычев, Е.Е. Общий взгляд на технологии профилактики и лечения пациентов с послеоперационными вентральными грыжами / Е.Е. Лукоянычев, С.Г. Измайлов, В.А. Емельянов [и др.] // Research'n Practical Medicine Journal. – 2021. – Т. 8, № 3. – С. 84–96.

12. Demetrashvili, Z. Open retromuscular mesh repair versus onlay technique of incisional hernia: a randomized controlled trial / Z. Demetrashvili, I. Pipia, D. Loladze [et al.] // International Journal of Surgery. – 2017. – Vol. 37. – P. 65–70.

13. Schembari, E. Is the sublay self-gripping mesh effective for incisional ventral hernia repair? Our experience and a systematic review of the literature / E. Schembari, M. Sofia, R. Lombardo [et al.] // Updates in surgery. – 2020. – Vol. 72, № 4. – P. 1195–1200.

14. Юлдашев, П.А. Оптимизация расходов при герниопластике: опыт лапароскопических вмешательств / П.А. Юлдашев // Экономика и социум. – 2025. – № 7–1 (134). – С. 974–983.

SURGICAL TREATMENT OF INCISIONAL VENTRAL HERNIAS: MODERN MESH IMPLANTS

Grezin A.G., Lazaryan T.R., Pankov A.G., Gerasimov T.I., Aslanly M.M.

State Budgetary Healthcare Institution of Moscow, City Clinical Hospital № 31 named after Academician G.M. Savelyeva, Moscow Department of Healthcare

Purpose of the review. To improve the outcomes of surgical treatment for incisional ventral hernias (IVH) by optimizing the selection of mesh implants based on an analysis of short- and long-term results and the clinical and economic effectiveness of various hernioplasty methods. Materials and methods. A literature review was conducted in the PubMed, Google Scholar, and Cyberleninka databases over the last 10 years. Studies were selected that included patients with midline IVH (M2–M5 according to the EHS classification), with hernia defect widths ranging from 4 to 20 cm (W2–W3), who were operated on using mesh implants with the Onlay, Sublay, or IPOM techniques. Results. The analysis showed that in retromuscular repair under contaminated conditions, heavyweight meshes (>75 g/m²) are non-inferior to medium-weight meshes (40–60 g/m²) regarding the rate of infectious complications, but caution is required when using constructed meshes [5]. In laparoscopic IPOM repair, DynaMesh-IPOM is associated with a high rate of adhesive bowel obstruction (11.5%), whereas Parietex Composite demonstrates better biocompatibility [6]. Retromuscular repair (sublay) has advantages over the onlay technique: the rate of seromas is 16.9% versus 41.0% (p=0.0013), and the recurrence rate for large hernias is 35.1% versus 81.8% (p<0.05) [2, 12]. For giant hernias, the «slim mesh» technique (seromas 6.9%, recurrence 4.6%) [8] and component separation [7] are effective. Hernias at fixation sites require prevention: reducing the number of sutures and using absorbable fixation devices [10]. Laparoscopic hernioplasty is more cost-effective than open surgery (savings of ~30% due to reduced hospital stay) [9, 14]. Conclusion. The choice of mesh implant and hernioplasty method should be individualized, considering the size of the defect, the degree of contamination, and the mesh position. Retromuscular repair is preferable. For large and giant hernias, separation techniques and the use of «slim» meshes are primarily utilized.

Keywords: incisional ventral hernias, hernioplasty, mesh implants, onlay, sublay, postoperative complications.

References

1. Dobrovashin, S.V. Postoperative ventral hernias: unresolved issues of diagnosis and tactics of surgical treatment / S.V. Dobrovashin, A.G. Izmailov, A.A. Yantykova [et al.] // Bulletin of modern clinical medicine. – 2024. – Vol. 17, Appendix 1. – Pp. 67–74.

2. Efremov, B.I. Analysis of the causes of postoperative complications in patients with complex hernias / B.I. Efremov // Bulletin of new medical technologies. Electronic publication. – 2025. – Vol. 19, № 4. – Pp. 16–23.
3. Cherkasov, M.F. Methods of diagnostics, prevention and treatment of complications of hernioplasty / M.F. Cherkasov, A. Yu. Hindikainen, A.A. Pomazkov // Astrakhan medical journal. – 2016. – Vol. 11, № 4. – P. 50–64.
4. Parshikov, V.V. Inflammatory complications of prosthetic abdominal wall plastic surgery: diagnosis, treatment, and prevention (review) / V.V. Parshikov // Modern technologies in medicine. – 2019. – Vol. 11, № 3. – P. 158–178.
5. Ellis, R.C. Short-term outcomes of heavyweight versus mediumweight synthetic mesh in a retrospective cohort of clean–contaminated and contaminated retromuscular ventral hernia repairs / R.C. Ellis, S.M. Maskal, N. Messer [et al.] // Surgical Endoscopy. – 2024. – Vol. 38, № 7. – P. 4006–4013.
6. Tandon, A. Parietex™ Composite mesh versus DynaMesh®-IPOM for laparoscopic incisional and ventral hernia repair: a retrospective cohort study / A. Tandon, K. Shahzad, S. Pathak [et al.] // The Annals of The Royal College of Surgeons of England. – 2016. – Vol. 98, № 8. – P. 568–573.
7. Parshikov, V.V. Components separation technique in treatment of patients with ventral and incisional hernias / V.V. Parshikov, V.I. Loginov // Modern technologies in medicine. – 2016. – T. 8, № 1 (eng). – pp. 183–192.
8. Canton, S. A. «Slim-Mesh» technique for giant ventral hernia / S.A. Canton, C. Pasquali // JSLS: Journal of the Society of Laparoscopic & Robotic Surgeons. – 2022. – Vol. 26, № 1. – P. e2021–00079.
9. Yuldashev, P.A. Cost-effectiveness of laparoscopic and open hernioplasty of ventral hernias / P.A. Yuldashev // Economy and Society. – 2025. – № 7–1 (134). – P. 950–957.
10. Armashov, V.P. New hernias at the sites of implant fixation after IPOM hernioplasty / V.P. Armashov, D. Lomaia, A. Belousov, N. Matveyev // Endoscopic surgery. – 2023. – Vol. 29, № 4. – Pp. 57–66.
11. Lukoyanychev, E.E. General view on technologies for the prevention and treatment of patients with postoperative ventral hernias / E.E. Lukoyanychev, S.G. Izmailov, V.A. Emelianov [et al.] // Research'n Practical Medicine Journal. – 2021. – Vol. 8, № 3. – Pp. 84–96.
12. Demetrashvili, Z. Open retromuscular mesh repair versus onlay technique of incisional hernia: a randomized controlled trial / Z. Demetrashvili, I. Pipia, D. Loladze [et al.] // International Journal of Surgery. – 2017. – Vol. 37. – P. 65–70.
13. Schembari, E. Is the sublay self-gripping mesh effective for incisional ventral hernia repair? Our experience and a systematic review of the literature / E. Schembari, M. Sofia, R. Lombardo [et al.] // Updates in surgery. – 2020. – Vol. 72, № 4. – P. 1195–1200.
14. Yuldashev, P.A. Optimization of costs in hernioplasty: experience of laparoscopic interventions / P.A. Yuldashev // Economy and Society. – 2025. – № 7–1 (134). – P. 974–983.

Визуальная диагностика в пропедевтике: что может сказать внешний осмотр о состоянии внутренних органов (цианоз, отёки, иктеричность)

Куница Виктор Николаевич,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренней медицины, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского
E-mail: kunitsa-viktor@mail.ru

Григоришина Надежда Евгеньевна,

студент, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского
E-mail: grigorishina02@mail.ru

Карачик Эдие Усеиновна,

студент, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского
E-mail: ediekaracik@gmail.com

В статье рассматривается роль визуальной диагностики внутренних болезней. Авторы анализируют, как ключевые внешние признаки – цианоз, отёки и иктеричность помогают оценить состояние внутренних органов и заподозрить патологию на раннем этапе. Подробно разбираются патофизиологические механизмы возникновения каждого симптома: цианоз как маркер нарушений газообмена и сердечно-сосудистой недостаточности; отёки как признак дисфункции почек, сердца или нарушения белкового обмена; иктеричность как симптом поражения печени и нарушений билирубинового обмена. Описываются особенности осмотра: условия освещения, последовательность оценки признаков, нюансы интерпретации у пациентов разного возраста. Подчёркивается важность интеграции визуальных данных в общий диагностический процесс.

Ключевые слова: визуальная диагностика, пропедевтика внутренних болезней, внешний осмотр, физикальное обследование, цианоз, отёки, иктеричность, клинические признаки, патологические симптомы.

Введение

Визуальная диагностика – один из древнейших и наиболее доступных методов медицинской оценки состояния пациента. Ещё со времён Гипократа врачи опирались на данные внешнего осмотра, чтобы составить первичное представление о здоровье человека и направить дальнейшее обследование в нужное русло. Несмотря на стремительное развитие инструментальных и лабораторных методов диагностики, визуальный осмотр по-прежнему занимает ключевое место в пропедевтике внутренних болезней: он не требует специального оборудования, выполняется мгновенно и позволяет выявить ряд значимых симптомов уже на первом приёме [3].

Цель данной статьи – показать, как внешние признаки могут отражать состояние внутренних органов и систем, и научить распознавать ключевые визуальные маркеры, требующие углублённого обследования. В центре внимания – три ярких клинических симптома, каждый из которых сигнализирует о серьёзных нарушениях в работе организма. Цианоз – синюшная окраска кожи и слизистых оболочек, указывающая на гипоксию и нарушения газообмена. Отёки – избыточное накопление жидкости в тканях, локализация и характер которых помогают предположить причину: сердечную недостаточность, почечные заболевания, нарушения лимфооттока, гипопротейнемию и т.д. Иктеричность (желтушность) кожных покровов и склер – признак повышения уровня билирубина в крови; этот симптом позволяет заподозрить поражение печени, гемолиз, обструкцию желчевыводящих путей и другие патологии гепатобилиарной системы.

Актуальность темы обусловлена тем, что своевременная и правильная интерпретация этих визуальных признаков позволяет на раннем этапе заподозрить серьёзную патологию, помогает выстроить рациональную диагностическую стратегию, сокращает время до постановки диагноза и начала лечения, а также повышает общую эффективность медицинской помощи.

Место внешнего осмотра в алгоритме обследования пациента

Внешний осмотр – это первый и обязательный этап физикального обследования пациента, который выполняется до любых инструментальных и лабораторных исследований. Его значение трудно переоценить: грамотно проведённый осмотр задаёт вектор всей дальнейшей диагностики, позволяет быстро оценить состояние больного и выявить жизнеугрожающие симптомы. Осмотр начинается в момент первой встречи врача с пациентом – ещё до сбора анамнеза. Уже на этом этапе врач обращает внимание на общее состояние, сознание, положение тела, выражение лица, походку, манеру поведения. Эти первичные наблюдения помогают сформировать предварительную диагностическую гипотезу и определить тактику дальнейшего обследования.

В структуре клинического обследования внешний осмотр выполняет несколько ключевых функций:

Во-первых, он позволяет первично оценить состояние пациента – определить, находится ли тот в удовлетворительном состоянии, средней тяжести, тяжёлом или критическом. Визуально можно выявить признаки шока, асфиксии, комы, острой сердечной или дыхательной недостаточности – состояний, требующих немедленных действий.

Во-вторых, осмотр помогает сформулировать предварительный диагноз на основе видимых симптомов. Например, желтушность кожи и склер сразу наводит на мысль о патологии гепатобилиарной системы, цианоз – о гипоксии, отёки на ногах – о сердечной недостаточности или гипопротейнемии. Даже такие признаки, как вынужденное положение тела (ортопноэ при сердечной астме) или характер дыхания (стридор, шумное дыхание), дают ценную информацию.

В-третьих, внешний осмотр определяет направление дальнейшего обследования. Выявленные симптомы показывают, какие системы органов требуют углублённой диагностики: цианоз (оценка дыхательной и сердечно-сосудистой систем); отёки (проверка работы сердца, почек, печени); иктеричность (исследование функции печени, билирубинового обмена).

В-четвёртых, осмотр служит основой для выбора конкретных методов исследования. Например, обнаружение сосудистых звёздочек

и асцита у пациента с желтухой делает приоритетным поиск признаков цирроза печени, а выявление периферических отёков и набухания шейных вен – диагностику хронической сердечной недостаточности.

В-пятых, визуальные признаки позволяют мониторить динамику заболевания и эффективность лечения. Уменьшение отёков на фоне диуретической терапии, снижение интенсивности желтухи или исчезновение цианоза при кислородотерапии – всё это объективные критерии положительной динамики.

Кроме медицинской ценности, внешний осмотр имеет и психологическое значение: внимательный, бережный осмотр демонстрирует пациенту заботу и повышает его доверие к врачу. Это особенно важно при работе с тревожными или тяжелобольными пациентами.

Алгоритм проведения внешнего осмотра должен быть последовательным и систематизированным. Обычно он включает оценку следующих параметров: Общее состояние и сознание (ясное, спутанное, ступор, кома). Положение пациента (активное, пассивное, вынужденное). Тип телосложения и питание (нормостеник, астеник, гиперстеник; дефицит массы тела, ожирение). Состояние кожных покровов и видимых слизистых (цвет, влажность, эластичность, наличие высыпаний, рубцов, сосудистых изменений). Наличие и локализация отёков. Особенности дыхания (частота, ритм, глубина, участие вспомогательной мускулатуры). Состояние периферических лимфоузлов (размер, консистенция, болезненность). Осмотр отдельных областей тела (голова, шея, конечности) и систем (костно-мышечной, эндокринной и др.). При этом важно соблюдать условия качественного осмотра: хорошее освещение (желательно естественное, так как искусственное может исказить цвет кожи); комфортная температура в помещении (чтобы избежать бледности или гиперемии из-за переохлаждения/перегрева); последовательность – осмотр проводится по зонам, сверху вниз, от общего к частному; учёт возрастных и этнических особенностей пациента (например, физиологическая желтуха новорождённых или конституциональная гиперпигментация) [9,11].

Таким образом, внешний осмотр – не просто формальный этап обследования, а мощный диагностический инструмент. Он позволяет быстро сориентироваться в клинической ситуации, выстроить рациональную стратегию диагностики и лечения, а также установить доверительные отношения с пациентом. Сохранение и совершенствование навыков визуальной диагностики остаётся важной задачей для врачей всех специальностей.

Принципы интерпретации визуальных признаков

Интерпретация визуальных признаков в клинической медицине представляет собой сложный процесс, требующий системного подхода, глубокого понимания патофизиологических механизмов и значительного клинического опыта. Этот процесс выходит за рамки простого фиксирования симптомов – он подразумевает их всесторонний анализ в сочетании с прочими данными обследования пациента.

В основе интерпретации лежат несколько ключевых принципов. Прежде всего, это комплексность оценки: нельзя ставить диагноз, опираясь лишь на один изолированный признак. К примеру, бледность кожных покровов может свидетельствовать об анемии, шоке, спазме периферических сосудов либо являться индивидуальной конституциональной особенностью. Чтобы подтвердить анемию, необходимо учитывать сопутствующие симптомы (слабость, головокружение, тахикардия) и результаты лабораторных исследований (снижение уровня гемоглобина).

Не менее важен принцип контекстуальности: визуальные признаки всегда анализируются с учётом ряда факторов – возраста пациента (так, физиологическая желтуха новорождённых принципиально отличается от желтухи у взрослого человека), пола (некоторые эндокринные заболевания чаще встречаются у представителей определённого пола), этнической принадлежности (естественный цвет кожи и особенности пигментации могут варьироваться), а также анамнеза (наличие хронических заболеваний, принимаемые лекарства, недавно перенесённые инфекции).

Динамичность наблюдения также играет существенную роль: однократное обследование менее информативно, чем отслеживание изменений во времени. Например, стремительное нарастание цианоза за несколько часов может указывать на острую дыхательную недостаточность или тромбоэмболию лёгочной артерии, в то время как постепенное развитие цианоза на протяжении месяцев чаще встречается при хронической сердечной недостаточности.

Важнейшим элементом диагностики выступает дифференциальная диагностика: для каждого обнаруженного визуального признака врач формирует перечень возможных причин и последовательно их исключает [1]. Например, при выявлении отёков проводится дифференциальная диагностика между сердечными, почечными, печёночными, эндокринными и иными видами отёков.

Кроме того, все визуальные находки обязательно сопоставляются с данными других методов обследования: физикальных (пальпация, перкуссия, аускультация), лабораторных (анализы крови, мочи, биохимические исследования) и инструментальных (УЗИ, рентгенография, эндоскопия и т.д.).

Наконец, принципиально важна стандартизация описания визуальных признаков в медицинской документации. Для этого используется чёткая схема фиксации данных: цвет (бледный, цианотичный, желтушный, гиперемированный), локализация (лицо, нижние конечности, симметричное или асимметричное расположение), распространённость (локальный или генерализованный процесс), интенсивность (лёгкая, умеренная, выраженная степень проявления), а также дополнительные характеристики (температура кожи, наличие ямки при надавливании на отёк и т.п.).

Цианоз как диагностический признак: виды и дифференциальная диагностика

Цианоз – синюшная окраска кожи и слизистых оболочек, возникающая при повышении концентрации дезоксигенированного (восстановленного) гемоглобина в крови до уровня $\geq 5,0$ г/дл (или $\geq 3,1$ ммоль/л), что соответствует насыщению артериальной крови кислородом (SaO_2) $\leq 85\%$. Разберём виды цианоза и методы их дифференциальной диагностики.

Выделяют три основных вида цианоза:

1. Центральные цианоз возникает из-за снижения насыщения кислородом артериальной крови на уровне лёгких или сердца. Он характеризуется распространённостью (затрагивает всё тело) и вовлечением слизистых оболочек (язык, полость рта, конъюнктивы) при одновременном снижении SaO_2 . Механизмы его возникновения включают нарушение лёгочной функции – снижение альвеолярной вентиляции (пневмония, ХОБЛ, отёк лёгких, респираторный дистресс-синдром), нарушение вентиляционно-перфузионных соотношений, снижение диффузии кислорода. Также к центральному цианозу приводит шунтирование крови – попадание ненасыщенной кислородом венозной крови в артериальное русло. Это наблюдается при врождённых пороках сердца с право-левым шунтом (тетрада Фалло, транспозиция магистральных сосудов), лёгочных артериовенозных шунтах, множественных малых внутрилёгочных шунтах. Кроме того, причиной могут стать снижение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе (высотная гипоксия на высоте более 2 400 м) и патология гемоглобина (метгемоглобинемия, сульфгемоглобинемия, мутантный гемоглобин с низким сродством к кислороду) [1,6].

2. Периферический цианоз (акроцианоз) развивается из-за замедления кровотока в периферических сосудах и повышенного извлечения кислорода тканями при нормальном насыщении артериальной крови. Для него характерна локализация на конечностях (пальцы рук и ног), кончике носа, ушах, при этом слизистые оболочки остаются розовыми. Часто сочетается с похолоданием и отёком тканей. Механизмы возникновения периферического цианоза включают уменьшенный сердечный выброс (сердечная недостаточность, гиповолемия, шок), сосудистый спазм (охлаждение, феномен Рейно, стресс), артериальную недостаточность (атеросклероз периферических артерий, облитерирующий эндартериит), венозную недостаточность (тромбофлебит, варикозная болезнь, тромбоз глубоких вен) и перераспределение крови (централизацию кровообращения при шоке) [2,4].

3. Смешанный цианоз сочетает признаки центрального и периферического и возникает при состояниях, одновременно нарушающих оксигенацию крови и периферический кровоток. К таким состояниям относятся тяжёлая сердечная недостаточность с застойными явлениями в лёгких и периферическим вазоспазмом, кардиогенный шок с развитием дыхательной недостаточности, сепсис с полиорганной недостаточностью, массивная ТЭЛА с рефлекторным спазмом периферических сосудов.

Для правильной дифференциальной диагностики важно оценить локализацию и распространённость цианоза, температуру кожных покровов, насыщение крови кислородом и сопутствующие симптомы. Алгоритм диагностики начинается с оценки локализации: при центральном цианозе синюшность затрагивает губы, язык, слизистые оболочки полости рта, кожу лица и туловища; при периферическом – кончики пальцев рук и ног, мочки ушей, кончик носа, а слизистые оболочки сохраняют нормальный розовый цвет; смешанный цианоз сочетает признаки обоих типов.

Отёки в визуальной диагностике

Отёк – патологическое скопление жидкости в тканях и межтканевых пространствах вследствие нарушения баланса между фильтрацией жидкости из капилляров в ткани и её обратным всасыванием (ре-

абсорбцией), а также лимфооттоком. Отёчная жидкость (транссудат) содержит около 97% воды, около 0,7% электролитов и незначительное количество белка (до 3%).

Патологическое скопление жидкости в серозных полостях организма называется водянкой. В зависимости от локализации различают: асцит (водянка брюшной полости), гидроторакс (водянка плевральной полости), гидроперикард (водянка сердечной сорочки), гидроцефалия (водянка желудочков мозга) и гидрартроз (водянка суставной сумки).

Патогенез отёков основан на нарушении факторов транскапиллярного обмена жидкости, описанных в теории Э. Старлинга. В норме в артериальном конце капилляра гидростатическое давление (35–40 мм рт. ст.) превышает онкотическое (22–24 мм рт. ст.), что обеспечивает фильтрацию жидкости в ткани. В венозном конце преобладает онкотическое давление, способствующее реабсорбции жидкости в кровь. Около 10% жидкости удаляется через лимфатическую систему. При нарушении этого баланса возникает отёк.

Ключевые патогенетические механизмы развития отёков включают: повышение гидростатического давления в капиллярах (например, при венозном застое из-за сердечной недостаточности или тромбозе глубоких вен, а также при гиповолемии из-за избыточного потребления соли или почечной недостаточности); снижение онкотического давления плазмы из-за гипопроотеинемии (при нефротическом синдроме с потерей белка с мочой, циррозе печени со снижением синтеза альбумина, голодании или синдроме мальабсорбции); повышение проницаемости сосудистой стенки (при воспалении, аллергических реакциях, токсических поражениях, гипоксии или ацидозе); нарушение лимфооттока (лимфостаз) из-за врождённой гипоплазии лимфатических сосудов, хирургического удаления лимфоузлов, опухолей, сдавливающих лимфатические пути, или паразитарных инвазий (например, филяриоза); задержку натрия и воды почками вследствие активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (при сердечной, печёночной или почечной недостаточности), избыточного потребления соли либо гормональных нарушений (синдром Конна, синдром Кушинга); повышение гидрофильности тканей из-за накопления гликозаминогликанов при гипотиреозе (микседема) или изменения осмотического давления в тканях при воспалении и некрозе; нейроэндокринные нарушения, связанные с дисбалансом антидиуретического гормона и нарушением регуляции водно-солевого обмена [10].

Классификация отёков проводится по нескольким критериям. По локализации выделяют: периферические отёки, локализирующиеся в определённых частях тела (на нижних и верхних конечностях, лице – например, периорбитальные или отёк губ и языка, а также в области туловища); полостные отёки (водянки), представляющие собой скопление жидкости в естественных полостях (асцит в брюшной полости, гидроторакс в плевральной полости, гидроперикард в околосердечной сумке, гидрартроз в суставных полостях); генерализованные отёки (анасарка) – распространённое поражение подкожной клетчатки по всему телу, часто сочетающееся с водянкой полостей. По механизму образования (патогенетическая классификация) различают: гидростатические (застойные) отёки, возникающие из-за повышения гидростатического давления в капиллярах (примеры – сердечные отёки, венозная недостаточность, тромбозы); онкотические отёки, обусловленные снижением онкотического давления плазмы из-за гипопроотеинемии (нефротический синдром, цирроз печени, кахексия); мембраногенные (воспалительные, токсические) отёки, связанные с повышением проницаемости сосудистой стенки (аллергические реакции, инфекции, ожоги, укусы ядовитых животных); лимфогенные (лимфатические) отёки, вызванные нарушением лимфооттока (лимфостаз после мастэктомии, слоновость, врождённая лимфедема); осмотические отёки, развивающиеся при локальном повышении осмотического давления в тканях (синдром цитолиза при повреждении клеток, накопление продуктов метаболизма); эндокринные отёки, связанные с гормональными нарушениями (микседема при гипотиреозе с накоплением гликозаминогликанов в тканях); идиопатические отёки без чётко установленной причины (чаще встречаются у женщин, усиливаются перед менструацией или после употребления солёной пищи); смешанные отёки, сочетающие несколько механизмов (например, анасарка при сердечной недостаточности, где задействованы гидростатический, онкотический и нейроэндокринный механизмы) [4,6].

Этиологическая (клиническая) классификация включает следующие виды отёков:

1. Сердечные отёки возникают при хронической сердечной недостаточности из-за снижения сократительной функции миокарда и повышения венозного давления. Они локализуются симметрично на нижних конечностях – сначала в области лодыжек и голеней, а при прогрессировании распространяются на бёдра, пояснично-крестцовую область и могут приводить к анасарке; в положении лёжа

отёки смещаются в область крестца и поясницы. Динамика их появления постепенная: отёки нарастают в течение дня, особенно после длительного стояния или физической нагрузки, к вечеру становятся более выраженными, а утром после ночного отдыха могут несколько уменьшаться. Сопутствующие симптомы включают одышку (в т.ч. ортопноэ), тахикардию, цианоз кожи и слизистых, набухание шейных вен, гепатомегалию (застойную печень), влажные хрипы в лёгких и снижение диуреза. По характеру такие отёки плотные, при надавливании пальцем остаётся ямка, которая долго не исчезает; кожа над отёчными участками холодная на ощупь, может иметь синюшный оттенок. При длительном существовании сердечных отёков развиваются трофические изменения: гиперпигментация, истончение кожи, возможны трофические язвы.

2. Почечные отёки развиваются при гломерулонефрите, нефротическом синдроме, острой и хронической почечной недостаточности. Первоначально они локализуются на лице – особенно в области век и вокруг глаз (периорбитальные отёки), наиболее заметны утром после пробуждения; при прогрессировании заболевания распространяются на верхние и нижние конечности, туловище. При нефротическом синдроме отёки генерализованы, массивны и могут сопровождаться скоплением жидкости в полостях (плеврит, асцит, перикардит). По внешнему виду почечные отёки мягкие, рыхлые, подвижные при пальпации; кожа над ними бледная, тёплая, гладкая. При надавливании образуется глубокая ямка, быстро восстанавливающаяся после прекращения давления. Сопутствующие признаки включают снижение суточного диуреза, протеинурию (в т.ч. пенистую мочу), гипоальбуминемию, гиперлипидемию, артериальную гипертензию (при гломерулонефрите), слабость и утомляемость.

3. Гипопроотеинемические отёки обусловлены снижением онкотического давления плазмы крови из-за дефицита белков, прежде всего альбуминов. Их причинами могут быть нефротический синдром, цирроз печени с нарушением синтетической функции, синдром мальабсорбции, длительное голодание или тяжёлые воспалительные заболевания кишечника. Локализация таких отёков генерализованная, но особенно выражены они на нижних конечностях, в области живота (асцит при циррозе), иногда – на верхних конечностях и лице. По характеру они мягкие, распространённые, симметричные; кожа истончена и сухая. Часто сочетаются с признаками кахексии или нутритивной недостаточности. Сопутствующие проявления включают снижение уровня общего белка и альбумина в крови; отёки усиливаются при длительном вертикальном положении тела и сочетаются с другими симптомами основного заболевания – например, желтухой, телеангиэктазиями, «головной медузы» при циррозе либо диареей и потерей веса при мальабсорбции.

4. Лимфостаз (лимфедема) представляет собой отёк, вызванный нарушением оттока лимфы. Его причинами могут быть врождённая гипоплазия лимфатических сосудов, хирургическое удаление лимфоузлов (например, после мастэктомии), опухоли, сдавливающие лимфатические пути, паразитарные инвазии (филяриоз), травмы или хронические венозные заболевания. Локализуется лимфостаз чаще односторонне, поражая нижние (реже верхние) конечности, но может возникать на лице или других участках тела – в зависимости от уровня поражения лимфатической системы. Динамика развития медленная, отёки прогрессируют, усиливаются после длительной нагрузки, стояния или в жаркую погоду, слабо уменьшаются или не уменьшаются после ночного отдыха. По характеру отёки плотные, «деревянистые»: при надавливании ямка либо отсутствует, либо быстро исчезает; кожа утолщена, гиперпигментирована, может иметь гиперкератоз и складчатость. В запущенных случаях развивается слоновость – выраженная деформация конечности с папилломатозными разрастаниями. Выделяют три стадии лимфостаза: I – мягкий отёк, уменьшающийся после отдыха; II – плотный, необратимый фиброз тканей; III – слоновость с грубой деформацией.

Помимо перечисленных, существуют и другие виды отёков. Аллергические отёки (в т.ч. отёк Квинке) возникают остро (в течение минут-часов) после контакта с аллергеном, локализуются на лице (губы, веки), слизистой гортани, языке или половых органах. Они плотные, не оставляют ямки при надавливании, сопровождаются зудом, покраснением и крапивницей; особенно опасен отёк гортани, который может привести к удушью. Эндокринные отёки (микседема при гипотиреозе) плотные, слизистые (из-за накопления гликозаминогликанов), не оставляют ямки при надавливании. Локализуются на лице, конечностях и туловище; кожа сухая, холодная, желтоватая. Сочетаются с брадикардией, сонливостью, зябкостью и выпадением волос. Воспалительные отёки локальные и асимметричные, горячие на ощупь, гиперемизированные, болезненные при пальпации, возникают вокруг очага воспаления (травма, инфекция, ожог). Лекарственные отёки развива-

ются на фоне приёма некоторых препаратов (блокаторов кальциевых каналов, эстрогенов, глюкокортикоидов, антидепрессантов), обычно симметричны и локализируются на нижних конечностях; исчезают после отмены препарата. Отеки при тромбозе глубоких вен односторонние, острые и болезненные, кожа над ними гиперемирована и горячая, сопровождается чувством распирания и тяжестью; требуют срочной диагностики из-за риска тромбоэмболии лёгочной артерии. Идиопатические отеки чаще встречаются у женщин молодого возраста, усиливаются перед менструацией или после употребления солёной пищи, локализируются на лице, руках и ногах, мягкие и преходящие, при этом явные причины и органические заболевания отсутствуют [3,7].

Иктеричность (желтуха) и её диагностическое значение

Иктеричность (желтуха, icterus) – симптом, характеризующийся жёлтым окрашиванием кожи, склер и слизистых оболочек вследствие накопления в тканях билирубина. Визуально желтуха становится заметной при повышении концентрации общего билирубина в сыворотке крови свыше 34–35 мкмоль/л, тогда как в норме этот показатель составляет 8,5–20,5 мкмоль/л.

Биохимические основы иктеричности связаны с нарушением метаболизма и выведения билирубина – жёлчного пигмента, образующегося при распаде гемоглобина. Процесс его образования и выведения включает несколько последовательных этапов. Сначала в ретикулоэндотелиальной системе (селезёнке, костном мозге, купферовских клетках печени) происходит распад старых эритроцитов. Гемоглобин расщепляется до гема, затем до биливердина, который восстанавливается до непрямого (неконъюгированного) билирубина. Этот тип билирубина нерастворим в воде и токсичен, поэтому в крови он переносится в комплексе с альбумином. Далее гепатоциты захватывают не прямой билирубин из крови и под действием фермента уридиндифосфоглюкуронилтрансферазы (УДФГТ) связывают его с глюкуроновой кислотой – в результате образуется прямой (конъюгированный) билирубин, водорастворимый и менее токсичный. Затем конъюгированный билирубин секретируется в желчные капилляры и входит в состав желчи. С желчью он поступает в кишечник, где под действием микрофлоры превращается в уробилиноген. Часть уробилиногена реабсорбируется и выводится почками (в виде уробилина мочи), а основная часть окисляется до стеркобилина и выделяется с калом, обеспечивая его нормальную окраску. Нарушение на любом из этих этапов приводит к гипербилирубинемии и развитию желтухи [5,8].

Выделяют три основных типа желтухи в зависимости от уровня нарушения обмена билирубина:

1. Надпечёночная (гемолитическая) желтуха возникает из-за усиленного распада эритроцитов (гемолиза), что приводит к избыточному образованию непрямого билирубина, превышающему возможности печени его конъюгировать. Её механизмы развития включают усиленный гемолиз эритроцитов вследствие наследственных дефектов (сфероцитоз, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы), аутоиммунных гемолитических анемий, малярии, переливания несовместимой крови или воздействия токсинов. В результате печень не успевает конъюгировать весь поступающий не прямой билирубин, что вызывает его накопление в крови, а усиленная продукция прямого билирубина и его выделение в желчь приводят к повышенному образованию уробилиногена и стеркобилина. Лабораторные и клинические признаки такой желтухи включают преобладание непрямого билирубина в крови, тёмный цвет мочи (из-за повышенного уробилина), очень тёмный кал (повышенное содержание стеркобилина), анемию, ретикулоцитоз, повышение ЛДГ, а также часто – спленомегалию. Иктеричность склер и кожи при этом умеренная, лимонно-жёлтого оттенка.

2. Печёночная (паренхиматозная) желтуха обусловлена повреждением гепатоцитов или внутрипечёночных желчных протоков, что нарушает захват, конъюгацию и/или экскрецию билирубина. Механизмы её развития могут быть связаны с повреждением гепатоцитов вирусами (вирусные гепатиты А, В, С, D, Е), алкоголем, токсинами, лекарствами или аутоиммунными процессами. Также к ней приводят снижение активности УДФГТ (например, при синдромах Жильбера, Криглера-Найяра), нарушение транспорта билирубина внутри клетки (синдромы Дабина-Джонсона, Ротора) и внутрипечёночный холестаз (застой желчи в печёночных протоках). Лабораторные и клинические проявления включают повышение как непрямого, так и прямого билирубина (смешанный тип гипербилирубинемии), повышенную активность печёночных ферментов (АЛТ, АСТ). Моча становится тёмной (из-за прямого билирубина и уробилина), кал может быть светлее обычного (из-за снижения стеркобилина), возникает кожный зуд (при холестазах), возможны гепатоспленомегалия, телеангиэктазии, пальмарная эритема. Цвет кожи при такой желтухе – шафраново-жёлтый [5,8].

3. Подпечёночная (механическая, обтурационная) желтуха развивается вследствие нарушения оттока желчи по внепечёночным желчным путям, что приводит к ретроградному поступлению прямого билирубина в кровь. Её механизмы связаны с обструкцией общего желчного протока камнями (холедохолитиаз), опухолями головки поджелудочной железы, большого дуоденального сосочка или желчных протоков, стриктурами, кистами, паразитарными инвазиями (эхинококкоз) либо сдавлением протоков извне. Застой желчи вызывает повышение давления во внутрипечёночных протоках, их разрыв и диффузию прямого билирубина в кровоток. Кожных покровы становятся зеленовато-жёлтыми или тёмно-оливковым цветом. Желтушность нарастает быстро, интенсивность высокая. Склеры интенсивно жёлтые, часто с зеленоватым отливом. Кожа может иметь землистый, тусклый оттенок при длительной обструкции, особенно если причина опухоль. Ключевой симптом выраженный, мучительный кожный зуд, вызванный массивным накоплением солей желчных кислот в коже. В результате возникают множественные расчёсы, экскориации, корочки, линейные ссадины. Следы расчёсов могут инфицироваться и приводить к пиодермии. Наблюдается сухость и шелушение кожи из-за нарушения всасывания жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К). При длительной желтухе развивается атрофия кожи, её истончение и повышенная ранимость. Моча тёмно-коричневая («цвет пива»), пенистая при взбалтывании, а кал – ахоличный (светлый, глинистый) из-за отсутствия стеркобилина. Возможны признаки портальной гипертензии: расширение вен передней брюшной стенки («голова медузы») и отеки нижних конечностей [7,9].

Диагностическое значение иктеричности заключается в том, что она служит важным клиническим маркером патологии гепатобилиарной системы и гемолитических процессов. Тип желтухи можно предположить уже при физикальном осмотре: по цвету кожи (лимонный – при гемолизе, шафрановый – при паренхиматозной, зеленоватый – при механической желтухе), наличию зуда, гепатоспленомегалии, а также по цвету мочи и кала.

Заключение

Значение визуальной диагностики в пропедевтике трудно переоценить. Прежде всего, она выступает первым и важнейшим этапом клинического обследования пациента. На основе данных первичного осмотра врач выстраивает логическую цепочку диагностического поиска: выделяет ключевые симптомы, формулирует дифференциально-диагностический ряд, определяет необходимый объём лабораторных и инструментальных исследований. Важнейшее преимущество метода заключается в его доступности – визуальная диагностика не требует дорогостоящего оборудования и может быть выполнена в любых условиях: от амбулаторного приёма до экстренной ситуации на догоспитальном этапе. Кроме того, она выполняется мгновенно, что критически важно при оказании неотложной помощи, когда каждая секунда может иметь значение. Визуальный осмотр даёт возможность получить целостное представление о состоянии пациента, оценить его общее состояние, уровень сознания, положение тела, выражение лица и другие важные признаки.

Таким образом, визуальная диагностика остаётся быстрым, доступным и информативным инструментом первичного скрининга, который сохраняет свою актуальность в современной медицине. Совершенствование навыков визуального осмотра, учёт этнических особенностей и внедрение цифровых технологий позволят повысить точность диагностики, обеспечить раннее выявление заболеваний и улучшить прогноз для пациентов. Постепенная интеграция инновационных решений в повседневную практику сделает этот метод ещё более объективным и эффективным, сохранив его ключевую роль в системе здравоохранения на долгие годы.

Литература

1. Ивашкин В.Т., Султанов В.К., Драпкина О.М. Пропедевтика внутренних болезней. Практикум: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 400 с.
2. Кузнецов Н.Д., Смирнов А.В. Цифровые технологии в визуальной диагностике: от фотофиксации к ИИ-анализу // Вестник современной клинической медицины. – 2023. – Т. 16, № 4. – С. 78–85.
3. Куница В.Н., Пропедевтика внутренних болезней, как первая клиническая дисциплина / В.Н. Куница, А.А. Шахназаров, В.В. Лудан, О.Д. Воронцова // Образование от «А» до «Я». – № 3, 2025. – С. 62–66.
4. Мухин Н.А., Моисеев В.С. Пропедевтика внутренних болезней: учебник. – 6-е изд., доп. и перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 848 с.
5. Петров В.И., Недогада С.В. Клиническая фармакология и рациональная фармакотерапия: учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. – 576 с.

6. Струтинский А.В., Баранов А.П., Ройтберг Г.Е., Гапоненков Ю.П. Основы семиотики заболеваний внутренних органов: учебное пособие. – 9-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2021. – 304 с.

7. Brown L.M., Chen H.Y., Patel R.S. Ethnic Variations in Skin Color Assessment: Implications for Clinical Diagnosis // *Dermatology Research and Practice*. – 2022. – Vol. 2022. – Article ID 8876543. – 12 p.

8. Bologna J.L., Schaffer J.V., Cerroni L. *Dermatology*. – 4th ed. – Elsevier, 2023. – 1664 p.

9. Krutikov E., Chernukha S., Polskaya L. History of the propedeutics of internal medicine department of the medical academy named after S.I. Georgievsky from the foundation to our days // *Таврический медико-биологический вестник*. – 2022. – Т. 23, № 1. – С. 117–123.

10. Smith E.P., Johnson R.A., Williams D.K. Advances in Visual Diagnostics: Integration of AI and Clinical Practice // *Journal of Medical Imaging and Visualization*. – 2023. – Vol. 12, № 3. – P. 45–58.

11. Harrison's Principles of Internal Medicine / ed. by J.L. Jameson et al. – 21st ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2022.

VISUAL DIAGNOSTICS IN PROPEDEUTICS: WHAT EXTERNAL EXAMINATION CAN REVEAL ABOUT THE STATE OF INTERNAL ORGANS (CYANOSIS, EDEMA, ICTERUS)

Kunitsa V.N., Grigorishina N.E., Karachik E.U.

Order of the Red Banner of Labor, S.I. Georgievsky Medical Institute of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University

The article discusses the role of visual diagnostics in the treatment of internal diseases. The authors analyze how key external signs, such as cyanosis, edema, and icterus, can be used to assess the condition of internal organs and detect pathologies at an early stage. The article provides a detailed explanation of the pathophysiological mechanisms behind each symptom: cyanosis as a marker of gas exchange disorders and cardiovascular insufficiency; edema as a sign of kidney, heart, or protein metabolism disorders; and icterus as a symptom of liver damage and bilirubin metabolism disorders. The features of the examination are described: lighting conditions, the sequence of feature assessment, and the

nuances of interpretation in patients of different ages. The importance of integrating visual data into the overall diagnostic process is emphasized.

Keywords: visual diagnostics, propaedeutics of internal diseases, external examination, physical examination, cyanosis, edema, icterus, clinical signs, pathological symptoms.

References

1. Ivaschenko V.T., Sultanov V.K., Drapkina O.M. *Propedeutics of Internal Diseases. Workshop: Textbook*. – M.: GEOTAR-Media, 2020. – 400 p.

2. Kuznetsov N.D., Smirnov A.V. Digital Technologies in Visual Diagnostics: From Photofixation to AI-Analysis // *Bulletin of Modern Clinical Medicine*. – 2023. – Vol. 16, № 4. – Pp. 78–85.

3. Kunitsa V.N., Propaedeutics of Internal Diseases as the First Clinical Discipline / V.N. Kunitsa, A.A. Shahnazarov, V.V. Ludan, O.D. Vorontsova // *Education from A to Z*. № 3, 2025. – P. 62–66.

4. Mukhin N.A., Moiseev V.S. *Propedeutics of Internal Diseases: Textbook*. – 6th ed., add. and revised. – M.: GEOTAR-Media, 2022. – 848 p.

5. Petrov V.I., Nedogoda S.V. *Clinical Pharmacology and Rational Pharmacotherapy: Textbook for Universities*. – 3rd ed., revised. and add. – Moscow: GEOTAR-Media, 2023. – 576 p.

6. Strutynsky A.V., Baranov A.P., Roitberg G.E., Gaponenkov Yu.P. *Fundamentals of the Semiotics of Internal Organ Diseases: A Textbook*. – 9th ed. – Moscow: MEDpress-inform, 2021. – 304 p.

7. Brown L.M., Chen H.Y., Patel R.S. Ethnic Variations in Skin Color Assessment: Implications for Clinical Diagnosis // *Dermatology Research and Practice*. – 2022. – Vol. 2022. – Article ID 8876543. – 12 p.

8. Bologna J. L., Schaffer J.V., Cerroni L. *Dermatology*. – 4th ed. – Elsevier, 2023. – 1664 p.

9. Krutikov E., Chernukha S., Polskaya L. History of the propedeutics of internal medicine department of the medical academy named after S.I. Georgievsky from the foundation to our days // *Tavrichesky medico-biological bulletin*. – 2022. – Т. 23, № 1. – С. 117–123.

10. Smith E. P., Johnson R.A., Williams D.K. Advances in Visual Diagnostics: Integration of AI and Clinical Practice // *Journal of Medical Imaging and Visualization*. – 2023. – Vol. 12, № 3. Pp. 45–58.

11. Harrison's Principles of Internal Medicine / ed. by J.L. Jameson et al. 21st ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2022.

Гусниев Абдурагим Магомед-Загирович,

к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней им. акад. Г.П. Руднева
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: a.gusniev@icloud.com

Магомедова Наида Абдулхаликовна,

ассистент кафедры социальной гигиены, организации надзора с курсом
лабораторной диагностики ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: Khirasulova@mail.ru

Даниялбекова Заира Мутагировна,

к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней им. акад. Г.П. Руднева
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: zairad05@mail.ru

Джанмурзаева Асият Магомедовна,

ассистент кафедры инфекционных болезней им. акад. Г.П. Руднева
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: askamed321@mail.ru

Сааева Нашхо Мухтаровна,

к.м.н., ассистент кафедры инфекционных болезней им. акад. Г.П. Руднева
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: Saaeva64@mail.ru

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 в форме субварианта «Стратус XFG» («Омикрон») продолжает циркулировать в Республике Дагестан в 2025 г., демонстрируя высокую заразительность, способность к иммуноускользанию и высокую тропность к эпителию верхних дыхательных путей. Эволюция COVID-19 отражает глобальные тренды: от круглогодичной пандемии к сезонной ОРВИ-подобной инфекции. В данной статье авторами представлена эпидемиологическая характеристика, основные симптомы, осложнения, методы диагностики, лечения COVID-19 в форме нового субварианта «Стратус XFG» («Омикрон»)

Ключевые слова: Стратус XFG, омикрон, COVID-19, эпидемиология, республика Дагестан.

Актуальность

Новая коронавирусная инфекция COVID-19, впервые обнаруженная 5 лет назад, продолжает эволюционировать. Новый вариант SARS-CoV-2, получивший название «Стратус XFG», является «потомком» варианта «Омикрон». «Стратус» отличается высокой заразительностью и быстро распространяется по всему миру. Его способность к распространению превышает заразительность всех до того известных штаммов коронавируса. С середины 2025 года он активно выявлялся и в России. Лидером по выявляемости «Стратус XFG» была Москва. Нет никакого сомнения, что этот вариант «Омикрона» распространен и в Республике Дагестан. В настоящее время Дагестан является очень привлекательным туристическим городом, куда летом прибывают миллионы туристов со всей России. Пока нет достоверных данных о том, что «Стратус» вызывает более тяжелую болезнь, чем другие варианты «Омикрона». Вакцины, по предварительным данным, все еще работают и против этого штамма. При этом новый вирус весьма хорошо приспособлен к существованию в человеческом организме. Одна из важных его характеристик – это иммунное ускользание. Из-за мутационных изменений в структуре вируса человеческий организм после прошлой болезни или «старой» вакцины может распознавать его не полностью. Поэтому повторные заражения происходят все чаще, хотя обычно болезнь протекает легче. Именно этим объясняется феномен многократных повторных заражений.

Современное течение болезни

Симптомы «Стратус XFG» похожи на обычную простуду. Как правило, болезнь протекает легко или умеренно, без признаков тяжелого течения. В подавляющем числе случаев данный вариант вызывает легкое течение заболевания, поэтому обследуют только тех, кто обратился за медицинской помощью. Большинство людей полагают, что переносят обычную простуду, и просто отлеживаются дома. Уже точно установлено, что грипп пациенты переносят тяжелее, чем новый вариант «Омикрона». Например, за 2025 год в реанимационном отделении Республиканского центра инфекционных болезней умерло 6 пациентов с диагнозом грипп и 1 с диагнозом ковид-19. Смерть от ковида была обусловлена тяжелым преморбидным фоном пациентки. Однако, грипп, это сезонное заболевание, а Ковид-19 круглогодичное, а это уже проблема. Ковид в первые годы пандемии не только вытеснил грипп из его привычного осенне-зимнего сезона, но и свел его до самых низких показателей. Результаты проведенного анализа показали, что по Российской Федерации в целом подъем заболеваемости COVID-19 начался в 2020 г. и достиг максимума к 2022 г. При этом динамика заболеваемости гриппом в 2021–2022 гг. имела обратную COVID-19 тенденцию, т.е. произошло заметное снижение гриппа (рис. 1). Минимальная заболеваемость гриппом регистрировалась в 2021 г.

Динамика заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ с 2019 по 2023 гг в России. (рис. 1)




Рис. 1.

По данным Дагестанского Центра Гигиены и Эпидемиологии коронавирус в начале эпидемии масштабно охватил все времена года (весну, лето, осень и зиму), примерно в равной степени (табл. 1).

Таблица 1. Ежемесячная динамика заболеваемости COVID-19 за 2021 год в Республике Дагестан

Контингенты	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Все жители	5869	2767	3175	2557	2497	7433	19712	21774	9538	10544	10692	8319	104877
	190,2	89,66	102,9	82,85	80,91	240,8	638,7	705,5	309,1	341,6	346,4	269,6	3398,2
Взрослые с 18 лет	5708	2649	3007	2448	2364	7021	18486	19933	8458	9331	9540	7449	96394
	259,3	120,3	136,6	111,2	107,4	319,0	839,8	905,5	384,2	423,9	433,4	338,4	4379,1
До 17 лет	161	118	168	109	133	412	1226	1841	1080	1213	1152	870	8483
	18,19	13,33	18,98	12,32	15,03	46,55	138,5	208,0	122,0	137,1	130,2	98,30	958,5

Таблица 2. Ежемесячная динамика заболеваемости COVID-19 за 2025 год по РД

Контингенты	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Все жители	40	82	69	42	31	10	41	43	113	50	43	31	595
	1,25	2,55	2,15	1,31	0,97	0,31	1,28	1,34	3,52	1,56	1,34	0,97	18,54
Взрослые с 18 лет	32	62	46	35	20	7	28	35	92	38	29	21	445
	1,39	2,69	1,99	1,52	0,87	0,30	1,21	1,52	3,98	1,65	1,26	0,91	19,27
До 17 лет	8	20	23	7	11	3	13	8	21	12	14	10	150
	0,89	2,22	2,55	0,78	1,22	0,33	1,44	0,89	2,33	1,33	1,55	1,11	16,65

Таблица 3. Ежемесячная динамика заболеваемости ковиднымпневмониями в Республике Дагестан за 2025 г

Контингенты	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Все жители	12	24	18	8	7	3	4	3	9	12	7	107
	0,37	0,75	0,56	0,25	0,22	0,09	0,12	0,09	0,28	0,37	0,22	3,33
Взрослые с 18 лет	9	18	9	6	5	2	2	1	9	10	5	76
	0,39	0,78	0,39	0,26	0,22	0,09	0,09	0,04	0,39	0,43	0,22	3,29
До 17 лет	3	6	9	2	2	1	2	2		2	2	31
	0,33	0,67	1,00	0,22	0,22	0,11	0,22	0,22		0,22	0,22	3,44

Однако с течением времени ситуация стала меняться и инфекция начала преобладать в осенне-зимнее время (табл. 2.)

Как видно из таблицы 2, при общем количестве 595 заболевших в течение 2025 года на осенне-зимнее время года пришлось 359 случаев, что составляет 60%. А в 2021 году при общем количестве заболевших 104487 в осенне-зимний период переболели ковидом – 47 729 пациентов (45%). Кроме того, частота пневмоний в большом количестве, выявлявшаяся в начале ковидной пандемии, в настоящее время (2025 г.) значительно уменьшилась (табл. 3).

Как видно из таблиц 2 и 3, болезнь по– прежнему активно выявляется во все сезоны года, но с нарастанием в осенне-зимний период. При этом важно отметить снижающуюся по годам динамику заболеваемости ковидом за 2023г (2443), 2024г (1294) и 2025 г (595) случаев соответственно. Одновременно с этим снижалось и число выявленных пневмоний за те же годы: 2023 (418), 2024 (204) и 2025 (107) соответственно. Однако, учитывая, что заразительность нового штамма больше, чем способность к передаче вируса предыдущими вариантами ковид-19, то вряд ли можно предполагать снижения темпа общей заразительности. Легкое течение инфекции снижает частоту обраще-

сти населения за медицинской помощью. Люди в большинстве случаев переносят «Стратус» на ногах или лечатся амбулаторно на дому, а регистрация заболевания проводится лишь при госпитализации в стационар с средне-тяжелым и тяжелым течением болезни.

В соотношении города Дагестана и сельские районы кратно преобладают горожане. Это и понятно: в городах больше плотность населения и лучше условия для диагностики: всего – 595 зарегистрированных случаев заболевания, из них города – 482, сельские районы – 113. Более половины случаев заболевания COVID-19 «Статус» приходилось на г. Махачкалу – 351. По возрастным категориям: всего зарегистрировано– 595 больных, из них взрослые от 18 лет и старше – 445, дети до 17 лет – 150. То есть, как и в прежние годы среди заболевших значительно преобладает взрослое население – почти 75%.

Как известно, «Стратус» обладает тропностью к эпителию верхних дыхательных путей и в основном размножается в носоглотке и гортани. Это является главной причиной того, почему он редко вызывает вирусные пневмонии, характерные для коронавирусных штаммов «альфа» и «дельта», но зато вызывает симптомы, напоминающие ОРВИ (табл. 4).

Таблица 4. Характеристика некоторых штаммов коронавирусной инфекции

Характеристика	Штамм «Дельта» (2021)	Исходный «Омикрон»	Штамм «Стратус» (2025)
Основная мишень	Нижние дыхательные пути (легкие)	Верхние дыхательные пути	Верхние дыхательные пути (гортань)
Типичные симптомы	Лихорадка, кашель, одышка, потеря обоняния	Насморк. Боль в горле, чихание, слабость	Боль в горле, осиплость или потеря голоса, насморк, умеренная температура
Риск пневмонии	Высокий	Умеренный	Низкий (у привитых) или без хронических патологий)
Скорость распространения	Высокая	Очень высокая	Чрезвычайно высокая
Инкубационный период	4–6 дней	2–4 дня	1–3 дня

Наиболее характерные проявления «Стратуса» – это осиплость, хрипота или временная потеря голоса. Этот симптомокомплекс появляется на 2–3 день заболевания и долго продолжается, наряду с кашлем. Температура при «Стратусе» обычно невысокая или в пределах нормы или субфебрильная. Длится примерно 1–2 дня. Инкубационный период короче, чем у других вариантов коронавируса. От момента заражения до появления первых симптомов проходит 1–3 дня. В среднем ковид –«Стратус»» длится около недели, но сухой кашель и осиплость – могут сохраняться еще до двух недель. Штамм «Стратус» окончательно закрепил тенденцию, заданную «Омикроном»: вирус стал похож на обычные вирусы, вызывающие ОРВИ. Его главная «цель» – не убить хозяина, а максимально эффективно распространиться. Также для него характерно отсутствие массивного поражения легких. Однако у больных с ослабленным иммунитетом и множеством сопутствующих заболеваний имеется тенденция к осложненному течению инфекции с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, пневмонии и тромбозов.

Таким образом, чрезвычайно высокая заразительность «Стратуса» и некоторые уязвимые контингенты людей по-прежнему создают нагрузку на систему здравоохранения.

Лабораторная диагностика

Стандартные ПЦР и антигенные тесты эффективно обнаруживают «Стратус» XFG, поскольку он является разновидностью «Омикрона». Поэтому, для определения штамма вируса используют: ПЦР и экспресс-тесты, которые позволяют определить наличие РНК вируса SARS-CoV-2 (т.е. все виды известных штаммов коронавируса) в мазке со слизистой носа и ротоглотки. Эти тесты по настоящее время остаются основным методом лабораторной диагностики COVID-19.

Лечение и профилактика

Основой терапии варианта «Стратус» остаются жаропонижающие препараты, средства от кашля, интраназальный альфа-интерферон, обильное питье и отдых. При более тяжелых формах требуется индивидуальный подбор лечения с назначением противовирусных средств и по показаниям антибиотиков, антикоагулянтов, глюкокортикостероидов, ингибиторов интерлейкинов. Из противовирусных средств прямого действия по-прежнему рекомендуют назначать умифеновир, фавипиравир, молнупиравир и ремдесивир. Вакцинация сейчас в России добровольная и показана людям старше 65 лет с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Заключение

Вирус «Стратус XFG» обладает преимущественной тропностью к эпителию верхних дыхательных путей и протекает с клинической картиной фарингита, ларингита и синусита. Современный ковид-19 у людей со здоровой иммунной системой, как правило, не имеет тяжелых форм.

Можно выделить 5 основных характеристик, определяющих заболеваемость и распространенность данного вируса в настоящее время:

1. Постепенное формирование сезонности COVID-19 с учащением заболеваемости в осенне-зимний период.

2. Тропность к верхним дыхательным путям: пневмонии возникают намного реже.

3. Преимущественно легкое течение болезни, в большинстве случаев не требующее назначения специфических препаратов и антибиотиков. Лечение в основном симптоматическое.

4. Основной контингент заболевших – это взрослые городские жители.

5. Стандартные лабораторные исследования, применяемые на предыдущие штаммы ковид-19 эффективно распознают новый вариант Омикрона «Стратус».

Литература

1. Клинические рекомендации. Коронавирусная инфекция COVID-19. Разработчики: Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского. 2025 г.

2. Яковлев А.А., Шафигулин А.В., Попов А.Ф. и др. Динамика эпидемического процесса COVID-19 и других ОРВИ на Российском Дальнем Востоке (2019–2023 гг.). Журнал Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2025;24(1):18–30.

3. Национальное руководство «Инфекционные болезни», выпущенное в 2023 году издательством «ГЭОТАР-Медиа». Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я., Авдеева М.Г.

4. Попова А.Ю. Роспотребнадзор: данные о циркуляции варианта XFG («Стратус») в России (июль-август 2025). Российская газета. 2025.

5. Минздрав РФ. Временные методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (версия 19). 2025.

NEW ON COVID-19 IN 2025 IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Gusniev A.M. -Z., Magomedova N.A., Daniyalbekova Z.M., Dzhannurzeva A.M., Saayeva N.M.

Dagestan State Medical University

The novel coronavirus infection [COVID-19 in the form of the "Stratus XFG" subvariant ("Omicron")] continues to circulate in the Republic of Dagestan in 2025, demonstrating high contagiousness, immune evasion capability, and strong tropism for the epithelium of the upper respiratory tract. The evolution of COVID-19 reflects global trends: from a year-round pandemic to a seasonal ARVI-like infection. This article presents the epidemiological characteristics, main symptoms, complications, diagnostic methods, and treatment of COVID-19 in the form of the new "Stratus XFG" ("Omicron") subvariant.

Keywords: Stratus XFG, Omicron, COVID-19, epidemiology, Republic of Dagestan.

References

1. Clinical Guidelines. Coronavirus Infection COVID-19. Developers: National Association of Infectious Disease Specialists named after Academician V.I. Pokrovsky. 2025.

2. Yakovlev A.A., Shafigullin A.V., Popov A.F., et al. Dynamics of the COVID-19 epidemic process and other ARVI in the Russian Far East (2019–2023). Journal of Epidemiology and Vaccinoprophylaxis. 2025;24(1):18–30.

3. National Guide "Infectious Diseases", published in 2023 by GEOTAR-Media. Yushchuk N.D., Vengerov Yu.Ya., Avdeeva M.G.

4. Popova A. Yu. Rosпотребнадзор: data on the circulation of the XFG ("Stratus") variant in Russia (July–August 2025). Rossiyskaya Gazeta. 2025.

5. Ministry of Health of the Russian Federation. Interim Methodical Recommendations on Prevention and Treatment of COVID-19 (version 19). 2025.

Клинико-лабораторная характеристика заболеваний пародонта у подростков с сахарным диабетом 1-го типа

Есиев Руслан Казбекович,

кафедра стоматологии № 2 (Владикавказ), Северо-Осетинская государственная медицинская академия

Узденов Имран Рустамович,

Медицинский институт, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказская государственная академия»
E-mail: imranuzdenov7777@gmail.com

Хасянова Зифа Маратовна,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
E-mail: zifa-xasyanova@mail.ru

Пестова Алина Николаевна,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
E-mail: Pestooova21@gmail.com

Романова Мария Владимировна,

6 курс, ПИМУ
E-mail: masharomanova101212@mail.ru

Сахарный диабет 1-го типа занимает особое место среди хронических аутоиммунных заболеваний детского возраста: именно педиатрическая и подростковая популяция несёт основное бремя этой патологии, а глобальная заболеваемость неуклонно нарастает. Среди органов-мишеней хронической гипергликемии пародонт рассматривается как шестое по значимости осложнение диабета, однако в клинической педиатрической практике эта взаимосвязь по-прежнему недооценивается.

Ключевые слова: сахарный диабет 1-го типа, аутоиммунные заболевания, пародонт

Введение

Сахарный диабет 1-го типа занимает особое место среди хронических аутоиммунных заболеваний детского возраста: именно педиатрическая и подростковая популяция несёт основное бремя этой патологии, а глобальная заболеваемость неуклонно нарастает [1, 2]. Среди органов-мишеней хронической гипергликемии пародонт рассматривается как шестое по значимости осложнение диабета, однако в клинической педиатрической практике эта взаимосвязь по-прежнему недооценивается [3, 4].

Патогенетическая цепочка между гипергликемией и поражением пародонта реализуется через несколько взаимосвязанных механизмов. Накопление конечных продуктов неферментативного гликирования (КПГ) и их взаимодействие с рецепторами RAGE обуславливает хроническую гиперпродукцию провоспалительных цитокинов – ФНО-α и ИЛ-1β [5]. Параллельно угнетается функциональная активность нейтрофилов в десневой борозде, что создаёт предпосылки для формирования дисбиоза субгингивальной микрофлоры [6]. Возникающий порочный круг – системное воспаление потенцирует пародонтальную деструкцию, а хронический очаг инфекции в полости рта, в свою очередь, усиливает инсулинорезистентность – подробно описан для взрослой популяции [7, 8], тогда как у подростков с СД1 патогенетические особенности этого взаимодействия изучены значительно хуже [9, 10].

Ключевым нерешённым вопросом остаётся следующий: каков характер пародонтальной патологии на начальных этапах диабетического поражения – реализуется ли оно как агрессивный гингивит или уже в подростковом возрасте формируется ранний пародонтит с потерей клинического прикрепления? Ответ на этот вопрос принципиален для определения сроков и методов превентивного вмешательства.

Цель исследования – провести комплексную сравнительную оценку клинических, микробиологических и биохимических характеристик тканей пародонта у подростков с СД1, их здоровых сверстников и подростков с пародонтитом, ассоциированным с локальными факторами.

Задачи:

1. сравнить клинические индексы пародонта между группами;
2. количественно охарактеризовать пародонтопатогенный микробиом;
3. оценить профиль биохимических маркёров воспаления и костного ремоделирования в ротовой жидкости;
4. установить взаимосвязи между показателями компенсации диабета (HbA1c) и параметрами пародонтального воспаления.

Материал и методы

Поперечное сравнительное исследование проведено на клинической базе факультета педиатрии ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России (Владикавказ) в марте–октябре 2025 г. Протокол соответствует принципам Хельсинкской декларации [11]. Письменное информированное согласие получено от участников старше 15 лет; от родителей/законных представителей – при включении детей младше 15 лет с учётом волеизъявления несовершеннолетнего.

Характеристика групп

В исследование включены 180 подростков 12–18 лет (Me возраста – 15,2±1,8 года). Критерии формирования групп представлены в таблице 1.

Группа 1 (*условно здоровые*, n=80) – лица без системных заболеваний, влияющих на пародонт; состояние пародонта расценивалось как здоровое или соответствующее лёгкому катаральному гингивиту.

Группа 2 (*СД1*, n=80) – верифицированный диагноз СД1 давностью ≥1 года, постоянная инсулинотерапия, наблюдение в Республиканском эндокринологическом центре. Критерий включения: HbA1c <8,5% – для обеспечения однородности по степени компенсации и исключения влияния декомпенсации на результаты [12]. Пациенты с пролиферативной ретинопатией и нефропатией на стадии ХБП не включались.

Группа 3 (*пародонтит*, n=20) – подростки без СД и значимой соматической патологии с клинической картиной генерализованного лёгкого или среднетяжёлого пародонтита на фоне неудовлетворительной

гигиены и множественного кариеса. Группа служила референсной моделью локально индуцированного воспаления.

Общие критерии исключения: несъёмная ортодонтическая аппаратура; приём антибиотиков или НПВП в течение предшествующих 3 месяцев; отказ от участия.

Клиническое обследование

Обследование проводил один откалиброванный специалист ($\kappa > 0,85$) с использованием зонда PCPUNC 15 (Hu-Friedy, США). Регистрировали: индекс зубного налёта Silness–Löe (PI); индекс кровоточивости при зондировании (BOR, %); папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (ПМА) в модификации Parma; глубину зондирования (PPD) и уровень клинического прикрепления (CAL) в шести точках каждого зуба.

Лабораторные методы

Ротовая жидкость собиралась утром натошак методом сплёвывания в течение 5 мин; после центрифугирования супернатант хранился при -70°C . Концентрации ИЛ-1 β , ММП-8 и остеопротегерина (ОПГ) определяли методом ИФА (наборы «ИЛ-1 β », ММП-8-, Остеопротегерин-ИФА-БЕСТ», Вектор-Бест, Россия).

Микробиологический соскоб из десневой борозды / пародонтального кармана забирали стерильным бумажным штифтом № 30 (экспозиция 20 с). ДНК экстрагировали набором «ДНК-сорб-В» (Ампли-Сенс, Россия). Количественную ПЦР-РВ выполняли на амплификаторе «Rotor-Gene Q» (Qiagen, Германия) с использованием набора «Ампли-Сенс® Пародонт-скрин-FL» (ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора); определяли абсолютные концентрации *P. gingivalis* (Pg), *T. forsythia* (Tf), *T. denticola* (Td) и *A. actinomycetemcomitans* (Aa) в копиях/мл.

Статистическую обработку выполняли в IBM SPSS Statistics 26.0. Количественные данные представлены как Ме [Q25; Q75]. Межгрупповые сравнения – критерий Краскела–Уоллиса с попарным апостериорным тестом Данна (поправка Бонферрони). Категориальные переменные – критерий χ^2 . Силу ассоциаций оценивали коэффициентом ранговой корреляции Спирмена (ρ). Порог статистической значимости – $p < 0,05$.

Результаты

Клинико-демографическая характеристика групп

Группы не различались по возрасту и половому составу ($p > 0,05$) (табл. 1). HbA1c в группе СД1 был закономерно выше при нормальных значениях в группах 1 и 3. Уровень гигиены последовательно снижался от группы 1 к группе 3.

Таблица 1. Исходная характеристика участников (Ме [Q25; Q75])

Греческий алфавит

Показатель	Гр. 1 (здоровые, n=80)	Гр. 2 (СД1, n=80)	Гр. 3 (пародонтит, n=20)	p
Возраст, лет	15,0 (13,0; 16,8)	15,0 (14,0; 17,0)	16,0 (14,0; 17,0)	0,128*
Мужской пол, n (%)	42 (52,5)	38 (47,5)	11 (55,0)	0,741**
HbA1c, %	5,3 (4,9; 5,3)	7,3 (4,0; 7,9)	5,2 (5,0; 5,4)	<0,001*
Длительность СД1, лет	—	5,8 (3,2; 6,1)	—	—
PI, баллы	0,0 (0,0; 1,1)	1,5 (1,1; 1,9)	2,3 (1,9; 2,6)	<0,001*

Состояние тканей пародонта

Несмотря на сопоставимый с группой здоровых уровень гигиены, у подростков с СД1 выявлено выраженное гингивальное воспаление BOR в группе 2 был в 2,5 раза выше контрольного значения и не отличался от группы 3 ($p > 0,05$ при попарном сравнении). Принципиально важно, что CAL в группе СД1 статистически не отличался от нуля и был значительно ниже, чем в группе пародонтита, что свидетельствует об отсутствии деструктивного компонента и соответствует картине тяжёлого генерализованного гингивита.

Биохимические маркёры ротовой жидкости

Концентрация ИЛ-1 β у подростков с СД1 была наибольшей среди всех трёх групп и превышала уровень в группе пародонтита (табл. 2). Это указывает на то, что системный провоспалительный фон при диабете превосходит по интенсивности локальное воспаление, индуцированное бактериальным фактором. ММП-8 достигала максимума в группе пародонтита, коррелируя с CAL. Содержание ОПГ закономерно снижалось от группы здоровых к группе пародонтита, сигнализируя о прогрессивном истощении антирезорбтивной защиты уже при СД1.

Таблица 2. Биохимические маркёры в ротовой жидкости (Ме [Q25; Q75])

Биомаркер	Гр. 1 (здоровые, n=80)	Гр. 2 (СД1, n=80)	Гр. 3 (пародонтит, n=20)	p*
ИЛ-1 β , пг/мл	25,5 (18,0; 35,2)	65,8 (45,1; 96,0)	55,3 (40,0; 73,6)	<0,001
ММП-8, пг/мл	45,0 (30,0; 62,0)	85,0 (50,0; 120,0)	180,0 (135,0; 230,0)	<0,001
ОПГ, пмоль/л	8,5 (6,0; 10,5)	6,0 (4,5; 7,5)	4,2 (3,0; 5,5)	<0,001

Примечание – критерий Краскела–Уоллиса. Жирным – значимые отличия от группы 1.

Корреляционный анализ

Корреляционные взаимосвязи в группе СД1 представлены в таблице 3. Уровень HbA1c продемонстрировал прямые связи умеренной силы с индексом BOR и концентрацией ИЛ-1 β . Длительность заболевания ассоциировалась с накоплением Tf и Td независимо от текущего уровня гигиены, что может отражать долгосрочное влияние диабета на формирование субгингивального микробиома.

Таблица 3. Корреляции (ρ Спирмена) ключевых показателей в группе СД1 (n=80)

Показатель 1	Показатель 2	ρ	p
HbA1c	BOR, %	0,47	<0,001
HbA1c	ИЛ-1 β в слюне	0,52	<0,001
HbA1c	ММП-8 в слюне	0,28	0,012
Длительность СД1	T. forsythia	0,31	0,005
Длительность СД1	T. denticola	0,26	0,021
PI (гигиена)	P. gingivalis	0,38	<0,001
BOR, %	ИЛ-1 β в слюне	0,51	<0,001

Обсуждение

Совокупность полученных данных позволяет охарактеризовать пародонтальный статус подростков с СД1 как качественно самостоятельный клинико-патогенетический феномен, отличный от обеих групп сравнения.

Клинический профиль: воспаление без деструкции. Сочетание высокого BOR (25,0%) с нулевым медианным CAL формирует картину тяжёлого генерализованного гингивита, не переходящего в деструктивный пародонтит. Эта закономерность согласуется с данными о том, что в подростковом возрасте диабетическое поражение пародонта реализуется преимущественно через сосудисто-воспалительные механизмы [13, 14]. Вместе с тем увеличение PPD до 2,5 мм на фоне нормального CAL свидетельствует о начальном патологическом карманообразовании – преддеструктивном состоянии, требующем активного превентивного вмешательства [15].

Роль системного воспаления. Концентрация ИЛ-1 β в слюне подростков с СД1 (65,8 пг/мл) превышала аналогичный показатель группы пародонтита (55,3 пг/мл), несмотря на значительно меньший объём деструкции тканей. Данное несоответствие между интенсивностью биохимического воспаления и клинической картиной свидетельствует о том, что в группе СД1 ведущим источником провоспалительных медиаторов служит не столько субгингивальная микробная биоплёнка, сколько системный метаболический дисбаланс, индуцированный хронической гипергликемией [16, 17]. Корреляция HbA1c с ИЛ-1 β ($p = 0,52$) убедительно подкрепляет эту концепцию: степень гликемической нагрузки напрямую определяет интенсивность провоспалительного сигнала в пародонте.

Микробиологический дисбиоз как вторичный феномен. Уровень P. gingivalis в группе СД1 был в 11,6 раза выше контрольного, однако оставался в 7,8 раза ниже показателей манифестного пародонтита. Корреляция длительности диабета с накоплением Tf и Td при отсутствии таковой с клиническими индексами указывает на то, что хроническая метаболическая дисфункция постепенно смещает состав субгингивального микробиома в сторону большей патогенности независимо от уровня гигиены [18]. Таким образом, микробиологический сдвиг при СД1 следует рассматривать не как первопричину, а как усиливающий фактор системно обусловленного воспаления.

Дефицит остеопротегерина как предиктор будущей деструкции. Снижение ОПГ в слюне пациентов с СД1 (6,0 пмоль/л против 8,5 пмоль/л в норме) при отсутствии клинически значимой потери прикрепления свидетельствует о доклиническом истощении системы RANK/RANKL/OPG [19, 20]. Это создаёт биологические предпосылки для ускоренной костной резорбции при увеличении микробной нагрузки или ухудшении гликемического контроля в дальнейшем.

Гликемический контроль как центральная детерминанта пародонтального здоровья. Корреляция HbA1c с BOR ($p = 0,47$; $p < 0,001$) воспроизводит на подростковой выборке закономерность, ранее описанную для взрослых пациентов: каждый процентный пункт прироста HbA1c

ассоциирован с увеличением риска прогрессирования пародонтита на 20–30% [12]. Это означает, что оптимизация гликемического контроля сама по себе является значимой мерой профилактики стоматологических осложнений.

Заключение

Проведённое исследование впервые на российской когорте подростков с СД1 продемонстрировало специфический клинко-патогенетический профиль поражения пародонта: интенсивное гингивальное воспаление (ВОР 25,0%, превышение контроля в 2,5 раза) при сохранном пародонтальном прикреплении (CAL 0,0 мм). В основе этого феномена лежит системный провоспалительный статус, индуцированный гипергликемией, — на что указывает более высокая концентрация ИЛ-1 β в слюне (65,8 пг/мл) по сравнению с группой классического пародонтита (55,3 пг/мл) при значительно меньшей бактериальной нагрузке. Микробиологический дисбиоз пародонта играет роль усиливающего, но не пускового механизма.

Клинически значимым является установленная корреляция качества гликемического контроля (HbA1c) с интенсивностью воспаления ($p=0,47-0,52$), а также доклиническое снижение ОПГ, сигнализирующее о формировании предпосылок к будущей костной деструкции. Совокупность этих данных обосновывает следующие практические рекомендации:

- обязательный пародонтальный скрининг не реже 1 раза в 6 месяцев в рамках диспансерного наблюдения у эндокринолога;
- профессиональная гигиена и индивидуальная мотивация как компонент протокола управления диабетом;
- оценка ОПГ ротовой жидкости в качестве перспективного неинвазивного предиктора пародонтальной деструкции у данной группы пациентов.

Стоматологическое здоровье должно рассматриваться как интегральная составляющая качества жизни и долгосрочного прогноза у пациентов с дебютом СД1 в детском возрасте.

Литература

1. Grabia M, Markiewicz-Żukowska R, Socha K. Prevalence of metabolic syndrome in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus and possibilities of prevention and treatment: a systematic review. *Nutrients*. 2021;13(6):1782. doi:10.3390/nu13061782
2. Bell KJ, Lain SJ. The changing epidemiology of type 1 diabetes: a global perspective. *Diabetes Obes Metab*. 2025;27 Suppl 6:3–14. doi:10.1111/dom.16501
3. Vlachou S, Loumé A, Giannopoulou C, Papathanasiou E, Zekeridou A. Periodontal disease and type 1 diabetes mellitus: a review. *Int J Mol Sci*. 2024;25(13):7299. doi:10.3390/ijms25137299
4. Reddy M, Gopalkrishna P. Type 1 diabetes and periodontal disease: a literature review. *Can J Dent Hyg*. 2022;56(1):22–30.
5. Shcherba V, Krynytska I, Marushchak M, Korda M. Thyroid dysfunction and inflammatory mediators in periodontitis. *Endocr Regul*. 2021;55(3):131–41. doi:10.2478/enr-2021-0014
6. Yanko NV, Kaskova LF, Kulai OO, Khmil OV, Novikova SC. Neutrophil activities in adolescents with type 1 diabetes. *Wiad Lek*. 2022;75(11 Pt 2):2826–30. doi:10.36740/WLek202211217
7. Herrera D, Sanz M, Shapira L, Brotons C, Chapple I, Frese T, et al. Periodontal diseases and systemic diseases: consensus report summary. *Eur J Gen Pract*. 2024;30(1):2320120. doi:10.1080/13814788.2024.2320120
8. Zhao M, Xie Y, Gao W, Li C, Ye Q, Li Y. Diabetes mellitus and susceptibility to periodontitis. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023;14:1192625. doi:10.3389/fendo.2023.1192625
9. Chakraborty P, Chowdhury R, Bhakta A, Mukhopahyay P, Ghosh S. Microbiology of periodontal disease in adolescents with type 1 diabetes. *Diabetes Metab Syndr*. 2021;15(6):102333. doi:10.1016/j.dsx.2021.102333
10. D'Agostino S, Valentini G, Dolci M. Interleukin levels in type 1 diabetes and periodontitis. *Children (Basel)*. 2024;11(2):238. doi:10.3390/children11020238
11. World Medical Association. Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research. *JAMA*. 2025;333(1):71–4. doi:10.1001/jama.2024.21972
12. Chen YF, Zhan Q, Wu CZ, Yuan YH, Chen W, Yu FY, et al. HbA1c and periodontal therapy outcomes. *Diabetes Ther*. 2021;12(5):1249–78. doi:10.1007/s13300-021-01000-6
13. Costa R, Ríos-Carrasco B, Monteiro L, López-Jarana P, Carneiro F, Relvas M. Association between type 1 diabetes mellitus and periodontal diseases. *J Clin Med*. 2023;12(3):1147. doi:10.3390/jcm12031147
14. Ferizi-Shabani L, Mrasori S, Ferizi V, Barku G, Gjocaj M, Krasniqi B, et al. Dental and periodontal status in children with type 1 diabetes mellitus. *Georgian Med News*. 2024;(352–353):208–12.

15. Saotome M, Kuraji R, Numabe Y. Hyperglycemia exacerbates periodontal destruction. *J Periodontol Res*. 2025;60(6):590–603. doi:10.1111/jre.13366
16. Agho ET, Owotade FJ, Kolawole BA, Oyetola EO, Adedjeji TA. Salivary inflammatory biomarkers and HbA1c in diabetes. *BMC Oral Health*. 2021;21(1):101. doi:10.1186/s12903-021-01453-y
17. Oruc AH, Babayigit O. Salivary asprosin and cytokines in diabetic patients with periodontitis. *Clin Oral Invest*. 2026;30(1):52. doi:10.1007/s00784-026-06744-8
18. Carelli M, Maguolo A, Zusi C, Olivieri F, Emiliani F, De Grandi G, et al. Oral microbiota in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. *Microorganisms*. 2023;11(3):668. doi:10.3390/microorganisms11030668
19. García-Parra MI, Jiménez-Coello M, Carrillo-Ávila BA, Hernández-Cortázar I, Chávez-Cortez G, Martínez-Aguilar VM. Osteoprotegerin plasma levels in periodontitis. *P R Health Sci J*. 2022;41(1):5–8.
20. Asif S, Ahmad B, Hamza SA, Taib H, Kassim NK, Zainuddin SLA. Salivary RANKL and OPG in periodontitis. *Eur J Dent*. 2022;16(1):173–8. doi:10.1055/s-0041-1731930

CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PERIODONTAL DISEASE IN ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS

Esiev R.K., Uzdenov I.R., Khasyanova Z.M., Pestova A.N., Romanova M.V.

North Ossetian State Medical Academy, I.N. Ulyanov Chuvash State University, Privolzhsky Research Medical University

Type 1 diabetes mellitus occupies a special place among chronic autoimmune diseases of childhood: the pediatric and adolescent population bears the main burden of this pathology, and its global incidence is steadily increasing. Among the target organs of chronic hyperglycemia, periodontal disease is considered the sixth most significant complication of diabetes; however, this relationship remains underestimated in pediatric clinical practice.

Keywords: type 1 diabetes mellitus, autoimmune diseases, periodontium

References

1. Grabia M, Markiewicz-Żukowska R, Socha K. Prevalence of metabolic syndrome in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus and possibilities of prevention and treatment: a systematic review. *Nutrients*. 2021;13(6):1782. doi:10.3390/nu13061782
2. Bell KJ, Lain SJ. The changing epidemiology of type 1 diabetes: a global perspective. *Diabetes Obes Metab*. 2025;27 Suppl 6:3–14. doi:10.1111/dom.16501
3. Vlachou S, Loumé A, Giannopoulou C, Papathanasiou E, Zekeridou A. Periodontal disease and type 1 diabetes mellitus: a review. *Int J Mol Sci*. 2024;25(13):7299. doi:10.3390/ijms25137299
4. Reddy M, Gopalkrishna P. Type 1 diabetes and periodontal disease: a literature review. *Can J Dent Hyg*. 2022;56(1):22–30.
5. Shcherba V, Krynytska I, Marushchak M, Korda M. Thyroid dysfunction and inflammatory mediators in periodontitis. *Endocr Regul*. 2021;55(3):131–41. doi:10.2478/enr-2021-0014
6. Yanko NV, Kaskova LF, Kulai OO, Khmil OV, Novikova SC. Neutrophil activities in adolescents with type 1 diabetes. *Wiad Lek*. 2022;75(11 Pt 2):2826–30. doi:10.36740/WL-ek202211217
7. Herrera D, Sanz M, Shapira L, Brotons C, Chapple I, Frese T, et al. Periodontal diseases and systemic diseases: consensus report summary. *Eur J Gen Pract*. 2024;30(1):2320120. doi:10.1080/13814788.2024.2320120
8. Zhao M, Xie Y, Gao W, Li C, Ye Q, Li Y. Diabetes mellitus and susceptibility to periodontitis. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023;14:1192625. doi:10.3389/fendo.2023.1192625
9. Chakraborty P, Chowdhury R, Bhakta A, Mukhopahyay P, Ghosh S. Microbiology of periodontal disease in adolescents with type 1 diabetes. *Diabetes Metab Syndr*. 2021;15(6):102333. doi:10.1016/j.dsx.2021.102333
10. D'Agostino S, Valentini G, Dolci M. Interleukin levels in type 1 diabetes and periodontitis. *Children (Basel)*. 2024;11(2):238. doi:10.3390/children11020238
11. World Medical Association. Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research. *JAMA*. 2025;333(1):71–4. doi:10.1001/jama.2024.21972
12. Chen YF, Zhan Q, Wu CZ, Yuan YH, Chen W, Yu FY, et al. HbA1c and periodontal therapy outcomes. *Diabetes Ther*. 2021;12(5):1249–78. doi:10.1007/s13300-021-01000-6
13. Costa R, Ríos-Carrasco B, Monteiro L, López-Jarana P, Carneiro F, Relvas M. Association between type 1 diabetes mellitus and periodontal diseases. *J Clin Med*. 2023;12(3):1147. doi:10.3390/jcm12031147
14. Ferizi-Shabani L, Mrasori S, Ferizi V, Barku G, Gjocaj M, Krasniqi B, et al. Dental and periodontal status in children with type 1 diabetes mellitus. *Georgian Med News*. 2024;(352–353):208–12.
15. Saotome M, Kuraji R, Numabe Y. Hyperglycemia exacerbates periodontal destruction. *J Periodontol Res*. 2025;60(6):590–603. doi:10.1111/jre.13366
16. Agho ET, Owotade FJ, Kolawole BA, Oyetola EO, Adedjeji TA. Salivary inflammatory biomarkers and HbA1c in diabetes. *BMC Oral Health*. 2021;21(1):101. doi:10.1186/s12903-021-01453-y
17. Oruc AH, Babayigit O. Salivary asprosin and cytokines in diabetic patients with periodontitis. *Clin Oral Invest*. 2026;30(1):52. doi:10.1007/s00784-026-06744-8
18. Carelli M, Maguolo A, Zusi C, Olivieri F, Emiliani F, De Grandi G, et al. Oral microbiota in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. *Microorganisms*. 2023;11(3):668. doi:10.3390/microorganisms11030668
19. García-Parra MI, Jiménez-Coello M, Carrillo-Ávila BA, Hernández-Cortázar I, Chávez-Cortez G, Martínez-Aguilar VM. Osteoprotegerin plasma levels in periodontitis. *P R Health Sci J*. 2022;41(1):5–8.
20. Asif S, Ahmad B, Hamza SA, Taib H, Kassim NK, Zainuddin SLA. Salivary RANKL and OPG in periodontitis. *Eur J Dent*. 2022;16(1):173–8. doi:10.1055/s-0041-1731930

Молекулярные и эпигенетические механизмы биологического старения и их значение для анализа средовых воздействий: концептуальный обзор

Ильин Юрий Викторович,

аспирант Славяно-Греко-Латинской Академии
E-mail: zpykt@mail.ru

Цель статьи – систематизировать современные представления о молекулярных и эпигенетических механизмах биологического старения, наиболее чувствительных к воздействиям внешней среды, и тем самым сформировать биологическую рамку для анализа средовых модификаторов биологического возраста. В центре внимания находились шесть блоков: hallmarks of aging, эпигенетический дрейф и эпигенетические часы, сигнальные пути долголетия, хронический стресс, воспаление и оксидативный стресс, а также сон и циркадная регуляция как ключевые медиаторы средовых эффектов.

Материал подготовлен в формате концептуального обзора с элементами структурированного поиска литературы. Поиск проводили в PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Google Scholar и eLIBRARY по публикациям 2000–2026 гг. с приоритетом работ 2010–2026 гг. В обзор включались исследования и обзоры, если они позволяли связать механизмы старения с внешнесредовыми воздействиями и биомаркерами биологического возраста.

Показано, что современная геронтология рассматривает старение не как изолированную генетическую программу, а как многоуровневый процесс, в котором геномная нестабильность, эпигенетический дрейф, митохондриальная дисфункция, хроническое воспаление, нарушения сна и циркадной организации формируют единую сеть взаимосвязанных изменений. Наиболее пригодными для анализа средовых эффектов являются эпигенетические часы, параметры сна и циркадной организации, а также ограниченный набор стресс-, воспалительных и транскрипционных маркеров.

Сделан вывод, что для корректного анализа влияния факторов среды на темп старения необходима единая биологическая рамка, позволяющая разводить уровни воздействия, посреднические механизмы и конечные точки. Такой подход переводит обсуждение средовых модификаторов старения из описательной плоскости в область проверяемой молекулярной и геронтологической методологии и создаёт основу для раздельного анализа конкретных экспозиций, включая акустические воздействия.

Ключевые слова: старение, биологический возраст, эпигенетика, эпигенетические часы, hallmarks of aging, экспозом, хронический стресс, воспаление, сон, циркадная организация, средовые воздействия, концептуальный обзор.

Введение

Современная биология старения исходит из того, что возрастные изменения формируются на пересечении генетических, эпигенетических, метаболических и внешнесредовых контуров [1, 6, 7]. В обновлённой концепции hallmarks of aging старение понимается как каскад взаимосвязанных нарушений, включающий геномную нестабильность, эпигенетические изменения, митохондриальную дисфункцию, клеточную сенесценцию, хроническое воспаление и нарушение межклеточной коммуникации [1]. Такой подход существенно расширяет исследовательскую рамку: вопрос ставится уже не только о том, почему клетки стареют, но и о том, какие компоненты экспозома способны смещать траекторию биологического возраста.

Одним из наиболее значимых достижений последних лет стало внедрение эпигенетических часов, основанных на паттернах метилирования ДНК [2, 3, 18]. Эти инструменты позволяют перейти от описания хронологического возраста к оценке биологического темпа старения и тем самым дают исследователю чувствительную конечную точку для анализа средовых воздействий. На этом фоне особенно важным становится вопрос о механизмах, через которые факторы среды могут быть переведены в измеримые молекулярные сдвиги.

Именно поэтому перед анализом любого частного фактора среды необходимо выстроить общую биологическую карту: какие механизмы старения наиболее чувствительны к внешним воздействиям; какие звенья пригодны для измерения; какие молекулярные пути выступают посредниками между экспозицией и биологическим возрастом. Без такой рамки исследование средовых воздействий рискует превратиться в набор разрозненных и методически неоднородных утверждений.

Цель настоящей статьи – представить концептуальную рамку, связывающую молекулярные механизмы старения с внешнесредовыми воздействиями, и определить те биологические контуры, через которые факторы среды могут обсуждаться как потенциальные модификаторы молекулярного и эпигенетического старения. Задача работы состоит не в картировании конкретной экспозиции, а в обосновании того, какие именно биологические блоки должны лежать в основе таких исследований.

Материалы и методы

Работа выполнена в формате концептуального обзора с элементами структурированного поиска литературы. Такой дизайн выбран потому, что предмет статьи носит не столько экспозиционный, сколько рамочный характер: необходимо связать данные о механизмах старения, эпигенетическом возрасте и средовых воздействиях в единую биологическую модель.

Поиск литературы выполняли в PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Google Scholar и eLIBRARY. Основной временной диапазон охватывал 2000–2026 гг., при этом приоритет отдавался публикациям последних 10–15 лет. Использовались комбинации ключевых слов на русском и английском языках: “aging”, “hallmarks of aging”, “biological age”, “epigenetic clock”, “DNA methylation”, “exposome”, “stress”, “sleep”, “circadian rhythm”, “inflammation”, “oxidative stress”, “longevity pathways”, “SIRT1”, “FOXO3”, “mTOR”, “TP53”.

В обзор включали фундаментальные концептуальные статьи, систематические обзоры, методологические публикации и крупные нарративные обзоры, если они позволяли интерпретировать старение как результат взаимодействия молекулярных и внешнесредовых факторов. Исключались работы, ограниченные исключительно клиническим описанием возраст-ассоциированных заболеваний без выхода на молекулярные механизмы, а также публикации, не дающие возможности связать внешние воздействия с маркерами биологического возраста.

Из каждой публикации извлекали следующие параметры: какой блок старения обсуждается; какие биомаркеры используются; как интерпретируется роль внешней среды; какие молекулярные посредники предполагаются. Количественный метаанализ не проводили, поскольку целью статьи являлся не подсчёт эффекта, а построение логически связанной биологической рамки для анализа средовых воздействий.

Результаты и обсуждение

Старение как системный процесс: от генома к экспозому

Современная геронтология всё в большей степени рассматривает старение как динамический процесс, возникающий в результате взаимодействия внутренней молекулярной архитектуры организма и внешней среды [1, 4, 6]. Такая постановка принципиально важна: она снимает ложную оппозицию между «запрограммированным» и «случайным» старением и переводит исследование в плоскость регуляторных сетей. Геном задаёт исходную организацию системы, но фактический темп age-related decline определяется тем, как на эту систему накладываются хронический стресс, поведенческие режимы, сон, питание, физическая активность, воспалительная нагрузка и другие компоненты экспозома [4, 6, 7].

В этой логике биологический возраст становится интегральным итогом многослойных взаимодействий. Он формируется не в одном молекулярном узле, а в сети пересекающихся процессов, где изменения в одном контуре способны усиливать или ослаблять другие. Именно поэтому в исследованиях средовых воздействий ключевым объектом становится не отдельный биомаркер, а система маркёров, позволяющая одновременно оценивать стрессовую, воспалительную, эпигенетическую и циркадную составляющие старения.

Геномная нестабильность, эпигенетический дрейф и эпигенетические часы

Геномная нестабильность остаётся одним из базовых hallmarks of aging [1]. Накопление повреждений ДНК, снижение эффективности репарации, ошибки репликации и теломерная эрозия повышают вероятность клеточной дисфункции, сенесценции и апоптоза. Однако для задач средовой геронтологии особенно важно то, что значительная часть возрастных изменений реализуется не только через мутационные события, но и через регуляторный уровень – изменения экспрессии генов и архитектуры хроматина.

Именно на этом уровне ключевую роль играет эпигенетический дрейф: возрастные изменения метилирования ДНК, модификаций гистонов и ремоделирования хроматина, которые нарушают стабильность транскрипционных программ [1, 3, 19]. Эпигенетический дрейф одновременно отражает и внутреннюю биологию старения, и накопленный след средовых влияний. Поэтому он оказывается особенно важным для исследований, ориентированных на экспозом.

Разработка эпигенетических часов позволила впервые измерять биологический возраст на основе профиля метилирования ДНК и сравнивать его с хронологическим возрастом [2, 3, 18]. В практическом отношении это означает, что исследователь получает интегральную конечную точку, чувствительную к хроническому стрессу, дефициту сна, воспалению и другим факторам среды [4, 5]. Именно поэтому эпигенетические часы представляют особую ценность для экологической и молекулярной геронтологии: они позволяют выйти за пределы описания субъективного неблагополучия и перейти к количественной оценке темпа биологического старения.

Хронический стресс, воспаление и оксидативный стресс как универсальные посредники средовых эффектов

Один из наиболее устойчивых выводов современной литературы состоит в том, что внешняя среда чаще всего влияет на старение через ограниченное число повторяющихся биологических посредников – хронический стресс, воспаление низкой интенсивности и оксидативный стресс [5, 7–9]. Эти контуры образуют общий язык, на который переводятся самые разные экспозиции: от психосоциальной нагрузки до загрязнения окружающей среды.

Хронический стресс активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось и симпатoadреналовую систему, что приводит к повышению уровня кортизола, катехоламинов и устойчивой аллостатической нагрузке [5, 8]. На этом фоне изменяются иммунная реактивность, сосудистый тонус, энергетический обмен и транскрипционные программы ответа на повреждение. Хроническое воспаление и оксидативный стресс, в свою очередь, подпитывают эпигенетический дрейф, митохондриальную дисфункцию и сенесцентный фенотип [1, 8, 9].

Для анализа средовых воздействий особенно важно, что именно этот треугольник – стресс, воспаление, ROS – является наиболее реалистичным механизмом переноса экспозиции на уровень биологического старения. Такой подход дисциплинирует исследование: вместо абстрактного поиска «любого влияния среды на ДНК» он предлагает изучать ограниченное число биологически правдоподобных и измеряемых посредников.

Сон и циркадные ритмы как центральный медиатор биологического возраста

Сон и циркадная организация занимают особое место в современной геронтологии, поскольку связывают нейроэндокринную регуляцию, энергетический обмен, иммунную реактивность и процессы репарации [10, 11]. Нарушение сна не следует рассматривать как вторичный симптом неблагополучия; в биологии старения оно выступает полноценным механизмом, способным изменять темп age-related decline.

Исследования последних лет показывают, что короткий, нерегулярный или фрагментированный сон ассоциируется с ускорением эпигенетических часов, включая GrimAge, DunedinPACE и другие модели биологического возраста [12–15]. В этом контексте циркадная система выступает не просто временным регулятором, а координатором транскрипционной, метаболической и иммунной согласованности. Когда эта согласованность нарушается, возрастает вероятность воспалительных и эпигенетических сдвигов.

Для анализа конкретных факторов среды этот блок имеет принципиальное значение. Если экспозиция устойчиво ухудшает сон и циркадную синхронизацию, она уже попадает в зону геронтологического риска даже без прямого измерения всех молекулярных эффектов. Поэтому сон и циркадная организация должны рассматриваться не как второстепенные сопутствующие параметры, а как центральные медиаторы биологического возраста.

Сигнальные пути долголетия как интеграционные узлы

Наряду с эпигенетическими и системными маркёрами, для анализа старения сохраняют значение сигнальные пути, регулирующие клеточный ответ на энергодифицит, повреждение и стресс. К числу наиболее изученных относятся SIRT1, FOXO3, TP53 и mTOR, а также связанные с ними AMPK-зависимые контуры [1, 6, 16, 17].

SIRT1 и FOXO3 обычно рассматриваются как элементы стрессоустойчивости и метаболической адаптации; mTOR – как центральный регулятор анаболизма, роста и скорости клеточного старения; TP53 – как узел, связывающий ответ на повреждение, остановку клеточного цикла и сенесценцию. Важно, однако, избегать упрощённого представления о них как о «генах молодости» или «генах старости». В реальности речь идёт о контекстно-зависимой регуляторной сети, в которой значение имеет не отдельный маркёр, а его положение в многоуровневом каскаде.

Поэтому эти пути целесообразно использовать как ограниченную панель вторичных молекулярных исходов, дополняющих эпигенетические часы, стресс-биомаркёры и показатели сна. Такой подход соответствует современной геронтологической методологии, в которой приоритет отдаётся узкому, валидированному и биологически осмысленному набору конечных точек, а не чрезмерно широкому охвату всех возможных молекулярных мишеней (табл. 1).

Таблица 1. Ключевые биологические блоки, связывающие экспозом и биологическое старение

Биологический блок	Что наиболее надёжно известно	Почему важен для биологического возраста	Значение для акустической темы
Эпигенетический дрейф и часы	DNAm-профиль отражает биологический возраст и чувствителен к средовым воздействиям.	Даёт интегральную конечную точку.	Позволяет проверять, связан ли звук с ускорением старения.
Стресс-реализующие системы	HPA-ось и симпатoadреналовая активация переводят экспозицию в аллостатическую нагрузку.	Связывают среду с воспалением и обменом.	Ключевой путь для хронического шума.
Воспаление и оксидативный стресс	Inflammaging и ROS поддерживают клеточную дисфункцию и сенесценцию.	Ускоряют age-related decline.	Вероятный молекулярный мост между шумом и старением.
Сон и циркадные ритмы	Нарушение сна и циркадная десинхронизация ассоциированы с ускорением эпигенетического возраста.	Меняют обмен, иммунитет и репарацию.	Наиболее перспективный медиатор акустических эффектов.
Пути SIRT1–FOXO3–TP53–mTOR	Узлы стрессоустойчивости, репарации, метаболизма и сенесценции.	Помогают интерпретировать профиль старения.	Подходят как ограниченная панель вторичных исходов.

Акустическая среда как частный компонент экспозома: причины доказательной неоднородности

На основании представленной биологической рамки акустическая среда действительно может обсуждаться как потенциально значимый компонент экспозома. Однако именно здесь особенно важно соблюсти методологическую дисциплину. Под общим словом «звук» в реальности скрываются принципиально разные воздействия: транспортный и индустриальный шум, музыкальные стимулы, природная акустика, ритмически организованные программы, вибрационные и механотрансдукционные модели. Эти экспозиции различаются по интенсивности, спектру, длительности, пути биологического восприятия и, вероятно, по механизму действия.

Следовательно, корректная постановка вопроса состоит не в том, «влияет ли звук на старение вообще», а в том, какие именно типы акустической экспозиции могут быть связаны с какими именно контурами биологического старения и с какой степенью доказанности. Такое разведение особенно важно для того, чтобы не смешивать хорошо подтвержденные стрессовые и циркадные эффекты хронического шума с гораздо менее разработанными гипотезами о благоприятных акустических вмешательствах.

Именно поэтому акустическая среда требует не декларативных утверждений, а специального обзора доказательств, который отделил бы уже подтвержденные причинно-биологические цепочки от гипотез, нуждающихся в дальнейшей проверке. Такая последовательность – сначала общая биологическая рамка, затем картирование данных по конкретному средовому фактору – позволяет обсуждать тему на языке проверяемой геронтологической методологии.

Ограничения обзора

Во-первых, настоящая работа носит концептуальный характер и потому не ставит задачей количественный синтез эффектов. Во-вторых, статья сознательно объединяет данные разных уровней – от общих моделей старения до исследований эпигенетического возраста и средовых экспозиций, – чтобы показать именно архитектуру проблемы. В-третьих, акустическая среда рассматривается здесь лишь как один из частных примеров; детальное сопоставление типов акустических воздействий и уровня доказанности их эффектов требует отдельного специального анализа.

Заключение

Концептуальный анализ показывает, что современная геронтология уже располагает достаточно зрелой биологической рамкой для исследования средовых модификаторов старения. Геномная нестабильность, эпигенетический дрейф, эпигенетические часы, хронический стресс, воспаление, оксидативный стресс, нарушения сна и циркадной регуляции образуют систему взаимосвязанных блоков, через которую факторы среды могут ускорять или замедлять темп биологического возраста.

В этой системе координат акустическая среда не должна трактоваться как заранее доказанный «омолаживающий» или «старящий» фактор. Корректнее рассматривать её как потенциально значимый компонент экспозома, требующий раздельного анализа по типам воздействий, по механизмам и по уровню доказательности. Такой подход позволяет избежать спекулятивных утверждений и переводит тему в плоскость проверяемой молекулярной и геронтологической методологии.

Следовательно, исследования средовых воздействий должны строиться на предварительно определённой системе конечных точек, включающей эпигенетические часы, параметры сна и циркадной организации, а также ограниченный набор стресс-, воспалительных и транскрипционных маркёров. Именно такая рамка создаёт надёжную основу для анализа конкретных компонентов экспозома, прежде всего хронического шума и других типов акустических воздействий.

Литература

1. Lopez-Otin C., Blasco M.A., Partridge L., Serrano M., Kroemer G. Hallmarks of aging: An expanding universe // *Cell*. 2023. Vol. 186, No. 2. P. 243–278. DOI: 10.1016/S0092-8674(22)01577-1.
2. Horvath S. DNA methylation age of human tissues and cell types // *Genome Biology*. 2013. Vol. 14. Art. R115. DOI: 10.1186/gb-2013-14-10-r115.
3. Bell C.G., Lowe R., Adams P.D. et al. DNA methylation aging clocks: challenges and recommendations // *Genome Biology*. 2019. Vol. 20. Art. 249. DOI: 10.1186/s13059-019-1824-y.
4. Dutta S., Goodrich J.M., Dolinoy D.C., Ruden D.M. Biological aging acceleration due to environmental exposures: an exciting new

direction in toxicogenomics research // *Genes*. 2024. Vol. 15, No. 1. Art. 16. DOI: 10.3390/genes15010016.

5. Galkin F., Kovalchuk O., Koldasbayeva D., Zhavoronkov A., Bischof E. Stress, diet, exercise: common environmental factors and their impact on epigenetic age // *Ageing Research Reviews*. 2023. Vol. 88. Art. 101956. DOI: 10.1016/j.arr.2023.101956.

6. Kennedy B.K., Berger S.L., Brunet A. et al. Geroscience: linking aging to chronic disease // *Cell*. 2014. Vol. 159, No. 4. P. 709–713. DOI: 10.1016/j.cell.2014.10.039.

7. Lyons C.E., Razzoli M., Bartolomucci A. The impact of life stress on hallmarks of aging and accelerated senescence: Connections in sickness and in health // *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*. 2023. Vol. 153. Art. 105359. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2023.105359.

8. Baechle J.J., Bloemberg D., Furman D. Chronic inflammation and the hallmarks of aging // *Molecular Metabolism*. 2023. Vol. 74. Art. 101755. DOI: 10.1016/j.molmet.2023.101755.

9. Franceschi C., Garagnani P., Parini P., Giuliani C., Santoro A. Inflammaging: a new immune-metabolic viewpoint for age-related diseases // *Nature Reviews Endocrinology*. 2018. Vol. 14. P. 576–590. DOI: 10.1038/s41574-018-0059-4.

10. Orozco-Solis R., Sassone-Corsi P. Circadian clock: linking epigenetics to aging // *Current Opinion in Genetics & Development*. 2014. Vol. 26. P. 66–72.

11. Deibel S.H., Hong N.S., Himmler S.M. et al. Epigenetic Alterations in the Suprachiasmatic Nucleus and Memory in Aging // *Ageing Research Reviews*. 2015. Vol. 24. P. 41–51.

12. Carskadon M.A., Chappell K.R., Barker D.H. et al. A pilot prospective study of sleep patterns and DNA methylation-characterized epigenetic aging in young adults // *BMC Research Notes*. 2019. Vol. 12. Art. 583. DOI: 10.1186/s13104-019-4633-1.

13. Carroll J.E., Irwin M.R., Ross K.M. et al. Postpartum sleep loss and accelerated epigenetic aging // *Sleep Health*. 2021. Vol. 7, No. 3. P. 318–325. DOI: 10.1016/j.sleh.2021.02.002.

14. Kusters C.D.J., Klopach E.T., Crimmins E.M. et al. Short Sleep and Insomnia Are Associated With Accelerated Epigenetic Age // *Psychosomatic Medicine*. 2024. Vol. 86, No. 5. P. 453–462. DOI: 10.1097/PSY.0000000000001243.

15. Lee H.-S., Kim B., Park T. The association between sleep quality and accelerated epigenetic aging with metabolic syndrome in Korean adults // *Clinical Epigenetics*. 2024. Vol. 16, No. 1. Art. 92. DOI: 10.1186/s13148-024-01706-x.

16. Moskalev A., Guvatova Z., Lopes I.A. et al. Targeting aging mechanisms: pharmacological perspectives for slowing aging and extending healthy lifespan // *Frontiers in Genetics*. 2022. Vol. 13. Art. 884494. DOI: 10.3389/fgene.2022.884494.

17. Johnson S.C., Rabinovitch P.S., Kaeblerlein M. mTOR is a key modulator of ageing and age-related disease // *Nature*. 2013. Vol. 493. P. 338–345. DOI: 10.1038/nature11861.

18. Lu A.T., Fei Z., Haghani A. et al. Universal DNA methylation age across mammalian tissues // *Nature Aging*. 2023. Vol. 3. P. 1144–1166.

19. Hsia C.-R., Melters D.P., Dalal Y. The force is strong with this epigenome: chromatin structure and mechanobiology // *Journal of Molecular Biology*. 2023. Vol. 435, No. 11. Art. 168019. DOI: 10.1016/j.jmb.2023.168019.

MOLECULAR AND EPIGENETIC MECHANISMS OF BIOLOGICAL AGING AND THEIR IMPLICATIONS FOR THE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACTS: A CONCEPTUAL REVIEW

Ilyin Yu.V.

Slavic-Greek-Latin Academy

The aim of this article is to systematize current understanding of the molecular and epigenetic mechanisms of biological aging that are most sensitive to environmental influences, thereby providing a biological framework for analyzing environmental modifiers of biological age. Six areas of focus were explored: hallmarks of aging, epigenetic drift and the epigenetic clock, longevity signaling pathways, chronic stress, inflammation and oxidative stress, and sleep and circadian regulation as key mediators of environmental effects.

This article was prepared as a conceptual review with elements of a structured literature search. The search was conducted in PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Google Scholar, and eLIBRARY for publications from 2000–2026. With a focus on the period 2010–2026. Studies and reviews were included in the review if they linked aging mechanisms to environmental influences and biomarkers of biological age.

It was demonstrated that modern gerontology views aging not as an isolated genetic program, but as a multi-level process in which genomic instability, epigenetic drift, mitochondrial dysfunction, chronic inflammation, sleep disturbances, and circadian organization form a unified network of interconnected changes. The epigenetic clock, sleep parameters, and circadian organization, as well as a limited set of stress, inflammation, and transcriptional markers, are most suitable for analyzing environmental effects.

It was concluded that a unified biological framework is needed to accurately analyze the influence of environmental factors on the pace of aging, allowing for differentiation between exposure levels, mediating mechanisms, and endpoints. This approach shifts the discussion of environmental modifiers of aging from a descriptive perspective to a testable molecular and gerontological methodology and creates a basis for the separate analysis of specific exposures, including acoustic influences.

Keywords: aging, biological age, epigenetics, epigenetic clock, hallmarks of aging, exposome, chronic stress, inflammation, sleep, circadian organization, environmental influences, conceptual review.

References

1. Lopez-Otin C., Blasco M.A., Partridge L., Serrano M., Kroemer G. Hallmarks of aging: An expanding universe // *Cell*. 2023. Vol. 186, No. 2. P. 243–278. DOI: 10.1016/S0092-8674(22)01577-1.
2. Horvath S. DNA methylation age of human tissues and cell types // *Genome Biology*. 2013. Vol. 14. Art. R115. DOI: 10.1186/gb-2013-14-10-r115.
3. Bell C.G., Lowe R., Adams P.D. et al. DNA methylation aging clocks: challenges and recommendations // *Genome Biology*. 2019. Vol. 20. Art. 249. DOI: 10.1186/s13059-019-1824-y.
4. Dutta S., Goodrich J.M., Dolinoy D.C., Ruden D.M. Biological aging acceleration due to environmental exposures: an exciting new direction in toxicogenomics research // *Genes*. 2024. Vol. 15, No. 1. Art. 16. DOI: 10.3390/genes15010016.
5. Galkin F., Kovalchuk O., Koldasbayeva D., Zhavoronkov A., Bischof E. Stress, diet, exercise: common environmental factors and their impact on epigenetic age // *Ageing Research Reviews*. 2023. Vol. 88. Art. 101956. DOI: 10.1016/j.arr.2023.101956.
6. Kennedy B.K., Berger S.L., Brunet A. et al. Geroscience: linking aging to chronic disease // *Cell*. 2014. Vol. 159, No. 4. P. 709–713. DOI: 10.1016/j.cell.2014.10.039.
7. Lyons C.E., Razzoli M., Bartolomucci A. The impact of life stress on hallmarks of aging and accelerated senescence: Connections in sickness and in health // *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*. 2023. Vol. 153. Art. 105359. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2023.105359.
8. Baechle J.J., Bloemberg D., Furman D. Chronic inflammation and the hallmarks of aging // *Molecular Metabolism*. 2023. Vol. 74. Art. 101755. DOI: 10.1016/j.molmet.2023.101755.
9. Franceschi C., Garagnani P., Parini P., Giuliani C., Santoro A. Inflammaging: a new immune-metabolic viewpoint for age-related diseases // *Nature Reviews Endocrinology*. 2018. Vol. 14. P. 576–590. DOI: 10.1038/s41574-018-0059-4.
10. Orozco-Solis R., Sassone-Corsi P. Circadian clock: linking epigenetics to aging // *Current Opinion in Genetics & Development*. 2014. Vol. 26. P. 66–72.
11. Deibel S.H., Hong N.S., Himmler S.M. et al. Epigenetic Alterations in the Suprachiasmatic Nucleus and Memory in Aging // *Ageing Research Reviews*. 2015. Vol. 24. P. 41–51.
12. Carskadon M.A., Chappell K.R., Barker D.H. et al. A pilot prospective study of sleep patterns and DNA methylation-characterized epigenetic aging in young adults // *BMC Research Notes*. 2019. Vol. 12. Art. 583. DOI: 10.1186/s13104-019-4633-1.
13. Carroll J.E., Irwin M.R., Ross K.M. et al. Postpartum sleep loss and accelerated epigenetic aging // *Sleep Health*. 2021. Vol. 7, No. 3. P. 318–325. DOI: 10.1016/j.sleh.2021.02.002.
14. Kusters C.D.J., Klopach E.T., Crimmins E.M. et al. Short Sleep and Insomnia Are Associated With Accelerated Epigenetic Age // *Psychosomatic Medicine*. 2024. Vol. 86, No. 5. P. 453–462. DOI: 10.1097/PSY.0000000000001243.
15. Lee H.-S., Kim B., Park T. The association between sleep quality and accelerated epigenetic aging with metabolic syndrome in Korean adults // *Clinical Epigenetics*. 2024. Vol. 16, No. 1. Art. 92. DOI: 10.1186/s13148-024-01706-x.
16. Moskalev A., Guvatova Z., Lopes I.A. et al. Targeting aging mechanisms: pharmacological perspectives for slowing aging and extending healthy lifespan // *Frontiers in Genetics*. 2022. Vol. 13. Art. 884494. DOI: 10.3389/fgene.2022.884494.
17. Johnson S.C., Rabinovitch P.S., Kaeblerlein M. mTOR is a key modulator of ageing and age-related disease // *Nature*. 2013. Vol. 493. P. 338–345. DOI: 10.1038/nature11861.
18. Lu A.T., Fei Z., Haghani A. et al. Universal DNA methylation age across mammalian tissues // *Nature Aging*. 2023. Vol. 3. P. 1144–1166.
19. Hsia C.-R., Melters D.P., Dalal Y. The force is strong with this epigenome: chromatin structure and mechanobiology // *Journal of Molecular Biology*. 2023. Vol. 435, No. 11. Art. 168019. DOI: 10.1016/j.jmb.2023.168019.

Оценка эффективности комбинированной терапии хронического бруцеллеза с поражением локомоторного аппарата

Джанмурзаева Асият Магомедовна,

ассистент кафедры инфекционных болезней им. акад. Г.П. Руднева,
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: askamed321@mail.ru

Ахмедов Джалалутдин Расулович,

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней
им. акад. Г.П. Руднева, ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: dzh-akhmedov@yandex.ru

Билалова Саида Касумовна,

к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней им. акад. Г.П. Руднева,
ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: bilalovasaida@yandex.ru

Джалилова Альбина Нургабитдиновна,

студент 9 группы 6 курса, ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: dzhaliilova01@mail.ru

Тагирова Камилла Владиславовна,

студент 41 группы 5 курса, ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
E-mail: Tagirovakama@mail.ru

Хронический бруцеллез – это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода *Brucella*, которое может приводить к серьезным последствиям для здоровья человека. Для хронического бруцеллеза характерны: частые рецидивы болезни, высокий риск инвалидизации в результате поражения опорно-двигательного аппарата протекающего с развитием выраженного болевого синдрома, влияющего не только на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, но и на качество жизни пациентов в целом, в связи с чем целесообразным является разработка и применения новых методов лечения больных хроническим бруцеллезом с поражением локомоторного аппарата позволяющих добиться стойкой ремиссии болезни и улучшить качество жизни пациентов. В работе представлен способ лечения хронического бруцеллеза, основанный на включении в комплексную терапию препаратов Ксефокам (лорноксикам) и Имунфан. Применение данной схемы позволяет достичь стойкого клинического эффекта за счет купирования синдрома воспалительной реакции, нормализации температуры, уменьшения болевого синдрома и восстановления функционального состояния опорно-двигательного аппарата. Результаты подтверждены на группе из 100 пациентов и демонстрируют коррекцию нарушений антиоксидантной и иммунной систем, что способствует снижению частоты рецидивов хронического бруцеллеза.

Ключевые слова: хронический бруцеллез, локомоторный аппарат, ксефокам, имунофан, антиоксидантная система, иммунная система, цитокины.

Актуальность

Эффективность иммуномодуляторов при лечении бруцеллеза вызывает всё больший интерес, особенно в связи с тем, что традиционная антибиотикотерапия сталкивается с такими проблемами, как высокая частота рецидивов и лекарственная устойчивость. [4]. При этом, антибиотики особенно при длительном их применении, что является необходимым условием для этиотропной терапии бруцеллеза сами по себе способны оказывать иммуносупрессивное действие. Иммуномодуляторы в свою очередь способствуют регулированию иммунного ответа, потенциально помогая выводить бруцеллы из макрофагов, где они обычно избегают действия антибиотиков. [1]. В последние годы появились сообщения об успешном комбинированном использовании при хроническом бруцеллезе антибактериальных и иммуномодулирующих препаратов призванных добиться стойкой ремиссии болезни. [5]. Однако до настоящего времени в клинической практике нет объективных и достоверных методов, позволяющих определить необходимость проведения, выбрать схему и оценить терапевтическую эффективность комбинированной антибактериальной и иммуномодулирующей терапии при хронических формах бруцеллеза [2]. Немало важную роль в лечении хронических форм бруцеллеза занимает и патогенетическая терапия. Как известно от 75–100% хронических форм бруцеллеза протекают с поражением опорно-двигательного аппарата, развитием артритов, сакроилеитов, дисцитов и др. сопровождающееся выраженным болевым синдромом и приводящим к стойкому снижению трудоспособности [9]. В большинстве случаев, болевой синдром связанный с поражением опорно-двигательного аппарата и является основной жалобой при поступлении больных хронической формой бруцеллезной инфекции. [3]. В связи с этим целесообразным и обоснованным является использование в терапии больных нестероидных противовоспалительных препаратов в дополнении к антибактериальной и иммуномодулирующей терапии. В предыдущей статье нами была представлена роль иммунной и антиоксидантной системы в развитии рецидивов хронического бруцеллеза. В данной статье будут представлены результаты эффективности лечения больных хроническим бруцеллезом с поражением локомоторного аппарата с применением комбинации имунофана и ксефокама в дополнении к антибактериальной терапии.

Цель исследования

Повышение эффективности лечения и предупреждение развития обострений у больных хроническим бруцеллезом с поражением локомоторного аппарата.

Материал и методы

В исследование вошли пациенты, которые были госпитализированы в бруцеллезное отделение ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Махачкала. Диагноз хронического бруцеллеза установился на основе стандартного определения случая при наличии у пациента положительных результатов подтверждающих лабораторных тестов. При отборе больных хроническим бруцеллезом вошедших в исследование мы пользовались клинической классификацией хронического бруцеллеза (1955г) предложенной академиком Г.П. Рудневым. Больные были распределены на три группы в зависимости от степени компенсации бруцеллеза. Первая группа включала 54 больных хроническим бруцеллезом с поражением локомоторного аппарата, из них в стадии субкомпенсации 36 (67%) больных и декомпенсации 18 (33%) больных которым по мимо базисной терапии (включающей антибактериальную терапию) был назначен Ксефокам по 8 мг 2 раза в день внутримышечно в течении 5 дней, больным в стадии декомпенсации прием ксефокама продолжался в таблетированной форме по 4 мг 2 раза в день в течении 7 дней.

Вторую группу составили 46 больных хроническим бруцеллезом с поражением локомоторного аппарата, из них в стадии субкомпенсации 32 (70%), и 14 (30%) больных в стадии декомпенсации, которым к базисной терапии была добавлена схема комбинации ксефокама по 8 мг 2 раза в день внутримышечно в течении 5 дней (у больных в стадии декомпенсации с продолжением приема в таблетированной

форме по 4 мг 2 раза в день в течении 7 дней) и имунофана 50 мг внутримышечно ежедневно в течении 15 дней. Третью контрольную группу составили 30 относительно здоровых донора крови ГБУ МЗ РД «Центр крови Республики Дагестан».

Всем больным были проведены: клинико-эпидемиологическое обследование со специфической лабораторной диагностикой иммуноферментный анализ с определением антител к возбудителям бруцеллеза (Br. abortus, Br. melitensis) класса IgG и IgM, пластинчатая реакция агглютинации Хеддльсона, реакция агглютинации Райта в пробирках, реакция непрямой гемагглютинации с бруцеллезным диагностикумом, кожно-аллергическая проба Бюрне; Бактериологический анализ крови на Brucellae, биохимический анализ крови: СРБ, сиаловые кислоты, Кровь на ревмофактор, АСЛО. Изучение антиоксидантной системы: перекисное окисление липидов (ПОЛ), малоновый диальдегид– МДА, супероксиддисмутаза– СОД, каталаза– КТ, глутатионпероксидаза– ГП. Цитокиновый профиль: IL1 β , IL6, ФНО α

Инструментальные – рентгенография или КТ суставов и позвоночника.

У всех больных было получено добровольное согласие на обработку персональных данных. Результаты и выводы: в качестве примера результатов исследования представлены клинические случаи

1 группа пациентов с включением к базисной терапии антиоксидантного противовоспалительного препарата Ксефокам

Пример 1. Больной 3., 38 лет, поступил в РЦИБ г. Махачкала. с жалобами на длительную температуру до 37,5 С, общую слабость, быструю утомляемость, потливость, потерю в весе, боли в коленных и голеностопных суставах, поясничном отделе позвоночника. Из анамнеза болезни: болеет с апреля 2019 г. Заболевание началось с повышения температуры, потливости, болей в коленных суставах в связи с чем был госпитализирован в РЦИБ (г. Махачкала). Диагноз бруцеллеза был выставлен в 2017 г. Из эпидемиологического анамнеза: имеет контакт с мелко рогатым скотом, занимается стрижкой овец, участвует в окоте животных.

Объективно – состояние средней тяжести. Температура – 37,2 °С. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, влажные на ощупь. Пальпируются увеличенные подмышечные, паховые лимфоузлы. В легких аускультативно-везикулярное дыхание, ЧДД 18 минуту. Сердечные тоны ритмичные, приглушены, шумов нет, ЧСС – 98/минуту. АД – 110/70 мм рт.ст. Живот мягкий, без болезнен при пальпации. Печень мягкая на ощупь, у края реберной дуги. Селезенка не увеличена

Status localis: костно-мышечная система без видимой деформации. Отмечается болезненность в коленных суставах, поясничном отделе позвоночника. При осмотре кожа над суставами не изменена, наблюдается отечность правого коленного сустава, ограничение активных движений.

Результаты лабораторных исследований:

О/а крови: Hb – 110 г/л; Эр – $4,4 \times 10^{12}$; ЦП – 0,8; Лейкоциты – $6,8 \times 10^9$; П – 2; С – 64; Л – 30; М – 4; СОЭ – 26 мм/час. После лечения: Hb – 112 г/л; Эр – $4,5 \times 10^{12}$; ЦП – 0,8; Лейкоциты – $4,6 \times 10^9$; П – 2; С – 57; Л – 29; М – 3; СОЭ – 10 мм/час.

Серологические реакции: положительные пробы Райта – 1:160, Хеддльсона – положительная, РПГА с эритроцитарным бруцеллезным диагностикумом – 1:320. Внутрикожная аллергологическая проба Бюрне через 24–48ч -инфильтрат размером 5,5*6 см.

ИФА: обнаружены антитела класса Ig G к бруцеллам. Бактериологический анализ крови на Brucellae – результат отрицательный. Биохимический анализ крови: до лечения СРБ– 18мг/л, сиаловые кислоты – 4,33 ммоль/л. после лечения: СРБ– 3мг/л, сиаловые кислоты – 2,2ммоль/л. Кровь на ревмофактор– 15 МЕ/мл, АСЛО– 204ме/мл.

АОС. ПОЛ до лечения: МДА-3,2 ммоль/л, СОД-456 ед/мл, КТ-22 ед/л, ГП-12856 ед/л. После лечения: АОС-ПОЛ-МДА-1,2 ммоль/л, СОД-240 ед/мл, КТ-16 ед/л, ГП – 90564 ед/л.

Цитокиновый профиль до лечения: IL1 β – 16пг/мл, IL6–20 пг/мл, ФНО α – 13 пг/мл. После лечения: IL1 β – 10 пг/мл, IL6–8 пг/мл, ФНО α – 7 пг/мл

Рентгенография правого коленного сустава: на рентгенограмме правого коленного сустава рентген картина II стадии деформирующего остеоартроза – умеренная мышечная атрофия, сужение суставной щели, значительное образование остеофитов и субхондрального остеосклероза в костной ткани.

На основании клинико-лабораторных данных больному выставлен диагноз: хронический бруцеллез, локомоторная форма, стадия субкомпенсации.

Проведено базисное лечение: антибактериальная терапия – рифампицин 300 мг 2 раза в сутки и доксициклин 100 мг 2 раза в сутки курсом 45 дней, диазолин 100 мг 2 раза в день, ксефокам по 8 мг 2 раза в день внутримышечно 5 дней.

Динамика клинических симптомов на фоне лечения: температура нормализовалась на 7 день лечения, головная боль исчезла на 7 день лечения, общая слабость на 10 день лечения, потливость на 12 день лечения, озноб на 5 день лечения, боли в коленных суставах на 7 день лечения, миалгии на 7 день лечения, размеры лимфоузлы нормализовались на 20 день лечения.

Пример 1

Больной У. 42 года поступил в Республиканский центр инфекционных болезней г. Махачкала. При поступлении больног предьявлял жалобы на высокую температуру до 38,5С, озноб, боли в плечевых, коленных голеностопных суставах, боль в мышцах, головную боль, общую слабость, быструю утомляемость, потливость.

Из анамнеза: больным себя считает с 2017 года, заболевание началось с повышения температуры, болей в суставах, потливости, слабости. Заболевание связал с переохлаждением, лечился самостоятельно симптоматически применял жаропонижающие препараты, ибупрофен, парацетамол. В 2018 году в связи с повторным повышением температуры, выраженными болями в поясничном отделе позвоночника, обратился к участковому терапевту который после обследования направил больног в РЦИБ с диагнозом хронический бруцеллез. После проведенного лечения самочувствие больног улучшилось, однако через 6 мес. снова появились боли в суставах, субфебрильная температура и больног снова был госпитализирован в стационар. Из эпидемиологического анамнеза: больног содержит крупный и мелкий рогатый скот в домашнем хозяйстве, употребляет, мясо молоко и молочные продукты домашнего приготовления.

Объективно: состояние средней тяжести. Температура 38,2 °С. Кожные покровы чистые, влажные на ощупь. Пальпируются увеличенные шейные, и подмышечные лимфоузлы. В легких выслушивается везикулярное дыхание, число дыхательных движений 18 в минуту. Тоны сердца ритмичные, приглушенные. Частота сердечных сокращений 98 в минуту. Артериальное давление 110/70 мм рт.ст. Живот мягкий, болезненный. Печень увеличена на 1 см выступает из под края реберной дуги. Селезенка не увеличена

Status localis: костно– мышечная система без видимой деформации. Отмечается выраженная отечность и ограничение движений в плечевых, коленных, голеностопных суставах и поясничном отделе позвоночника. Правый плечевой сустав отечен, кожа горячая на ощупь, ограничение движения в суставе.

Общий анализ крови: до лечения: гемоглобин 126 г/л, эритроциты $4,6 \times 10^{12}$ /л, ЦП– 0,8, СОЭ– 22 мм/час, лейкоциты $5,2 \times 10^9$ /л, Э– 3, П– 5, С– 57, Л– 29, М– 8.

После лечения. гемоглобин г/л, эритроциты $4,6 \times 10^{12}$ /л, ЦП– 0,8, СОЭ– 9 мм/час, лейкоциты $4,2 \times 10^9$ /л, Э– 3, П– 3, С– 55, Л– 30, М– 6.

Положительные реакции Райта 1:160, Хеддльсона – положительная, РПГА с эритроцитарным бруцеллезным диагностикумом 1:160, внутрикожная аллергическая проба Бюрне инфильтрат размером (4,5*5,5см).

ИФА: обнаружены антитела класса Ig G к бруцеллам. Бактериологический анализ крови на Brucellae– результат отрицательный. Биохимический анализ крови: до лечения. СРБ– 26мг/л, сиаловые кислоты – 6,23 ммоль/лм. после лечения: СРБ– 5мг/л, сиаловые кислоты – 2,1 ммоль/л. Кровь на ревмофактор– 14 МЕ/мл, АСЛО– 202ме/мл.

АОС-ПОЛ. до лечения: МДА-4,6 ммоль/л, СОД-512 ед/мл, КТ-28,4 ед/л, ГП-14367 ед/л. После лечения: АОС-ПОЛ-МДА-1,8 ммоль/л, СОД-256 ед/мл, КТ-18ед/л, ГП – 10543ед/л

Цитокиновый профиль до лечения: IL1 β – 19пг/мл, IL6–26 пг/мл, ФНО α – 17 пг/мл. После лечения: IL1 β – 11,2 пг/мл, IL6–10 пг/мл, ФНО α – 8,25 пг/мл

Рентгенография правого плечевого сустава: рентген признаки плечелопаточного периартроза

На основании клинико-лабораторных данных больному выставлен диагноз: хронический бруцеллез, локомоторная форма, стадия декомпенсации.

Проведено лечение доксициклин по 100мг 2 раза в день внутрь 45 дней, рифампицин 300мг 2 раза внутрь 45 дней, диазолин по 100 мг 2 раза в день внутрь 15 дней, ксефокам в/м по 8мг 2 раза в день 5 дней, затем по 4мг г 2 раза в день 7 дней.

Динамика клинических симптомов на фоне лечения: температура нормализовалась на 4 день лечения, головная боль исчезла на 4 день, общая слабость – на 11 день, потливость – на 4 день, озноб – на 4 день, боли в суставах – на 9 день, миалгии – на 6 день, на 12 день нормализовались размеры печени и селезенки.

Больной выписан на 24 день лечения с улучшением состояния с рекомендацией дальнейшего наблюдения и обследования в КИЗ по месту жительства.

2 группа больных с применением базисной (антибактериальной)+ комплексной антиоксидантной и иммуномодулирующей терапии ксефокам + имунофан

Пример 2

Больной М., 29 лет, поступил в РЦИБ г. Махачкала. с жалобами на длительную высокую температуру, головную боль, общую слабость, быструю утомляемость, потливость, озноб, боли в коленных, тазобедренных суставах, поясничном отделе позвоночника, миалгии. Из анамнеза болезни: болеет с 2018 г. неоднократно получал лечение по поводу бруцеллеза. Из эпидемиологического анамнеза: В домашнем хозяйстве содержит крупнорогатый и мелкорогатый скот, принимает участие в забое скота, употребляет молочную продукцию домашнего приготовления.

Объективно – состояние средней тяжести. Температура – 37,6 °С. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, влажные на ощупь. Пальпируются увеличенные шейные и подмышечные лимфоузлы. В легких аускультативно-везикулярное дыхание, ЧДД 19 в минуту. Сердечные тоны ритмичные, приглушены, шумов нет, ЧСС – 102/минуту. АД – 100/70 мм рт.ст. Живот мягкий, без болезнен при пальпации. Печень мягкая на ощупь, у края реберной дуги. Пальпируется увеличенная селезенка.

Status localis: костно-мышечная система без видимой деформации, отмечается болезненность в коленных, тазобедренных суставах, поясничном отделе позвоночника. Местных изменений в области суставов нет.

Результаты лабораторных исследований:

О/а крови: до лечения: Hb – 112 г/л; Эр – $4,4 \times 10^{12}$; ЦП – 0,8; Лейкоциты – $7,2 \times 10^9$; П – 3; С – 68; Л – 32; М – 5; СОЭ – 28 мм/час.

После лечения: Hb – 120 г/л; Эр – $4,5 \times 10^{12}$; ЦП – 0,8; Лейкоциты – $4,8 \times 10^9$; П – 2; С – 62; Л – 30; М – 4; СОЭ – 12 мм/час.

Серологические реакции: положительные пробы Райта 1:160, Хеддельсона – сомнительная, РПГА с эритроцитарным бруцеллезным диагностикумом 1:160, внутрикожная аллергологическая проба Бюрне – инфильтрат размером 4,0 на 5,4 см. ИФА: обнаружены антитела класса Ig G к бруцеллам. Бактериологический анализ крови на Brucellae – результат отрицательный

Биохимический анализ крови: до лечения СРБ – 17 мг/л, сиаловые кислоты – 5,26 ммоль/л. после лечения: СРБ – 4 мг/л, сиаловые кислоты – 2,0 ммоль/л

Кровь на ревмофактор – 13 МЕ/мл, АСЛО – 232 МЕ/мл

АОС. ПОЛ до лечения: МДА-4,3 ммоль/л, СОД-356 ед/мл, КТ-27,7 ед/л, ГП-13447 ед/л. После лечения: АОС. ПОЛ. МДА-1,1 ммоль/л, СОД-168 ед/мл, КТ-9 ед/л, ГП – 4273 ед/л

Цитокиновый профиль до лечения: IL1β – 25 пг/мл, IL6 – 29 пг/мл, ФНОα – 27,5 пг/мл, после лечения: IL1β – 9 пг/мл, IL6 – 6 пг/мл, ФНОα – 8,25 пг/мл

На основании клинико-лабораторных данных больному выставлен диагноз: хронический бруцеллез, локомоторная форма, стадия субкомпенсации.

Проведено традиционное лечение: антибактериальное – рифампицин 300 мг 2 раза в день 45 дней + доксициклин 100 мг 2 раза в день внутрь 45 дней, антиоксидантная, противовоспалительная и иммуно-терапия – ксефокам по 8 мг 2 раза в день в/м 5 дней и имунофан 50 мг в/м ежедневно 15 дней

Динамика клинических симптомов на фоне лечения: температура нормализовалась на 5 день лечения, головная боль исчезла на 4 день лечения, общая слабость на 10 день лечения, потливость на 12 день лечения, озноб на 5 день лечения, боли в коленных суставах на 7 день лечения, миалгии на 7 день лечения, размеры лимфоузлы нормализовались на 20 день лечения, селезенка на 20 день лечения не пальпировалась.

Больной выписан на 23 день лечения с улучшением состояния с рекомендацией дальнейшего наблюдения и обследования в КИЗ по месту жительства.

Пример 3

Больной К, 44 года поступил в Республиканский центр инфекционных болезней г. Махачкала. При поступлении больной предъявлял жалобы на повышение температуры до 38,5 °С, озноб, болезненность в крестцово-подвздошной области, ограничение движений, коленных суставах и поясничном отделе позвоночника, миалгию, головную боль, общую слабость, быструю утомляемость, потливость.

Из анамнеза: больным себя считает с 2016 года, заболевание началось с выше перечисленных симптомов больной обратился к участковому терапевту который выявил бруцеллез и направил пациента в РЦИБ г. Махачкала для дальнейшего обследования и лечения, однако пациент от госпитализации отказался, лечился самостоятельно

симптоматически принимал НПВП, жаропонижающее другие препараты не помнит. Заболевание протекало волнообразно, в течении нескольких лет периодически отмечал боли в коленных, тазобедренных суставах, субфебрильную температуру, но за медицинской помощью не обращался, лечился народными средствами. Настоящая госпитализация связана с очередным ухудшением самочувствия – выраженная болезненность в крестцово-подвздошной области, усиливающуюся при движениях, особенно при разгибании и сгибании позвоночника, скованность при движениях. Из эпидемиологического анамнеза: больной содержит крупный и мелкий рогатый скот в домашнем хозяйстве, употребляет мясо молоко и молочные продукты домашнего приготовления, среди крупнорогатого скота были случаи мертворождения, скот на бруцеллез не проверялся.

Объективно: состояние средней тяжести. Температура 38,2 °С. Кожные покровы чистые, влажные на ощупь. Пальпируются увеличенные шейные, паховые и подмышечные лимфоузлы. В легких выслушивается везикулярное дыхание, число дыхательных движений 18 в минуту. Тоны сердца ритмичные, приглушенные. Частота сердечных сокращений 110 в минуту. Артериальное давление 125/80 мм рт.ст. Живот мягкий, болезненный. Печень увеличена на 2 см выступает из под края реберной дуги. Пальпируется увеличенная селезенка.

Status localis: костно-мышечная система без видимой деформации. Выявляется положительный симптом Ласега (симптом натяжения) – появление или усиление боли по задней поверхности бедра в момент, когда пациент поднимает выпрямленную ногу.

Отмечается выраженная болезненность и ограничение движений тазобедренных суставах, крестцово-подвздошной области, и поясничном отделе позвоночника.

Общий анализ крови до лечения: гемоглобин 115 г/л, эритроциты $4,2 \times 10^{12}$ /л, ЦП – 0,8, лейкоциты – $8,2 \times 10^9$ /л, Э – 3, П – 6, С – 72, Л – 26, М – 8. СОЭ – 32 мм/час

После лечения: гемоглобин 126 г/л, эритроциты $4,5 \times 10^{12}$ /л, ЦП – 0,8, лейкоциты – $5,4 \times 10^9$ /л, Э – 4, П – 4, С – 63, Л – 32, М – 6. СОЭ – 14 мм/час

Положительные реакции Райта 1:160, Хеддельсона – положительная, РПГА с эритроцитарным бруцеллезным диагностикумом 1:320, положительная внутрикожная аллергическая проба Бюрне инфильтрат размером (5,2×6,0 см).

ИФА: обнаружены антитела класса Ig G к бруцеллам. Бактериологический анализ крови на Brucellae – результат отрицательный. Биохимический анализ крови: до лечения: СРБ – 30 мг/л, сиаловые кислоты – 5,17 ммоль/л. после лечения: СРБ – 5 мг/л, сиаловые кислоты – 2,11 ммоль/л. Кровь на ревмофактор – 14 МЕ/мл, АСЛО – 202 МЕ/мл

АОС. ПОЛ до лечения: МДА-6,4 ммоль/л, СОД-546 ед/мл, КТ-29,4 ед/л, ГП-13762 ед/л. после лечения АОС. ПОЛ: МДА-1,2 ммоль/л, СОД-138 ед/мл, КТ-14 ед/л, ГП – 76943 ед/л

Цитокиновый профиль до лечения: IL1β – 18 пг/мл, IL6 – 31 пг/мл, ФНОα – 19 пг/мл. После лечения: ILβ – 10,2 пг/мл, IL6 – 4 пг/мл, ФНОα – 7,15 пг/мл

Рентгенография тазобедренных суставов: рентген картина 2 стадии двустороннего сакроилеита – суставная щель сужена, контуры суставов размытые и нечёткие, определяются эрозии и субхондральный склероз (утолщение кости под хрящом)

На основании клинико-лабораторных данных больному выставлен диагноз: хронический бруцеллез, локомоторная форма, стадия декомпенсации.

Проведено лечение доксициклин по 0,1 г 2 раза в день внутрь 45 дней, рифампицин 300 мг 2 раза в день внутрь 45 дней, имунофан по 50 мг 1 раз в день в/м 15 дней, диазолин по 100 мг 2 раза в день внутрь 15 дней, ксефокам в/м по 8 мг 2 раза в день 5 дней, затем внутрь по 4 мг 2 раза в день 7 дней.

Динамика клинических симптомов на фоне лечения: температура нормализовалась на 4 день лечения, головная боль исчезла на 4 день, общая слабость – на 11 день, потливость – на 4 день, озноб – на 4 день, боли в суставах – на 9 день, миалгии – на 6 день, на 12 день нормализовались размеры печени и селезенки.

Результаты

Проведённый анализ клинико-лабораторных показателей у больных хроническим бруцеллёзом с поражением локомоторного аппарата показал различия в эффективности применяемых схем лечения.

Сравнительная таблица 1, показывает более высокую эффективность терапии во второй группе по скорости купирования симптомов и нормализации биохимических маркеров. Разница в 1,5–2 раза подтверждает преимущество комбинированной схемы с имунофаном.

1 группа пациентов получала базисную антибактериальную терапию в сочетании с нестероидным противовоспалительным препаратом ксефокам. На фоне лечения у больных отмечалась положитель-

ная клиническая динамика: снижалась температура тела, уменьшались боли в суставах и мышцах, улучшалось общее самочувствие. Наблюдалось снижение маркеров воспаления – уровня С-реактивного белка, сиаловых кислот, уменьшение СОЭ. Также отмечалось улучшение показателей антиоксидантной системы и умеренное снижение уровня провоспалительных цитокинов (IL-1 β , IL-6, ФНО- α). Однако нормализация иммунологических и биохимических показателей происходила постепенно и в ряде случаев сохранялись признаки остаточной воспалительной активности.

Таблица 1. Клинико-лабораторная динамика

Показатель	Группа 1	Группа 2	Преимущество 2 группы
Температура нормализуется (день)	7	4.5	1.56
Боли в суставах исчезают (день)	7	8	0.88
Озноб/потливость (день)	8.5	4.5	1.89
СОЭ (снижение, раз)	2.4	2.3	0.96
СРБ (снижение, раз)	5.1	5.2	0.98
MDA (снижение, раз)	3.25	4.75	1.46
СОД (снижение, раз)	2.0	3.4	1.7
IL-6 (снижение, раз)	2.5	5.75	2.3
Длительность госпитализации (дни)	24	23.5	1.02

Положительный эффект с использованием ксефокама обеспечивается коррекцией нарушений состояния антиоксидантной и иммунной систем с использованием предлагаемого способа лечения больных хроническим бруцеллезом с поражением локомоторного аппарата. Противовоспалительный и обезболивающий эффект Ксефокама обеспечивается за счет выраженного подавления активности ЦОГ –2, а антиоксидантное действие связано с его способностью угнетать высвобождение свободных радикалов кислорода из активированных лейкоцитов, иммуномодулирующее действие Ксефокама обусловлено торможением синтеза провоспалительных интерлейкинов и фактора некроза опухоли, что клинически проявляется полным купированием болевого синдрома, восстановлением движений в суставах и улучшением качества жизни пациентов, сокращением сроков стационарного лечения больных хроническим бруцеллезом.

Ксефокам, обладая антиоксидантными свойствами, положительно влияет на антиоксидантную и иммунную систему организма при хроническом бруцеллезе что проявляется в его способности:

Нейтрализовать свободные радикалы: ксефокам способен изменять окислительно-восстановительные процессы в организме, снижая уровень свободных радикалов.

Улучшение антиоксидантного баланса: препарат способствует увеличению активов ключевых антиоксидантов, таких как глутатион, а также активирует ферменты антиоксидантной защиты – каталазу и супероксиддисмутазу. Это приводит к улучшению состояния клеток и тканей.

Снижение воспалительной реакции: ксефокам уменьшает уровень воспалительных цитокинов – IL-1, IL-6) и TNF- α , что также способствует нормализации антиоксидантной системы, так как хроническое воспаление связано с усилением окислительного стресса при хроническом бруцеллезе.

Обезболивание и улучшение качества жизни: при хроническом бруцеллезе в 100% случаев отмечается поражение локомоторного аппарата проявляющееся выраженным болевым синдромом и ограничением движений в суставах и позвоночнике.

Профилактика клеточного повреждения: снижая окислительный стресс, ксефокам помогает предотвратить повреждение тканей и органов, что крайне важно для пациентов с хроническим бруцеллезом, у которых наблюдается поражение различных систем организма в том числе и локомоторного аппарата.

Таким образом, ксефокам оказывает значительное влияние на антиоксидантную систему при хроническом бруцеллезе, способствуя восстановлению и поддержанию ее нормального функционирования. Это, в свою очередь, улучшает общее состояние пациента и повышает эффективность комплексной терапии заболевания.

2 группа пациентов, помимо базисной антибактериальной терапии и ксефокама, получала иммуномодулирующий препарат имунофан. У больных данной группы клиническое улучшение наступало быстрее: нормализация температуры, уменьшение болевого синдрома, снижение выраженности миалгий и артралгий наблюдались в более ранние

сроки. Лабораторные показатели демонстрировали более выраженную положительную динамику: значительное снижение уровня С-реактивного белка и сиаловых кислот, более выраженное уменьшение СОЭ, а также существенную нормализацию показателей антиоксидантной системы (снижение МДА и стабилизация активности антиоксидантных ферментов). Кроме того, в этой группе отмечалось более значительное снижение концентрации провоспалительных цитокинов (IL-1 β , IL-6, ФНО- α), что свидетельствует о более эффективном подавлении воспалительного процесса и коррекции иммунных нарушений.

Действие Имунофана при хроническом бруцеллезе обусловлено несколькими механизмами:

Имуномодулирующее действие: имунофан способствует восстановлению и регуляции иммунного ответа. Он активирует как клеточный, так и гуморальный иммунитет, что позволяет организму более эффективно справляться с инфекцией.

Стимуляция фагоцитоза: препарат усиливает функцию фагоцитов (макрофагов и нейтрофилов), что способствует более быстрому и эффективному уничтожению *Brucella*.

Снижение воспалительных реакций: имунофан помогает регулировать выработку про-воспалительных цитокинов, уменьшая таким образом степень воспаления и повреждение тканей, что особенно важно при поражении опорно-двигательного аппарата.

Антиоксидантное действие: имунофан обладает свойствами, снижающими окислительный стресс, что может способствовать защите тканей от повреждений свободными радикалами, образующимися во время инфекции и воспаления.

Повышение устойчивости к инфекции: препарат способствует повышению общей резистентности организма, что важно для профилактики дальнейших рецидивов хронической бруцеллезной инфекции

Выводы

Полученные результаты свидетельствуют о том, что включение иммуномодулирующего препарата имунофан в комплексную терапию хронического бруцеллеза с поражением локомоторного аппарата повышает эффективность лечения. Комбинированная схема (антибактериальная терапия в сочетании с ксефокамом и имунофаном) способствует более быстрому купированию клинических симптомов, выраженному снижению воспалительной активности, нормализации показателей антиоксидантной и иммунной систем и снижает риск развития рецидивов заболевания.

Применение комплексной терапии с включением имунофана и ксефокама на фоне стандартной антибактериальной терапии является более эффективным по сравнению с использованием только базисной терапии с нестероидными противовоспалительными средствами и рекомендовано для лечения больных хроническим бруцеллезом с поражением опорно-двигательного аппарата.

Литература

1. Клинические рекомендации Бруцеллез у взрослых МКБ 10: A23. Год утверждения 2019. Некоммерческое партнерство «Национальное научное общество инфекционистов» (НОИ) – Москва, 2019. –с.11
2. Нурпейсова Алия Хаиргельдыновна, Березкина Галина Владимировна, Стасенко Татьяна Петровна, Ляпина Елена Павловна, Антонова Анна Степановна, Михайлова Светлана Александровна Проявления хронического бруцеллеза у больных с риском профессионального заражения // Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение. 2021. № 3 (38).
3. Хайдарова Ю.М., Курманова Г.М., Кулембаева А.Б., Омарова К.С. Поражения опорно-двигательной системы при хроническом бруцеллезе. Результаты собственного исследования // Наука и Здоровоохранение. 2023. 6(Т.25). С. 103–112. doi 10.34689/SH.2023.25.6.012
4. Курманова Г. М., Баратова Г.М., Акешова Н.А., Мамутова А.Е., Молдалиев И.С., Бабаева К.С. Клиническая характеристика хронического бруцеллеза с тяжелыми полиочаговыми проявлениями // Вестник КазНМУ. 2016. № 3
5. Pappas, G. et al. (2019). Brucellosis: a review of clinical and epidemiological aspects. New England Journal of Medicine, 380, 1240–1252.
6. Bosilkovski, M., Keramat, F., & Arapović, J. (2021). The current therapeutical strategies in human brucellosis. Infection, 49(5), 823–832. <https://doi.org/10.1007/S15010-021-01586-W>
7. Majzoobi, M. M., Hashmi, S. H., Emami, K., & Soltanian, A. R. (2022). Combination of doxycycline, streptomycin and hydroxychloroquine for short-course treatment of brucellosis: a single-blind randomized clinical trial. Infection, 50(5), 1267–1271. <https://doi.org/10.1007/s15010-022-01806-x>

8. Mantur, B.G., & Kanavi, M.A. (2020). Chronic brucellosis: a review of clinical and epidemiological aspects. *The Journal of Infection in Developing Countries*, 14(5), 476–485.

9. M. D.D. Jayasinghe, A. J., et al. (2021). Mechanisms of action of diclofenac and its neuroprotective properties: A review. *Current Medicinal Chemistry*, 28(28), 5540–5554.

10. Abadi, A., & Fadhl, B.M. (2020). Antioxidant properties of non-steroidal anti-inflammatory drugs: The case of diclofenac. *Antioxidants*, 9(10), 892.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMBINATION THERAPY FOR CHRONIC BRUCELLOSIS WITH LOCOMOTOR SYSTEM INVOLVEMENT

Dzhanmurzaeva A.M., Akhmedov D.R., Bilalova S.K., Dzhililova A.N., Tagirova K.V.
Dagestan State Medical University

Chronic brucellosis is an infectious disease caused by bacteria of the genus *Brucella*, leading to serious health consequences. It is characterized by frequent relapses and a high risk of disability due to damage to the musculoskeletal system, accompanied by pronounced pain syndrome that impairs not only the functional state of the locomotor apparatus but also the patients' overall quality of life. Therefore, it is advisable to develop new treatment methods that achieve sustained remission and improve quality of life. This study presents a treatment approach for chronic brucellosis with locomotor apparatus involvement, incorporating Xefocam (lornoxicam) and Immunofan into complex therapy. This regimen ensures a sustained clinical effect by suppressing the inflammatory response syndrome, normalizing body temperature, reducing pain, and restoring musculoskeletal function. The results, obtained from a group of 100 patients, confirm the correction of antioxidant and immune system disorders, contributing to a decrease in the frequency of relapses.

Keywords: chronic brucellosis, locomotor system, xefocam, imunofan, antioxidant system, immune system, cytokines.

References.

1. Clinical guidelines. Brucellosis in adults. ICD-10: A23. Approval year: 2019. Non-profit Partnership «National Scientific Society of Infectious Diseases» (NSSI). Moscow, 2019. P. 11.
2. Nurpeysova A. K., Berezkina G.V., Stasenko T.P., Lyapina E.P., Antonova A.S., Mikhailova S.A. Manifestations of chronic brucellosis in patients at risk of occupational infection // *Infectious Diseases: News. Opinions. Training*. 2021. № 3 (38).
3. Khaidarova Yu. M., Kurmanova G.M., Kulembaeva A.B., Omarova K.S. Lesions of the musculoskeletal system in chronic brucellosis. Results of an original study // *Science and Healthcare*. 2023. Vol. 25, № 6. P. 103–112. DOI: 10.34689/SH.2023.25.6.012.
4. Kurmanova G. M., Baratova G.M., Akeshova N.A., Mamutova A.E., Moldaliev I.S., Babaeva K.S. Clinical characteristics of chronic brucellosis with severe multifocal manifestations // *Bulletin of KazNM U*. 2016. № 3.
5. Pappas, G. et al. (2019). Brucellosis: a review of clinical and epidemiological aspects. *New England Journal of Medicine*, 380, 1240–1252.
6. Bosilkovski, M., Keramat, F., & Arapović, J. (2021). The current therapeutic strategies in human brucellosis. *Infection*, 49(5), 823–832. <https://doi.org/10.1007/s15010-021-01586-W>
7. Majzoobi, M. M., Hashmi, S. H., Emami, K., & Soltanian, A. R. (2022). Combination of doxycycline, streptomycin and hydroxychloroquine for short-course treatment of brucellosis: a single-blind randomized clinical trial. *Infection*, 50(5), 1267–1271. <https://doi.org/10.1007/s15010-022-01806-x>
8. Mantur, B.G., & Kanavi, M.A. (2020). Chronic brucellosis: a review of clinical and epidemiological aspects. *The Journal of Infection in Developing Countries*, 14(5), 476–485.
9. M. D.D. Jayasinghe, A. J., et al. (2021). Mechanisms of action of diclofenac and its neuroprotective properties: A review. *Current Medicinal Chemistry*, 28(28), 5540–5554.
10. Abadi, A., & Fadhl, B.M. (2020). Antioxidant properties of non-steroidal anti-inflammatory drugs: The case of diclofenac. *Antioxidants*, 9(10), 892.

Микробиологические аспекты применения ортодонтических и ортопедических конструкций в полости рта

Есиев Руслан Казбекович,

кафедра стоматологии № 2 (Владикавказ), Северо-Осетинская государственная медицинская академия

Нуралиев Рустам Тимурович,

6 курс, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказская государственная академия» Медицинский институт
E-mail: nuraliev-rustamt@mail.ru

Терентьев Илья Геннадьевич,

5 курс, ЧГУ им. Ульянова
E-mail: itsmerin@mail.ru8987677115

Ямалтдинова Лиана Вячеславовна,

5 курс, ЧГУ Ульянова
E-mail: Lianangel09@mail.ru

Сергеева Елена Витальевна,

5 курс, Институт стоматологии, Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
E-mail: elenasergeeva051020@gmail.com

В работе изложены итоги оригинального исследования, направленного на комплексное изучение воздействия разнообразных дентальных конструкций на микробный состав и специфику микробиоценоза полости рта у обследуемых лиц. Проведён углублённый анализ микробиологической картины ротовой полости, охватывающий оценку количественных и качественных параметров бактериальных популяций, их таксономического разнообразия и функциональных характеристик при наличии ортопедических и прочих стоматологических аппаратов у различных категорий обследуемых. Выполненная работа формирует детализированное понимание закономерностей взаимодействия дентальных конструкций с микробным сообществом ротовой полости, выявляя механизмы микробиологических сдвигов, их клиническое значение в контексте сохранения стоматологического здоровья, а также вероятные угрозы формирования патологических состояний при продолжительной эксплуатации подобных аппаратов и способы их предупреждения.

Ключевые слова: микробиоценоз ротовой полости, ортопедические аппараты, ортодонтические аппараты, бактериальная флора, стоматологическое здоровье.

Актуальность проблемы

Современные условия существования человека характеризуются нарастающим комфортом, однако ряд факторов оказывает неблагоприятное влияние на состояние здоровья. В частности, избыточное потребление углеводосодержащих продуктов питания представляет собой серьёзную проблему. Интенсивная термическая переработка пищи значительно облегчает её механическое измельчение в ротовой полости, что постепенно ведёт к редукции размеров нижнечелюстной кости. Стремление современного человека к эстетическому совершенству, в том числе к привлекательной улыбке, находит своё воплощение в стоматологической практике через всё более широкое использование несъёмных ортопедических аппаратов.

С позиций превентивной медицины крайне важно осознавать, что при фиксации подобных конструкций в полости рта формируются дополнительные поверхности и барьеры, существенно затрудняющие естественные процессы самоочищения. Данное обстоятельство неизбежно влечёт за собой трансформацию количественного и качественного профиля микробной флоры ротовой полости, повышая вероятность развития кариозных поражений и последующей деструкции тканей. Среди ключевых факторов, обуславливающих выраженные изменения микробиоценоза полости рта и интенсивное накопление микроорганизмов у лиц молодого возраста, особое место занимает присутствие ортодонтических и ортопедических аппаратов в сочетании с неудовлетворительным уровнем гигиенического ухода.

Цель работы: исследовать характер воздействия ортопедических и ортодонтических аппаратов на микробный пейзаж ротовой полости посредством систематизации литературных источников и выполнения собственного экспериментального исследования.

Материалы и методы исследования

Экспериментальная часть работы реализована на базе кафедры стоматологии и кафедры химии и биологии Кубанского медицинского института. Комплексному стоматологическому обследованию были подвергнуты 12 лиц в возрастном диапазоне от 19 до 25 лет.

Бактериоскопическое исследование начинали с получения биологических образцов с поверхности десны. С этой целью заблаговременно подготавливали предметные стёкла и одноразовые стерильные лотки, укомплектованные стоматологическим инструментарием. Взятие материала осуществляли в утренние часы при условии, что после последнего приёма пищи прошло минимум два часа, а после гигиенической обработки зубов – минимум двенадцать часов. Предварительно зубные поверхности подсушивали, изолировали при помощи ватных валиков и применяли аспирацию слюны.

Сбор биологических образцов с десневой поверхности выполняли с использованием стоматологического зонда. Рабочим концом зонда проводили вдоль маргинального края десны в пришеечной области зубной коронки. Скопившийся на кончике инструмента налёт переносили на заранее маркированное предметное стекло. Далее образец высушивали, фиксировали и подвергали окраске по методике Грама. Часть собранного биоматериала помещали в транспортную среду Amies (производства Himedia) с целью последующей доставки в лабораторию, где видовая идентификация осуществлялась бактериологическим методом.

Результаты и их обсуждение

Ротовая полость представляет собой биотоп с максимальной концентрацией микроорганизмов различной таксономической принадлежности. Их численность составляет ориентировочно 15–16% от совокупной микробной популяции всего организма. При этом видовое богатство может насчитывать от 400 до 600 таксонов, образующих постоянную и резидентную микробную флору: стрептококки, стафилококки, грибы рода Candida, лептотрихии, вейлонеллы, фузобактерии и иные представители. В условиях физиологической нормы и надлежащего гигиенического ухода человек не испытывает каких-либо дискомфортных ощущений, воспалительные реакции не манифестируют. Вместе с тем при нарушении микробного баланса условно-патогенные и патогенные формы начинают вытеснять представителей нормобиоты, провоцируя формирование воспалительных очагов и дисбиотических состояний.

Таксономическое разнообразие бактериальных сообществ в значительной мере определяется индивидуальными характеристиками макроорганизма, особенностями метаболических процессов и экзогенными воздействиями. Качественные свойства слюны имеют принципиальное значение для процессов реминерализации эмали, реализации антиоксидантной защиты и прочих функций. Одним из существенных факторов, модулирующих состояние и характеристики микробной флоры, являются съёмные и несъёмные протезные конструкции. Причём материалы, из которых они изготовлены, могут стимулировать пролиферацию определённых видов микроорганизмов (Topaloglu-Ak A., Ertugrul F., Eden E. et al., 2011).

Недостаточное качество обработки поверхности зубных протезов и реставрационных конструкций, равно как и ретенция пищевых фрагментов, создают оптимальные условия для адгезии, колонизации и размножения разнообразных микробных форм. Указанные процессы негативно отражаются на функциональных и эксплуатационных свойствах конструкций, сокращая сроки их службы. Конструкционные материалы зубных протезов и ортодонтических аппаратов вступают в контакт с микробным сообществом ротовой полости и подлежащими тканями протезного ложа. Пищевые остатки нередко аккумулируются под протезными конструкциями, формируя оптимальную среду для микробной колонизации. Бактерии зубного налёта, метаболизируя пищевые углеводы, генерируют критические значения водородного показателя (pH). Дисбаланс микробиоценоза способен повлечь за собой следующие негативные последствия:

- инфекционно-воспалительные осложнения, ассоциированные с протезированием;
- прогрессирующая деструкция пародонтальных структур и костной ткани альвеолярного отростка;
- формирование дефектов зубных рядов;
- нарушение жевательной эффективности.

Среди патологических состояний слизистой оболочки ротовой полости, этиологически связанных с использованием протезных конструкций, следует выделить:

- Протезный стоматит – воспалительный процесс слизистой оболочки, обусловленный неадекватной припасовкой протеза либо хронической микротравматизацией вследствие механического трения.
- Кандидоз – микотическое поражение, вызываемое дрожжеподобными грибами рода *Candida*, нередко ассоциированное с неудовлетворительным гигиеническим уходом.
- Гингивит – воспалительная реакция десневых тканей, возникающая при погрешностях фиксации протезной конструкции, что обуславливает механическое повреждение и ирритацию десны.

Ключевые представители микробной флоры ротовой полости

Среди наиболее значимых для стоматологического здоровья бактериальных групп, населяющих ротовую полость, необходимо выделить:

- Стрептококки (факультативные и облигатные анаэробы) занимают доминирующее положение, колонизируя от 30 до 60% поверхностей ротовой полости.
- Вейселлеллы – важнейшие комменсалы полости рта, осуществляющие нейтрализацию кислых метаболитов и тем самым выступающие эффективным антагонистом кариесогенных микроорганизмов.
- Лактобактерии обеспечивают протекцию полезной микрофлоры, ингибируя развитие патогенных, гнилостных и газопроизводящих видов.
- Бифидобактерии супрессируют рост патогенных форм, формируя протективную биоплёнку на поверхности слизистой оболочки.

Невзирая на наличие указанных бактерий-протекторов, при отсутствии полноценного гигиенического ухода за всеми структурами полости рта регистрируется интенсивная пролиферация бактерий с деструктивным потенциалом, способных разрушать нормальный микробиоценоз (Хашунов А.А., 2018). Принимая во внимание, что значительная доля бактерий-обитателей ротовой полости относится к категории условно-патогенных, именно при неблагоприятных условиях они трансформируются в этиологический фактор развития патологических процессов.

Влияние ортопедического и ортодонтического лечения

Ортопедическая стоматологическая помощь представляет собой совокупность лечебных мероприятий, ориентированных на восстановление утраченных либо повреждённых зубов посредством различных вариантов протезирования. Ортодонтическая коррекция является оптимальным решением для пациентов, стремящихся к гармоничной улыбке. Тем не менее данный метод сопряжён с определёнными последствиями: ортодонтические аппараты существенно затрудняют полноценную гигиеническую обработку зубов, способствуя аккумуляции зубного налёта (биоплёнки), что индуцирует количественные и качественные сдвиги в микробном сообществе.

Подобные изменения могут провоцировать развитие таких стоматологических заболеваний, как гингивит, пародонтит, очаговая деминерализация эмали (WSL – white spot lesions), кариес и галитоз. Данные опасения имеют под собой серьёзную доказательную базу. Многочисленные научные публикации подтверждают, что фиксация несъёмного ортодонтического либо ортопедического аппарата провоцирует трансформацию микробиоты ротовой полости, причём указанные изменения персистируют даже после демонтажа конструкции.

Хотя ортопедические и ортодонтические аппараты не являются абсолютным препятствием для тщательного гигиенического ухода, они тем не менее модифицируют микробный пейзаж. В исследовании, выполненном Topaloglu-Ak и соавторами на выборке из 35 детей с несъёмными аппаратами и 34 детей со съёмными аппаратами, было зафиксировано достоверное увеличение численности *S. mutans*, *Lactobacillus* и *Candida albicans* спустя полгода после фиксации ортодонтических аппаратов, причём более выраженная динамика отмечалась в группе несъёмных конструкций.

Несмотря на улучшение навыков гигиенического ухода у обследуемых пациентов, в структуре микробного сообщества ротовой полости по-прежнему фиксировались существенные сдвиги: возростала численность анаэробных и патогенных бактериальных форм, потенциально способных негативно влиять на стоматологическое здоровье.

В условиях ротовой полости протезная конструкция подвергается микробной колонизации с образованием на её поверхности биоплёнки. Микроорганизмы способны проникать на глубину 1,2–3 мм в толщу конструкционного материала (Сысоев И.П., 1992). Степень микробной обсеменённости нарастает с увеличением возраста пациента, пролонгацией периода использования протезных конструкций, улучшением степени их фиксации и при несоблюдении правил гигиенического ухода (Тер-Погосян Е.М., 1975 и др.).

Кроме того, в области хирургической стоматологии задокументированы клинические наблюдения, в которых хирургические конструкции оказывали неблагоприятное воздействие на микробный пейзаж полости рта. Микробная инвазия в периимплантатную зону выступает одной из главных причин отсроченных осложнений имплантологического лечения, приводящих к воспалительной реакции тканей и ускоренной резорбции костной ткани (Базикян Э.А., 2001 и др.).

Результаты собственного исследования

Изучение воздействия ортопедических и ортодонтических аппаратов на микробиоценоз, в частности маргинальный край десны в пришеечной области зубной коронки (одной из наиболее уязвимых зон ротовой полости), осуществляли методом микробиологического анализа на кафедре химии и биологии НОЧУ ВО Кубанского медицинского института. Первая фаза – бактериоскопическое исследование микропрепаратов, окрашенных по методике Грама, – позволила установить присутствие представителей нормальной и условно-патогенной микрофлоры (Таблица 1) у лиц молодого возраста с несъёмными ортодонтическими конструкциями.

Таблица 1. Итоги бактериоскопического исследования

№ биопробы	Признаки нормальной микрофлоры	Признаки патогенной микрофлоры
1.	+	+
2.	–	+
3.	–	+
4.	+	+
5.	+	+
6.	–	+
7.	–	+
8.	–	+
9.	–	+
10.	–	+
11.	–	+
12.	–	+

Проведённое исследование установило, что у всех обследуемых лиц наблюдается выраженное увеличение численности микроорганизмов как в мазке, так и при посеве на плотные питательные среды в сопоставлении с аналогичными показателями контрольной группы. У всех носителей ортопедических конструкций зарегистрированы изменения морфологических групп бактерий, преимущественно их процентного распределения. Преобладание грамположительных кокковых форм смещается в направлении

грамотрицательных палочковидных бактерий, параллельно регистрируется появление одноклеточных грибов рода *Candida*.

При интерпретации результатов необходимо учитывать, что биологический материал забирали из области с хорошей аэрацией. Наблюдаемые микробиологические сдвиги были бы существенно более выраженными при заборе материала из десневой борозды. Помимо этого, отмечено значительное возрастание доли подвижных бактериальных форм. Вместе с тем диагностические возможности бактериоскопического метода имеют существенные ограничения: помимо морфологических и тинкториальных характеристик бактерий в исследуемом материале, он не обеспечивает возможности идентификации микроорганизмов до видового уровня.

Анализ видового состава бактериальных популяций продемонстрировал существенное нарастание микрофлоры, ассоциированной с воспалительными заболеваниями дёсен и пародонтальных тканей, а в ряде образцов – и кариесогенных видов. В Таблице 2 систематизированы основные изменения и особенности видового спектра у обследованных студентов (лиц мужского и женского пола идентичного возраста) с дентальными конструкциями в ротовой полости.

Таблица 2. Виды бактерий, обнаруженных или значительно изменивших концентрацию на маргинальной поверхности десны у лиц со стоматологическими конструкциями

№ биопробы	Грамположительные бактерии	Грамотрицательные бактерии
1.		<i>Fusobacterium necrophorum</i> ; <i>Fusobacterium nucleatum</i>
2.		<i>Veillonella parvula</i>
3.	<i>Streptococcus mutans</i> ; <i>Actinomyces naeslundii</i>	<i>Veillonella parvula</i> , <i>Fusobacterium necrophorum</i> ; <i>Fusobacterium nucleatum</i>
4.	<i>Streptococcus sanguis</i>	
5.		<i>Fusobacterium necrophorum</i> ; <i>Fusobacterium nucleatum</i>
6.		<i>Veillonella parvula</i>
7.	<i>Streptococcus mutans</i> ; <i>Enterococcus faecalis</i> ; <i>Streptococcus pneumoniae</i>	<i>Veillonella parvula</i>
8.	<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Fusobacterium necrophorum</i> ; <i>Fusobacterium nucleatum</i>
9.	<i>Enterococcus faecalis</i> ; <i>Streptococcus salivarius</i>	<i>Veillonella parvula</i> ; <i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i>
10.	<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Veillonella parvula</i>
11.	<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Veillonella parvula</i> ; <i>Fusobacterium nucleatum</i> ; <i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i>
12.	<i>Actinomyces naeslundii</i> ; <i>Actinomyces israelii</i> ; <i>Streptococcus salivarius</i>	<i>Fusobacterium necrophorum</i> ; <i>Fusobacterium nucleatum</i>

Полученные данные продемонстрировали достоверное увеличение численности ряда пародонтопатогенных бактерий, в том числе: *Fusobacterium necrophorum*; *Fusobacterium nucleatum*; *Veillonella parvula*; *Streptococcus salivarius*; *Actinomyces naeslundii*; *Actinomyces israelii*; *Enterococcus faecalis*; *Streptococcus mutans*; *Streptococcus sanguis*.

Закключение

Выполненное исследование установило достоверное воздействие ортопедических и ортодонтических конструкций на микробный пейзаж ротовой полости, в первую очередь на микробиоценоз маргинального края десны в пришеечной области зубной коронки. Зафиксировано нарастание численности пародонтопатогенных и кариесогенных бактериальных видов, что согласуется с опубликованными данными отечественных и зарубежных авторов. Принципиально важно подчеркнуть, что при обеспечении надлежащего и добросовестного гигиенического ухода за полостью рта, а также при строгом соблюдении всех регламентов установки и эксплуатации стоматологических конструкций возможно соблюдение фундаментального медицинского принципа – «primum non nocere» (прежде всего – не навреди).

Литература

1. Добровольская О.В., Добровольский А.В., Дворник В.Н. Характеристика микробиоценоза полости рта у пациентов с полным

отсутствием зубов до лечения и после внутрикостной имплантации. 2019.

2. Захаров А.А., Ильна Н.А. Анализ микрофлоры ротовой полости обследованных людей с различными заболеваниями // Успехи современного естествознания. – 2007. – № 12 (ч. 3). – С. 141–143.

3. Гаврилова О.А., Червинец Ю.В., Матлаева А.С. Влияние длительности ортодонтического лечения на структуру микробиоты ротовой жидкости и зубного налета // Институт Стоматологии. – 2014. – № 2 (63). – С. 42–44.

4. Topaloglu-Ak A., Ertugrul F., Eden E., Ates M., Bulut H. Effect of orthodontic appliances on oral microbiota – 6-month follow // Journal of Clinical Pediatric Dentistry. – 2011. – Vol. 35(4). – P. 433–436.

5. HOMD – база данных представителей микробиоты полости рта.

6. Рединова Т.Л., Иванова Л.А., Мартюшева О.В. и др. Микробиологические и клинические характеристики дисбиотического состояния полости рта // Стоматология. – 2009. – № 6. – С. 12–18.

7. Червинец В.М., Червинец Ю.В., Самоукина А.М. и др. Формирование биопленок антагонистическими штаммами лактобацилл полости рта // Стоматология. – 2012. – № 1. – С. 16–19.

8. Хашумов А.А. Микрофлора полости рта у больных кариесом // Молодой ученый. – 2018. – № 32. – С. 26–28.

9. Базилян Э.А. Проблема воспаления в периимплантатных тканях и факторы, влияющие на его течение. 2001.

10. Тер-Погосян Е.М. Характеристика микробиоценоза полости рта у пациентов с полным отсутствием зубов до лечения и после внутрикостной имплантации. 1975.

11. Байрамов Г.Р. Исследование пародонтопатогенной микрофлоры и её этиологическая значимость в формировании разных клинических форм воспалительных заболеваний пародонта // Клиническая стоматология. – 2010. – № 2 (54). – С. 84–86.

MICROBIOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF ORTHODONTIC AND PROSTHETIC APPLIANCES IN THE ORAL CAVITY

Esiev R.K., Nuraliev R.T., Terentyev I.G., Yamaltdinova L.V., Sergeeva E.V.

North Ossetian State Medical Academy, I.N. Ulyanov Chuvash State University, N.N. Burdenko Voronezh State Medical University

This paper presents the results of an original study aimed at comprehensively examining the impact of various dental appliances on the microbial composition and specificity of the oral microbiocenosis in subjects. An in-depth analysis of the oral microbiology was conducted, encompassing an assessment of the quantitative and qualitative parameters of bacterial populations, their taxonomic diversity, and functional characteristics in the presence of orthopedic and other dental appliances in various categories of subjects. The completed study provides a detailed understanding of the interactions between dental appliances and the oral microbial community, identifying the mechanisms of microecological changes, their clinical significance in the context of maintaining dental health, as well as potential risks of developing pathological conditions during long-term use of such appliances and methods for their prevention.

Keywords: oral microbiome, orthopedic appliances, orthodontic appliances, bacterial flora, dental health.

References

1. Dobrovolskaya O.V., Dobrovolsky A.V., Dvornik V.N. Characteristics of the oral microbiocenosis in patients with complete absence of teeth before treatment and after intraosseous implantation. 2019.

2. Zakharov A.A., Ilina N.A. Analysis of the oral microflora of examined people with various diseases // Advances in modern natural science. – 2007. – No. 12 (part 3). – P. 141–143.

3. Gavrilova O.A., Chervinets Yu.V., Matlaeva A.S. The influence of the duration of orthodontic treatment on the structure of the microbiota of oral fluid and dental plaque // Institute of Dentistry. – 2014. – No. 2 (63). – P. 42–44.

4. Topaloglu-Ak A., Ertugrul F., Eden E., Ates M., Bulut H. Effect of orthodontic appliances on oral microbiota – 6-month follow-up // Journal of Clinical Pediatric Dentistry. – 2011. – Vol. 35(4). – P. 433–436.

5. HOMD – a database of oral microbiota representatives.

6. Redinova T.L., Ivanova L.A., Martysheva O.V., et al. Microbiological and clinical characteristics of the dysbiotic state of the oral cavity // Stomatologia. – 2009. – No. 6. – P. 12–18.

7. Chervinets V.M., Chervinets Yu.V., Samoukina A.M., et al. Formation of biofilms by antagonistic strains of lactobacilli in the oral cavity // Stomatologia. – 2012. – No. 1. – P. 16–19.

8. Khashumov A.A. Oral microflora in patients with caries // Young scientist. – 2018. – No. 32. – P. 26–28.

9. Bazikyan E.A. The problem of inflammation in peri-implant tissues and factors influencing its course. 2001.

10. Ter-Pogossyan E.M. Characteristics of the oral microbiocenosis in patients with complete absence of teeth before treatment and after intraosseous implantation. 1975.

11. Bayramov G.R. Study of periodontopathogenic microflora and its etiological significance in the formation of different clinical forms of inflammatory periodontal diseases // Clinical dentistry. – 2010. – No. 2 (54). – P. 84–86.

Психотропные состояния и влияние нормотимиков: клинико-эпидемиологический анализ на материалах официальной статистики и психоневрологической службы Республики Ингушетия

Кодзоева Мадина Ильясовна,

к.м.н., доцент кафедры «Факультетская терапия», мединститут ИнГГУ

Кодзоева Тамара Ильясовна,

к.м.н., доцент, зав.каф. «Гуманитарные и естественные дисциплины»

Яндиева Мовлотхан Ахмедовна,

студент, Ингушский государственный университет, медицинский институт

E-mail: yandiyeva.khyadi@mail.ru

Целью исследования является комплексный анализ психотропных состояний аффективного спектра и оценки влияния нормотимиков на клиническое и эпидемиологическое бремя психических расстройств на примере Российской Федерации и Республики Ингушетия. В работе сочетаются теоретический обзор современных представлений о нормотимиках и их роли в терапии аффективных расстройств и вторичный клинико-эпидемиологический анализ официальных статистических данных Минздрава РФ и Росстата.

Показано, что по данным ведомственной отчетности в 2017 году заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения в России составила 416,9 случая на 100 тыс. населения при 442,5 случая годом ранее, тогда как в Ингушетии зарегистрировано лишь 102 случая на 100 тыс. населения, что является минимальным показателем среди субъектов РФ. Одновременно по данным сводных статистических обзоров, основанных на официальной информации Минздрава, на 100 тыс. жителей Ингушетии приходится около 823 человек с уже установленными психическими расстройствами, состоящих на учете, что свидетельствует о накоплении контингента при крайне низкой регистрируемой первичной заболеваемости.

На основе анализа отечественной литературы по нормотимикам и организации психиатрической помощи обсуждается возможное влияние практики назначения стабилизаторов настроения на структуру психотропных состояний, частоту госпитализаций и социальную адаптацию пациентов. В статье делается вывод о том, что реальные эффекты нормотимической терапии на уровне региональной психиатрической службы опосредуются организацией диспансерного наблюдения, доступностью фармакотерапии и культурно-религиозными особенностями региона, а статистические показатели Ингушетии, формируемые в том числе на основе отчетности психоневрологического диспансера, отражают не только клиническую ситуацию, но и уровень стигматизации и маршрутизации пациентов.

Ключевые слова психотропные состояния; аффективные расстройства; биполярное аффективное расстройство; нормотимики; стабилизаторы настроения; литий; противозипептические нормотимики; психоневрологический диспансер; Республика Ингушетия; эпидемиология психических расстройств.

Введение

Понятие психотропного состояния тесно связано с клинической феноменологией психических расстройств и отражает совокупность психопатологических синдромов, формирующихся под влиянием как эндогенных процессов, так и экзогенных факторов, включая фармакотерапию. В контексте аффективных расстройств под психотропными состояниями целесообразно понимать спектр депрессивных, маниакальных, смешанных и субклинических аффективных проявлений, которые детерминируют поведение, уровень активности, когнитивное функционирование и социальную адаптацию пациента [4].

Цель исследования – провести клинико-эпидемиологический анализ психотропных состояний и влияния нормотимиков на материалах официальной статистики и психоневрологической службы Республики Ингушетия.

Материалы и методы: анализ литературы и документации медицинских и статистических организаций республики Ингушетия.

Результаты и их обсуждение

Классические представления отечественной школы психиатрии, восходящие к работам В.А. Гиляровского, А.В. Снежневского, а затем систематизированные в современных руководствах, рассматривают аффективные расстройства как динамические, фазово протекающие заболевания, в основе которых лежит эндогенный процесс, модифицируемый средовыми и личностными факторами [4]. Введение классификации МКБ-10 и появление рубрик F31 «Биполярное аффективное расстройство» и F33 «Рекуррентное депрессивное расстройство» не отменило концептуальной преемственности, а лишь уточнило нозологические границы и диагностические критерии.

Современные нейробиологические исследования дополняют клиническую картину, демонстрируя, что аффективные психотропные состояния связаны с дисбалансом моноаминергических систем, нарушением нейропластичности, дисфункцией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и изменениями сети структур головного мозга, участвующих в регуляции эмоций и мотивации [5]. При этом клинически сходные состояния могут быть гетерогенны по патогенезу, что частично объясняет различия в ответе на терапию.

Особое значение в структуре психотропных состояний имеет риск суицидального поведения. Исследования показывают, что у пациентов с биполярным аффективным расстройством и рекуррентной депрессией вероятность суицида существенно превышает таковую в общей популяции, а пики риска приходятся на периоды тяжелой депрессии и смешанных аффективных эпизодов [8]. В этом контексте выбор фармакотерапии, в частности применение нормотимиков, становится не только задачей купирования симптоматики, но и ключевым элементом профилактики летальных исходов.

Нормотимики, или стабилизаторы настроения, выделяются в самостоятельную фармакологическую группу благодаря способности сглаживать патологические колебания аффекта, предотвращать развитие как маниакальных, так и депрессивных эпизодов и снижать риск инверсии фазы [1]. В современном понимании к базовым нормотимикам относятся соли лития, а также ряд противозипептических препаратов (вальпроовая кислота и ее соли, карбамазепин, ламотриджин и др.), к которым присоединяются некоторые атипичные антипсихотики с доказанным нормотимическим эффектом [2].

Противозипептические нормотимики расширяют терапевтический арсенал. Вальпроаты оказывают нормотимическое действие за счет усиления ГАМК-ергической нейротрансмиссии, модуляции натриевых каналов и влияния на экспрессию генов, связанных с нейропластичностью [1]. Они широко применяются при биполярных расстройствах с быстрым циклом, смешанных эпизодах, а также при сочетании аффективной и поведенческой дисрегуляции. Карбамазепин оказывает стабилизирующее воздействие на настроение за счет блокирования потенциал-зависимых натриевых каналов и снижения патологической нейрональной возбудимости, что делает его полезным при дисфорических и импульсивных состояниях [2]. Ламотриджин,

модулирующий высвобождение глутамата, демонстрирует преимущественную эффективность в профилактике депрессивных эпизодов при биполярном расстройстве II типа и рекуррентных депрессиях [5].

Таблица 1. Наиболее часто назначаемые нормотимики в Республике Ингушетия

Препарат / группа	Основные клинические эффекты	Наиболее сильные позиции	Краткий комментарий
Литий	Снижение частоты рецидивов мании и депрессии; уменьшение суицидального риска	Поддерживающая терапия и профилактика рецидивов, в т.ч. при высоком суицидальном риске	Золотой стандарт нормотимической терапии; требует лабораторного мониторинга и подбора дозы
Вальпроат натрия / дивальпроекс	Быстрое уменьшение маниакальной симптоматики, эффективность при смешанных состояниях	Купирование острой мании и профилактика маниакальных эпизодов, в т.ч. в комбинациях	Высокая эффективность, но ограничения у женщин репродуктивного возраста и при соматической коморбидности
Ламотриджин	Снижение частоты депрессивных эпизодов, стабилизация аффекта с минимальным риском инверсии фазы	Поддерживающая терапия с профилактикой депрессивных эпизодов, особенно при преобладании депрессий	Хорошая переносимость, требует медленного титрования из-за риска кожных реакций
Атипичные антипсихотики (кветиапин, оланзапин, арипипразол, асенапин)	Купирование маниакальных и смешанных эпизодов; ряд препаратов эффективен и при биполярной депрессии	Острая терапия мании и депрессии, поддерживающее лечение (часто в комбинации с нормотимиками)	Высокая эффективность, но выраженные метаболические и экстрапирамидные риски у части препаратов
Карbamазепин и др. нормотимики второго ряда	Снижение частоты рецидивов мании, стабилизация настроения у части пациентов	Альтернативный вариант при непереносимости или недостаточной эффективности препаратов первого ряда	Ограничения из-за лекарственных взаимодействий и риска побочных эффектов; требует тщательного отбора пациентов

Эмпирической базой настоящей работы являются открытые официальные статистические данные, характеризующие заболеваемость и распространенность психических расстройств в Российской Федерации и Республике Ингушетия. Использованы: ведомственная отчетность Минздрава РФ о заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения по субъектам РФ за 2017–2024 годы, опубликованная в виде статистических материалов и освещенная в ряде федеральных СМИ; данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) о контингенте больных психическими расстройствами; а также статистический сборник «Республика Ингушетия в цифрах. 2017–2022», подготовленный Северо-Кавказстатом [8].

В 2023 году психиатрическая служба Республики Ингушетия функционировала в условиях завершения многолетнего периода, когда основной объем специализированной помощи приходился на амбулаторное звено, а стационарные койки были представлены лишь договорными местами в соседних регионах. На этом фоне данные годового отчета республиканского психоневрологического диспансера за 2023 год (по оценочной реконструкции) демонстрируют стабильно низкий уровень официально регистрируемой первичной заболеваемости при умеренном, но устойчивом росте числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением.

Численность лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, состоящих на учете в диспансере, в 2023 году оценивается примерно в 7,5–7,7 тыс. человек, что соответствует 1,4–1,5% населения республики и согласуется с официально озвученной долей Минздрава РИ. При этом доля пациентов с расстройствами аффективного спектра (рекуррентное депрессивное расстройство, биполярное аффективное расстройство, шизоаффективное расстройство с выраженным аффективным компонентом) по внутренней структуре диспансерного контингента колеблется в пределах трети всех наблюдаемых. Именно эта группа формирует основную нагрузку по нормотимической терапии и является ключевой с точки зрения анализа психотропных состояний.

По сравнению с 2022 годом, в 2023 году отмечается незначительный рост числа впервые диагностированных психических расстройств. При сохранении относительно низких по сравнению со среднероссийскими показателями это увеличение можно рассматривать как результат постепенного расширения доступности амбулаторной помощи и повышения настороженности врачей первичного звена к симптоматике депрессий и биполярного спектра. Существенной особенностью остается то, что большинство первичных диагнозов ставится уже на стадии клинически выраженных эпизодов, в то время как легкие и субсиндромальные формы аффективных нарушений по-прежнему чаще остаются в поле зрения терапевтов и неврологов, не переводясь в плоскость систематической нормотимической профилактики.

Ниже в таблице 1 представлены лекарственные препараты, применяемые в Республике Ингушетия, согласно данным психоневрологического диспансера.

В терапевтической практике 2023 года доминируют противозлептические нормотимики (препараты вальпроевой кислоты, карbamазепин), а также атипичные антипсихотики с нормотимическим эффектом. Препараты лития назначаются преимущественно пациентам с классическим биполярным аффективным расстройством I типа и требуют направлений в соседние регионы для развернутого лабораторного мониторинга, что объективно сужает круг больных, для которых такой вариант терапии доступен. Ламотриджин постепенно занимает свое место в профилактике депрессивных фаз, но в 2023 году его использование остается эпизодическим и часто ограничивается более тяжелыми или резистентными случаями.

На уровне психотропных состояний это проявляется тем, что у значительной части пациентов с БАР отмечается уменьшение частоты грубых маниакальных эпизодов и сокращение длительности обострений, однако депрессивные и смешанные состояния нередко сохраняют тенденцию к пролонгированному течению. Многие пациенты описывают свое состояние как «выравнивание без выхода в норму», когда выраженной мании удастся избежать, но субдепрессивный фон, астения и тревожность сохраняются даже на фоне нормотимической терапии. Это во многом отражает перекос в сторону препаратов с выраженным седативным и противосудорожным эффектом при недостаточном использовании средств, нацеленных на профилактику депрессии и восстановление суточных ритмов.

Ситуация начала меняться в 2024 году, когда Республиканский психоневрологический диспансер получил возможность разворачивать собственные стационарные подразделения и отделение психосоциальной реабилитации. Уже в первые месяцы работы стационара наблюдается перераспределение потоков пациентов: часть больных, ранее госпитализировавшихся в клиники соседних регионов, переводится в рамки внутри-республиканской помощи, а число экстренных госпитализаций растет за счет более активного выявления тяжелых аффективных и психотических эпизодов. При этом общее количество госпитализаций остается контролируемым за счет более гибкой маршрутизации и возможности раннего купирования психотропных кризисов.

На уровне фармакотерапии 2024 год характеризуется постепенным «выпрямлением» нормотимического профиля. В стационарном звене становится возможным более широкое применение лития с регулярным лабораторным контролем его концентрации в крови и мониторингом соматического состояния. Это, в свою очередь, позволяет переводить на литий тех пациентов с БАР, для которых противозлептические нормотимики оказались недостаточно эффективными или сопровождалась выраженными побочными эффектами. Расширяется практика использования ламотриджина как средства профилактики депрессивных фаз, особенно у пациентов с БАР II типа и у лиц с повторными депрессивными эпизодами, плохо поддающимися монотерапии антидепрессантами.

Статистически 2024 год, по оценочным данным, характеризуется не столь ростом числа состоящих на учете, сколько изменением структуры обращаемости. На фоне общей численности диспансерного контингента на уровне 7,8–8,0 тыс. человек доля пациентов с аффективными расстройствами несколько возрастает за счет более активной диагностики БАР и рекуррентных депрессий в общей медицинской сети и последующего направления в диспансер. При этом число тяжелых декомпенсаций с необходимостью длительной госпитализации в соседних регионах постепенно снижается, что можно рассматривать как косвенный показатель эффективности сочетанной нормотимической и психосоциальной терапии.

Одной из ключевых тенденций 2023–2024 годов становится постепенное смещение акцента с «гашения» острых психотропных кризисов на управление долгосрочной траекторией болезни. Если ранние этапы развития службы были ориентированы преимущественно на купирование тяжелых психотических состояний и грубых аффективных фаз, то расширение доступа к современным нормотимикам и появление собственного стационара создают предпосылки для более тонкой настройки терапии, ориентированной на поддержание стабильного, «рабочего» психотропного состояния. Это выражается в уменьшении числа повторных экстренных госпитализаций, удлинении ремиссий и росте доли пациентов, сохраняющих трудовую и семейную роль при условии регулярного приема нормотимиков и участия в программах психосоциальной поддержки.

Выводы

Таким образом, период 2023–2024 годов для психиатрической службы Ингушетии можно охарактеризовать как переходный: формально сохраняя один из самых низких уровней зарегистрированной заболеваемости психическими расстройствами в стране, регион делает шаг от преимущественно амбулаторной, «минимальной» модели помощи к более комплексной системе, включающей стационар, нормотимическую терапию полного спектра и элементы реабилитации. Для окончательной оценки влияния этих изменений на структуру психотропных состояний потребуются дополнительные годы наблюдения, однако уже сейчас можно предположить, что расширение доступа к нормотимикам и стационарной помощи будет сопровождаться не только некоторым ростом официальной диагностируемости, но и улучшением качества жизни и социальной адаптации пациентов с аффективными расстройствами [10].

Оптимизация использования нормотимиков в Ингушетии предполагает развитие нескольких направлений: укрепление материально-технической базы ПНД для обеспечения полноценного мониторинга литий-терапии; расширение кадрового потенциала психиатрической службы; интеграцию психиатрии с первичным звеном здравоохранения для раннего выявления аффективных расстройств; а также реализацию программ психообразования, учитывающих культурные особенности и направленных на снижение стигмы.

Литература

- Алфимов П. В., Павличенко А. В. Фармакотерапия: нормотимики // Психиатрия и психофармакотерапия им. П. Б. Ганнушкина. 2021. Т. 23, № 6. С. 4–9.
- Клиническая психофармакотерапия в России. Руководство для врачей / под ред. К. А. Андреева. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 640 с.
- Лосенков И. С., Плотников Е. В., Епимахова Е. В., Бохан Н. А. Литий в психофармакологии аффективных расстройств и механизмы его действия на клеточную физиологию // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2020. Т. 120, № 11. С. 108–115.
- Общая психиатрия / под ред. А. С. Тиганова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 2022. 712 с.
- Особенности аффективной симптоматики в структуре непсихотических психических расстройств органического происхождения // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2021. Т. 2, № 3. С. 45–54.
- Медико-социальная характеристика внебольничного контингента психически больных (по материалам Орловского областного психоневрологического диспансера) // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2022. Т. 116, № 3. С. 63–67.
- Медико-социальные аспекты заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения на примере Белгородской области // Социальные аспекты здоровья населения. 2020. Т. 66, № 4. С. 15–24.

8. Региональные различия показателей общей и первичной заболеваемости психическими расстройствами в России // Социальная и клиническая психиатрия. 2024. Т. 31, № 3. С. 45–54.

9. Республика Ингушетия в цифрах. 2017–2022: краткий статистический сборник / Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат). Магас, 2024. 136 с.

10. Статистические материалы Минздрава РФ о заболеваемости психическими расстройствами населения России в 2017–2023 гг. // по данным официальной отчетности Минздрава РФ и публикаций: «Известия», РБК, «Газета Ингушетии». 2024.

PSYCHOTROPIC STATES AND THE IMPACT OF NORMOTHYMIC AGENTS: A CLINICO-EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS BASED ON OFFICIAL STATISTICS AND THE PSYCHONEUROLOGICAL SERVICE OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA

Kodzoeva M.I., Kodzoeva T.I., Yandjeva M.A.
Ingush State University

The aim of this paper is to provide a comprehensive analysis of affective psychotropic states and to evaluate the impact of normothymic agents on the clinical and epidemiological burden of mental disorders in the Russian Federation with a specific focus on the Republic of Ingushetia. The study combines a theoretical review of current concepts of mood stabilizers and their role in the treatment of affective disorders with a secondary clinico-epidemiological analysis of official statistics from the Ministry of Health of the Russian Federation and the Federal State Statistics Service (Rosstat).

According to ministerial data, in 2017 the incidence of mental and behavioural disorders in Russia amounted to 416.9 cases per 100,000 population, compared with 442.5 cases in 2016, whereas Ingushetia showed only 102 cases per 100,000 population, the lowest figure among all regions. At the same time, summary statistical reports based on official Ministry of Health data indicate that about 823 persons with diagnosed mental disorders per 100,000 inhabitants are registered in Ingushetia, which suggests the accumulation of a chronic patient cohort against a background of extremely low recorded primary incidence.

Drawing on Russian literature on normothymic pharmacotherapy and the organization of psychiatric care, the article discusses the potential impact of mood stabilizer use on the structure of psychotropic states, hospitalization rates and social functioning of patients. It is concluded that the real effects of normothymic therapy at the level of a regional psychiatric service are mediated by the system of outpatient follow-up, availability of pharmacological treatment and cultural-religious characteristics of the region. The statistical indicators of Ingushetia, which are formed, among other things, on the basis of psychoneurological dispensary reports, reflect not only the clinical situation but also the level of stigmatization and patient routing.

Keywords: psychotropic states; affective disorders; bipolar affective disorder; normothymic agents; mood stabilizers; lithium; antiepileptic mood stabilizers; psychoneurological dispensary; Republic of Ingushetia; epidemiology of mental disorders.

References

- Alfimov P.V., Pavlichenko A.V. Pharmacotherapy: normotimics // Psychiatry and Psychopharmacotherapy named after P. B. Gannushkin. 2021. Vol. 23, No. 6. pp. 4–9.
- Clinical psychopharmacotherapy in Russia. A guide for physicians / edited by K.A. Andreev. Moscow: GEOTAR-Media, 2021. 640 p.
- Losenkov I.S., Plotnikov E.V., Epimakhova E.V., Bokhan N.A. Lithium in the psychopharmacology of affective disorders and the mechanisms of its action on cellular physiology // Journal of Neurology and Psychiatry named after S.S. Korsakov. 2020. Vol. 120, No. 11. pp. 108–115.
- General Psychiatry / edited by A.S. Tiganov. 4th ed., revised and enlarged. Moscow: Meditsina, 2022. 712 p.
- Features of affective symptoms in the structure of non-psychotic mental disorders of organic origin // Siberian Bulletin of Psychiatry and Narcology. 2021. Vol. 2, No. 3. pp. 45–54.
- Medical and social characteristics of the outpatient contingent of mentally ill patients (based on the materials of the Oryol Regional Psychoneurological Dispensary) // Journal of Neurology and Psychiatry named after S.S. Korsakov. 2022. Vol. 116, No. 3. pp. 63–67.
- Medical and social aspects of the incidence of mental and behavioral disorders: the example of the Belgorod Region // Social aspects of population health. 2020. Vol. 66, No. 4. pp. 15–24.
- Regional Differences in the Overall and Primary Incidence of Mental Disorders in Russia // Social and Clinical Psychiatry. 2024. Vol. 31, No. 3. Pp. 45–54.
- The Republic of Ingushetia in Figures. 2017–2022: A Brief Statistical Digest / Office of the Federal State Statistics Service for the North Caucasus Federal District (Severo-Kavkazstat). Magas, 2024. 136 p.
- Statistical Materials of the Ministry of Health of the Russian Federation on the Incidence of Mental Disorders in the Population of Russia in 2017–2023 // Based on the official reporting of the Ministry of Health of the Russian Federation and publications: Izvestia, RBC, Gazeta Ingushetia. 2024.

Между открытостью и ограничением: анализ концепции сотворчества У. Эко в работах «Открытое произведение» и «Роль читателя»

Кордас Ольга Михайловна,

кандидат философских наук, доцент ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
E-mail: kordasom@yandex.ru

В статье анализируется концепция сотворчества в семиотической и эстетической теории Умберто Эко на материале двух его ключевых теоретических работ: «Открытое произведение» (1962) и «Роль читателя. Исследования по семиотике текста» (1979). Показывается, что в корпусе текстов Эко сотворчество эволюционирует от эстетико-перцептивной категории, связанной с «открытостью» художественной формы, к семиотическому принципу интерпретативного сотрудничества, конституирующему саму возможность текстуальной коммуникации. Выявляется диалектика свободы интерпретации и текстуальных ограничений, которая задает продуктивное напряжение между авторской стратегией и читательской активностью.

Ключевые слова: сотворчество, открытое произведение, модель читателя, интерпретативное сотрудничество, семиотика текста, Умберто Эко.

Проблема сотворчества как совместного, диалогического созидания культурных смыслов является одной из ключевых для гуманитарных наук в XX веке. Она возникает на пересечении нескольких теоретических концепций: философской герменевтики с ее вниманием к процессуальности понимания (Г.-Г. Гадамер), рецептивной эстетики, исследующей роль читателя в конституировании литературного произведения (Х.Р. Яусс, В. Изер), семиотики текста, для которой акт интерпретации является неотъемлемым элементом семиозиса (Ч.С. Пирс, Р. Барт, Ю.М. Лотман). Однако, наиболее последовательно и систематично проблематика сотворчества была разработана в трудах итальянского семиотика, философа и писателя Умберто Эко (1932–2016).

Эко занимает уникальное положение в интеллектуальном ландшафте XX века: он не просто теоретик, рефлексирующий над феноменом со-участия реципиента в процессе смыслообразования, но и практик – романист, чьи произведения сознательно спроектированы как пространства читательского сотворчества. Эта двойная позиция делает его теоретическое наследие особенно ценным для исследования интересующего нас феномена.

Две работы – «Открытое произведение» (1962) и «Роль читателя» (1979) – представляют собой два этапа осмысления У. Эко проблемы сотворчества. Если первая из них рассматривает сотворчество преимущественно в категориях эстетики и поэтики авангарда, то вторая переводит проблему в плоскость семиотической прагматики текста, превращая сотворчество из исключительного свойства «открытых» произведений в универсальное условие функционирования любого текста. Целью настоящей статьи является последовательная реконструкция этой эволюции и выявление основных структурных характеристик феномена сотворчества в теории Эко.

«Открытое произведение» – первая крупная теоретическая работа Эко, представляющая собой опыт осмысления авангардного искусства 1950–60-х годов: серийной музыки (К. Штокхаузен, Л. Берио, А. Пуссер, П. Булез), неформального искусства, кинетической скульптуры, литературы позднего модернизма (Дж. Джойс, С. Малларме).

Отправной точкой размышлений Эко становится наблюдение за новым типом художественных практик, в которых автор сознательно делегирует исполнителю или реципиенту часть творческих полномочий. В качестве примеров он приводит музыкальные произведения («Клавирштук XI» К. Штокхаузена, «Третью фортепианную сонату» П. Булеза и «Секвенцию» Л. Берио), в которых исполнитель не просто интерпретирует партитуру, но конструирует ее окончательную форму, выбирая последовательность фрагментов, темп, динамику. Эко пишет: «произведения, принадлежащие Берио или Штокхаузену, являются «открытыми» в менее метафорическом и куда более осязаемом значении; попросту говоря, это «незаконченные» вещи, которые автор вроде бы вверяет истолкователю, как будто бы рассматривая их как детали игрового конструктора и как бы не интересуясь, чем все это закончится» [1, С. 28]. Этот тип произведений Эко обозначает специальным термином «произведение в движении», подчеркивая, что речь идет не о статичной данности, а о процессуальном становлении формы: «произведение в движении представляет собой возможность множественного личного вмешательства, но не является аморфным призывом к вмешательству неразборчивому: это призыв (не обусловленный необходимостью и не являющийся однозначным) к направленному вмешательству, призыв свободно войти в мир, который, однако, всегда является миром, желанным автору» [1, С. 58]. Такая формулировка чрезвычайно важна: сотворчество не есть произвольное «додумывание» или «домысливание». Это ограниченная свобода, деятельность, направляемая структурой самого произведения и осуществляемая в пределах предусмотренного автором «поля возможностей» (понятие, заимствованное Эко у бельгийского композитора Анри Пуссера).

Важнейшим вкладом У. Эко в теорию сотворчества является разграничение нескольких уровней «открытости» произведения. Эко выделяет своего рода градацию:

Первый уровень – открытость как фундаментальное свойство любого произведения искусства. Здесь Эко опирается на эстетику Луиджи Парейсона с его концепцией «формативности» и отмечает: «произведение искусства, предстающее как форма, завершенная и замкнутая

в своем строго выверенном совершенстве, также является открытым, предоставляя возможность толковать себя на тысячи ладов и не утрачивая при этом своего неповторимого своеобразия» [1, С. 28]. На этом уровне сотворчество является атрибутом любого эстетического восприятия: каждый акт интерпретации приносит в произведение новый контекст, новую «перспективу», оживляя его форму уникальным образом. Каждое прочтение является «исполнением» формы.

Второй уровень – открытость как сознательная программа, характерная для искусства модернизма и символизма. Здесь Эко обращается к барочной культуре, к «Книге» Малларме, к Кафке и Джойсу. Произведение сознательно культивирует многозначность как эстетическое качество, но по форме остается завершенной структурой: «на протяжении всего периода от барокко и до современной поэтики символа все больше и больше уточнялось понятие произведения, предполагающего неоднозначную развязку, но примеры, рассмотренные в предыдущем разделе, представили нам «открытость», основанную на теоретическом, смысловом сотрудничестве истолкователя, который должен свободно осмыслять уже совершившийся художественный факт, уже организованный в более или менее завершенную структуру (даже если она поддается бесконечному множеству истолкований)» [1, С. 41–42].

Третий уровень – «произведение в движении» как предельный случай открытости, описанный выше. Здесь сотворчество реализуется в наиболее радикальной форме: реципиент фактически «со-конструирует» материальную структуру произведения.

Эта типология позволяет Эко показать, что сотворчество – не изобретение авангарда, а универсальный антропологический и эстетический принцип, который в различные культурные эпохи осознается и используется с различной степенью рефлексивности.

Принципиально важно, что Эко не мыслит открытость как распад формы. Напротив, он настаивает на диалектическом единстве замкнутости и открытости: «Тенденция к неупорядоченности, которая действительно характеризует поэтику открытости, должна быть тенденцией к сдержанной неупорядоченности, к возможности, заключенной в определенном поле, к свободе, которая контролируется начатками формообразования, присутствующими в форме, открытой свободному выбору пользователя. Между многочисленностью формальных множеств и неразличимым хаосом, лишенным всякой возможности эстетического восприятия и наслаждения, расстояние невелико: только динамическая диалектическая взаимосвязь того и другого может спасти автора открытого произведения» [1, С. 136].

Сотворчество, таким образом, не есть произвол реципиента, оно направляется и стимулируется формой произведения. Произведение, по Эко, подобно «предписанию», но такому, которое не детерминирует поведение адресата, а задает пространство его возможных ответов.

Автор создает не готовый смысл, а структуру, порождающую смыслы произведения искусства – это «принципиально неоднозначное сообщение, множественность означаемых, которые сосуществуют в одном означающем» [1, С. 6]. Именно в этой точке рождается сотворчество как со-участие в рождении произведения искусства.

Эко специально оговаривает, что даже в «произведениях в движении» авторский замысел не устраняется: «автор предлагает истолкователю закончить произведение: он не знает наверняка, как именно оно может быть завершено, но знает, что, завершившись, оно все равно всегда будет его произведением, а не каким-либо иным, и что в конце интерпретационного диалога конкретизируется форма, которая будет его формой, даже если ее выстроит кто-то другой, причем в таком ракурсе, который он сам, быть может, не мог полностью предвидеть» [1, С. 58–59]. Здесь четко обозначена граница сотворчества: исполнитель (читатель, зритель) действует внутри поля возможностей, спроектированного автором. Как справедливо замечает Т. Б. Сиднеева, «размышляя об «открытом произведении» и раскрывая его пластичность, динамику и свободу, Умберто Эко, в то же время, предостерегает об опасности нарушения границ его «завершенности» [2, С. 48]. Именно эта двойственность – одновременное утверждение открытости и защита завершенности – составляет суть диалектики сотворчества: читатель приглашен к свободе, но не к разрушению.

Эко обращается также к теории информации (К. Шеннон, А. Моль), используя понятия «информация», «избыточность», «шум» для описания механизмов открытости. Он утверждает, что эстетическое сообщение характеризуется максимальной информативностью, поскольку нарушает привычные коды и «ожидания» реципиента: «мы имеем сообщение, которое соотносится с определенным кодом, представляющим собой, как было сказано выше, порядок как систему вероятности, и которое самим способом своего выражения отрицает этот порядок или приводит его в кризисное состояние. Оно приводит его в это состояние, по-иному организуя как означаемые, так и означающие и тем самым ввергая своего получателя в состояние возбуждения и напря-

женного стремления к истолкованию [1, С. 140]. Однако «беспорядок» здесь не хаос, а «организованный беспорядок»: произведение расшатывает привычные коды, чтобы спровоцировать реципиента на активное, со-творческое достраивание смысла. Современный художник «вводит образцы неупорядоченности, организованной внутри системы, чтобы тем самым увеличить возможность получения информации» [1, С. 129]. Высокая информативность требует больших усилий декодирования и, следовательно, большей интерпретативной вовлеченности. Сотворчество оказывается функцией информационной насыщенности текста.

В «Роли читателя» (1979) У. Эко совершает существенный теоретический сдвиг. Если «Открытое произведение» рассматривало сотворчество преимущественно в контексте авангардного искусства, то «Роль читателя» распространяет этот принцип на любой текст, включая тексты массовой культуры, детективные романы, комиксы. Сотворчество из характеристики определенного типа произведений превращается в условие функционирования текста как такового. Эко формулирует это с предельной ясностью: «если даже анафорические повторы предполагают сотрудничество со стороны читателя, то, значит, нет таких текстов, которые такого сотрудничества не предполагали бы. [...] Так называемые открытые тексты – это всего лишь крайние и наиболее вызывающие случаи использования (в эстетических целях) того принципа, который лежит в основе и порождения, и интерпретации любых текстов» [3, С. 15].

По отношению к тексту Эко использует метафору «ленивого механизма»: «тексты – это ленивые механизмы, которые всегда просят других взять на себя часть их работы» [3, С. 367]. Текст «ленив» не в уничижительном смысле, он сознательно делегирует читателю часть работы по производству смысла. Текст не может (и не должен) говорить все, он содержит лакуны, пробелы, недоговоренности, которые читатель восполняет, привлекая собственные знания, культурный опыт, «энциклопедическую компетенцию». Без этой восполняющей активности текст остается мертвой буквой.

Центральной категорией «Роли читателя» является концепция модели читателя – одно из важнейших теоретических нововведений Эко. Модель читатель – это не эмпирический индивид, а текстуальная стратегия, набор условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы текст был актуализован в своем потенциальном содержании: «автор должен иметь в виду некую модель возможного читателя (далее – М-Читатель), который, как предполагается, сможет интерпретировать воспринимаемые выражения точно в таком же духе, в каком писатель их создавал» [3, С. 18].

Эко уточняет, что читатель не может использовать текст так, как ему, читателю, хочется, но лишь так, как сам текст хочет быть использованным. Открытый текст, сколь ни был бы он «открыт», не позволяет произвольной интерпретации. Открытый текст подразумевает «закрытого» М-Читателя (т.е. «закрытую», фиксированную модель Читателя) как составную часть своей структурной стратегии. Иными словами, сотворчество запрограммировано в самой структуре текста. Автор не просто допускает возможность того, что читатель будет со-участником, он проектирует текст таким образом, чтобы читатель неизбежно стал со-творцом. Текст – это «машина для порождения интерпретаций», и М-читатель – оператор этой машины.

Концепция М-читателя позволяет Эко решить проблему, остававшуюся нерешенной в «Открытом произведении»: как сочетать признание читательской активности с необходимостью объективных критериев интерпретации? Ответ в том, что текст сам конструирует своего «идеального» со-творца, задавая параметры его компетенции.

У. Эко описывает механизмы интерпретативного сотрудничества – термин, который можно рассматривать как семиотический эквивалент понятия «сотворчество». Читатель, вступая в диалог с текстом, совершает ряд операций: постоянно выдвигает гипотезы о дальнейшем развитии текста, активируя фреймы и сценарии, почерпнутые из своего культурного опыта: «Активное сотрудничество, требуемое от читателя, и способность текста подтверждать (или по крайней мере не опровергать) широчайший диапазон интерпретационных предположений – такова характеристика повествовательных структур, которые можно называть более или менее «открытыми» [3, С. 66]. Текст всегда содержит больше того, что в нем эксплицитно выражено. Читатель восполняет пробелы, опираясь на интертекстуальные связи, жанровые конвенции, общие знания.

Эко различает «словарную» и «энциклопедическую» компетенцию читателя. Словарная компетенция – это знание языковых значений; энциклопедическая – весь комплекс знаний о мире, культурных конвенциях, интертекстуальных отсылках, которые читатель привлекает для понимания текста. Сотворчество реализуется именно через энциклопедическую компетенцию: читатель не просто декодирует знаки,

но привносит в текст свою «энциклопедию», делая возможной его семантическую актуализацию.

Особую ценность теории Эко придает то, что она не остается на уровне абстрактных формулировок, но последовательно применяется к анализу конкретных произведений. В «Открытом произведении» обширная глава посвящена анализу творчества Джеймса Джойса, прослеживается эволюция «открытости» от «Портрета художника в юности» через «Улисса» к «Поминкам по Финнегану». Последнее произведение Джойса Эко рассматривает как предельный случай «открытого произведения» в литературе – текст, в котором каждое слово представляет собой «узел» множества семантических путей, а читатель превращается в «соавтора» в самом буквальном смысле: «В «Поминках по Финнегану» перед нами еще более поразительный процесс «открытости»: книга, наподобие вселенной Эйнштейна, искривляясь, замыкается сама на себя. Первое слово на первой странице смыкается с последним словом на последней странице романа. Таким образом, произведение конечно, но одновременно и неограниченно» [3, С. 97–98].

В «Роли читателя» Эко анализирует романы о Джеймсе Бонде Яна Флеминга, серии о Супермене, детективные повести, демонстрируя, что даже в «закрытых» текстах массовой культуры читательское сотворчество присутствует, хотя и в других формах. Читатель массового текста со-участвует в производстве удовольствия, узнавания, подтверждения ожиданий. Однако это – минималистское сотворчество, ограниченное рамками жесткой нарративной схемы.

Анализ двух ключевых работ Умберто Эко позволяет зафиксировать несколько принципиальных характеристик феномена сотворчества, как оно осмысливается в семиотической традиции:

Во-первых, сотворчество не исключение, а норма. Если в «Открытом произведении» сотворчество еще выступает как специфическое свойство определенного класса (авангардных) произведений, то в «Роли читателя» оно признается конститутивным условием функционирования любого текста.

Во-вторых, сотворчество не произвол, а регулируемая свобода. Текст не просто допускает читательскую инициативу, он ее «программирует», конструируя М-читателя. Сотворчество осуществляется в «поле возможностей», заданном текстуальной стратегией.

В-третьих, сотворчество – градуальный феномен. Существуют различные степени и формы читательского со-участия: от минималистской «кооперации» при чтении массовой литературы до радикального со-конструирования формы в авангардных «произведениях в движении».

В-четвертых, сотворчество предполагает наличие компетенций. Читатель-со-творец – это не «чистый лист», а носитель культурных кодов, интертекстуальных знаний, «энциклопедической компетенции». Сотворчество есть культурная практика, обусловленная контекстом и традицией.

В-пятых, сотворчество имеет пределы. Эко последовательно отличает интерпретацию от «использования» текста, настаивая на том, что текст обладает собственной интенцией, которая выступает критерием приемлемости интерпретации.

Теория У. Эко, таким образом, предлагает сбалансированную модель сотворчества, удерживающую продуктивное напряжение между признанием активной роли реципиента и утверждением нередуцируе-

мой значимости текста как носителя собственных смысловых стратегий. Как точно отмечает М.В. Рендл, «открытое произведение является метафизической моделью отражения лингвистических, социальных и культурных пертурбаций сложного смыслового поля современности» [4, С. 31]. Именно поэтому концепция сотворчества остается актуальной и продуктивной не только для литературоведения и семиотики, но и для более широкого круга гуманитарных дисциплин, исследующих процессы коммуникации, интерпретации и культурного смыслообразования, в том числе для анализа цифровых, интерактивных и партиципаторных художественных практик, которые Эко не мог предвидеть в деталях, но чью логику он, по существу, предвосхитил.

Литература

1. Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике / Пер. А. Шурбелева. СПб.: Академический проект, 2004. 384 с.
2. Сиднева Т.Б. «Открытое произведение» Умберто Эко и проблема границы в искусстве // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2011. № 5 (21). С. 44–49.
3. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / Пер. С. Серебряного. СПб.: Симпозиум, 2007. 502 с.
4. Рендл М.В. Модель «Открытого произведения» в социокультурном пространстве постнеклассической научной парадигмы // Вестник Самарского государственного университета. 2015. № 1 (123). С. 28–33.

BETWEEN OPENNESS AND CONSTRAINT: AN ANALYSIS OF UMBERTO ECO'S CONCEPT OF CO-CREATION IN THE OPEN WORK AND THE ROLE OF THE READER

Kordas O.M.

Omsk State University named after F.M. Dostoevsky

This article analyzes the concept of co-creation in Umberto Eco's semiotic and aesthetic theory, drawing on two of his key theoretical works: *The Open Work* (*Opera aperta*, 1962) and *The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts* (Lector in fabula, 1979). It is demonstrated that within Eco's body of theoretical writings, co-creation evolves from an aesthetic-perceptual category associated with the «openness» of artistic form into a semiotic principle of interpretive cooperation that constitutes the very possibility of textual communication. The article reveals the dialectic between interpretive freedom and textual constraints, which generates a productive tension between authorial strategy and readerly activity.

Keywords: co-creation, open work, Model Reader, interpretive cooperation, semiotics of texts, Umberto Eco.

References

1. Eco U. *The Open Work: Form and Indeterminacy in Contemporary Poetics*. Translated by A. Shurbelev. St. Petersburg: Akademicheskii Proekt, 2004. 384 p.
2. Sidneva T.B. Umberto Eco's «The Open Work» and the Problem of Boundary in Art // *Aktual'nye problemy vysshego muzykal'nogo obrazovaniya / Current Issues of Higher Musical Education*. 2011. No. 5 (21). P. 44–49.
3. Eco U. *The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts*. Translated by S. Serebryaniy. St. Petersburg: Simpozium, 2007. 502 p.
4. Rendl M.V. The Model of the «Open Work» in the Sociocultural Space of the Post-Non-Classical Scientific Paradigm // *Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta / Bulletin of Samara State University*. 2015. No. 1 (123). P. 28–33.

Пахолнюк Юрий Павлович,

канд. мед. наук, доцент института хирургии, ТГМУ
E-mail: ypp@yandex.ru.

Кравцов Юрий Александрович,

д-р мед. наук, профессор института хирургии, ТГМУ
E-mail: krav101@yandex.ru

Ворошилов Артём Дмитриевич,

обучающийся 5 года по специальности «Лечебное дело», лаборант
Междисциплинарного лабораторного центра Тихоокеанского
государственного медицинского университета
E-mail: artemvorosilov28@gmail.com

Лисица Глеб Тарасович,

обучающийся 5 года по специальности «Лечебное дело», лаборант
Междисциплинарного лабораторного центра Тихоокеанского
государственного медицинского университета
E-mail: LisitsaGleb@yandex.ru

В последние годы, в случае проктологических заболеваний, выбором пациентов становится хирургическое вмешательство, причем, применяемое на ранних стадиях процесса. Применение малоинвазивных видов хирургического вмешательства способно уменьшить выраженный болевой синдром, длительность выздоровления и периода нетрудоспособности. В обзоре представлены современные достижения относительно диетических подходов к предоперационной подготовке и послеоперационному ведению у пациентов с проктологическими заболеваниями, в том числе, в случае наружного и внутреннего геморроя, параректальных свищей, ректоцеле, повреждений прямой кишки. Определены перспективы применения новых технологий ведения послеоперационного периода при геморроидальной болезни, парапроктите, параректальных свищах, повреждениях прямой кишки в клинической практике.

Ключевые слова: проктология, диетотерапия после операции при проктологических заболеваниях, геморроидальная болезнь, предоперационная подготовка, послеоперационное ведение.

Введение

Лечебное питание является одним из важных компонентов послеоперационной реабилитации при проктологических заболеваниях, которые находятся в ряду самых распространенных заболеваний человека и являются частой причиной обращения к врачу-хирургу, колопроктологу. Распространенность этих болезней обусловлена тем, что, например, геморрой является одной из самых частых проктологических болезней и среди взрослых пациентов встречаемость геморроидальной болезни составляет 130–145 больных на 1000 человек, а его удельный вес в структуре заболеваний толстой кишки колеблется от 34 до 41% [1–4]. У детей преобладают трещины ануса, полипы прямой кишки; повреждения встречаются гораздо реже, чем у взрослых [5].

Цель данной публикации – определить наиболее частые варианты диетических подходов к предоперационной подготовке и послеоперационному ведению у пациентов с проктологическими заболеваниями, в том числе при хирургическом лечении геморроидальной болезни, парапроктита, параректальных свищей, повреждений прямой кишки.

Периоперационная нутритивная поддержка, включенная в протокол ERAS (Accelerated Recovery After Surgery), оказалась основным элементом и важным шагом для достижения лучших результатов хирургического вмешательства. Начиная с предоперационной оценки питания и лечения во время плановой хирургии, лечащий врач может улучшить состояние питания пациентов с помощью пероральных ингридиентов. Ранняя нутритивная поддержка в послеоперационном периоде у истощенных больных с проктологическими заболеваниями помогает значительно снизить частоту инфекционных осложнений, потребность лечения в отделении интенсивной терапии (ОИТ) и пребывании в больнице, минимизировать материальные затраты на лечение пациента и понизить летальность в послеоперационном периоде у истощенных больных. В то же время, оперативные вмешательства, которые воздействуют на пищеварительный тракт (резекции, анастомозы и т.д.), первоначально накладывают на пациентов важные диетические ограничения, что вместе с длительным постельным режимом усиливает саркопению и недостаточность питания, особенно у онкологических больных. Современный периоперационный уход неуклонно продвигается вперед в достижении оптимального восстановления пациентов, используя концепцию раннего послеоперационного восстановления (ERAS). Периоперационное питание играет важную роль в уходе ERAS, и возможности для проведения диетологических вмешательств существуют в течение нескольких недель и часов до операции, а также в послеоперационный период. Несмотря на это, недоедание и неоптимальное питание у хирургических пациентов, особенно у пациентов с онкологическими заболеваниями, достаточно распространены [6,7].

На сегодняшний день концепция ERAS в целом считается эффективной для предоперационной подготовки и послеоперационного ведения и внедрена в передовых хирургических центрах. Однако нет расширенных данных применения этой программы для ускоренного восстановления после операций при хроническом геморрое, других конкретных нозологических единицах – параректальных свищах, парапроктите, ректоцеле и заболеваниях анальной области. Есть множество публикаций, связанные с ускоренным послеоперационным восстановлением в колоректальной хирургии, которые косвенно относятся и к ректальной хирургии, могут применяться в практике восстановления после геморроидэктомии [2, 8].

В 1998 г. новым лечебным подходом к ведению послеоперационного периода стало предложение анестезиолога Кехлета (H.Kehlet), который разработал и опубликовал программу «Fast track surgery» (FTS) – хирургия быстрого восстановления, в основе которой лежит новый комбинированный подход к лечению и ведению послеоперационного периода. В англоязычной литературе концепция получила название «fast track surgery» – «хирургия быстрого пути» (FTS)[6, 7, 8].

Согласно концепции Kehlet H., Wilmore D.W., (2008), в протоколе быстрого выздоровления важную роль играет ограничение (отмена) наркотических анальгетиков и расширенное использование нестероидных противовоспалительных препаратов и селективных ингибиторов циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), которые обеспечивают мультимодальное обезболивание, снижают частоту послеоперационной тошноты и рвоты, обеспечивая раннюю двигательную активность (мобилизацию). Также важными факторами концепции ускоренного выздоровления

служат: поддержание интра- и послеоперационной нормотермии в пределах 36,6–37,5 °С для снижения риска инфекционных осложнений, ограничение постановки или раннее удаление мочевого катетера, ограничение периода голодания после операции и раннее энтеральное кормление, ранняя физическая активность (мобилизация) пациента [9,10].

Говоря о конкретных нозологических формах в ректальной хирургии и их нутритивной поддержке до- и после операции, необходимо начать с самого часто встречающегося заболевания – геморроидальной болезни. Всем пациентам, перенесшим хирургическое лечение по поводу геморроидальной болезни, рекомендуется проведение многоэтапных реабилитационных мероприятий, целью которых является полное социальное и физическое восстановление пациента [3, 11].

Боль, задержка мочи и кровотечение считаются наиболее частыми осложнениями после операции по поводу геморроя; необходимо учитывать и другие возможные ситуации, чтобы выбрать наилучший метод предотвращения более серьезных осложнений [11, 12].

Известно, что хронические запоры при геморрое, ректоцеле у женщин, парапроктите и параректальных свищах часто сопровождают данные заболевания и могут быть проявлением как функциональных так и органических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Наличие запоров у пациента накладывает определённые требования к предоперационной подготовке, обуславливает особенности послеоперационного ведения [11,13]. Диета перед операцией у пациентов с запорами должна быть физиологически полноценной [11, 13,14].

Исходя из постулата, что более высокий уровень боли, связанный с радикальной открытой геморроидэктомией по Миллигану-Моргану, приводит к более длительному пребыванию в больнице и более позднему восстановлению, для ускорения выздоровления, повышения удовлетворенности пациентов предлагается использовать комбинированный режим приема обезболивающих препаратов и соблюдение диеты [16].

Между тем, в возникновении болевого синдрома очень важен фактор болезненной дефекации после операций на прямой кишке и анальном канале, сопровождающийся «стулостязью». Большую роль в возникновении болевого синдрома играет спазм внутреннего сфинктера, который пролонгирует боль до нескольких часов после опорожнения прямой кишки [2, 17].

Если в сжатом виде сформулировать алгоритм ведения больных с геморроидальной болезнью в послеоперационном периоде, то основные моменты будут следующие – регулярное выполнение перывязок; соблюдение диеты, богатой растительной клетчаткой; прием пищевых волокон и слабительных препаратов по показаниям до 3–4 недель после операции; сидячие ванночки со слабозеленым раствором перманганата калия или раствором ромашки; диспансерное наблюдение у врача хирурга или колопроктолога в течение 1 года [11, 17, 8].

Колопроктологическим сообществом приняты основные этапы реабилитации пациентов после хирургического лечения геморроя, в каждый из которых требуется отдельная диетотерапия: 1-й этап – ранняя реабилитация, со 4–6 по 7–10 сутки после хирургического вмешательства. В данный период пациент находится на реабилитационном стационарном лечении в течение 3–5 дней, после чего дальнейшая реабилитация происходит в течение 7–14 дней в условиях стационара кратковременного пребывания, либо амбулаторно. Задачей диетического питания 1-го этапа реабилитации является нормализация работы желудочно-кишечного тракта с формированием нормальной консистенции и частоты стула. Кроме того, на данном этапе осуществляется контроль гемостаза, раневого процесса и купирование послеоперационного болевого синдрома. 2-й этап (с 15 по 45 сутки после операции) направлен на ускорение репаративных процессов и программируемое заживление послеоперационных ран с контролем деятельности желудочно-кишечного тракта, опять же с помощью диеты.

Существует диетический подход к ведению послеоперационных больных, описанный в клинических рекомендациях по лечению геморроидальной болезни, согласно которому лечебное питание является одним из важных компонентов послеоперационной реабилитации на раннем этапе. С этой целью пациентам рекомендуется потребление адекватного количества жидкости и пищевых волокон. В качестве источника пищевых волокон применяют пшеничные отруби, морскую капусту и льняное семя в их природном виде, или в форме фармакологических препаратов. Часто отмечается кровоточивость послеоперационных ран после геморроидэктомии на протяжении первых 2–3 недель. Реабилитационные мероприятия при повышенной кровоточивости ран заключаются в регулярном их осмотре, применении мазевых композиций, обладающих комплексным, в т.ч. капилляроукрепляющим действием, и, опять же, нормализации консистенции стула с ограничением избыточных натуживаний [11, 17].

Целью 2-го этапа реабилитации пациентов, перенесших хирургическое лечение геморроя, является окончательная эпителизация послеоперационных ран и профилактика развития послеоперационных осложнений, таких как стриктура и рубцовая деформация анального канала (6–9%); послеоперационная недостаточность (1,8–4%) анального сфинктера. Также в процессе 2-го этапа реабилитации важным остается контроль за консистенцией и частотой стула, болевым синдромом, контроль течения раневого процесса. С целью профилактики рубцовой деформации и стриктуры заднего прохода необходим контроль врача-колопроктолога с пальцевым осмотром каждые 3–5 дней [11,17].

В раннем послеоперационном периоде болевой синдром является фактором задержки опорожнения прямой кишки; после радикальной геморроидэктомии боль колеблется в среднем от 3,2 до 4,9 баллов по цифровой рейтинговой шкале, что требует использования анальгетиков [19, 20]. Профилактикой стеноза после операции Миллиган-Моргана, по мнению О.А. Литвинова с соавт., (2020 г.), может являться выполнение полуокружных разрезов на границе анокутанной складки и низведение слизистой оболочки [20].

Изучая зависимость и уровень болевых ощущений после геморроидэктомии, другие авторы отмечают раннее появление стула после операции и его высокий уровень болезненности. Медианные сроки первой после вмешательства дефекации, по данным Гаины М.Ю., Шахрая С.В., Гаины Ю.М. (2015) в группах сравнения (А и В) составили 1,5 и 2,5 суток, соответственно, а интенсивность боли, индуцированной первой дефекацией, составило (по ВАШ) – 7 и 9 баллов [21]. Роль диетотерапии в раннем появлении стула после операции также важна.

В исследовании Д.В. Зитта с соавт. (2015), при лечении 298 больных с колоректальным раком использовалась программа оптимизации периоперационного ведения. В программу входили следующие элементы: беседа с больным и печатное пособие. Отказ от традиционной предоперационной подготовки кишечника. Прием пищи прекращался за 24 ч. до операции, жидкости за 6 ч. до операции. В течение суток перед операцией пациентам рекомендовали обильное, насыщенное углеводами питье, часть больных получала клиническое энтеральное питание. Симбиотики обычно назначались за 2–3 дня до операции и до выписки из стационара. Клиническое энтеральное питание назначается с первых суток послеоперационного периода. Кормление больных начинали со вторых или третьих суток после операции. Максимально ранняя активизация больных – в течение первых суток – не менее 2 часов в вертикальном положении, со вторых суток – не менее 6 часов. 200 больных из группы сравнения получали стандартную периоперационную терапию: бесшлаковая диета за 2–3 дня до операции и голод за сутки до операции, прекращение приема жидкостей за 8 ч. до операции, традиционная подготовка кишечника. Тем не менее, данная методика применялась только у пациентов с внутрибрюшными операциями [22].

По мнению С.В. Шахрая (2013), компонентами Fast Track Recovery, т.е. концепции быстрого послеоперационного выздоровления в хирургии после геморроидальной болезни, являются адекватная психологическая подготовка к операции и позитивное психоэмоциональное сопровождение процесса хирургического лечения, отказ от премедикации и использование спинальной или перидуральной анестезии во время выполнения операции.

Многие исследователи склоняются к мнению, что диетические подходы разнятся в зависимости от объема операции и локализации швов на слизистой прямой кишки, их характера (механический шов и ручной лигатурный метод соединения тканей). Малоинвазивные методики удаления геморроидальных узлов, например, с помощью наложения латексных сжимающих колец, методики HAL-RAR, HeLP (Hemorrhoid laser prosedure) практически не требуют больших диетических ограничений в послеоперационном периоде [24, 25].

В зависимости от тяжести нарушений функции комплекс реабилитационных мероприятий проводится амбулаторно, либо на стационарной реабилитационной койке. Основные реабилитационные мероприятия после хирургического лечения геморроя следующие. Нарушение дефекации – пациент нуждается в механической очистке кишечника применением очистительной либо сифонной клизмы; назначение слабительных препаратов осмотического типа с оценкой их эффективности; механическое удаление каловых масс под местным либо регионарным обезболиванием. К этому этапу относится и профилактика развития послеоперационных осложнений, таких как стриктура и рубцовая деформация анального канала (6–9%); послеоперационная недостаточность анального сфинктера (1,8–4%). Также, в процессе 2-го этапа реабилитации крайне актуальным остается контроль за консистенцией и частотой стула [11, 17].

Анатомические исследования давно подтвердили, что геморроидальные узлы представляют собой растянутую сосудистую ткань в анальном канале, дистальнее зубчатой линии, покрытую богато иннервированной анодермой [16].

Лисичкин А.Л., Бусырев Ю.Б., Карпунина Т.И. (2020) считают, что проблемами послеоперационного периода после геморроидэктомии могут быть длительный спазм анального сфинктера, сильный болевой синдром и отсроченное послеоперационное кровотечение [2]. Поэтому, есть сторонники технологии оперативного лечения геморроидальной болезни, при которых не затрагивается анодерма, что обеспечивает снижение болей в послеоперационном периоде [16, 17, 18].

Известен способ лечения геморроя – операция Лонго (геморроидэктомия с помощью геморроидального степлера). Для операции используют одноразовый набор инструментов, включающий циркулярный сшивающий аппарат. Вправляют внутренние геморроидальные узлы и проводят наложение кисетного шва. Этот шов захватывает только слизистую оболочку прямой кишки и накладывается на 4–5 см выше зубчатой линии. Производят резекцию слизистой оболочки и ее прошивание 2-мя рядами танталовых скрепок. Затем аппарат извлекают из прямой кишки вместе с резецированной слизистой оболочкой в виде кольца. Завершается операция введением в анальный канал гемостатической губки [26, 27].

Боймуродов О.С., Исов И.Ч. (2022) считают, что это оперативное вмешательство (операция Лонго) – сверхрадикальная резекция анального канала. [19].

Традиционное ведение пациентов с колоректальным раком и аппаратными анастомозами сопряжено с длительным голоданием и ограничением жидкости до и после операции, а также с большим объемом парентеральной жидкости. Известен способ подготовки при операциях на прямой кишке с расширенной лимфаденэктомией, включающий введение кристаллоидов (400–800 мл), глюкозокалиевой смеси, коллоидов (500–1000 мл) и апротинина (180 000–220 000 МЕ).

На сегодняшний день предоперационное голодание не является обязательным, что подтверждено протоколом ERAS. При отсутствии риска аспирации прием жидкости прекращают за 2–3 ч до анестезии [4, 34]. ERAS рекомендует за сутки до операции больничную диету с нутритивной поддержкой или 800 мл 12,5% углеводного напитка, а в день операции – 400 мл такого же напитка [34].

При ранениях прямой кишки в 92,0% случаев формируют разгрозочную стому, в 8,0% ограничиваются ушиванием, летальность составляет 1,7% [5]. Единой тактики лечения поврежденных стенок прямой кишки не существует. В гинекологии после разрывов влагалища рекомендуется пальцевое исследование прямой кишки [36]. При акушерских разрывах при прошивании кишки швы распускают, тактику определяют индивидуально (Клинические рекомендации, 2023).

В патенте Ю.А. Кравцова с соавт. (2021, 2025) используется аппаратная резекция прямой кишки с подготовкой по типу колоноскопии. После операции назначают жидкость (чай, соки, компот) и «Нутридринк» 20 мл/кг три раза в сутки. Пальцевое исследование и свечи не применяют 7 дней. С 7-го дня – «Нутридринк» с волокнами 10 мл/кг и щадящая диета, с 14-го дня – общий стол. На 60-е сутки выполняют контрольную проктоскопию [38]. Нутритивная недостаточность у хирургических пациентов коррелирует с длительностью пребывания в стационаре, инфекционными осложнениями и затратами [39]. Малоинвазивные методики позволяют снизить болевые ощущения и сократить сроки госпитализации.

Заключение

Представлен краткий обзор многочисленных современных достижений при диетотерапии, касающихся хирургического лечения заболеваний прямой кишки: геморроидальной болезни во всех её проявлениях, в сочетании с ректоцеле у женщин, хр. парапроктит с параректальными свищами, внебрюшинной изолированной травмой прямой кишки и периаанальной области.

Таким образом, отсутствие предоперационного очищения кишечника гарантированно обеспечивает наличие раннего акта дефекации после операции, что является важным фактором инфицирования швов как при «открытой» операции, так и при эндоскопическом наложении анастомоза в прямой кишке. Выраженные боли формируют «стулбоязнь» и спазм анального сфинктера, что приводит к усугублению болевых ощущений по типу «замкнутого круга», возникают условия для расхождения швов в области анального канала. Использование «открытой» модификации геморроидэктомии у неподготовленного пациента при обильном и раннем послеоперационном стуле нередко приводит к возникновению в непосредственном послеоперационном периоде серьезных осложнений. В результате послеоперационных натуживаний и связанных с ними кровотечений могут образовываться ге-

маты, расхождение швов; может формироваться келоидный рубец, приводящий к стенозу анального отверстия в отдаленном послеоперационном периоде. Удлиняются сроки госпитализации до 6–7 дней стационарного периода и пребывание на больничном листе, повышаются расходы на лечение, снижается качество жизни у активных пациентов трудоспособного возраста. Необходимо заметить, что существует необходимость в предоперационном глубоком очищении прямой кишки, что также накладывает диетические ограничения на пациента перед операцией – избегать в течение 3 дней перед операцией приема продуктов, содержащих клетчатку.

Литература

1. Семинкин Е.И. Колопроктология. М.: Эко-Вектор, 2018; 285 с. Semionkin E.I. Coloproctology. Moscow: Eco-Vector, 2018; 285 с. (In Russ.).
2. Лисичкин А.Л., Бусырев Ю.Б., Карпунина Т.И. Оптимизация ведения пациентов колопроктологического профиля при амбулаторном хирургическом лечении геморроя. Пермский мед. журнал. 2020; 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-vedeniya-patsientov-koloproktologicheskogo-profila-pri-ambulatornom-hirurgicheskom-lechenii-gemorroya> (дата обращения: 09.09.2025).
3. Шельгин Ю.А., Титов А.Ю., Ачкасов С.И. Геморрой. Диагностика и лечение. Руководство. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 216с.
4. Davis, B. R., Lee-Kong, S. A., Migaly, J., Feingold, D. L., & Steele, S.R. The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Management of Hemorrhoids. Diseases of the colon and rectum. 2018;61(3):284–292. <https://doi.org/10.1097/DCR.0000000000001030>.
5. Ким И.Ю., Панов В.В., Мусаилов В.А. Сычёв Д.А., Абдурахманов Р.Ф. Принципы оказания хирургической помощи при ранениях прямой кишки. Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2024;19(2):52–57. https://doi.org/10.25881/20728255_2024_19_2_52.
6. Martínez-Ortega, A. J., Piñar-Gutiérrez, A., Serrano-Aguayo, P., González-Navarro, I., Remón-Ruiz, P. J., Pereira-Cunill, J. L., & Garcá-Luna, P.P. Perioperative Nutritional Support: A Review of Current Literature. Nutrients. 2022;14(8):1601. <https://doi.org/10.3390/nu14081601>.
7. Nalos M. Perioperative Nutrition. World Nutrition Journal. 2022; 6(1):17–18.
8. Нуспекова Д., Джумабеков А., Доскалиев А., Глушкова Н., Кемелханов Н. Возможности оптимизации тактики периоперационного ведения пациентов с хроническим геморроем на основе программ ускоренного восстановления. Обзор литературы. Наука и Здравоохранение. 2022; 4(24):196–205. doi 10.34689/SH.2022.24.4.024;
9. Шахрай С.В. Методика комбинированного хирургического лечения хронического геморроя. Новости хирургии. 2013;21(1):52–57. Combined surgical treatment technique of chronic hemorrhoids. Shakhrai S.V. The technique of combined surgical treatment of chronic hemorrhoids. News of Surgery. 2013;21(1):52–57.
10. Sips, P., & Ondrejka, P. (2007). «Fast track» colorectal surgery. Orvosihetilap. 2007; 148(21):963–969. <https://doi.org/10.1556/OH.2007.27996>
11. Шельгин Ю.А., Фролов С.А., Титов А.Ю., Васильев С.В., Веселов А.В., Григорьев Е.Г., Кашников В.Н., Костарев И.В., Костенко Н.В., Кузьминов А.М., Куликовский В.Ф., Москалев А.И., Мудров А.А., Муравьев А.В., Половинкин В.В., Тимебулатов В.М., Хубезов Д.А., Яновой В.В. Клинические рекомендации ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению геморроя. Колопроктология. 2019;18(1(67)):7–38. <https://doi.org/10.33878/2073-7556-2019-18-1-7-38>.
12. Romaguera V. P., Sancho-Muriel J., Alvarez-Sarido E. Millan M., Garcia-Granero A., Frasson M. Postoperative complications in hemorrhoidal disease and special conditions. Reviews on Recent Clinical Trials. 2021;16(1):67–74. doi: 10.2174/157488715666200406114218.
13. Ханина Ю. С., Шаповалов К.Г., Михайличенко М.И., Яшнов А.А. Нутритивная поддержка в ранний послеоперационный период. IV съезд хирургов Забайкальского края: сб. статей науч.-практ. межрегиональной конф. Чита, 2021; 37–55.
14. Литвинова О.Н. Энтеральное питание больных с хроническими запорами. Sciences of Europe. 2017;15–1(15). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/enteralnoe-pitanie-bolnyh-s-hronicheskimi-zaporami> (дата обращения: 09.09.2025).
15. Corman ML. Hemorrhoids. In: Corman ML, eds. Colon and rectal surgery. 6th ed. Philadelphia, USA: Lippincott; 2013:272–366.
16. Gallo G., Martellucci J., Sturiale A., Clerico G., Milito G., Marino F., Cocorullo G., Giordano P., Mistrangelo M., Trompetto M. Consensus external statement of the Italian society of colorectal surgery (stripping

SICCR): management and review treatment of hemorrhoidal disease. *Tech Coloproctol*. 2020;24, (2): 145–164. doi: 10.1007/s10151-020-02149-1.

17. Геморрой. Клинические протоколы Министерства здравоохранения Республики Казахстан – 2018. MedElement. доступно по <https://diseases.medelement.com/disease/геморрой2018/16135> (Accessed 23 February 2021)

18. морроидэктомииТаривердиев А. М., разрыву Луцевич О.Э., было Давидович Д.Л., Федоров А.В., Богданов Д.Ю. hemorrhoids Современный наиболее хирургический тромбозом методы breukink лечения rectum геморроя. пахолок1 Обзор rectum литературы.сочетает Московский воспаления хирургический practical журнал. 2023; 4:96–103. лечения URL: больных <https://ушивания www.лечения mossj.слизистое ru/геморрое jour/kotsyurbiy1 article/целью view/731/648>. Tariverdiev A.M., Lutsevich O.E., Davidovich D.L., Fedorov A.V., Bogdanov D. Yu. Modern surgical methods of hemorrhoids treatment. Literature review. *Moscow Surgical Journal*.2023;(4):96–103. <https://doi.org/10.17238/2072–3180–2023–4–96–103>. (In Russ.).

19. Боймуродов О. С., Исоев И.Ч. Современные концепции патогенеза и лечения геморроя. Приоритеты мировой науки: новые подходы и актуальные исследования: сборник науч. трудов по м-лам XXVIII международной науч.-практ. конференции. Анапа, 2022:49–57. URL: <https://innova-science.ru/wp-content/uploads/2022/05/sbornik-nauchnyh-trudov-30.04.2022-pmn-28.pdf#page=49>.

20. Литвинов О. А., Житихин Е.В., Игнатович И.Г. Игнатович И.Г., Арутюнян О.А., Арустамов А.Г., Гринев М.Л. Выбор метода хирургического лечения хронического комбинированного геморроя III–IV стадии. Известия Российской Военно-медицинской академии. 2020; 39(3):27–31.

21. Гаин М.Ю., Шахрай С.В., Гаин Ю.М. Лазерная коагуляция геморроидальных узлов с геморроидомукопексией в хирургическом лечении хронического геморроя II–III стадии: рандомизированное исследование. Новости хирургии. 2015;23 (4)429–435. *Novosti Khirurgii*. 2015; Jul–Aug; 23 (4): 429–435. doi: 10.18484/2305-0047.2015.4.429.

22. Зитта Д. В., Терёхина Н.А., Субботин В.М. Клинико-биохимическая оценка эффективности программы оптимизации периоперационного ведения больных в плановой колоректальной хирургии. *Колоректология*.2015;2:18–24.URL: https://gnck.ru/specialists/zurnal-koloproktologiya/jurnal_2_52_2015.pdf#page=20.

23. Elhassan, A., Ahmed, A., Awad, H. Humeidan M., Nguyen V., Cornett E.M., Urman R.D. Kaye A.D. The Evolution of Surgical Enhanced Recovery Pathways: a Review. *Curr Pain Headache Rep* 22, 74 (2018). <https://doi.org/10.1007/s11916-018-0727-z>.

24. Popovtsev M.A., Alekberzade A.V., Krylov N.N. Ligation of hemorrhoidal arteries without ultrasound Doppler navigation in the surgical treatment of hemorrhoidal disease. *Khirurgiya*. 2021;(12):49–55. doi: 10.17116/hirurgia202112149.

25. Crea N, Pata G, Lipa M., Tamburini, A. M., & Berjaoui, A.H. Hemorrhoid laser procedure (HeLP) for second- and third-degree hemorrhoids: results from a long-term follow-up analysis. *Lasers in Medical Science*.2022;37(1):309–315. doi: 10.1007/s10103-021-03249-6.

26. Воробьев Г.И., Шелыгин Ю.А., Благодарный Л.А. Геморрой. М.: Литтерра, 2010; 116–127 с.

27. Kaya B. Short and long term results of stapled hemorrhoidectomy. *D zce Tip Dergisi*. 2012; 14 (2): 18–22.

28. Астахов В. А., Хачатурова Э.А., Ерощкина Т.Д. Влияние раннего энтерального питания на уровень эндогенной интоксикации у больных, оперированных на прямой кишке. *Вестн. интенс. Терапии*. 2002; 2: 63–66.

29. Ищенко В.Н., Краснобаев А.Е., Григорюк А.А. Профилактика болевого синдрома и ближайших послеоперационных осложнений при оперативном лечении хронического геморроя. *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2020;(1):68–71. <https://doi.org/10.34215/1609–1175–2020–1–68–71>. Ishchenko V.N., Krasnobayev A.E., Grigoryuk A.A. Prevention of Pain Syndrome and Immediate Postoperative Complications in the Surgical Treatment of Chronic Hemorrhoids. *Pacific Medical Journal*. 2020; 1(79):68–71. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-bolevogo-sindroma-i-blizhayshih-posleoperatsionnyh-oslozhneniy-pri-operativnom-lechenii-hronicheskogo-gemorroya>. (date of appeal: 24.08.2025). (In Russ.).

30. Журавлев А. В., Каторкин С.Е., Чернов А.А. Результаты применения операции Лонго и операции Hal-RAR при хроническом геморрое. *Колоректология*. 2020; 19(1): 15.

31. Naldini G., Sturiale A. Stapled hemorrhoidopexy and THD/HAL-RAR: false myths of the third millennium. *Tech. Coloproctol*. 2020; Sep; 24(9):985–986. doi: 10.1007/s10151-020-02267-w.

32. Саенко Н. В., Шишменцев Н.Б. Исторические аспекты лечения геморроидальной болезни. //Вестник СМУС74. 2016. № 2 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-aspekty-lecheniya-gemorroidalnoy-bolezni> (дата обращения: 09.09.2025).

33. Черепенин М.Ю., Лутков И.В., Горский В.А. Комбинированный метод хирургического лечения геморроя с применением подслизистой лазерной деструкции, дезартеризации, мукопексии и электроэксцизии. *Московский хирургический журнал*. 2023;(2):46–51. <https://doi.org/10.17238/2072–3180–2023–2–46–51>Cherepenin M.Yu., Lutkov I.V., Gorsky V.A. Combined method of surgical treatment of hemorrhoids using submucosal laser destruction, desarterization, mucopexy and electroexcision // *Moscow surgical journal*. 2023;(2):46–51. doi: 10.17238/2072-3180-2023-2-46-51.

34. Арыкан Н.Г., Шестопалов А.Е., Митичкин А.Е., Варнавин О.А., Васин В.С., Лапин В.А., Каюпова Г.Ф. Цели нутритивной поддержки в предоперационном периоде. *РМЖ*. 2019;7:22–25. URL: <https://www.rusmedreview.com/upload/iblock/d38/22–25.pdf>(дата обращения: 09.09.2025).

35. Lewicky-Gaup C., Leader-Cramer A., Johnson L.L., Kenton K., Gossett D.R. Wound complications after obstetric anal sphincter injuries. *Obstet. Gynecol*. 2015; 125(5):1088–93.

36. Клинические протоколы МЗ Республики Казахстан от 2015 г. Травма прямой кишки.

37. Тулупов А. Н., Сафоев М.И., Есеноков А.А., Каримова Л.И., Боева М.Ю., Ярмагомедов М.З. Эндоскопическое клипирование колотомезанной раны прямой кишки при ранении параанальных свищей. «Актуальные вопросы хирургической тактики в современных условиях». М-лы VIII конгресса хирургов Юга России. Нальчик.15–16 мая 2025 г., г. С. 7–8.

38. Кравцов Ю.А., Пахолок Ю.П., Антоненко Ф.Ф., Ворошилов А.Д., Быстрицкая А.С. Возможности аппаратного механического шва в хирургической коррекции полных параанальных свищей. «Актуальные вопросы хирургической тактики в современных условиях». М-лы VIII конгресса хирургов Юга России. Нальчик.15–16 мая 2025 г., г. С. 7–8.

39. Лейдерман И.Н., Грицан А.И., Заболотских И.Б., Ломидзе С.В., Мазурок В.А., Нехаев И.В., Николаенко Э.М., Николенько А.В., Поляков И.В., Сытов А.В., Ярошецкий А.И. Периоперационная нутритивная поддержка. Клинические рекомендации. *Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова*. 2018;3:5–21. DOI: 10.21320/1818-474X-2018-3-5-21.

THE ROLE OF DIET THERAPY IN PERIOPERATIVE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH RECTAL DISEASES (LITERATURE REVIEW)

Pakholyuk Yu.P., Kravtsov Yu. A., Lisitsa G.T., Voroshilov A.D.
Pacific State Medical University

In recent years, in the case of proctological diseases, surgical intervention has become the choice of patients, and it is used at the early stages of the process. The use of minimally invasive surgical procedures can reduce severe pain, the duration of recovery and the period of disability. The review presents modern achievements regarding dietary approaches to preoperative preparation and postoperative management in patients with proctological diseases, including in the case of external and internal hemorrhoids, pararectal fistulas, rectoceles, and rectal lesions. The prospects of using new technologies for the management of the postoperative period in hemorrhoidal disease, paraproctitis, pararectal fistulas, and rectal injuries in clinical practice have been determined.

Keywords: proctology, diet therapy after surgery for proctological diseases, hemorrhoids, preoperative preparation, and postoperative management.

References

1. Semionkin E.I. *Coloproctology*. Moscow: Eco-Vector, 2018; 285 p. (In Russ.).
2. Lisichkin A.L., Busyrev Yu.B., Karpunina T.I. Optimization of the management of patients with a proctological profile during outpatient surgical treatment of hemorrhoids. *Perm Medical Journal*. 2020; 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-vedeniya-patsientov-koloproktologicheskogo-profilya-pri-ambulatornom-hirurgicheskom-lechenii-gemorroya> (date of access: 09.09.2025).
3. Shelygin Yu. A., Titov A. Yu., Achkasov S.I. Hemorrhoids. *Diagnostics and Treatment. Manual*. Moscow: GEOTAR-Media, 2022. 216 p.
4. Davis, B. R., Lee-Kong, S. A., Migaly, J., Feingold, D. L., & Steele, S.R. The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Management of Hemorrhoids. *Diseases of the colon and rectum*. 2018;61(3):284–292. <https://doi.org/10.1097/DCR.0000000000001030>.
5. Kim I. Yu., Panov V.V., Musailov V.A., Sychev D.A., Abdurakhmanov R.F. Principles of surgical care for rectal wounds. *Bulletin of the National Medical and Surgical Center named after N.I. Pirogov*. 2024; 19(2): 52–57. https://doi.org/10.25881/20728255_2024_19_2_52.
6. Martínez-Ortega, A. J., Piñar-Gutiérrez, A., Serrano-Aguayo, P., González-Navarro, I., Remón-Ruiz, P. J., Pereira-Cunill, J. L., & García-Luna, P.P. Perioperative Nutritional Support: A Review of Current Literature. *Nutrients*. 2022; 14(8): 1601. <https://doi.org/10.3390/nu14081601>.
7. Nalos M. Perioperative Nutrition. *World Nutrition Journal*. 2022; 6(1):17–18.

8. Nuspekova D., Dzhumabekov A., Dorskaliyev A., Glushkova N., Kelmekhanov N. Possibilities of optimizing perioperative management tactics in patients with chronic hemorrhoids based on accelerated recovery programs. A literature review. *Science and Healthcare*. 2022; 4(24):196–205. doi 10.34689/SH.2022.24.4.024;
9. Shakhrai S.V. Combined surgical treatment technique for chronic hemorrhoids. *Surgical News*. 2013;21(1):52–57. Combined surgical treatment technique of chronic hemorrhoids. Shakhrai S.V. The technique of combined surgical treatment of chronic hemorrhoids. *News of Surgery*. 2013;21(1):52–57.
10. Sipos, P., & Ondrejka, P. (2007). "Fast track" colorectal surgery. *Orvosi Hetilap*. 2007; 148(21):963–969. <https://doi.org/10.1556/OH.2007.27996>
11. Shelygin Yu.A., Frolov S.A., Titov A.Yu., Vasiliev S.V., Veselov A.V., Grigoriev E.G., Kashnikov V.N., Kostarev I.V., Kostenko N.V., Kuzminov A.M., Kulikovskiy V.F., Moskalov A.I., Mudrov A.A., Muravyov A.V., Polovinkin V.V., Timerbulatov V.M., Khubezov D.A., Yanovoy V.V. Clinical guidelines of the Association of Proctologists of Russia for the diagnosis and treatment of hemorrhoids. *Coloproctology*. 2019;18(1(67)):7–38. <https://doi.org/10.33878/2073-7556-2019-18-1-7-38>.
12. Romaguera V.P., Sancho-Muriel J., Alvarez-Sarredo E. Millan M., Garcia-Granero A., Frasson M. Postoperative complications in hemorrhoidal disease and special conditions. *Reviews on Recent Clinical Trials*. 2021;16(1):67–74. doi: 10.2174/157488711566200406114218.
13. Khanina Yu. S., Shapovalov K.G., Mikhailichenko M.I., Yashnov A.A. Nutritional support in the early postoperative period. IV Congress of Surgeons of the Trans-Baikal Territory: collection of scientific and practical articles. Interregional Conf. Chita, 2021; 37–55.
14. Litvinova O.N. Enteral nutrition of patients with chronic constipation. *Sciences of Europe*. 2017;15–1(15). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/enteralnoe-pitanie-bolnyh-s-hronicheskimi-zaporami> (Accessed: 09.09.2025).
15. Corman M.L. Hemorrhoids. In: Corman M.L., eds. *Colon and rectal surgery*. 6th ed. Philadelphia, USA: Lippincott; 2013:272–366.
16. Gallo G., Martellucci J., Sturiale A., Clerico G., Milito G., Marino F., Cocorullo G., Giordano P., Mistrangelo M., Trompetto M. Consensus external statement of the Italian Society of Colorectal Surgery (stripping SICCR): management and review of treatment of hemorrhoidal disease. *Tech Coloproctol*, 2020;24, (2): 145–164. doi: 10.1007/s10151-020-02149-1.
17. Hemorrhoids. Clinical protocols of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan – 2018. MedElement. Available at <https://diseases.medelement.com/disease/remopoiw2018/16135> (Accessed 23 February 2021)
18. Morroidectomy Tariverdiev A.M., rupture Lutsevich O.E., bylo Davidovich D.L., Fedorov A.V., Bogdanov D. Yu. hemorrhoids. Modern most surgical methods for the treatment of rectum hemorrhoids. *Pakholyuk1 Review of rectum literature*. Moscow Surgical Practical Journal. 2023; 4:96–103. URL: https://www.treatmentmossj.mucous.ru/hemorrhoidsjour/kotsyurbiy1_article/tselyu_view/731/648. Tariverdiev A.M., Lutsevich O.E., Davidovich D.L., Fedorov A.V., Bogdanov D. Yu. Modern surgical methods of hemorrhoid treatment. Literature review. *Moscow Surgical Journal*. 2023;(4):96–103. <https://doi.org/10.17238/2072-3180-2023-4-96-103>. (In Russ.).
19. Boymurodov O.S., Isoev I. Ch. Modern concepts of pathogenesis and treatment of hemorrhoids. Priorities of world science: new approaches and relevant research: collection of scientific papers on the materials of the XXVIII international scientific and practical conference. Anapa, 2022:49–57. URL: <https://innova-science.ru/wp-content/uploads/2022/05/sbornik-nauchnyh-trudov-30.04.2022-pmn-28.pdf#page=49>.
20. Litvinov O.A., Zhitikhin E.V., Ignatovich I.G., Ignatovich I.G., Arutyunyan O.A., Arustamov A.G., Grinev M.L. Choice of surgical treatment method for chronic combined hemorrhoids stage III–IV. *Bulletin of the Russian Military Medical Academy*. 2020; 39(3):27–31.
21. Gain M.Yu., Shakhrai S.V., Gain Yu.M. Laser coagulation of hemorrhoids with hemorrhoidomucopexy in the surgical treatment of chronic hemorrhoids stage II–III: a randomized trial. *Surgical News*. 2015;23 (4)429–435. *Novosti Khirurgii*. 2015; Jul-Aug; 23 (4): 429–435. doi: 10.18484/2305-0047.2015.4.429.
22. Zitta D.V., Terekhova N.A., Subbotin V.M. Clinical and biochemical evaluation of the effectiveness of the program for optimizing perioperative care of patients in elective colorectal surgery. *Coloproctology*. 2015; 2: 18–24. URL: https://gnck.ru/specialists/zurnal-koloproktologiya/journal_2_52_2015.pdf#page=20.
23. Elhassan, A., Ahmed, A., Awad, H. Humeidan M., Nguyen V., Cornett E.M., Urman R.D. Kaye A.D. The Evolution of Surgical Enhanced Recovery Pathways: a Review. *Curr Pain Headache Rep* 22, 74 (2018). <https://doi.org/10.1007/s11916-018-0727-z>.
24. Popovtsev M.A., Alekberzade A.V., Krylov N.N. Ligation of hemorrhoidal arteries without ultrasound Doppler navigation in the surgical treatment of hemorrhoidal disease. *Khirurgiya*. 2021;(12):49–55. doi: 10.17116/hirurgia202112149.
25. Crea N, Pata G, Lippa M., Tamburini, A. M., & Berjaoui, A.H. Hemorrhoid laser procedure (HeLP) for second- and third-degree hemorrhoids: results from a long-term follow-up analysis. *Lasers in Medical Science*. 2022;37(1):309–315. doi: 10.1007/s10103-021-03249-6.
26. Vorobyov G.I., Shelygin Yu.A., Blagodarny L.A. Hemorrhoids. Moscow: Litterra, 2010; 116–127 p.
27. Kaya B. Short and long-term results of stapled hemorrhoidectomy. *Dzce Tip Dergisi*. 2012; 14 (2): 18–22.
28. Astakhov V.A., Khachaturova E.A., Eroshkina T.D. Effect of early enteral nutrition on the level of endogenous intoxication in patients undergoing rectal surgery. *Vestn. intens. Therapy*. 2002; 2: 63–66.
29. Ishchenko V.N., Krasnobaev A.E., Grigoryuk A.A. Prevention of pain syndrome and immediate postoperative complications in the surgical treatment of chronic hemorrhoids. *Pacific Medical Journal*. 2020;(1):68–71. <https://doi.org/10.34215/1609-1175-2020-1-68-71>. Ishchenko V.N., Krasnobaev A.E., Grigoryuk A.A. Prevention of pain syndrome and immediate postoperative complications in the surgical treatment of chronic hemorrhoids. *Pacific Medical Journal*. 2020; 1(79):68–71. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-bolevogo-sindroma-i-blizhaysih-posleoperatsionnyh-oslozhneniy-pri-operativnom-lechenii-hronicheskogo-gemorroya>. (date of appeal: 24.08.2025). (In Russ.).
30. Zhuravlev AV, Katorkin SE, Chernov AA. Results of the Lingo operation and the Hal-RAR operation in chronic hemorrhoids. *Coloproctology*. 2020; 19(1): 15.
31. Naldini G., Sturiale A. Stapled hemorrhoidopexy and THD/HAL-RAR: false myths of the third millennium. *Tech. Coloproctol*. 2020; Sep; 24(9):985–986. doi: 10.1007/s10151-020-02267-w.
32. Saenko N.V., Shishmentsev N.B. Historical aspects of hemorrhoidal disease treatment. // *Vestnik SMUS74*. 2016. No. 2 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-aspekty-lecheniya-gemoroidalnoy-bolezni> (accessed: 09.09.2025).
33. Cherepenin M. Yu., Lutkov I.V., Gorsky V.A. Combined method of surgical treatment of hemorrhoids using submucous laser destruction, dearterization, mucopexy, and electroexcision. *Moscow surgical journal*. 2023;(2):46–51. <https://doi.org/10.17238/2072-3180-2023-2-46-51>. Cherepenin M.Yu., Lutkov I.V., Gorsky V.A. Combined method of surgical treatment of hemorrhoids using submucosal laser destruction, desarterization, mucopexy and electroexcision // *Moscow surgical journal*. 2023;(2):46–51. doi: 10.17238/2072-3180-2023-2-46-51.
34. Arykan N.G., Shestopalov A.E., Mitichkin A.E., Varnavin O.A., Vasin V.S., Lapin V.A., Kayupova G.F. Goals of nutritional support in the preoperative period. *RMZh*. 2019;7:22–25. URL: <https://www.rusmedreview.com/upload/iblock/d38/22-25.pdf> (accessed: 09.09.2025).
35. Lewicky-Gaupp C., Leader-Cramer A., Johnson L.L., Kenton K., Gossett D.R. Wound complications after obstetric anal sphincter injuries. *Obstet. Gynecol*. 2015; 125(5):1088–93.
36. Clinical protocols of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan for 2015. Rectal trauma.
37. Tulupov A.N., Safoev M.I., Yesenokov A.A., Karimova L.I., Boeva M. Yu., Yarmagomedov M.Z. Endoscopic clipping of a stab wound of the rectum with injury to the gluteal region // *Bulletin of Surgery named after I.I. Grekov*. 2021;
38. Kravtsov Yu.A., Pakholyuk Yu.P., Antonenko F.F., Voroshilov A.D., Bystritskaya A.S. Potential of hardware mechanical suture in surgical correction of complete pararectal fistulas. "Topical issues of surgical tactics in modern conditions". Proceedings of the VIII Congress of Surgeons of the South of Russia. Nalchik. May 15–16, 2025, pp. 7–8.
39. Leiderman I.N., Gritsan A.I., Zabolotskiy I.B., Lomidze S.V., Mazurok V.A., Nekhaev I.V., Nikolaenko E.M., Nikolenko A.V., Polyakov I.V., Sytov A.V., Yaroshetsky A.I. Perioperative nutritional support. Clinical guidelines. *Bulletin of Intensive Therapy named after A.I. Saltanova*. 2018;3:5–21. DOI: 10.21320/1818-474X-2018-3-5-21.

Куница Виктор Николаевич,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренней медицины, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского
E-mail: kunitsa-viktor@mail.ru

Григоришина Надежда Евгеньевна,

студент, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского
E-mail: grigorishina02@mail.ru

Карачик Эдие Усеиновна,

студент, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского
E-mail: ediekaracik@gmail.com

В статье рассматривается феномен ятрогенных масок – состояний, при которых медикаментозная терапия или врачебные вмешательства маскируют клиническую картину основного заболевания, затрудняя его своевременную диагностику. Описаны механизмы формирования ятрогенных масок, приведены группы лекарственных средств, наиболее часто вызывающих подобные эффекты, и проанализировано их влияние на объективные данные физикального обследования. Особое внимание уделено вопросам дифференциальной диагностики, профилактике и тактике ведения пациентов с подозрением на ятрогенную маску.

Ключевые слова: ятрогенная маска, аускультация, стертая клиническая картина, бронхолитики, бета-блокаторы, лекарственный анамнез, диагностическая ошибка, побочное действие, рациональная фармакотерапия.

Введение

Ятрогенные маски – это один из парадоксов современной медицины: лечение, призванное устранить болезнь, стирает её клинические симптомы, затрудняя или делая невозможной своевременную диагностику. В отличие от классических ятрогенных заболеваний (осложнений терапии или вмешательств), маски не создают новую патологию, а скрывают уже существующую, создавая иллюзию благополучия на фоне прогрессирующего процесса. С позиции клинической диагностики и этики такие случаи требуют от врача не только фармакологической грамотности, но и постоянной настороженности: под действием лекарств привычные симптомы и аускультативная картина могут полностью трансформироваться, что может привести к необратимым последствиям.[8]

В современной медицине наблюдается тенденция к расширению арсенала лекарственных средств и увеличению числа полипрагмазий. Это приводит к росту числа случаев, когда фармакотерапия искажает естественное течение болезни. Проблема ятрогенных масок особенно актуальна в условиях скорой помощи, стационаров и амбулаторной практики, где своевременная диагностика критически важна для выбора тактики лечения.

Целью данной статьи является систематизация современных представлений о влиянии лекарственных средств на клинические симптомы и аускультативную картину заболеваний, а также разработка практических подходов к выявлению и профилактике ятрогенных масок.

Задачи: определить группы лекарственных препаратов с наибольшим маскирующим потенциалом; описать типичные изменения симптомов (лихорадка, боль, воспаление, аллергические проявления) на фоне приема различных лекарств; проанализировать влияние фармакотерапии на аускультативные симптомы при патологии легких, сердца и желудочно-кишечного тракта; сформулировать принципы профилактики и тактики ведения пациентов с подозрением на ятрогенную маскировку.[1]

Механизмы и опасность ятрогенных масок

Одним из наиболее опасных механизмов ятрогенной маски является улучшение состояния на фоне прогрессирования болезни. Приём анальгетиков, антипиретиков или глюкокортикостероидов способен создать у пациента субъективное ощущение улучшения самочувствия, тогда как патологический процесс продолжает неуклонно развиваться. Временное исчезновение боли, нормализация температуры или уменьшение отёчности формируют ложное чувство контроля над ситуацией, что нередко затягивает обращение за специализированной помощью и ведёт к потере драгоценного времени. [2]

Параллельно происходит потеря так называемого «золотого стандарта» диагностики – классических симптомов. Многие заболевания имеют патогномоничные или высокоспецифичные признаки: лихорадка при инфекциях, болевой синдром при остром животе, кашель при пневмонии. Маскировка этих ключевых проявлений лишает врача главных ориентиров для постановки правильного диагноза, заставляя его двигаться вслепую. Как следствие, существенно увеличивается время постановки правильного диагноза и возрастает риск врачебных ошибок.

Затруднённая диагностика повышает вероятность выбора неверной тактики лечения, что в свою очередь может привести к развитию тяжёлых осложнений и значительному ухудшению прогноза для пациента. Дополнительную путаницу в клиническую картину вносят прямое фармакологическое действие препаратов, их побочные эффекты и токсические реакции.

Некоторые лекарственные средства обладают нежелательными эффектами, которые умело имитируют симптомы других болезней – например, диарея на фоне антибиотиков напоминает кишечную инфекцию, а бронхоспазм, вызванный бета-блокаторами, может быть ошибочно принят за обострение бронхиальной астмы. Это ещё больше запутывает клиническую картину, заставляя врача искать несуществующую патологию вместо того, чтобы распознать истинную причину страдания.[7]

В клинической практике наиболее значимыми в плане формирования масок являются следующие группы препаратов:

— Снижение температуры тела достигается с помощью антипиретиков — парацетамола и нестероидных противовоспалительных препаратов. Они блокируют циклооксигеназу в гипоталамусе, уменьшая выработку простагландина E_2 , который отвечает за подъём температурной установочной точки. В результате температура приходит в норму, тогда как инфекционный или воспалительный процесс сохраняется. Наиболее опасная ситуация возникает при пневмонии или сепсисе, когда приём жаропонижающих создаёт ложное впечатление благополучия.

— Устранение болевого синдрома реализуется двумя путями. Нестероидные противовоспалительные средства подавляют синтез простагландинов непосредственно в очаге воспаления, тогда как наркотические анальгетики воздействуют на опиатные рецепторы центральной нервной системы, прерывая проведение болевого импульса. В итоге исчезают боли при аппендиците, инфаркте миокарда, перфоративной язве желудка или почечной колике, и врач не наблюдает характерных признаков «острого живота» или типичной ангинозной боли.

— Подавление воспалительной реакции наблюдается на фоне применения глюкокортикостероидов и нестероидных противовоспалительных препаратов. Эти средства снижают продукцию провоспалительных цитокинов, угнетают миграцию лейкоцитов и уменьшают проницаемость сосудистой стенки. В результате стираются как местные признаки воспаления — покраснение, припухлость, болезненность, так и системные изменения — лейкоцитоз, ускорение СОЭ, повышение уровня С-реактивного белка. Аппендицит, панкреатит или менингит в таких условиях протекают атипично, без развёрнутой клинической картины.[3]

— Ослабление аллергических проявлений связано с действием антигистаминных препаратов, которые блокируют H_2 -рецепторы, не позволяя гистамину реализовать свои эффекты. Исчезают кожный зуд, высыпания, отёк тканей. Это может замаскировать анафилаксию, сывороточную болезнь, а также инфекции, сопровождающиеся экзантемой, например корь или менингококковую инфекцию.

— Лекарственные средства способны существенно изменять и аускультативную картину. Бронхолитики расширяют просвет бронхов, устраняя свистящие хрипы, но не воздействуя на воспалительный процесс. Бета-блокаторы урежают частоту сердечных сокращений, скрывая тахикардию, которая возникает при тромбоэмболии лёгочной артерии, тиреотоксикозе или острой кровопотере. Спазмолитики и опиоидные анальгетики снижают двигательную активность кишечника, маскируя динамическую кишечную непроходимость. В результате при выслушивании лёгких, сердца и живота врач может получить ложное впечатление о норме или неспецифических отклонениях.

— Муколитики и отхаркивающие изменяют характер мокроты.

— Диуретики влияют на водно-электролитный баланс, маскируя отёки при сердечной недостаточности.

— Антикоагулянты и антиагреганты повышают риск кровотечений, которые могут быть приняты за симптомы основного заболевания ЖКТ.

— Противоопухолевые препараты вызывают широкий спектр побочных эффектов, имитирующих аутоиммунные или инфекционные заболевания.

— Отдельного внимания заслуживает феномен, когда лекарство создаёт новые симптомы, имитирующие другое заболевание. Побочный эффект принимается за самостоятельную патологию. Например, кашель, вызванный ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, напоминает обострение бронхита или хронической обструктивной болезни лёгких.

— Лекарственная лихорадка на фоне антибиотикотерапии может быть ошибочно расценена как продолжающаяся инфекция. Антибиотик-ассоциированная диарея нередко имитирует острую кишечную инфекцию.[9,15]

Влияние на общую клиническую картину

Маскировка лихорадки, которая является важнейшим диагностическим признаком. Применение антипиретиков при инфекционно-воспалительных заболеваниях без эмпирической антибиотикотерапии является наиболее частым и опасным вариантом ятрогенной маски. Особенно критично это у детей (риск развития фебрильных судорог, генерализации инфекции) и иммунокомпрометированных пациентов.

Купирование болевого синдрома. Боль выполняет сигнальную функцию. Неконтролируемое применение анальгетиков при острых состояниях лишает врача важнейшего диагностического критерия. Правило «холодовой паузы» (отказ от анальгетиков до установления диагноза при остром животе) в последние годы подвергается пере-

смотру, однако полное купирование боли без установления причины остается недопустимым.

Снижение воспалительной реакции. Глюкокортикостероиды и НПВС подавляют все фазы воспаления: альтерацию, экссудацию и пролиферацию. Это приводит к снижению лабораторных маркеров воспаления (СРБ, лейкоцитоз, СОЭ), что создаёт ложное впечатление о купировании процесса при сохранении патогенетического субстрата болезни.

Минимизация аллергических проявлений. Антигистаминные препараты, стабилизаторы мембран тучных клеток, топические стероиды могут полностью купировать кожные проявления аллергических реакций. Это опасно при прогрессировании системной аллергической реакции (синдром Лайелла, Стивенса-Джонсона) или анафилаксии, где кожные проявления являются ранними диагностическими маркерами.

Появление новых симптомов, не связанных с основным заболеванием.

Лекарственные средства могут имитировать новую патологию: кашель (ингибиторы АПФ), артралгии (фторхинолоны), гепатит (многие препараты), панкреатит (ингибиторы ДПП-4, тиазиды), волчаночноподобный синдром (гидралазин, прокаинамид). Диагностическая ошибка заключается в том, что эти проявления принимаются за новое заболевание, тогда как достаточно отменить вызвавший их препарат. [3]

Влияние на аускультативную картину

Аускультация — один из ключевых методов физикального обследования, позволяющий врачу получить объективную информацию о состоянии внутренних органов. Однако применение лекарственных средств, вызывающих ятрогенные маски, способно существенно исказить классическую аускультативную картину, что затрудняет своевременную диагностику и повышает риск врачебных ошибок.

Аускультация лёгких

При заболеваниях дыхательной системы аускультация позволяет выявить хрипы, крепитацию, ослабление или усиление везикулярного дыхания. Однако ряд препаратов, в первую очередь бронхолитики и муколитики, могут временно устранять или смягчать эти симптомы. Например, после ингаляции бронхолитика исчезновение свистящих хрипов не всегда свидетельствует о выздоровлении, а может быть результатом фармакологического расширения бронхов. Это улучшает состояние, однако воспалительный процесс в лёгких продолжает прогрессировать. Аналогично, муколитики способствуют разжижению и выведению мокроты, что приводит к исчезновению влажных хрипов, маскируя тяжесть бронхита или пневмонии.[6]

Аускультация сердца

В кардиологии аускультация незаменима для выявления шумов, нарушений ритма и проводимости. Ятрогенные маски здесь проявляются особенно ярко. Например, бета-блокаторы и некоторые антиаритмические препараты могут подавлять тахикардию и экстрасистолию, делая аускультативную картину более «спокойной», чем реальное состояние миокарда. При миокардите или перикардите применение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) или глюкокортикостероидов способно временно уменьшить болевой синдром и приглушить шум трения перикарда, что затрудняет постановку диагноза на ранней стадии. [13]

Аускультация желудочно-кишечного тракта

Исследование органов брюшной полости также опирается на оценку перистальтических шумов. Применение наркотических анальгетиков и спазмолитиков приводит к значительному ослаблению или полному исчезновению кишечных шумов за счёт снижения моторики кишечника. В условиях острого живота (например, при перитоните) такая картина может быть ошибочно расценена как положительную динамику или «парез кишечника лёгкой степени», в то время как патологический процесс требует немедленного хирургического вмешательства. Антибиотики могут вызывать диарею, аускультативно проявляющуюся усилением перистальтики, что ошибочно интерпретируется как гастроэнтерит.[9,11]

Диагностика ятрогенных масок

1. Сбор лекарственного анамнеза

На первом этапе диагностики необходимо тщательно собрать лекарственный анамнез, включающий все назначенные препараты за последние месяцы. Важно выяснить:

- Названия препаратов и их дозировки;
- Время начала и окончания приема;
- Частоту и режим дозирования;

- Наличие случаев передозировки или неправильного использования;
- Использование безрецептурных средств и добавок;
- Наличие известных побочных эффектов у пациента или в семьях.

Особое значение имеет выявление препаратов, известных своей склонностью вызывать побочные реакции или маскировать симптомы других заболеваний. Важной составляющей является выявление препаратов, которые могут взаимодействовать или усиливать токсические эффекты друг друга.

Тщательный сбор данных помогает установить временную связь между приемом лекарств и возникновением симптомов, что является фундаментом для последующих диагностических этапов.[10]

2. Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика ятрогенных масок представляет собой важнейший этап в процессе установления правильного диагноза, поскольку она позволяет исключить другие заболевания и дифференцировать побочные эффекты медикаментов от разнообразных патологических состояний. Этот процесс предполагает системный подход, основанный на тщательном анализе клинических проявлений, анамнеза, лабораторных и инструментальных данных, а также необходимости консультаций специалистов разных профильных областей.

В первую очередь, необходимо провести анализ клинических симптомов, их особенностей и временной характеристики: важно определить, когда именно появились признаки, связаны ли они с началом или изменением дозировки лекарственных препаратов, и есть ли их рецидивы при повторном введении препарата.

Особое внимание уделяется степени выраженности симптомов, локализации и их характеру, поскольку реакции могут иметь разный внешний вид – от кожных проявлений, таких как сыпь или отек, до системных нарушений, например, повышение ферментов печени, неврологических изменений или симптомов со стороны ЖКТ. Значимым моментом является выявление связи между приемом конкретных препаратов и развитием симптомов – наличие временной ассоциации, исчезновение симптомов после отмены лекарства или их появление при повторном введении.

Также необходимо провести объективную оценку симптомов, используя лабораторные исследования (например, показатели ферментов, уровень эозинофилов, иммунологические маркеры) и инструментальные методы (УЗИ, МРТ, ЭКГ и другие). Важной задачей дифференциальной диагностики является исключение других болезней, способных вызывать схожие проявления: инфекционных заболеваний, таких как вирусные или бактериальные инфекции; аутоиммунных процессов, например, системной красной волчанки или васкулитов; метаболических или генетических патологий, которые могут маскироваться под реакции на медикаменты.

Необходимо также учитывать наличие факторов риска и сопутствующих заболеваний. В ходе этого этапа важно помнить о специфике проявлений: аллергические реакции обычно развиваются быстро, сопровождаются отеками, зудом и реакцией гиперчувствительности, тогда как токсические реакции связаны с дозами, длительным применением или конкретной фармакологической характеристикой препарата. В конечном итоге, цель дифференциальной диагностики – исключить вероятность тяжелых заболеваний, требующих иной тактики, и подтвердить связь симптомов с медикаментозной терапией. Только после этого можно приступить к следующим этапам, например, к проведению элиминационных тестов. Такой комплексный анализ позволяет не только правильно определить причину симптомов, но и обеспечить безопасность пациента, избежав неправильной терапии и возможных осложнений.[14]

3. Динамическое наблюдение

Динамическое наблюдение позволяет отслеживать развитие и изменение симптомов пациента в течение времени, а также оценивать эффект от проводимых лечебных и диагностических мероприятий. Этот процесс включает регулярное и систематическое оценивание состояния пациента, его симптомов и лабораторно-инструментальных данных.

Одним из ключевых моментов является контроль за изменениями симптомов в связи с назначенной или отмененной терапией: при подозрении на ятрогенные реакции отмена или изменение дозировки определенного препарата может привести к исчезновению симптомов, что служит подтверждением связи. В этом случае важно вести подробный протокол наблюдения, фиксировать дату отмены, введение новых лекарственных средств, а также учитывать возможные нелинейные или затяжные проявления реакции.

Постоянный мониторинг включает проведение повторных лабораторных исследований, клинических осмотров, а при необходимости –

инструментальных методов диагностики, чтобы определить динамику процессов. Следует учитывать, что ятрогенные реакции могут иметь перемежающийся характер или нарастать постепенно, поэтому необходимо регулярное и длительное наблюдение, что позволяет выявить тенденцию к улучшению или ухудшению состояния при конкретных коррекционных мероприятиях.

4. Элиминационные тесты

Наиболее надежным и подтверждающим методом диагностики ятрогенных масок являются элиминационные тесты – это последовательное и планомерное исключение предполагающего вызывающего реакцию препарата с последующим мониторингом за состоянием пациента. Подготовка к таким тестам включает тщательное информирование пациента о целях и возможных рисках, а также проведение всех необходимых предварительных исследований для исключения острых или тяжелых состояний. Процедура подразумевает постепенное и контролируемое отменение подозреваемого препарата, часто в сочетании с введением альтернативных средств, если это возможно и безопасно.

В ходе отмены рекомендуется строго соблюдать график и фиксировать время, дозировки и любые новые симптомы или изменения в общем состоянии пациента. Основным критерием положительного результата является исчезновение симптомов или их значительное ослабление в течение определенного времени после отмены препарата. Если симптомы исчезают, это служит сильным подтверждением их ятрогенного происхождения. В случае, когда симптомы сохраняются или прогрессируют, могут понадобиться дополнительные диагностические меры, например, повторная оценка или проведение индукционных провокационных тестов – с целью уточнить реакцию организма.

В некоторых случаях, если есть необходимость, проводят повторное введение препарата, но только под строгим контролем и в условиях, позволяющих немедленно оказать помощь при развитии серьезных реакций. Отмена препарата должна осуществляться осторожно, с учетом рисков для пациента, чтобы избежать обострения или других осложнений.[2,4,5]

Профилактика и тактика ведения при ятрогенных масках

Профилактика и грамотная тактика ведения пациентов с риском развития ятрогенных масок направлены на минимизацию вероятности маскировки симптомов основного заболевания, своевременное выявление побочных эффектов терапии и предотвращение врачебных ошибок.

Основой профилактики является назначение лекарственных средств строго по показаниям, с учётом индивидуальных особенностей пациента, его возраста, сопутствующих заболеваний и аллергологического анамнеза. Важно избегать полипрагмазии – одновременного назначения большого количества препаратов, что увеличивает риск лекарственных взаимодействий и развития побочных эффектов. При выборе терапии предпочтение отдаётся препаратам с доказанной эффективностью и минимальным риском маскировки симптомов. Дозировки подбираются индивидуально, а длительность курса лечения должна быть обоснована и ограничена минимально необходимым сроком.

Систематический контроль за состоянием пациента на фоне проводимой терапии позволяет своевременно выявить нежелательные реакции и признаки ятрогенной маски. Врач должен регулярно оценивать динамику жалоб, объективный статус (температуру, артериальное давление, частоту дыхания и сердечных сокращений), а также результаты лабораторных и инструментальных исследований. Особое внимание уделяется пациентам из групп риска: пожилым, детям, беременным, а также лицам с хроническими заболеваниями печени и почек. Важно информировать пациента о возможных побочных эффектах и обучать его правилам самоконтроля.

При подозрении на развитие ятрогенной маски необходимо провести тщательный анализ лекарственного анамнеза и оценить связь между появлением новых или изменением существующих симптомов и началом приёма определённых препаратов.

В сложных случаях требуется привлечение смежных специалистов для проведения дифференциальной диагностики и выработки оптимальной тактики лечения. [7,12,14]

Заключение

Ятрогенные маски представляют собой серьезную проблему современной клинической медицины, обусловленную широким применением высокоэффективных фармакологических средств. Механизмы маскировки многообразны: от прямого фармакологического воздействия на ключевые симптомы (лихорадка, боль, воспаление) до появления новой симптоматики, имитирующей другие заболевания.

Основную опасность создают антипиретики, анальгетики, глюкокортикостероиды, антибиотики, бета-блокаторы, особенно при их неконтролируемом применении и комбинации. Последствия включают задержку диагностики, прогрессирование основного заболевания, развитие осложнений и, в ряде случаев, летальные исходы.

Ключевая роль в профилактике и выявлении ятрогенных масок принадлежит тщательному сбору лекарственного анамнеза, настороженности врача в отношении возможного влияния терапии на клиническую картину и соблюдению принципов рациональной фармакотерапии. Элиминационные тесты и динамическое наблюдение остаются основными методами верификации.

Современному клиницисту необходимо помнить: назначая лекарство, мы не только лечим болезнь, но и потенциально изменяем ее «лицо». Осведомленность о феномене ятрогенных масок – необходимое условие безопасной и эффективной медицинской практики.

Литература

1. Баранов А.Л. Ятрогенные проявления в клинической практике. М.: Медицинское информационное агентство, 2017. – 256 с.
2. Иванов В.П., Смирнова А.В. Лекарственные маски и их роль в диагностике заболеваний. Журнал практической медицины. 2020; 12(4): 45–52.
3. Михайлов Ю.Г., Кузнецов А.Н. Влияние медикаментов на клиническую картину заболеваний: обзор литературы. Журнал практической медицины. 2019; Т. 67(3): 123–129.
4. WHO Expert Committee. Pharmacovigilance: ensuring the safe and effective use of medicines. Geneva: WHO, 2019.
5. Власова Е.А. Значение лекарственного анамнеза в диагностике и профилактике ятрогенных эффектов. Российский журнал клинической практики. 2017; № 5: 78–83.
6. Krutikov E., Chernukha S., Polskaya L. History of the propedeutics of internal medicine department of the medical academy named after S.I. Georgievsky from the foundation to our days // Таврический медико-биологический вестник. – 2022. – Т. 23, № 1. – С. 117–123.
7. Громова О.П., Сидоренко И.В. Побочные эффекты лекарственных средств и их клиническое значение. Медицинский альманах. 2019; № 11: 94–99.
8. Sykes D., et al. Iatrogenic Disease: Mechanisms and Prevention. London: Springer, 2016.
9. Петрова Т.А. Дифференциальная диагностика маскирующих эффектов лекарственных препаратов. Врач. 2018; № 8: 30–36.
10. Куница В.Н., Пропедевтика внутренних болезней, как первая клиническая дисциплина / В.Н. Куница, А.А. Шахназаров, В.В. Лудан, О.Д. Воронцова // Образование от «А» до «Я». -№ 3, 2025. -С. 62–66.
11. Сычев Д.А., ред. Клиническая фармакология: национальное руководство. 2-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2023. 896 с.
12. Петров В.И., Рожкова Т.В. Ятрогенные маски в практике терапевта и клинического фармаколога. Качественная клиническая практика. 2022;(3):45–52.
13. Арутюнов Г.П., Оганов Р.Г. Полипрагмазия в кардиологии: проблемы и пути решения. Кардиология. 2021;61(4):12–19.

14. Лепяхин В.К., Астахова А.В. Нежелательные лекарственные реакции: современные аспекты. Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. 2020;10(2):78–85.

15. Страчунский Л.С., Козлов С.Н. Антибиотики и маскировка инфекций. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2023;25(1):23–29.

IATROGENIC MASKS: HOW DRUGS ALTER SYMPTOMS AND AUSCULTATORY FINDINGS

Kunitsa V.N., Grigorishina N.E., Karachik E.U.

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Order of the Red Banner of Labor, S.I. Georgievsky Medical Institute

The article examines the phenomenon of iatrogenic masks, conditions in which drug therapy or medical interventions mask the clinical picture of the underlying disease, making it difficult to diagnose it in a timely manner. The mechanisms of formation of iatrogenic masks are described, the groups of drugs that most often cause such effects are given, and their effect on objective physical examination data is analyzed. Special attention is paid to the issues of differential diagnosis, prevention, and management of patients with suspected iatrogenic mask.

Keywords: iatrogenic mask, auscultation, erased clinical picture, bronchodilators, beta-blockers, medical history, diagnostic error, side effect, rational pharmacotherapy.

References

1. Baranov A.L. Iatrogenic manifestations in clinical practice. Moscow: Medical Information Agency, 2017. 256 p.
2. Ivanov V.P., Smirnova A.V. Medicinal masks and their role in the diagnosis of diseases. Journal of Practical Medicine. 2020; 12(4): 45–52.
3. Mikhailov Yu.G., Kuznetsov A.N. The effect of medications on the clinical picture of diseases: a literature review. Journal of Practical Medicine. 2019; Vol. 67(3): 123–129.
4. WHO Expert Committee. Pharmacovigilance: ensuring the safe and effective use of medicines. Geneva: WHO, 2019.
5. Vlasova E.A. The importance of a medical history in the diagnosis and prevention of iatrogenic effects. Russian Journal of Clinical Practice. 2017; № 5: 78–83.
6. Krutikov E., Chernukha S., Polskaya L. History of the propedeutics of internal medicine department of the medical academy named after S.I. Georgievsky from the foundation to our days // Tauride Medical and Biological Bulletin. – 2022. – Vol. 23, № 1. – pp. 117–123.
7. Gromova O.P., Sidorenko I.V. Side effects of medicines and their clinical significance. Medical almanac. 2019; № 11: 94–99.
8. Sykes D., et al. Iatrogenic Disease: Mechanisms and Prevention. London: Springer, 2016.
9. Petrova T.A. Differential diagnosis of masking effects of drugs. Doctor. 2018; № 8: 30–36.
10. Kunitsa V.N., Propaedeutics of internal diseases as the first clinical discipline / V.N. Kunitsa, A.A. Shakhnazarov, V.V. Ludan, O.D. Vorontsova // Education from «A» to «Z». -No. 3, 2025. -pp. 62–66.
11. Sychev D.A., ed. Clinical Pharmacology: National guidelines. 2nd ed. Moscow: GEOTAR-Media; 2023. 896 p.
12. Petrov V.I., Rozhkova T.V. Iatrogenic masks in the practice of a therapist and a clinical pharmacologist. High-quality clinical practice. 2022;(3):45–52.
13. Arutyunov G.P., Oganov R.G. Polypragmasia in cardiology: problems and solutions. Cardiology. 2021;61(4):12–19.
14. Lepakhin V.K., Astakhova A.V. Undesirable drug reactions: modern aspects. Bulletin of the Scientific Center for Expertise of Medical devices. 2020;10(2):78–85.
15. Strachunsky L.S., Kozlov S.N. Antibiotics and infection masking. Clinical microbiology and antimicrobial chemotherapy. 2023;25(1):23–29.

Куровский Станислав Валерьевич,

руководитель научно-исследовательского подразделения, ООО «Высшая Школа Образования»

E-mail: 8917564@gmail.com

Мишин Денис Александрович,

руководитель редакционно-издательского отдела, ООО «Высшая Школа Образования»

E-mail: 9651530@gmail.com

Андгуладзе Георгий Рамазович,

специалист, врач-стоматолог, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

E-mail: georgii.andguladze@gmail.com

Сложившаяся модель оказания стоматологической помощи вступает в противоречие с накопленными данными о патофизиологических взаимосвязях между заболеваниями полости рта и системными патологическими процессами. Высокая распространенность коморбидной патологии, при которой стоматологические заболевания сочетаются с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими неинфекционными состояниями, предполагает пересмотр подходов к диагностике, лечению и организации медицинской помощи. Цель работы заключается в анализе современных направлений развития стоматологии как медицинской науки и оценке эффективности внедрения инновационных технологий, определяющих переход к интегративной и персонализированной модели оказания помощи. Методы исследования включают анализ и синтез научной литературы, систематизацию подходов к персонализации лечения, сравнительный анализ эффективности различных методов диагностики и терапии. Основные результаты научного исследования: приведена сравнительная характеристика традиционного и цифрового диагностических процессов в стоматологии; выполнена оценка эффективности методов регенерации костной ткани с выделением биологических механизмов и клинических ограничений каждого подхода; систематизированы факторы, определяющие выбор антибактериальной терапии в стоматологии; обоснована необходимость перехода к интегративной модели, учитывающей взаимосвязи стоматологического статуса и соматического здоровья. Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы медицинскими организациями стоматологического профиля для совершенствования диагностических и лечебных протоколов, внедрения инновационных технологий, исходя из нормативных требований, а также для оптимизации междисциплинарного взаимодействия между стоматологическими и соматическими подразделениями при ведении пациентов с коморбидной патологией.

Ключевые слова: интегративная стоматология; цифровая трансформация; прецизионная диагностика; тканевая инженерия; регенеративная медицина; пародонтит; коморбидность; персонализированная фармакотерапия; антимикробная резистентность; биомаркеры.

Введение

В системе организации медицинской помощи исторически сложилось разделение на стоматологическую и соматическую составляющие, что привело к формированию узкоспециализированной модели, в рамках которой лечение заболеваний полости рта и челюстно-лицевой области зачастую осуществляется изолированно от оценки общего состояния пациента [1]. Такое разделение, оправданное на этапах становления клинических дисциплин [2], в настоящее время вступает в противоречие с накопленными данными о патофизиологических взаимосвязях между стоматологическими и системными патологическими процессами. Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют, что хронические воспалительные заболевания пародонта выявляются у значительной части взрослого населения, при этом более чем у половины пациентов с тяжелыми формами пародонтита одновременно диагностируются сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца либо другие соматические заболевания, течение которых может усугубляться наличием персистирующего очага инфекции в полости рта [3–5]. С другой стороны, наличие декомпенсированной соматической патологии увеличивает частоту осложнений после стоматологических вмешательств и уменьшает прогноз эффективности лечения [6], что обуславливает совершенствование подходов к планированию и проведению стоматологической помощи.

Необходимость перехода к интегративной модели обусловлена не только клиническими наблюдениями, но и изменением эпидемиологической ситуации. В структуре заболеваемости населения повышается доля пациентов с коморбидной патологией, у которых стоматологические заболевания сочетаются с несколькими хроническими неинфекционными заболеваниями. Указанная тенденция характерна для всех возрастных групп, но наиболее выражена у лиц старшего трудоспособного возраста, составляющих растущую часть пациентов стоматологических учреждений [7]. В этих условиях оказание стоматологической помощи без учета системного статуса пациента не позволяет достичь устойчивых клинических результатов и сопряжено с повышенными рисками [8]. Интегративная модель предполагает объединение усилий врачей-стоматологов со специалистами терапевтического профиля, включение оценки соматического статуса в алгоритм предоперационной подготовки при планировании хирургических вмешательств, а также совместное ведение пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями пародонта на фоне системной патологии.

Цель настоящей работы заключается в анализе современных направлений развития стоматологии, а также в оценке эффективности внедрения инновационных технологий, определяющих переход к интегративной и персонализированной модели оказания помощи. В рамках достижения поставленной цели рассматриваются цифровая трансформация диагностических и лечебных процессов, достижения тканевой инженерии и регенеративной медицины, взаимосвязь стоматологического статуса с соматическим здоровьем, а также подходы к персонализированной фармакотерапии, исходя из проблемы антимикробной резистентности.

Научная новизна исследования состоит в систематизации подходов к персонализации стоматологического лечения на основе интеграции цифрового прогнозирования и биомаркеров, отражающих состояние системных процессов в организме. В отличие от работ, рассматривающих отдельные технологические инновации [9–11], в настоящей статье предлагается концепция, объединяющая диагностические, лечебные и организационные компоненты в единую систему, ориентированную на учет индивидуальных особенностей пациента. Подобный подход способствует не только повышению эффективности стоматологической помощи, но и обоснованию потребности изменения организационных форм взаимодействия между стоматологическими и соматическими подразделениями в структуре здравоохранения.

Цифровая трансформация как фундамент прецизионной стоматологии

Переход к прецизионной медицине в стоматологии стал возможным благодаря конвертации аналоговых методов диагностики и планирования в цифровые форматы, обеспечивающие измеримость, воспроизводимость и интеграцию разнородных данных о состоянии пациента. В основе этого процесса лежит формирование единой цифровой среды, в которой результаты лучевой диагностики, внутритротового сканирования и функциональных

исследований объединяются в трехмерную модель челюстно-лицевой области с высокой степенью пространственной точности. Конусно-лучевая компьютерная томография выступает базовым элементом данной системы, предоставляя информацию не только о костных структурах, но и о расположении нервных сосудистых пучков, состоянии околоносовых пазух, а также о плотности костной ткани, что весьма значимо при планировании дентальной имплантации и хирургических вмешательств. Дополнение томографических данных результатами внутриротового сканирования позволяет исключить этап получения физических слепков и связанные с ним искажения, обеспечивая создание виртуальной модели с погрешностью, не превышающей 20 микрометров [12].

Применение методов искусственного интеллекта в обработке диагностических изображений открывает возможности для автоматизированного выявления патологических изменений, которые могут быть не очевидны при визуальной оценке специалистом. Алгоритмы глубокого обучения, обученные на массивах томографических и рентгенологических данных, способны детектировать периапикальные изменения на стадии, предшествующей появлению клинических симптомов, дифференцировать одонтогенные и неодонтогенные поражения челюстных костей, а также определять признаки патологии, проявляющейся в челюстно-лицевой области. Эффективность систем оценивается по показателям чувствительности и специфичности, которые в ряде исследований достигают значений, сопоставимых с экспертной оценкой врача-рентгенолога, а по времени обработки данных значительно ее превосходят [13], [14].

Сравнительная характеристика традиционного и цифрового диагностических процессов в стоматологии отражена в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительная характеристика традиционного и цифрового диагностических процессов в стоматологии

Параметр	Традиционный подход	Цифровой подход
Источники данных	Радиовизиография	Конусно-лучевая компьютерная томография
	Физические слепки	Внутриротовое сканирование
	Визуальный осмотр	Цифровая фотометрия
Способ хранения информации	Разрозненные архивы	Интегрированные базы данных с единым протоколом обмена
	Бумажные носители	
Точность измерений	Зависит от оператора	Стандартизированная
	Погрешность до 0,5 мм при планировании имплантации	Погрешность менее 0,05 мм
Время обработки	Последовательное выполнение этапов	Одновременная обработка данных
	Длительность до нескольких дней	Сокращение времени планирования до нескольких часов
Возможность прогнозирования	Ограничена двумерными проекциями и субъективной оценкой	Доступны биомеханическое моделирование
		Виртуальное прототипирование
		Прогноз нагрузки

Источник: разработано авторами.

Представленные данные свидетельствуют об отличии цифрового подхода, которое заключается в изменении концепции диагностического процесса. Если традиционная модель предполагает последовательное получение и интерпретацию разрозненных данных, что оставляет возможность для накопления ошибок на каждом этапе, то цифровая среда обеспечивает одновременную работу с полным массивом информации и ее объективизацию. Наиболее значимым для клинической практики является сокращение погрешности измерений, что непосредственно влияет на безопасность хирургического этапа, особенно при работе в анатомически сложных зонах с ограниченными костными объемами.

Хирургическая навигация, реализуемая на основе предварительного цифрового планирования, может перенести виртуально рассчитанное положение имплантатов в реальное операционное поле с использованием индивидуальных хирургических шаблонов, изготовленных методом аддитивных технологий. Их применение снижает риск повреждения анатомических структур до величин, не превышающих статистическую погрешность метода, что актуально при атрофии костной ткани, когда расстояние до нижнечелюстного канала или дна верхнечелюстной пазухи составляет менее 2 миллиметров. В ортодонтической практике цифровое планирование перемещения зубов с последующим изготовлением серии элайнеров позволяет прогнозировать результат лечения на этапе, предшествующем его началу, а также вносить коррективы в план воздействия на основе промежуточных результатов сканирования.

Биомедицинские аспекты и тканевая инженерия

Развитие биомедицинских технологий расширило возможности восстановления тканей челюстно-лицевой области за пределы, доступные при использовании классических методов хирургии и ортопедии. Если ранее регенерация костной ткани была достижима преимущественно за счет аутогенной трансплантации с сопутствующей травматизацией донорской зоны и ограниченным объемом забираемого материала, то современные подходы предлагают альтернативы, основанные на использовании факторов роста, клеточных технологий и биосовместимых матриц. Модель направленной тканевой регенерации предполагает создание пространства для миграции остеогенных клеток с одновременным обеспечением их трофическими факторами, что достигается применением мембран, структурированных костнопластических материалов и обогащенных тромбобитами аутологичных препаратов.

Препараты, получаемые из аутологичной крови пациента путем дифференцированного центрифугирования, содержат концентрацию тромбоцитов, в несколько раз превышающую физиологическую, и служат источником факторов роста, стимулирующих ангиогенез и пролиферацию остеобластов. Фибриновые матрицы, обогащенные тромбоцитами, обладают достоинством по сравнению с синтетическими мембранами благодаря полной биосовместимости, отсутствию риска иммунного ответа и способности к постепенной резорбции с замещением собственной тканью. Применение таких препаратов в хирургической стоматологии позволяет уменьшить сроки заживления после удаления зубов, повысить эффективность синус-лифтинга при недостаточной высоте костной ткани верхней челюсти, улучшить исходы операций по закрытию перфораций верхнечелюстной пазухи.

Клеточные технологии представляют собой следующую ступень развития регенеративной медицины в стоматологии. Мезенхимальные стромальные клетки, получаемые из костного мозга, жировой ткани или пульпы временных зубов, способны к дифференцировке в остеогенном направлении и модуляции воспалительного ответа в зоне имплантации. Клинические исследования показывают, что применение клеточных конструкций в сочетании с костнопластическими материалами позволяет достичь восстановления костной ткани в объемах, сопоставимых с аутогенной трансплантацией, при меньшей травматичности процедуры [4], [15]. В области эндодонтии развитие методов реваскуляризации пульпарного пространства у пациентов с несформированными корнями зубов открыло возможность сохранения витальной функции зуба в ситуациях, ранее считавшихся показанием к его удалению (таблица 2).

Таблица 2. Оценка методов регенерации костной ткани в стоматологии

Метод	Источник материала	Биологический механизм	Ограничения	Клиническая эффективность (средний прирост костной ткани), мм
Аутогенная трансплантация	Собственная ткань пациента (подбородочная область, ветвь нижней челюсти)	Остеогенез	Дополнительное оперативное вмешательство	4,5
		Остеоиндукция	Ограниченный объем Резорбция до 30%	
Ксеногенные материалы с мембраной	Биоматериалы животного происхождения	Остеокондукция (пассивный каркас)	Отсутствие собственных факторов роста	3,25
			Длительный период интеграции	
Препараты аутологичных тромбоцитов	Венозная кровь пациента	Остеоиндукция (факторы роста)	Не создает опорной структуры	2,3
			Эффективен только в комбинации с носителем	
Клеточно-инженерные конструкции	Мезенхимальные стромальные клетки + матрикс	Остеогенез	Сложность регламентации	4,25
		Остеоиндукция	Высокая стоимость	
		Иммуномодуляция	Нормативные ограничения	

Источник: разработано авторами.

Аутогенная трансплантация сохраняет статус «золотого стандарта» благодаря сочетанию всех трех механизмов остеогенеза, однако сопряжена с дополнительной травматизацией и ограниченностью ресурса. Ксеногенные материалы уступают по эффективности, но их применение оправдано в ситуациях, когда не требуется значительного объема восстановления. Препараты аутологических тромбоцитов не являются самостоятельным методом, но усиливают эффект других материалов за счет доставки факторов роста. Клеточные технологии показывают эффективность, сопоставимую с аутогенной трансплантацией, тем не менее, их широкое внедрение сдерживается сложностью нормативного регулирования и необходимостью создания лабораторных подразделений.

Разработка биосовместимых материалов нового поколения направлена на создание конструкций, которые не только замещают утраченные ткани, но и активно участвуют в процессах репарации. Антибактериальные свойства материалов достигаются включением наночастиц металлов, обладающих олигодинамическим действием, или иммобилизацией антимикробных пептидов на поверхности имплантатов. Биоактивная керамика на основе гидроксиапатита и трикальций-фосфата вступает в ионный обмен с тканевой жидкостью, обеспечивая локальное насыщение кальцием и фосфором, что стимулирует образование кристаллов гидроксиапатита на поверхности материала и его интеграцию с костной тканью. В терапевтической стоматологии композиционные материалы с эффектом реминерализации способствуют восстановлению эмали в зонах начального кариозного поражения, что расширяет показания к применению неинвазивных методов лечения.

Стоматология в контексте соматического здоровья

Взаимосвязь стоматологического и общего состояния организма в последние десятилетия стала предметом интенсивных клинических исследований, результаты которых изменили представление о стоматологии как о дисциплине. Установлено, что хронические воспалительные заболевания пародонта сопровождаются персистирующей бактериемией, источником которой служат пародонтальные карманы с площадью эпителиальной поверхности, сопоставимой с ладонной поверхностью кистей рук. Микроорганизмы, колонизирующие пародонтальные карманы, и продукты их жизнедеятельности поступают в кровоток, индуцируя продукцию провоспалительных цитокинов, включая интерлейкин-6, фактор некроза опухолей альфа и С-реактивный белок. Системное воспаление низкой интенсивности, поддерживаемое обозначенным механизмом, рассматривается как патогенетическое звено, связывающее пародонтит с кардиоваскулярной патологией, нарушениями углеводного обмена.

Связь между пародонтитом и сахарным диабетом второго типа носит двунаправленный характер. С одной стороны, декомпенсация углеводного обмена утяжеляет течение пародонтита за счет нарушения микроциркуляции, снижения фагоцитарной активности нейтрофилов и накопления конечных продуктов гликирования в тканях пародонта. С другой стороны, эффективное лечение пародонтита у пациентов с диабетом приводит к снижению уровня гликированного гемоглобина в среднем на 0,5–0,8%. Соответственно, стоматологическое лечение у пациентов с диабетом должно планироваться с учетом уровня компенсации заболевания, а достижение стойкой ремиссии пародонтита вносит вклад в контроль гликемии.

Аналогичные взаимосвязи прослеживаются в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования отражают, что наличие тяжелого пародонтита ассоциировано с повышением риска развития инфаркта миокарда в 1,5–2,0 раза после поправки на традиционные факторы риска. Механизмы этой ассоциации включают воздействие пародонтопатогенных микроорганизмов на эндотелий сосудов, опосредованное действие воспаления на стабильность атеросклеротической бляшки, а также перекрестные иммунные реакции между антигенами бактерий и собственными структурами сосудистой стенки [5], [8]. С позиций клинической практики это означает, что пациенты с пародонтитом высокой степени тяжести должны рассматриваться как группа повышенного кардиоваскулярного риска и нуждаются в соответствующем скрининге.

Особую категорию составляют пациенты, получающие антирезорбтивную терапию по поводу остеопороза или злокачественных новообразований с метастазами в костную ткань. Бисфосфонаты и деносумаб, эффективно снижая риск патологических переломов, создают условия для развития медикаментозного остеонекроза челюстей, частота которого при стоматологических вмешательствах может достигать значимых величин. Правовое и клиническое значение этого осложнения определяется его резистентностью к лечению, тяжелым течением и необходимостью изменения тактики стоматологической помощи: перед началом антирезорбтивной терапии требуется санация полости

рта, а в процессе лечения предпочтение отдается консервативным методам и минимально травматичным хирургическим вмешательствам.

Основные пути взаимовлияния стоматологического статуса и соматической патологии:

1. Гематогенная диссеминация микроорганизмов из очагов одонтогенной инфекции (периапикальные очаги, пародонтальные карманы) в кровоток с последующей колонизацией эндотелия сосудов и формированием очагов вторичного воспаления.

2. Воспаление, индуцированное постоянным поступлением провоспалительных медиаторов из зоны воспаления в пародонте, что поддерживает хроническое воспаление низкой интенсивности и способствует, в частности, прогрессированию атеросклероза, инсулинорезистентности.

3. Влияние соматической патологии на течение стоматологических заболеваний посредством механизмов, включающих нарушение микроциркуляции (диабет, артериальная гипертензия), изменения иммунного ответа (онкологические заболевания, терапия иммуносупрессантами) и воздействия лекарственных препаратов на ткани полости рта (антирезорбтивная терапия, антикоагулянты).

Психоневрологические аспекты стоматологической помощи также требуют междисциплинарного подхода. Бруксизм (состояние, характеризующееся непроизвольным сжатием челюстей и скрежетанием зубами) имеет сложную этиологию, в которой переплетаются центральные механизмы регуляции жевательной мускулатуры, психоэмоциональное состояние пациента и периферические факторы окклюзионного дисбаланса. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, часто сопутствующая бруксизму, проявляется болевым синдромом, ограничением открывания рта и шумовыми феноменами, что уменьшает качество жизни пациентов и требует участия не только стоматолога, но и невролога, а в ряде случаев психотерапевта. Эффективность лечения подобных состояний возрастает при использовании комплексных протоколов, включающих окклюзионную коррекцию, миорелаксирующие мероприятия, когнитивно-поведенческую терапию и, при необходимости, фармакологическую поддержку.

Персонализированная фармакотерапия и антимикробная резистентность

Индивидуализация фармакотерапии в стоматологии базируется на учете генетически детерминированных особенностей метаболизма лекарственных средств, которые определяют как эффективность, так и безопасность лечения. Наиболее значимым с клинической точки зрения является полиморфизм генов, кодирующих изоферменты цитохрома P450, участвующих в биотрансформации анестетиков, анальгетиков и антибиотиков. Метаболизм артикаина, наиболее широко применяемого в стоматологии местного анестетика, осуществляется преимущественно через гидролиз псевдохоллинэстеразой сыворотки крови, и его продолжительность коррелирует с активностью данного фермента. У пациентов с наследственным дефицитом псевдохоллинэстеразы продолжительность анестезии может превышать ожидаемую в несколько раз, что создает риск задержки восстановления чувствительности и связанных с этим осложнений. Индивидуальные различия в метаболизме нестероидных противовоспалительных средств также значимы: у медленных метаболизаторов риск гастроинтестинального действия выше, а у быстрых анальгетический эффект может быть недостаточным при стандартных дозировках.

Выбор антибактериальных препаратов в стоматологической практике подразумевает совершенствование в условиях повышения антимикробной резистентности. Многочисленная практика эмпирического назначения антибиотиков при хирургических вмешательствах без учета микробиологического пейзажа и индивидуальных особенностей пациента привела к формированию резистентных штаммов микроорганизмов, в том числе среди представителей нормальной микрофлоры полости рта. Информация микробиологического мониторинга свидетельствует о росте устойчивости стрептококков и анаэробных микроорганизмов к амоксициллину, клавуланату и клиндамицину – препаратам, традиционно используемым в стоматологии.

Альтернативные подходы к контролю микробной инфекции приобретают особое значение в условиях увеличения резистентности. Фотодинамическая терапия основана на применении фотосенсибилизатора, который накапливается в микробных клетках, и последующем облучении светом с определенной длиной волны, что приводит к генерации активных форм кислорода и гибели микроорганизмов. Этот метод показал эффективность в отношении биопленок, в том числе мультирезистентных штаммов, и может применяться в пародонтологии для санации пародонтальных карманов, а также в эндодонтии для дезинфекции корневых каналов. Бактериофаги (вирусы, избирательно лизирующие бактериальные клетки) представляют собой еще одно

направление, тем не менее, их широкое внедрение ограничено необходимостью подбора фага под конкретный штамм возбудителя и отсутствием зарегистрированных на территории Российской Федерации фаговых препаратов для стоматологических показаний. Пробиотическая коррекция орального микробиома направлена на восстановление баланса между представителями нормальной микрофлоры за счет колонизации полости рта штаммами, обладающими антагонистической активностью в отношении патогенов, что может уменьшать потребность в антибактериальных препаратах при хронических воспалительных заболеваниях пародонта.

Выводы

Современная стоматология преодолела рамки дисциплины, ограничивавшейся лечением заболеваний зубов и полости рта, и заняла положение области медицины, интегрирующей достижения фундаментальных наук, цифровых технологий и клинических специальностей. Трансформация, происходящая в настоящее время, и затрагивает не только методы диагностики и лечения, но и организационные принципы оказания помощи, а также подходы к оценке ее качества и безопасности.

Формирование единых цифровых сред, объединяющих топографические, оптические и функциональные исследования, позволило снизить вариабельность результатов, зависящую от субъективного фактора, и повысить предсказуемость исходов хирургических, ортопедических и ортодонтических вмешательств. Применение методов искусственного интеллекта на этапе обработки диагностических изображений открывает возможности для раннего выявления патологических изменений, в том числе имеющих системное значение, что расширяет профилактический потенциал стоматологической помощи.

Использование аутологичных факторов роста, клеточных технологий и биосовместимых материалов позволяет восстанавливать костную ткань в объемах, ранее достижимых лишь путем аутогенной трансплантации, и создает предпосылки для разработки методов биологической реставрации зубов. Внедрение этих технологий, однако, предполагает совершенствование нормативной базы, поскольку многие из них не в полной мере интегрированы в клинические рекомендации и стандарты оказания помощи.

Хронические воспалительные процессы в пародонте рассматриваются в настоящее время как детерминанты, поддерживающие системное воспаление и влияющие на течение сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других соматических патологий. Данное обстоятельство требует перехода к интегративной модели ведения пациентов, предполагающей взаимодействие стоматологов с терапевтами, эндокринологами, кардиологами и онкологами на этапах диагностики, планирования лечения и последующего наблюдения.

Дальнейшее развитие стоматологии будет определяться тремя основными векторами, каждый из которых связан с углублением процессов, обозначенных в настоящем исследовании.

Наиболее амбициозным направлением исследований является создание биологического эквивалента зуба, способного к интеграции в зубной ряд и функциональному замещению утраченной единицы. Экспериментальные работы на животных обуславливают возможность рекапитуляции одонтогенеза путем трансплантации клеточных агрегатов, полученных из эпителиальных и мезенхимальных предшественников, в подготовленное костное ложе. Одновременно с этим будут совершенствоваться методы регенерации пародонта, направленные на восстановление не только костной ткани, но и периодонтальной связки с цементом корня.

Идентификация генетических маркеров, ассоциированных с повышенным риском развития агрессивных форм пародонтита, нарушений заживления после имплантации, а также с особенностями метаболизма лекарственных средств, позволит формировать группы риска на этапе первичного обращения и индивидуализировать программы профилактики и лечения.

Современные системы навигации, основанные на предварительном планировании и использовании хирургических шаблонов, обеспечивают перенос виртуальной модели в операционное поле, но сохраняют ограничения, связанные с невозможностью оперативной коррекции плана при изменении анатомической ситуации. Интеграция технологий дополненной реальности, при которой трехмерная модель анатомических структур и запланированных вмешательств проецируется непосредственно на операционное поле через очки или дисплей микроскопа, даст возможность хирургу получать актуальную информацию о положении инструментов относительно критических анатомических структур в реальном времени. Дальнейшее развитие получит также применение роботизированных систем, позиционирующих инструменты с точностью, превышающей возможности человеческой моторики,

что значимо при работе в зонах с минимальными допустимыми расстояниями до анатомических образований.

Литература

1. Куровский С. В., Мишин Д.А., Ванин Э.П., Бурдик В., Куровская М.А. Современные способы преподавания дисциплин для студентов стоматологического факультета // Современное педагогическое образование. – 2024. – № 7. – С. 136–142.
2. Куровский С. В., Соснин Д.А., Мишин Д.А. Ключевые проблемы развития системы здравоохранения: макроэкономический анализ // Финансовые рынки и банки. – 2023. – № 9. – С. 87–94.
3. Куровский С. В., Соснин Д.А., Шевчук Н.И. Макроэкономический анализ состояния системы здравоохранения на уровне федеральных округов Российской Федерации // Финансовые рынки и банки. – 2023. – № 8. – С. 84–92.
4. Юсупов Р. Д., Рубинина Э.Р., Азаряев И.В., Алои Т.Г., Никацаев Ш.С. Профилактика и восстановление зубного ряда с использованием 3D-технологии в современной стоматологии // Современные вопросы биомедицины. – 2025. – Т. 9. – № 4. – С. 229–236.
5. Куровский С. В., Мишин Д.А., Ванин Э.П., Бурдик В., Куровская М.А. Особенности стоматологического лечения и выявления кариееса у детей // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2024. – № 4. – С. 65–71.
6. Куровский С. В., Мишин Д.А., Ванин Э.П., Бурдик В., Куровская М.А. Методика оценки удовлетворенности потребителей оказываемой стоматологической помощью // Экономика и предпринимательство. – 2024. – № 10 (171). – С. 1454–1461.
7. Дьяченко В. Г., Садко Н.В. Инновационные технологии, которые изменят будущее стоматологии Дальнего Востока России // Дальневосточный медицинский журнал. – 2023. – № 1. – С. 114–126.
8. Куровский С. В., Мишин Д.А., Ванин Э.П., Бурдик В., Козлова О.Л. Использование цифровых инноваций в стоматологических клиниках // Инновации и инвестиции. – 2024. – № 7. – С. 166–170.
9. Кривенко А. Н., Гришин Д.В., Буткова Т.В., Андреюк Д.С., Кайшева А.Л. Перспективы развития секторов рынка отечественной биомедицинской продукции // Государственное управление. Электронный вестник. – 2020. – № 79. – С. 105–134.
10. Куровский С. В., Мишин Д.А., Ванин Э.П. Обоснование эффективности методики последипломного образования врачей-стоматологов // Современное профессиональное образование. – 2025. – № 7. – С. 107–112.
11. Куровский С. В., Мишин Д.А., Ванин Э.П. Подход к изучению процессов полной реставрации зубов // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2025. – № 4. – С. 139–145.
12. Гостев М. С., Тарасенко С.В., Казумян С.В., Дьячкова Е.Ю., Усанова А.П., Файзуллин А.Л., ... Садчикова Е.Р. Экспериментальное обоснование применения биорезорбируемых персонализированных коллагеновых мембран для закрытия дефектов слизистой оболочки рта // Проблемы стоматологии. – 2023. – Т. 19. – № 4. – С. 77–82.
13. Куровский С. В., Мишин Д.А., Ванин Э.П. Модель наблюдательной диагностики за пациентами стоматологии с использованием искусственного интеллекта // Мягкие измерения и вычисления. – 2025. – Т. 95. – № 10. – С. 32–45.
14. Куровский С. В., Мишин Д.А., Ванин Э.П. Алгоритм математического моделирования зубного протезирования // Мягкие измерения и вычисления. – 2025. – Т. 94. – № 9. – С. 114–124.
15. Тарба И.И. Замещение костных дефектов посредством персонализированной тканеинженерной конструкции in vivo // Пародонтология. – 2023. – Т. 28. – № 1. – С. 49–54.

DENTISTRY AS A SPACE FOR DIGITAL TRANSFORMATION AND PERSONALIZED REGENERATION

Kurovsky S.V., Mishin D.A., Andguladze G.R.

LLC "Higher School of Education", Saint Petersburg State Pediatric Medical University

The current model of dental care delivery is in conflict with the accumulated data on the pathophysiological relationships between oral diseases and systemic pathological processes. The high prevalence of comorbid pathology, in which dental diseases are combined with diabetes mellitus, cardiovascular diseases and other chronic non-communicable conditions, suggests a revision of approaches to diagnosis, treatment and organization of medical care. The aim of the work is to analyze current trends in the development of dentistry as a medical science and to evaluate the effectiveness of the implementation of innovative technologies that determine the transition to an integrative and personalized model of care. The research methods include the analysis and synthesis of scientific literature, systematization of approaches to treatment personalization, and a comparative analysis of the effectiveness of various diagnostic and therapeutic methods. The main results of the scientific study: a comparative description of traditional and digital diagnostic processes in dentistry is provided; an assessment of the effectiveness of bone tissue regeneration

methods is performed, highlighting the biological mechanisms and clinical limitations of each approach; the factors determining the choice of antibacterial therapy in dentistry are systematized; The need for a transition to an integrative model that takes into account the relationship between dental status and physical health is substantiated. The practical significance of the study lies in the fact that the obtained results can be used by dental healthcare organizations to improve diagnostic and treatment protocols, implement innovative technologies based on regulatory requirements, and optimize interdisciplinary collaboration between dental and physical departments when managing patients with comorbid pathology.

Keywords: integrative dentistry; digital transformation; precision diagnostics; tissue engineering; regenerative medicine; periodontitis; comorbidity; personalized pharmacotherapy; antimicrobial resistance; biomarkers.

References

1. Kurovsky S.V., Mishin D.A., Vanin E.P., Burdik V., Kurovskaya M.A. Modern methods of teaching disciplines for students of the Faculty of Dentistry // *Modern pedagogical education*. – 2024. – No. 7. – P. 136–142.
2. Kurovsky S.V., Sosnin D.A., Mishin D.A. Key problems of the development of the healthcare system: macroeconomic analysis // *Financial markets and banks*. – 2023. – No. 9. – P. 87–94.
3. Kurovsky S.V., Sosnin D.A., Shevchuk N.I. Macroeconomic analysis of the state of the healthcare system at the level of federal districts of the Russian Federation // *Financial markets and banks*. – 2023. – No. 8. – P. 84–92.
4. Yusupov R.D., Rubinina E.R., Azaryaev I.V., Aloï T.G., Nikatsaev Sh. S. Prevention and restoration of the dentition using 3D technology in modern dentistry // *Modern issues of biomedicine*. – 2025. – Vol. 9. – No. 4. – P. 229–236.
5. Kurovsky S.V., Mishin D.A., Vanin E.P., Burdik V., Kurovskaya M.A. Features of dental treatment and detection of caries in children // *Medicine. Sociology. Philosophy. Applied research*. – 2024. – No. 4. – P. 65–71.
6. Kurovsky S.V., Mishin D.A., Vanin E.P., Burdik V., Kurovskaya M.A. Methodology for Assessing Consumer Satisfaction with Dental Care Provided // *Economy and Entrepreneurship*. – 2024. – No. 10 (171). – P. 1454–1461.
7. Dyachenko V.G., Sadko N.V. Innovative Technologies That Will Change the Future of Dentistry in the Russian Far East // *Far Eastern Medical Journal*. – 2023. – No. 1. – P. 114–126.
8. Kurovsky S.V., Mishin D.A., Vanin E.P., Burdik V., Kozlova O.L. Use of Digital Innovations in Dental Clinics // *Innovations and Investments*. – 2024. – No. 7. – P. 166–170.
9. Krivenko A.N., Grishin D.V., Butkova T.V., Andreyuk D.S., Kaisheva A.L. Development Prospects of Domestic Biomedical Products Market Sectors // *Public Administration. Electronic Bulletin*. – 2020. – No. 79. – P. 105–134.
10. Kurovsky S.V., Mishin D.A., Vanin E.P. Justification of the Efficiency of the Methodology of Postgraduate Education of Dentists // *Modern Professional Education*. – 2025. – No. 7. – P. 107–112.
11. Kurovsky S.V., Mishin D.A., Vanin E.P. Approach to the Study of the Processes of Complete Dental Restoration // *Medicine. Sociology. Philosophy. Applied Research*. – 2025. – No. 4. – P. 139–145.
12. Gostev M.S., Tarasenko S.V., Kazumyan S.V., Dyachkova E. Yu., Usanova A.P., Fayzullin A.L., ... Sadchikova E.R. Experimental substantiation of the use of bioresorbable personalized collagen membranes for closure of defects of the oral mucosa // *Problems of Dentistry*. – 2023. – Vol. 19. – No. 4. – P. 77–82.
13. Kurovsky S.V., Mishin D.A., Vanin E.P. Model of observational diagnostics of dental patients using artificial intelligence // *Soft measurements and calculations*. – 2025. – Vol. 95. – No. 10. – P. 32–45.
14. Kurovsky S.V., Mishin D.A., Vanin E.P. Algorithm for mathematical modeling of dental prosthetics // *Soft measurements and calculations*. – 2025. – Vol. 94. – No. 9. – P. 114–124.
15. Tarba I.I. Replacement of bone defects by means of a personalized tissue-engineered construct in vivo // *Periodontology*. – 2023. – Vol. 28. – No. 1. – P. 49–54.

Магомедова Умийат Абдулбасировна,

старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
E-mail: m.umijat@yandex.ru

Сулейманова Раиса Герейхановна,

к.м.н., доцент, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
E-mail: suleimanova.r.g@mail.ru

Магомедов Магомед Мусаевич,

студент, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
E-mail: m.umijat@yandex.ru

Арсланкадиева Мадина Мухтаровна,

студент, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
E-mail: m.mukhtarovna@mail.ru

Даудов Шамиль Мурадович,

студент, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
E-mail: shaminoya@gmail.com

Статья посвящена систематизации экологических факторов риска для здоровья населения, проживающего в условиях аграрного региона, на примере Республики Дагестан. Предмет исследования – совокупное воздействие агрохимического загрязнения, дефицита качественного питьевого водоснабжения, почвенной деградации и аэрогенной нагрузки на заболеваемость и смертность сельского населения. Эмпирическую базу составили государственные доклады Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан за 2018–2023 годы, данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РД, а также ретроспективный анализ 340 амбулаторных карт пациентов сельских районов, поступивших с профессионально-обусловленной или экологически детерминированной патологией. Показано, что в сельских аграрных районах республики заболеваемость злокачественными новообразованиями превышает среднереспубликанский показатель на 14,7–22,3%, заболеваемость органов дыхания у детей до 14 лет в наиболее «пестицидоёмких» районах – на 31,8%, число случаев репродуктивных нарушений у женщин-работниц АПК – на 18,4%. Выделены четыре группы факторов риска: химические (пестициды, нитраты, тяжёлые металлы), водный (загрязнение источников питьевого водоснабжения), физический (аэрогенная пылевая нагрузка), социально-поведенческий (низкая осведомлённость, отсутствие средств индивидуальной защиты). Предложена авторская иерархическая модель управления экологическими рисками для здоровья в аграрном регионе.

Ключевые слова: экологические факторы риска, аграрный регион, здоровье населения, пестициды, питьевая вода, загрязнение почвы, репродуктивное здоровье, Республика Дагестан, профессиональная патология, медицинская экология.

Введение

Республика Дагестан – один из крупнейших аграрных регионов Российской Федерации. Более половины населения республики проживает в сельской местности; виноградарство, садоводство, производство зерновых, овощеводство и развитое животноводство формируют базовый уклад экономики значительной части районов. Доля сельскохозяйственных угодий в общей площади республики составляет около 37%, причём в ряде равнинных и предгорных районов – Хасавюртовском, Бабаюртовском, Кизлярском, Дербентском – практически всё трудоспособное население так или иначе занято в агропромышленном производстве.

Аграрный характер региона обуславливает специфический профиль экологической нагрузки. В отличие от промышленных городов, где доминируют выбросы предприятий металлургии и химической промышленности, в сельскохозяйственных районах ключевыми источниками загрязнения выступают агрохимикаты, ирригационные системы, ветровая эрозия обработанных полей и накопленные отходы животноводства. Эта нагрузка распределяется крайне неравномерно, поглощается в основном самим же населением, вовлечённым в сельскохозяйственный труд, и при этом систематически недооценивается как с точки зрения медицинского мониторинга, так и с точки зрения санитарно-эпидемиологического надзора.

Проблема усугубляется социальными факторами. Сельское население Дагестана, особенно в горных и предгорных районах, имеет ограниченный доступ к централизованному водоснабжению: по данным Роспотребнадзора по РД, в 2022 году доля сельских жителей, пользующихся водой из нецентрализованных источников, составляла около 31% [4]. Уровень медицинской грамотности в части оценки профессиональных и экологических рисков остаётся невысоким; использование средств индивидуальной защиты при работе с пестицидами носит эпизодический характер.

С позиций медицинской экологии [10] и социальной медицины данная проблема представляет собой классический случай множественного и долговременного воздействия, когда ни один отдельный фактор сам по себе не достигает острого токсического порога, но их совокупность формирует устойчивый фон хронической нагрузки на организм. Именно такой накопленный эффект, как правило, наиболее трудно выявить стандартными эпидемиологическими методами – и именно он является предметом настоящего исследования.

В научной литературе проблема экологически детерминированной заболеваемости сельского населения рассматривается преимущественно в контексте либо санитарно-гигиенических стандартов [8; 9], либо токсикологии отдельных химических веществ [14; 18]. Комплексного исследования, включающего одновременно химические, водные, аэрогенные и социально-поведенческие факторы применительно к конкретному аграрному субъекту Российской Федерации с учётом данных регионального эпидемиологического мониторинга, в отечественной литературе обнаружить не удалось. Настоящая работа призвана восполнить этот пробел применительно к Республике Дагестан.

Цель исследования – выявить и систематизировать ведущие экологические факторы риска для здоровья населения в условиях аграрного региона и разработать иерархическую модель управления этими рисками на уровне регионального здравоохранения.

Задачи: провести ретроспективный анализ официальной статистики заболеваемости сельского населения РД за 2018–2023 годы; установить корреляции между агрохимической нагрузкой и показателями заболеваемости по основным классам болезней; описать социально-поведенческие факторы, усиливающие экологическую уязвимость аграрного населения; сформировать иерархическую модель управления рисками.

Научная новизна. Впервые для Республики Дагестан проведён многофакторный анализ экологической нагрузки на здоровье сельского населения с выделением четырёх групп риска и количественным сопоставлением показателей заболеваемости в «пестицидоёмких» и «условно чистых» районах. Разработана авторская иерархическая модель управления экологическими рисками для здоровья в аграрном регионе, пригодная для адаптации к другим аграрным субъектам РФ со схожей структурой землепользования.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось с 2021 по 2024 год. Эмпирическая база включает три компонента. Проанализированы государственные до-

клады Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения» за 2018–2023 годы [4]; сведения Дагестанстата об уровне заболеваемости населения по нозологическим группам в разрезе городских и сельских территорий; материалы государственного доклада Министерства природных ресурсов РФ о состоянии окружающей среды [3]. Данные охватывают 41 муниципальный район и 10 городских округов республики; для целей настоящего исследования из них отобраны 18 районов с выраженной аграрной специализацией (доля сельскохозяйственной занятости населения более 55%).

Изучены 340 амбулаторных карт пациентов (средний возраст 42,7 ± 11,3 года; 54% женщины) из шести сельских центральных районных больниц и участковых больниц республики, поступивших за 2019–2023 годы с диагнозами, относящимися к классам «болезни органов дыхания», «злокачественные новообразования», «болезни нервной системы», «болезни репродуктивной сферы». Дополнительно проанализированы 60 карт работников АПК с профессионально обусловленной патологией, верифицированной профпатологической службой Республики Дагестан. Отбор документов осуществлялся по методу целенаправленной выборки с соблюдением критериев включения: постоянное проживание в сельской местности не менее 10 лет, основной источник дохода – занятость в сельском хозяйстве или проживание в домохозяйстве, занятом в АПК. Применялись: санитарно-гигиенический метод (оценка показателей загрязнения объектов окружающей среды по данным лабораторного мониторинга Роспотребнадзора); эпидемиологический метод (расчёт относительных рисков и показателей заболеваемости на 100 тыс. населения по районам); сравнительный анализ «экспонированных» и «условно контрольных» территорий; качественный анализ нормативной документации. Статистическая обработка выполнялась в пакете SPSS Statistics 26.0: применялась описательная статистика, критерий χ^2 для сравнения долей, коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Значимость различий принималась при $p < 0,05$.

Необходимо оговорить методологическое ограничение: ретроспективный дизайн и использование данных из официальных статистических источников не позволяют в полной мере контролировать все смешивающие переменные – в частности, социально-экономический статус, пищевое поведение и наследственную предрасположенность. Полученные корреляции следует интерпретировать как гипотезообразующие, не претендующие на доказательство прямой причинно-следственной связи.

Результаты и обсуждение

Применение пестицидов и минеральных удобрений в сельскохозяйственных районах Дагестана носит интенсивный характер. По данным Роспотребнадзора по РД, в 2022 году объём используемых пестицидов в расчёте на единицу сельскохозяйственных угодий в Дербентском, Кизлярском и Магарамкентском районах превысил среднероссийский показатель в 1,8–2,3 раза [4]. Виноградарство, являющееся одной из ключевых отраслей агропромышленного комплекса республики, сопряжено с многократной обработкой насаждений фунгицидами (прежде всего медьсодержащими препаратами и системными фунгицидами группы стробилуринов) и инсектицидами – на протяжении сезона, с апреля по октябрь, обработки проводятся с периодичностью 7–14 дней.

Систематическое превышение допустимых уровней содержания пестицидов в почве сельскохозяйственных угодий зафиксировано лабораториями Роспотребнадзора в 34,2% проверенных образцов почвы равнинных районов в 2021–2022 годах. Концентрации нитратов в грунтовых водах в ряде районов с интенсивным применением азотных удобрений превышали нормативный показатель (45 мг/л по СанПиН) в 2,1–3,7 раза [4]. Содержание тяжёлых металлов – свинца, кадмия, цинка – в почвах вблизи мест хранения и смешивания пестицидов фиксировалось выше предельно допустимых концентраций в 18,6% случаев.

Сопоставление показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями в «пестицидоёмких» районах (Дербентский, Магарамкентский, Кизлярский, Хасавюртовский) со среднереспубликанским уровнем выявило превышение на 14,7–22,3% ($p = 0,038$). Наиболее значимые различия зафиксированы по раку желудка и раку лёгкого – нозологическим формам, для которых в литературе показана связь с длительным воздействием хлорорганических соединений и тяжёлых металлов [14; 17]. Следует, однако, подчеркнуть, что данная корреляция не может расцениваться как доказательство этиологической роли пестицидов: она требует верификации в проспективном когортном исследовании с контролем конфаундеров.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с детьми. В районах с наибольшей агрохимической нагрузкой заболеваемость органов дыхания у детей до 14 лет в 2020–2022 годах была выше, чем в услов-

но «чистых» горных районах (Тляратинский, Цунтинский, Ахтынский), в среднем на 31,8% ($\chi^2(1) = 9,4$; $p = 0,002$). Этот результат согласуется с данными о раздражающем действии паров пестицидов на бронхиальное дерево у детей дошкольного возраста, описанном в работах Зайцевой Н.В. с соавторами [17].

Водный фактор применительно к аграрным районам Дагестана имеет двоякую природу. С одной стороны, значительная часть сельского населения – особенно в горных районах – использует децентрализованные источники: родники, колодцы, малые реки. По данным ежегодных докладов Роспотребнадзора, доля нестандартных проб воды из нецентрализованных источников в сельских районах республики в 2021–2023 годах стабильно составляла от 21 до 28% – прежде всего по микробиологическим показателям и содержанию нитратов [4]. С другой стороны, централизованные системы водоснабжения в ряде равнинных районов испытывают загрязнение из поверхностных водных источников, принимающих дренажный сток с орошаемых полей.

Анализ карт 340 пациентов из сельских районов показал, что среди жителей, пользовавшихся исключительно нецентрализованными источниками водоснабжения ($n = 147$; 43,2% выборки), доля лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта составила 38,1%, тогда как среди пользователей централизованного водопровода – 24,7% ($\chi^2(1) = 7,6$; $p = 0,006$). Это не доказывает причинности, но указывает на статистически значимую ассоциацию.

Особо следует выделить проблему нитратной нагрузки. Хроническое воздействие повышенных концентраций нитратов в питьевой воде хорошо изучено в отечественной гигиенической литературе: описаны их роль в индукции метгемоглобинемии у детей грудного возраста [8], канцерогенный потенциал N-нитрозосоединений, образующихся в желудочно-кишечном тракте [9; 10], а также антигипертензивный эффект при длительном воздействии. Последний представляется особенно значимым для женщин репродуктивного возраста. Данные Дагестанстата свидетельствуют об устойчивом росте заболеваемости узловым зобом в равнинных районах республики в 2018–2022 годах (+17,3% к базовому году) – тенденция, заслуживающая отдельного углублённого изучения с учётом как дефицита йода, так и вероятного антигипертензивного воздействия нитратов.

Физический компонент экологического риска в аграрных районах связан прежде всего с мелкодисперсной пылью, образующейся при обработке и уборке полей, а также при сгорании растительных остатков. В Дагестане сезонное сжигание пожнивных остатков остаётся широко распространённой практикой, несмотря на формальный запрет – по данным МЧС по РД, ежегодно фиксируется несколько сотен случаев несанкционированных палов на сельскохозяйственных угодьях. Продукты неполного сгорания растительной биомассы содержат полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), диоксины и взвешенные частицы PM2.5 – вещества с доказанным токсическим и мутагенным потенциалом [6; 7].

Пылевая нагрузка при механизированной уборке зерновых достигает, по данным инструментальных измерений Роспотребнадзора, 8–12 мг/м³ – при нормативе ПДК р.з. (рабочей зоны) для растительной пыли 4 мг/м³, то есть превышение составляет 2–3 ПДК. Операторы уборочной техники, как правило, не использующие респираторы, подвергаются этому воздействию 8–10 часов в сутки в период уборки урожая. Это классическая ситуация высокого профессионального риска, описанного Измеровым Н.Ф. и Денисовым Э.И. [6] как системная проблема российского АПК.

Анализ медицинской документации 60 работников АПК с верифицированной профессиональной патологией выявил следующее распределение нозологий: хронический пылевой бронхит – 41,7%; аллергический ринит и бронхиальная астма профессионального генеза – 23,3%; хронические заболевания нервной системы (в том числе периферические нейропатии, ассоциированные с воздействием пестицидов) – 18,3%; прочие (кожные заболевания, воздействие гербицидов на систему кроветворения) – 16,7%. Полученное распределение в целом согласуется с данными литературы по профессиональной патологии в АПК [6; 14], однако доля нейропатий несколько выше, чем в среднероссийских данных, что может отражать специфику применяемых в регионе фосфорорганических препаратов.

Отдельного рассмотрения заслуживает группа женщин, занятых в сельскохозяйственном производстве. В дагестанском АПК женский труд преобладает в виноградарстве (ручной сбор урожая), тепличном овощеводстве и переработке. Женщины нередко работают непосредственно после обработки насаждений пестицидами, особенно в малых фермерских хозяйствах, где соблюдение санитарных регламентов не контролируется.

Анализ медицинской документации женщин-работниц АПК из выборки ($n = 183$; 53,8%) показал, что доля репродуктивных нарушений

(нарушения менструального цикла, невынашивание беременности, патология щитовидной железы) у женщин репродуктивного возраста из «пестицидоёмких» районов на 18,4% выше, чем в контрольных районах с минимальной агрохимической нагрузкой ($p = 0,019$). Данный показатель согласуется с результатами Щеплягиной Л.А. и Курмачёвой Н.А. [15], выявивших устойчивую связь между экологическим неблагополучием сельской местности и нарушениями репродуктивного здоровья женщин.

Особую озабоченность вызывает феномен «молчаливой экспозиции»: значительная часть женщин, вовлечённых в сельскохозяйственный труд, не связывает собственные проблемы со здоровьем с воздействием агрохимикатов и не сообщает об этом лечащему врачу. Это отражает системный разрыв между медицинской осведомлённостью и реальной экологической ситуацией в аграрных сообществах – разрыв, устранение которого требует не только медицинских, но и образовательных, социальных, а в определённом смысле и философских усилий по переосмыслению ценности здоровья как общественного блага [1; 5].

В системе экологических рисков аграрного региона социально-поведенческий фактор занимает особое место – не как самостоятельный источник загрязнения, но как модификатор, существенно усиливающий воздействие всех остальных. Его основные составляющие, выявленные в ходе исследования, таковы.

Первое – низкий уровень санитарно-гигиенической грамотности в части оценки профессиональных рисков. Работники, опрошенные в рамках исследования ($n = 82$, неформализованное интервью), в 64,6% случаев не могли назвать ни одного заболевания, связанного с воздействием применяемых ими пестицидов. Это не является исключительной проблемой Дагестана – аналогичные данные приводятся Потаповым А.И. и Ракитским В.Н. [18] для ряда других аграрных регионов России.

Второе – практически полное отсутствие использования средств индивидуальной защиты при работе с агрохимикатами. Среди 82 опрошенных работников АПК только 11 (13,4%) регулярно использовали хотя бы один вид СИЗ (перчатки, маску или комбинезон) при работе с пестицидами. Это положение принципиально не изменилось по сравнению с данными более ранних исследований [6], несмотря на общие тенденции к цифровизации агропромышленного комплекса.

Третье – высокая доля самолечения с использованием лекарственных растений и народных средств. В горных районах этот феномен носит выраженный характер и нередко задерживает обращение за профессиональной медицинской помощью на месяцы и даже годы. Социологическая подоплёка данного явления достаточно хорошо описана в литературе [2; 8; 11]: речь идёт о сочетании традиционных ценностей, экономической доступности народных средств и недоверия к системе здравоохранения.

На основании проведённого анализа предлагается авторская иерархическая модель управления экологическими рисками для здоровья населения аграрного региона, включающая четыре уровня.

Уровень 1 – нормирование и мониторинг (федеральный и региональный уровень): формирование регионального реестра применяемых агрохимикатов; обязательный лабораторный мониторинг почвы, воды и атмосферного воздуха в сельских районах с интенсивным сельскохозяйственным производством (не менее двух раз в год); ведение регионального канцер-регистра с привязкой к территориям с повышенной агрохимической нагрузкой.

Уровень 2 – профессиональная защита (работодатели, профпатологическая служба): обязательное обеспечение работников АПК средствами индивидуальной защиты; медицинские осмотры работников, занятых в «пестицидоёмких» производствах, с кратностью не реже одного раза в год; верификация профессиональной патологии на базе специализированного центра профпатологии.

Уровень 3 – санитарное просвещение (первичное звено здравоохранения, образовательные организации): разработка и внедрение программ санитарно-гигиенического просвещения для работников АПК; включение тематики агроэкологических рисков в программы медицинских вузов и средних специальных образовательных учреждений; взаимодействие с сельскими фельдшерскими, которые в аграрных районах нередко являются единственным доступным медицинским ресурсом.

Уровень 4 – модификация поведения и среды (муниципальный уровень, местные сообщества): расширение охвата централизованным водоснабжением сельских населённых пунктов; запрет и контроль над практикой сезонного сжигания пожнивных остатков с разработкой экономически доступных альтернатив; создание консультативных пунктов медицинской помощи при агрокластерах.

Предложенная модель не претендует на исчерпывающее решение; она носит прикладной характер и ориентирована на практических дея-

телей регионального здравоохранения, а не на декларативные обещания «улучшения экологической ситуации». Философский смысл четырёхуровневой иерархии состоит в признании того, что управление экологическими рисками – это не только технологическая, но и социальная, и образовательная задача, реализация которой требует переосмысления отношений между человеком, трудом и природной средой [5; 11].

Выводы

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы.

Во-первых, совокупная экологическая нагрузка в аграрных районах Республики Дагестан носит многофакторный характер и не может быть адекватно оценена через анализ какого-либо одного загрязнителя. Химический (пестициды, нитраты, тяжёлые металлы), водный, аэрогенный и социально-поведенческий факторы действуют совместно, усиливая друг друга и формируя суммарный риск, превышающий прогнозируемый при раздельном рассмотрении.

Наиболее значимой и статистически подтверждённой связью оказалась ассоциация между интенсивностью агрохимической нагрузки и уровнями заболеваемости злокачественными новообразованиями (+14,7–22,3%, $p = 0,038$), болезнями органов дыхания у детей (+31,8%, $p = 0,002$) и репродуктивными нарушениями у женщин АПК (+18,4%, $p = 0,019$). Все три ассоциации нуждаются в проспективной верификации, но уже сегодня достаточны для обоснования целевых профилактических мероприятий.

Социально-поведенческий фактор – прежде всего низкая санитарно-гигиеническая грамотность и пренебрежение средствами индивидуальной защиты – является обратимым и подлежащим направленной коррекции через систему первичного звена здравоохранения и санитарного просвещения.

Предложенная иерархическая модель управления рисками обеспечивает алгоритмизированный подход к проблеме на уровнях нормирования, профессиональной защиты, санитарного просвещения и модификации среды. Её практическая апробация в двух-трёх пилотных районах республики представляется перспективным направлением дальнейших исследований.

Ограничения работы: ретроспективный дизайн, невозможность полного контроля конфаундеров, локальный характер выборки. Перспективы: проведение проспективного когортного исследования на расширенной выборке с включением биохимических маркёров экспозиции (холинэстераза, тяжёлые металлы в крови, метаболиты пестицидов в моче) и с охватом соседних аграрных регионов Северного Кавказа.

Литература

1. Авалиани С.Л., Ревич Б.А., Захаров В.М. Мониторинг здоровья человека и здоровья среды (региональная экологическая политика). – М.: Центр экологической политики России, 2001. – 76 с.
2. Гичев Ю.П. Здоровье человека и окружающая среда: монография. – М.: Новый центр, 2007. – 208 с.
3. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2022 году». – М.: Минприроды России, 2023. – 686 с. – URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/ (дата обращения: 15.03.2024).
4. Государственный доклад Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Дагестан в 2022 году». – Махачкала: Управление Роспотребнадзора по РД, 2023. – 198 с.
5. Денисов Э.И. Философские и социальные аспекты охраны труда и здоровья населения // Медицина труда и промышленная экология. – 2018. – № 9. – С. 4–8.
6. Измеров Н.Ф., Денисов Э.И. Профессиональный риск для здоровья работников: руководство. – М.: Тривант, 2003. – 448 с.
7. Зайцева Н.В., Май И.В., Кирьянов Д.А. Методические подходы к оценке риска для здоровья населения при воздействии химических факторов среды // Анализ риска здоровью. – 2013. – № 1. – С. 15–23.
8. Магомедова У.А. Экология эрозии шейки матки женского населения сельской местности Республики Дагестан // Лечащий врач. – 2022. – № 3. – С. 94–98.
9. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Зиневич Л.С. Гигиена и основы экологии человека: учебник. – 2-е изд. – М.: Академия, 2008. – 528 с.
10. Онищенко Г.Г., Рахманин Ю.А., Румянцев Г.И. Состояние здоровья населения России в связи с факторами окружающей среды // Гигиена и санитария. – 2016. – Т. 95. – № 1. – С. 5–9.

11. Ревич Б.А., Авалиани С.Л., Тихонова Г.И. Экологическая эпидемиология: учебник для вузов. – М.: Академия, 2004. – 384 с.
12. Решетников А.В. Социология медицины: руководство. – М.: Медицина, 2002. – 976 с.
13. Рахманин Ю.А., Михайлова Р.И. Окружающая среда и здоровье: приоритеты профилактической медицины // Гигиена и санитария. – 2014. – Т. 93. – № 5. – С. 5–10.
14. Сидоренко Г.И., Кутепов Е.Н. Методология изучения состояния здоровья населения в зависимости от качества окружающей среды // Вестник РАМН. – 1994. – № 8. – С. 15–18.
15. Спиридонов А.М. Загрязнение агроэкосистем пестицидами и последствия для здоровья сельского населения // Гигиена и санитария. – 2020. – Т. 99. – № 8. – С. 782–787.
16. Щеплягина Л.А., Курмачёва Н.А. Репродуктивное здоровье женщин в экологически неблагоприятных районах России // Педиатрия. – 2019. – Т. 98. – № 5. – С. 56–63.
17. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [ред. от 25.12.2023] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 2. – Ст. 133.
18. Зайцева Н.В., Лужецкий К.П., Мазунина А.А. Вклад экологических факторов в формирование онкологической заболеваемости населения сельских территорий // Анализ риска здоровью. – 2022. – № 2. – С. 50–61.
19. Потапов А.И., Ракитский В.Н. Актуальные вопросы гигиены применения пестицидов в Российской Федерации // Гигиена и санитария. – 2016. – Т. 95. – № 2. – С. 101–105.

ECOLOGICAL RISK FACTORS FOR HUMAN HEALTH IN AN AGRICULTURAL REGION

Magomedova U.A., Suleymanova R.G., Magomedov M.M., Arslankadiyeva M.M., Daudov Sh.M.
Dagestan State Medical University

The article systematizes ecological risk factors for the health of the rural population living in an agricultural region, using the Republic of Dagestan as a case study. The subject is the combined impact of agrochemical pollution, deficit of quality drinking water supply, soil degradation and aerial dust load on morbidity and mortality of the rural population. The empirical base comprises annual state reports of the Rospotrebnadzor Department for the Republic of Dagestan for 2018–2023, data from the territorial statistical service, and a retrospective analysis of 340 outpatient records of patients from rural districts admitted with occupationally or ecologically determined pathology. It is shown that in rural agricultural districts, malignant neoplasm morbidity exceeds the regional average by 14.7–22.3%, respiratory morbidity in children under 14 in the most pesticide-intensive districts – by 31.8%, and reproductive disorders among women workers in the agro-industrial complex – by 18.4%. Four groups of risk factors are identified: chemical (pesticides, nitrates, heavy metals), water (contamination of drinking water sources), physical (aerial dust load), and socio-behavioural (low awareness, absence of personal protective equipment). An original hierarchical model for managing ecological health risks in an agricultural region is proposed.

Keywords: ecological risk factors, agricultural region, public health, pesticides, drinking water, soil contamination, reproductive health, Republic of Dagestan, occupational pathology, medical ecology.

References

1. Avaliani S.L., Revich B.A., Zakharov V.M. Monitoring of Human Health and Environmental Health (Regional Environmental Policy). – Moscow: Center for Environmental Policy of Russia, 2001. – 76 p.
2. Gichev Yu.P. Human Health and the Environment: Monograph. – Moscow: Novyi Tsentr, 2007. – 208 p.
3. State Report «On the State and Environmental Protection of the Russian Federation in 2022.» – Moscow: Ministry of Natural Resources of Russia, 2023. – 686 p. – URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/ (accessed: 15.03.2024).
4. State Report of the Office of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-Being in the Republic of Dagestan «On the State of Sanitary and Epidemiological Well-Being of the Population in the Republic of Dagestan in 2022.» – Makhachkala: Office of Rospotrebnadzor in the Republic of Dagestan, 2023. – 198 p.
5. Denisov E.I. Philosophical and Social Aspects of Occupational Safety and Public Health Protection. Occupational Medicine and Industrial Ecology. – 2018. – № 9. – pp. 4–8.
6. Izmerov N.F., Denisov E.I. Occupational Health Risk for Workers: Guide. – Moscow: Trovart, 2003. – 448 p.
7. Zaitseva N.V., Mai I.V., Kiryanov D.A. Methodological Approaches to Assessing Health Risk from Environmental Chemical Factors. Health Risk Analysis. – 2013. – № 1. – pp. 15–23.
8. Pivovarov Yu.P., Korolik V.V., Zinevich L.S. Hygiene and Fundamentals of Human Ecology: Textbook. – 2nd ed. – Moscow: Akademiya, 2008. – 528 p.
9. Onishchenko G.G., Rakhmanin Yu.A., Rummyantsev G.I. The Health Status of the Russian Population in Relation to Environmental Factors. Hygiene and Sanitation. – 2016. – Vol. 95. – № 1. – pp. 5–9.
10. Revich B.A., Avaliani S.L., Tikhonova G.I. Environmental Epidemiology: University Textbook. – Moscow: Akademiya, 2004. – 384 p.
11. Reshetnikov A.V. Sociology of Medicine: Guide. – Moscow: Meditsina, 2002. – 976 p.
12. Rakhmanin Yu.A., Mikhailova R.I. Environment and Health: Priorities of Preventive Medicine. Hygiene and Sanitation. – 2014. – Vol. 93. – № 5. – pp. 5–10.
13. Sidorenko G.I., Kutepov E.N. Methodology for Studying Population Health Depending on Environmental Quality. Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences. – 1994. – № 8. – pp. 15–18.
14. Spiridonov A.M. Pollution of Agroecosystems with Pesticides and Consequences for the Health of the Rural Population. Hygiene and Sanitation. – 2020. – Vol. 99. – № 8. – pp. 782–787.
15. Shcheplyagina L.A., Kurmacheva N.A. Reproductive Health of Women in Environmentally Unfavorable Regions of Russia. Pediatrics. – 2019. – Vol. 98. – № 5. – pp. 56–63.
16. Federal Law dated January 10, 2002 № 7-FZ «On Environmental Protection» [as amended on December 25, 2023]. Collection of Legislation of the Russian Federation. – 2002. – № 2. – Art. 133.
17. Zaitseva N.V., Luzhetskyy K.P., Mazunina A.A. Contribution of Environmental Factors to the Formation of Oncological Morbidity in Rural Populations. Health Risk Analysis. – 2022. – № 2. – pp. 50–61.
18. Potapov A.I., Rakitsky V.N. Current Issues of Hygiene in the Use of Pesticides in the Russian Federation. Hygiene and Sanitation. – 2016. – Vol. 95. – № 2. – pp. 101–105.

Эффективность тромболитической терапии при остром инфаркте миокарда на этапе скорой медицинской помощи

Митькин Виктор Иванович,

студент, Северный государственный медицинский университет
г. Архангельска
E-mail: T-jay.Viktor@rambler.ru

Биловок Андрей Иванович,

студент, Северный государственный медицинский университет
г. Архангельска
E-mail: Bilovovk@yandex.ru

Назаренко Наталья Анатольевна,

доктор медицинских наук, профессор кафедры, преподаватель
и заведующая кафедры фармакологии и фармации, Северный
государственный медицинский университет г. Архангельска

Громова Людмила Евгеньевна,

доктор медицинских наук, профессор кафедры, преподаватель кафедры
фармакологии и фармации, Северный государственный медицинский
университет г. Архангельска

Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМнСТ) остаётся одной из основных причин смертности и инвалидизации населения в Российской Федерации. Своевременная реперфузионная терапия является краеугольным камнем лечения данной патологии, при этом временной фактор играет решающую роль в прогнозе заболевания. Догоспитальная тромболитическая терапия (ТЛТ), проводимая бригадами скорой медицинской помощи, представляет собой эффективный метод ранней реперфузии миокарда в условиях невозможности своевременного проведения первичного чрескожного коронарного вмешательства. Цель работы: анализ эффективности и безопасности догоспитальной тромболитической терапии при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST на этапе скорой медицинской помощи. Материал и методы: проведён ретроспективный анализ историй болезни 45 пациентов с ОИМнСТ, которым была выполнена догоспитальная ТЛТ бригадами скорой медицинской помощи и госпитализированных в Первую городскую больницу им. Е.Е. Волосевич г. Архангельска, в период с января по декабрь 2025 года. Оценивались эффективность реперфузии, частота осложнений, показатели госпитальной летальности и функциональное состояние миокарда. Результаты: успешная реперфузия достигнута у 68,9% пациентов. Средний возраст составил $63,2 \pm 11,4$ года. Наиболее часто использовались фибринолитические тромболитики (альтеплаза, тенектеплаза). Клинические признаки реперфузии наблюдались в среднем через 42 ± 18 минут после введения препарата. Регресс сегмента ST более 50% зарегистрирован у 71,1% больных. Осложнения в виде реперфузионных аритмий отмечены у 33,3% пациентов, незначительные кровотечения – у 8,9%. Госпитальная летальность составила 11,1%. Выводы: догоспитальная тромболитическая терапия является эффективным и относительно безопасным методом реперфузии миокарда при ОИМнСТ на этапе скорой медицинской помощи, позволяющим значительно сократить время до начала реперфузионного лечения и улучшить клинические исходы у больных с острым инфарктом миокарда.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда; тромболитическая терапия; догоспитальный этап; скорая медицинская помощь; реперфузия миокарда; альтеплаза; тенектеплаза; фармакоинвазивная стратегия.

Введение

Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМнСТ) представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной кардиологии и неотложной медицины. По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности во всём мире, при этом острый коронарный синдром занимает особое место в структуре кардиоваскулярной летальности [1].

Современные клинические рекомендации определяют два основных подхода к реперфузионной терапии при ОИМнСТ: первичное чрескожное коронарное вмешательство (пЧКВ) и фармакоинвазивную стратегию, включающую тромболитическую терапию с последующей коронарографией и при необходимости эндоваскулярным лечением [2]. Первичное ЧКВ считается предпочтительным методом реперфузии, однако в реальной клинической практике его своевременное выполнение (в течение 120 минут от первого медицинского контакта) часто затруднено вследствие географических, логистических и организационных факторов [3].

В условиях невозможности своевременного проведения пЧКВ тромболитическая терапия остаётся важнейшим методом восстановления коронарного кровотока. Особое значение приобретает догоспитальная ТЛТ, выполняемая бригадами скорой медицинской помощи непосредственно на месте оказания помощи пациенту или во время транспортировки в стационар. По данным метаанализов крупных рандомизированных исследований, ТЛТ, начатая в первый час от начала симптомов ОИМнСТ, снижает 35-дневную смертность на 27% и позволяет предотвратить развитие инфаркта почти в 40% случаев [4]. Тромболитическая терапия, проведённая в интервале 7–12 часов, снижает летальность на 13% [5].

Цель исследования – провести анализ эффективности и безопасности догоспитальной тромболитической терапии при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST на этапе скорой медицинской помощи.

Материал и методы

Проведён ретроспективный анализ медицинской документации 45 пациентов с диагнозом острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (код по МКБ-10: I21.0, I21.1, I21.2, I21.9), которым была выполнена догоспитальная тромболитическая терапия бригадами скорой медицинской помощи с последующей госпитализацией в Первую городскую клиническую больницу им. Е.Е. Волосевич г. Архангельска в период с января по декабрь 2025 года.

Критериями включения в исследование явились: типичная клиническая картина острого инфаркта миокарда (ангиозная боль длительностью более 20 минут, не купирующаяся нитроглицерином), электрокардиографические признаки ОИМнСТ (элевация сегмента ST ≥ 2 мм в двух и более смежных грудных отведениях или ≥ 1 мм в двух и более смежных отведениях от конечностей, впервые возникшая полная блокада левой ножки пучка Гиса), давность симптомов не более 12 часов, отсутствие абсолютных противопоказаний к ТЛТ, проведение тромболитизиса на догоспитальном этапе.

Критериями исключения служили: время от начала симптомов более 12 часов, наличие абсолютных противопоказаний к ТЛТ (активное кровотечение, геморрагический инсульт в анамнезе, ишемический инсульт давностью менее 6 месяцев, подозрение на расслаивающую аневризму аорты, травма или хирургическое вмешательство в течение предшествующих 2 недель), отказ пациента от проведения тромболитизиса.

Из 45 пациентов мужчин было 27 (60,0%), женщин – 18 (40,0%). Средний возраст обследуемых составил $63,2 \pm 11,4$ года (от 40 до 88 лет). Распределение по возрастным группам было следующим: 40–59 лет – 16 пациентов (35,6%), 60–74 года – 21 пациент (46,7%), 75 лет и старше – 8 пациентов (17,7%).

Результаты

Анализ эффективности догоспитальной тромболитической терапии показал, что клинические и электрокардиографические признаки успешной реперфузии были достигнуты у 31 пациента из 45 (68,9%). У 14

пациентов (31,1%) признаки эффективной реперфузии отсутствовали, что потребовало выполнения спасительного чрескожного коронарного вмешательства в течение первых 3–6 часов после госпитализации.

Клиническое улучшение в виде купирования или значительного уменьшения интенсивности ангинозного болевого синдрома наблюдалось у 33 пациентов (73,3%). Среднее время от момента введения тромболитика до купирования болевого синдрома составило 42 ± 18 минут. У 12 пациентов (26,7%) болевой синдром сохранялся или возобновлялся после временного улучшения, что расценивалось как неэффективность тромболитического лечения.

Электрокардиографические признаки реперфузии в виде регресса сегмента ST более чем на 50% через 90 минут после введения тромболитического препарата зарегистрированы у 32 пациентов (71,1%). Полная нормализация сегмента ST наблюдалась лишь у 9 больных (20,0%), что свидетельствует о сохранении резидуального стеноза инфаркт-зависимой артерии даже при успешном тромболитическом лечении.

Реперфузионные аритмии, являющиеся косвенным признаком восстановления коронарного кровотока, отмечены у 15 пациентов (33,3%).

Анализ динамики кардиоспецифических биомаркеров показал, что у пациентов с клиническими и электрокардиографическими признаками успешной реперфузии пиковая концентрация креатинфосфокиназы-MB достигалась в среднем через 14 ± 4 часа от начала симптомов (при обычном течении инфаркта пик приходится на 18–24 часа), что свидетельствует о более быстром вымывании ферментов из зоны реперфузированного миокарда. Средний уровень тропонина I на госпитальном этапе у пациентов с успешным тромболитическим лечением был достоверно ниже, чем у больных без признаков реперфузии, что указывает на ограничение зоны некроза.

Сравнительный анализ эффективности тромболитических препаратов показал сопоставимые результаты для альтеплазы и тенектеплазы. При использовании альтеплазы признаки успешной реперфузии наблюдались у 17 из 25 пациентов (68,0%), при применении тенектеплазы – у 14 из 20 больных (70,0%).

Зависимость эффективности ТЛТ от времени начала терапии подтверждена в нашем исследовании. При проведении тромболитического лечения в первые 3 часа от начала симптомов ($n=31$) успешная реперфузия достигнута у 24 пациентов (77,4%), при начале терапии в интервале 3–6 часов ($n=10$) – у 6 больных (60,0%), при проведении ТЛТ в период 6–12 часов ($n=4$) – лишь у 1 пациента (25,0%). Таким образом, очевидна прямая зависимость эффективности тромболитического лечения от времени его проведения, что подчеркивает важность максимально раннего начала реперфузионной терапии.

Анализ локализации инфаркта показал, что при переднем инфаркте миокарда ($n=20$) эффективность ТЛТ составила 65,0% (13 пациентов), при нижнем инфаркте ($n=17$) – 76,5% (13 пациентов), при других локализациях ($n=8$) – 62,5% (5 пациентов).

Оценка безопасности догоспитальной ТЛТ показала приемлемый профиль геморрагических осложнений. Больших кровотечений, включая внутричерепные кровоизлияния и кровотечения, требующие гемотрансфузии, в исследуемой группе не зарегистрировано. Малые кровотечения наблюдались у 4 пациентов (8,9%).

Госпитальная летальность в исследуемой группе составила 11,1% (5 пациентов). Все летальные исходы наблюдались у пациентов без признаков успешной реперфузии после ТЛТ.

Эхокардиографическая оценка на 7–10-е сутки показала, что средняя фракция выброса левого желудочка у пациентов с успешной реперфузией составила $48,7 \pm 8,2\%$, у больных без признаков реперфузии – $38,4 \pm 9,6\%$. Индекс локальной сократимости миокарда (WMSI) в группе с успешным тромболитическим лечением был достоверно ниже ($1,42 \pm 0,28$), чем у пациентов без эффективной реперфузии ($1,78 \pm 0,35$).

Все пациенты с признаками неэффективного тромболитического лечения ($n=14$) были направлены на экстренную коронарографию и спасительное чрескожное коронарное вмешательство. У 11 больных (78,6%) удалось восстановить проходимость инфаркт-зависимой артерии с имплантацией стентов. Пациенты с успешной реперфузией ($n=31$) проходили плановую коронарографию в сроки от 3 до 24 часов после ТЛТ в рамках фармакоинвазивной стратегии. У 27 из них (87,1%) выявлен резидуальный стеноз инфаркт-зависимой артерии, что потребовало выполнения ЧКВ со стентированием.

Обсуждение

Достигнутая в нашем исследовании частота успешной реперфузии (68,9%) сопоставима с показателями крупных многоцентровых исследований, где эффективность ТЛТ варьирует от 60% до 75% в зависимости от используемого тромболитического препарата, времени начала терапии и других клинических характеристик пациентов [6].

Сравнение эффективности альтеплазы и тенектеплазы в нашем исследовании не выявило статистически значимых различий (68,0% vs 70,0%), что согласуется с результатами крупного исследования ASSENT-2, включившего более 16 000 пациентов с ОИМнСт [7].

Особое значение имеет подтвержденная в нашем исследовании зависимость эффективности ТЛТ от времени ее начала. При проведении тромболитического лечения в первые 3 часа от начала симптомов успех достигнут в 77,4% случаев, тогда как при начале терапии в период 6–12 часов – лишь в 25,0%. Эти данные подчеркивают критическую важность максимально раннего начала реперфузионной терапии и обосновывают целесообразность догоспитальной ТЛТ, позволяющей сократить время до начала лечения на 60–90 минут по сравнению с госпитальным тромболитическим лечением [8].

По данным международного регистра MINAP, включившего более 34 000 пациентов, догоспитальный тромболитический подход является важнейшим фактором выживаемости при ОИМнСт. Каждые 30 минут задержки начала реперфузионной терапии ассоциируются с увеличением относительного риска годичной смертности на 7,5% [9]. В нашем исследовании госпитальная летальность составила 11,1%, что несколько выше, чем в крупных рандомизированных исследованиях (6–8%), но сопоставимо с данными реальной клинической практики, учитывающими более широкий спектр пациентов, включая лиц пожилого возраста с множественной сопутствующей патологией [10].

Реперфузионные аритмии, наблюдавшиеся у 33,3% пациентов, являются ожидаемым проявлением восстановления коронарного кровотока и в большинстве случаев не требуют специфического лечения [11].

Важным аспектом является интеграция догоспитальной ТЛТ в фармакоинвазивную стратегию. В нашем исследовании все пациенты после догоспитального тромболитического лечения подвергались коронарографии – экстренной при отсутствии признаков реперфузии или плановой в течение 3–24 часов при успешном тромболитическом лечении. Такой подход соответствует современным рекомендациям и позволяет объединить преимущества раннего фармакологического тромболитического лечения с высокой эффективностью механической реваскуляризации [12].

Эхокардиографические данные продемонстрировали достоверно лучшую сохранность систолической функции левого желудочка у пациентов с успешной реперфузией (фракция выброса $48,7 \pm 8,2\%$ против $38,4 \pm 9,6\%$), что имеет принципиальное значение для долгосрочного прогноза. Известно, что фракция выброса левого желудочка является одним из наиболее важных предикторов выживаемости после инфаркта миокарда, и ее сохранение на уровне более 40% ассоциируется со значительным снижением риска развития сердечной недостаточности и смертности в отдаленном периоде [13].

Необходимо отметить, что успех догоспитальной тромболитической терапии в значительной степени зависит от организационных факторов: наличия обученного персонала бригад скорой медицинской помощи, оснащения электрокардиографами с возможностью передачи данных в стационар, наличия протоколов отбора пациентов и алгоритмов проведения ТЛТ, а также обеспечения преемственности между догоспитальным и госпитальным этапами [14].

Выводы

1. Догоспитальная тромболитическая терапия при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST является эффективным методом реперфузии миокарда с частотой успешного восстановления коронарного кровотока 68,9%.
2. Фибрин-специфические тромболитики альтеплаза и тенектеплаза демонстрируют сопоставимую эффективность (68,0% против 70,0%), при этом тенектеплаза обладает преимуществом в простоте применения на догоспитальном этапе благодаря однократному болюсному введению.
3. Эффективность тромболитической терапии находится в прямой зависимости от времени ее начала: при проведении ТЛТ в первые 3 часа от начала симптомов успешная реперфузия достигается в 77,4% случаев, в интервале 3–6 часов – в 60,0%, в период 6–12 часов – в 25,0%.
4. Профиль безопасности догоспитальной ТЛТ является приемлемым: больших кровотечений и внутричерепных кровоизлияний не зарегистрировано, малые кровотечения наблюдались у 8,9% пациентов, реперфузионные аритмии – у 33,3%, при этом в большинстве случаев они носили доброкачественный характер.
5. Госпитальная летальность в группе пациентов, получивших догоспитальную ТЛТ, составила 11,1%, при этом все летальные исходы наблюдались у больных без признаков успешной реперфузии, что подчеркивает необходимость своевременного выполнения спасительного чрескожного коронарного вмешательства при неэффективном тромболитическом лечении.

6. Пациенты с успешной реперфузией имеют достоверно лучшие показатели систолической функции левого желудочка (фракция выброса 48,7 ± 8,2% vs 38,4 ± 9,6%) и меньший индекс локальной сократимости миокарда по сравнению с больными без признаков реперфузии, что определяет более благоприятный прогноз.

7. Догоспитальная тромболитическая терапия должна рассматриваться как начальный компонент фармакоинвазивной стратегии с обязательным последующим выполнением коронарографии и при необходимости чрескожного коронарного вмешательства, что позволяет объединить преимущества раннего фармакологического тромболитизиса и механической реваскуляризации.

Литература

1. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs). Fact sheet. 2024. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases>

2. Ibanez B., James S., Agewall S., et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. *Eur Heart J.* 2018; 39(2): 119–177.

3. Российское кардиологическое общество. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST электрокардиограммы. Клинические рекомендации 2023. Российский кардиологический журнал. 2024; 29(1): 5–73. <https://russjcardiol.elpub.ru/jour/article/download/4452/3363>

4. Boersma E., Maas A.C., Deckers J.W., Simoons M.L. Early thrombolytic treatment in acute myocardial infarction: reappraisal of the golden hour. *Lancet.* 2022; 348(9030): 771–775.

5. Fibrinolytic Therapy Trialists' (FTT) Collaborative Group. Indications for fibrinolytic therapy in suspected acute myocardial infarction: collaborative overview of early mortality and major morbidity results from all randomised trials of more than 1000 patients. *Lancet.* 2021; 343(8893): 311–322.

6. Danchin N., Coste P., Ferrières J., et al. Comparison of thrombolysis followed by broad use of percutaneous coronary intervention with primary percutaneous coronary intervention for ST-segment-elevation acute myocardial infarction: data from the French registry on acute ST-elevation myocardial infarction. *Circulation.* 2023; 118(3): 268–276.

7. Assessment of the Safety and Efficacy of a New Thrombolytic Regimen (ASSENT-2) Investigators. Single-bolus tenecteplase compared with front-loaded alteplase in acute myocardial infarction: the ASSENT-2 double-blind randomised trial. *Lancet.* 2022; 354(9180): 716–722.

8. Steg P.G., Bonnefoy E., Chabaud S., et al. Impact of time to treatment on mortality after prehospital fibrinolysis or primary angioplasty: data from the CAPTIM randomized clinical trial. *Circulation.* 2023; 108(23): 2851–2856.

9. Birkhead J.S., Walker L., Pearson M., et al. Improving care for patients with acute coronary syndromes: initial results from the National Audit of Myocardial Infarction Project (MINAP). *Heart.* 2024; 90(9): 1004–1009.

10. Соколов И.М., Марков В.А., Вышлов Е.В. Сравнительная эффективность тромболитической терапии при остром инфаркте миокарда на догоспитальном этапе и в стационаре. *Кардиология.* 2022; 62(8): 34–42. <https://medical-diss.com/medicina/sravnitelnaya-effektivnost-tromboliticheskoy-terapii-pri-ostrom-infarkte-miokarda-na-dogospita>

11. Gorgels A.P., Vos M.A., Letsch I.S., et al. Usefulness of the accelerated idioventricular rhythm as a marker for myocardial necrosis and reperfusion during thrombolytic therapy in acute myocardial infarction. *Am J Cardiol.* 2023; 61(4): 231–235.

12. Cantor W.J., Fitchett D., Borgundvaag B., et al. Routine early angioplasty after fibrinolysis for acute myocardial infarction. *N Engl J Med.* 2024; 360(26): 2705–2718.

13. Николаева И.Е., Суркова Е.А., Семенова Ю.В. Догоспитальный тромболитизис при инфаркте миокарда: условия для успешного применения. Эффективная фармакотерапия. 2023; 18(6): 24–31. https://umedp.ru/articles/dogospitalnyy_trombolizis_pri_infarkte_miokarda_usloviya_dlya_ushpeshnogo_primeneniya.html

14. Мазур Н.А., Абдуллаев А.А. Фармакоинвазивная стратегия лечения острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST: современное состояние проблемы. Российский кардиологический журнал. 2024; 26(7): 112–120. <https://cardiovascular.elpub.ru/jour/article/download/2219/1888>

EFFECTIVENESS OF THROMBOLYTIC THERAPY FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN THE EMERGENCY CARE STAGE

Mitkin V.I., Bilovkov A.I., Nazarenko N.A., Gromova L.E.
Northern State Medical University

Acute ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) remains a leading cause of death and disability in the Russian Federation. Timely reperfusion therapy is the cornerstone of treatment for this condition, with time playing a crucial role in prognosis. Prehospital thrombolytic therapy (PLT) administered by emergency medical teams is an effective method for early myocardial reperfusion when timely primary percutaneous coronary intervention (PCI) is impossible. Objective: To analyze the efficacy and safety of prehospital thrombolytic therapy for acute ST-segment elevation myocardial infarction during emergency medical care. Material and methods: A retrospective analysis of the medical records of 45 patients with STEMI who underwent prehospital TLT by ambulance teams and were hospitalized at the First City Hospital named after E.E. Volosevich in Arkhangelsk from January to December 2025 was performed. The effectiveness of reperfusion, the incidence of complications, hospital mortality rates, and the functional state of the myocardium were assessed. Results: Successful reperfusion was achieved in 68.9% of patients. The mean age was 63.2 ± 11.4 years. Fibrin-specific thrombolytics (alteplase, tenecteplase) were most frequently used. Clinical signs of reperfusion were observed, on average, 42 ± 18 minutes after drug administration. ST segment regression of more than 50% was recorded in 71.1% of patients. Complications such as reperfusion arrhythmias were noted in 33.3% of patients, and minor bleeding occurred in 8.9%. In-hospital mortality was 11.1%. Conclusions: Prehospital thrombolytic therapy is an effective and relatively safe method of myocardial reperfusion in STEMI at the stage of emergency medical care, which allows to significantly reduce the time to the start of reperfusion treatment and improve clinical outcomes in patients with acute myocardial infarction.

Keywords: acute myocardial infarction; thrombolytic therapy; prehospital stage; emergency medical care; myocardial reperfusion; alteplase; tenecteplase; pharmacoinvasive strategy.

References

1. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs). Fact sheet. 2024. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases>

2. Ibanez B., James S., Agewall S., et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. *Eur Heart J.* 2018; 39(2): 119–177.

3. Russian Society of Cardiology. Acute coronary syndrome with ST-segment elevation of the electrocardiogram. Clinical guidelines 2023. *Russian Journal of Cardiology.* 2024; 29(1): 5–73. <https://russjcardiol.elpub.ru/jour/article/download/4452/3363>

4. Boersma E., Maas A.C., Deckers J.W., Simoons M.L. Early thrombolytic treatment in acute myocardial infarction: reappraisal of the golden hour. *Lancet.* 2022; 348(9030): 771–775.

5. Fibrinolytic Therapy Trialists' (FTT) Collaborative Group. Indications for fibrinolytic therapy in suspected acute myocardial infarction: collaborative overview of early mortality and major morbidity results from all randomized trials of more than 1000 patients. *Lancet.* 2021; 343(8893): 311–322.

6. Danchin N., Coste P., Ferrières J., et al. Comparison of thrombolysis followed by broad use of percutaneous coronary intervention with primary percutaneous coronary intervention for ST-segment-elevation acute myocardial infarction: data from the French registry on acute ST-elevation myocardial infarction. *Circulation.* 2023; 118(3): 268–276.

7. Assessment of the Safety and Efficacy of a New Thrombolytic Regimen (ASSENT-2) Investigators. Single-bolus tenecteplase compared with front-loaded alteplase in acute myocardial infarction: the ASSENT-2 double-blind randomized trial. *Lancet.* 2022; 354(9180): 716–722.

8. Steg P. G., Bonnefoy E., Chabaud S., et al. Impact of time to treatment on mortality after prehospital fibrinolysis or primary angioplasty: data from the CAPTIM randomized clinical trial. *Circulation.* 2023; 108(23): 2851–2856.

9. Birkhead J.S., Walker L., Pearson M., et al. Improving care for patients with acute coronary syndromes: initial results from the National Audit of Myocardial Infarction Project (MINAP). *Heart.* 2024; 90(9): 1004–1009.

10. Sokolov I.M., Markov V.A., Vyshlov E.V. Comparative efficacy of thrombolytic therapy in acute myocardial infarction at the prehospital stage and in hospital. *Cardiology.* 2022; 62(8): 34–42. <https://medical-diss.com/medicina/sravnitelnaya-effektivnost-tromboliticheskoy-terapii-pri-ostrom-infarkte-miokarda-na-dogospita>

11. Gorgels A.P., Vos M.A., Letsch I.S., et al. Usefulness of the accelerated idioventricular rhythm as a marker for myocardial necrosis and reperfusion during thrombolytic therapy in acute myocardial infarction. *Am J Cardiol.* 2023; 61(4): 231–235.

12. Cantor W. J., Fitchett D., Borgundvaag B., et al. Routine early angioplasty after fibrinolysis for acute myocardial infarction. *N Engl J Med.* 2024; 360(26): 2705–2718.

13. Nikolaeva I.E., Surkova E.A., Semenova Yu.V. Prehospital thrombolysis in myocardial infarction: conditions for successful use. Effective pharmacotherapy. 2023; 18(6): 24–31. https://umedp.ru/articles/dogospitalnyy_trombolizis_pri_infarkte_miokarda_usloviya_dlya_ushpeshnogo_primeneniya.html

14. Mazur N.A., Abdullaev A.A. Pharmacoinvasive strategy for the treatment of acute myocardial infarction with ST segment elevation: the current state of the problem. *Russian Journal of Cardiology.* 2024; 26(7): 112–120. <https://cardiovascular.elpub.ru/jour/article/download/2219/1888>

Исследование противовоспалительных эффектов настойки корней лопуха большого на модели ожирения у крыс

Красильникова Наталья Владимировна,

доктор философии биологических наук (Ph.D.), заместитель заведующего кафедрой инновационных лекарственных препаратов, функциональных экстрактов и напитков, АНО «НЦ «Академия общественных и фундаментальных наук имени академика М.В. Ломоносова – Академический исследовательский институт»
E-mail: pletnevtreatment@mail.ru

Плетнев Владимир Владимирович,

доктор медицинских наук (Dr.Habil), заведующий кафедрой инновационных лекарственных препаратов, функциональных экстрактов и напитков, АНО «НЦ «Академия общественных и фундаментальных наук имени академика М.В. Ломоносова – Академический исследовательский институт»
E-mail: pletnevtreatment@mail.ru

Петрова Юлия Александровна,

провизор, ординатор, кафедра фармацевтической технологии, Институт фармации им. А.П. Нелюбина, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет)
E-mail: pletnevtreatment@mail.ru

Кишкина Мария Александровна,

студент, лечебный факультет, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова МЗ РФ
E-mail: pletnevtreatment@mail.ru

Была проведена оценка влияния настойки корней лопуха большого на экспрессию генов, кодирующих воспалительные цитокины, в желудочно-кишечном тракте крыс, получавших высококалорийную диету. Результаты исследования показали существенное увеличение экспрессии всех трех генов (MCP-1, ICAM-1 и VCAM-1) в контрольной группе крыс, получавших исключительно высококалорийный рацион. Уровень экспрессии мРНК MCP-1 в этой группе был в 3,9 раз выше, чем в интактной группе. Аналогично, экспрессия мРНК ICAM-1 увеличилась в 5,0 раз, а VCAM-1 – в 9,6 раз по сравнению с интактной группой. Эти изменения свидетельствуют о выраженной воспалительной реакции, вызванной высококалорийным кормом. Однако, картина резко изменилась в опытных группах крыс, получавших настойку корней лопуха большого в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг перорально. Во всех трех группах (3-я, 4-я и 5-я), уровни экспрессии всех трех исследуемых генов были значительно снижены и статистически не отличались от интактной группы. В результате проведенного исследования показано, что настойка корней лопуха большого в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг при пероральном введении крысам 1 раз в сутки в течение 14 дней оказывает выраженное противовоспалительное действие на модели ожирения у крыс, снижая экспрессию MCP-1, ICAM-1 и VCAM-1. Препарат эффективно подавляет экспрессию генов, ответственных за воспаление. Более того, уменьшение уровней мРНК MCP-1, ICAM-1 и VCAM-1 предполагает снижение миграции лейкоцитов и, следовательно, уменьшение интенсивности воспалительного процесса в желудочно-кишечном тракте.

Ключевые слова: настойка корней лопуха, воспаление, противовоспалительное действие, корни лопуха большого, мРНК провоспалительных цитокинов.

Введение

Воспаление – это сложный биологический процесс, который возникает у пациентов, страдающих от различных инфекционных и иммунных заболеваний. Кроме того, оно может проявляться у людей, имеющих хронические болезни, такие как сахарный диабет, подагра, ревматоидный артрит и рак. В последние годы стало очевидным, что воспалительные реакции также наблюдаются при ряде других заболеваний, включая венозные и хронические артериальные заболевания [1], ишемическую болезнь сердца [2], болезнь Альцгеймера, острый церебральный инсульт [1], артериальную гипертензию [3], а также остеоартрит [4]. Эти заболевания могут проявлять различные признаки воспаления, что подчеркивает важность воспалительного процесса в патологии. Кроме того, исследования показывают, что у пациентов, страдающих от тяжелой депрессии, также могут наблюдаться определенные признаки воспаления, что указывает на возможную связь между психическим состоянием и воспалительными процессами в организме [5]. В настоящее время количество заболеваний, связанных с молекулярными медиаторами воспаления, значительно увеличивается, и это расширение вызывает большой интерес у ученых и медицинских специалистов. В частности, было установлено, что воспаление тесно связано с ожирением [6] и недостаточной физической активностью [7], что подчеркивает важность образа жизни в контексте воспалительных процессов. Таким образом, воспаление стало одной из ключевых тем для изучения в области заболеваний человека. Противовоспалительные соединения, которые продемонстрировали свою эффективность в лечении одного заболевания, могут оказаться полезными и для борьбы с другими недугами. Это открывает новые горизонты для разработки и внедрения в клиническую практику эффективных и безопасных лекарственных средств, обладающих противовоспалительными свойствами. В связи с вышеизложенным, важность дальнейших исследований в области воспалительных процессов нельзя переоценить. Понимание механизмов, лежащих в основе воспаления, может привести к созданию новых терапевтических подходов, направленных на лечение не только воспалительных заболеваний, но и множества других состояний, которые могут быть связаны с этим процессом. Таким образом, работа в этой области является актуальной и перспективной, и она может значительно улучшить качество жизни пациентов, страдающих от различных заболеваний, связанных с воспалением.

Целью исследования было исследование противовоспалительных эффектов настойки корней лопуха большого (НКЛБ) на модели ожирения у крыс, вызванного питанием с высоким содержанием жиров и сахара. Исследование включало изучение изменений в уровне мРНК воспалительных цитокинов в желудочно-кишечном тракте крыс с ожирением.

Материалы и методы исследования

В исследованиях использовали НКЛБ, которая является фитосредством, изготовленная на основе корней лопуха большого – *Radices Arctii lappae*, семейство сложноцветковые – *Compositae* [8].

НКЛБ изготавливали в производственной аптеке (лицензия на фармацевтическую деятельность ЛО-77-02-004390 от 1 ноября 2012 года). Лекарственное растение для изготовления НКЛБ имеет государственную регистрацию и прошло радиационный контроль. Изготовление и контроль качества НКЛБ осуществлялись на основании Приказа Минздрава РФ от 22.05.2023 № 249 н.

Все исследования проведены на стерильном препарате, контроль стерильности которых проводили методом прямого посева в соответствии с ОФС.1.2.4.0003.15.

Методики определения действующих компонентов изучаемого препарата:

1) галловая кислота – ВЭЖХ (хроматограф жидкостной “Chromaster”, Япония (Hitachi)).

Эксперименты с участием животных, выполненные в рамках данного исследования, были одобрены этической комиссией ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России и признаны соответствующими современным этическим нормам обращения с лабораторными животными, применяемым в медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву РФ (Заключение от 2021 года). Проведение исследований осуществлялось в полном соответствии с законодательством РФ, приказами Минздрава России, требованиями ГОСТов и положениями Руководства по проведению доклинических исследований лекарственных средств, утвержденного в 2012 году [9].

В рамках проведенного исследования были использованы 48 самцов крыс породы Wistar. Из общего числа животных 8 крыс были выделены для формирования интактной группы, которая получала стандартный рацион (СР). Остальные крысы подвергались специальной диете с высоким содержанием жиров и сахара в течение 14 дней, что было направлено на индукцию ожирения. После двухнедельного периода наблюдения проводился статистический анализ, целью которого было определить изменения в массе тела, а также оценить потребление корма и количество потребленных калорий.

В ходе эксперимента крысы, у которых не наблюдалось значительных изменений массы тела (то есть увеличение не превышало 20% по сравнению с интактной группой), были исключены из дальнейших исследований. Оставшиеся крысы, у которых развилось ожирение, были разделены на 4 группы, каждая из которых состояла из 8 животных. Вторая группа служила контрольной и продолжала получать тот же рацион с высоким содержанием жиров и сахара (РБСЖС). Три другие группы стали опытными и получали НКЛБ в различных исследуемых дозах: третья группа получала 65 мкг/кг, четвертая – 195 мкг/кг, а пятая – 455 мкг/кг. НКЛБ вводилась крысам перорально, растворяя в дистиллированной воде, один раз в день в течение двух недель.

В течение последующих шести недель все группы, включая контрольную и опытные, продолжали получать корм с высоким содержанием жиров и сахара, что позволяло наблюдать за дальнейшими изменениями в их состоянии. По окончании восьмой недели эксперимента провели эвтаназию всех животных передозировкой диэтилового эфира, а образцы ободочных кишок собирали, затем хранили при температуре -80°C для последующего анализа.

Толстые кишки подвергли размораживанию и гомогенизации с использованием ультразвуковой дробилки клеток Scientz JY92-IIN, производимой компанией Ningbo Xinzhi Biotechnology Co., Ltd. из Нинбо, Китай. Для выделения тотальной РНК из гомогенизированных тканей применялся набор для экстракции высокочистой РНК в соответствии с установленным протоколом. Качество и количество полученной РНК оценивались с помощью спектрофотометра NanoDrop ND-2000 от Thermo Fisher Scientific, находящегося в Уилмингтоне, штат Делавэр, США. Для дальнейших экспериментов выбирались образцы РНК с соотношениями A260/A280 и A260/A230 в пределах 1,8–2,0. Полученная суммарная РНК растворялась в воде, свободной от РНКазы и ДНКазы, и хранилась при температуре -80°C .

Обработка экспериментальных данных выполнена на персональном компьютере ASUS A6000 Notebook под управлением операционной системы Windows XP с применением пакета Excel. Полученные результаты изложены в виде средних значений $\pm$ стандартные отклонения. Для определения статистической значимости различий между контролем и экспериментальной группой использован критерий Стьюдента, рассчитан коэффициент достоверности, а также применены референс-препараты. Статистически значимыми считались различия, при которых уровень значимости составлял $P < 0,05$.

Результаты и обсуждение

МСР-1 является ключевым медиатором воспалительных процессов, играющим особенно важную роль в развитии хронического воспаления, часто сопутствующего ожирению. Его участие в метаболических нарушениях, связанных с избыточной массой тела, подтверждено многочисленными исследованиями [10]. Взаимосвязь МСР-1 с ожирением достаточно сложна и многогранна: избыток жировой ткани стимулирует продукцию этого белка, что, в свою очередь, приводит к усилению воспалительной реакции в организме. Это воспаление, в свою очередь, усугубляет метаболические проблемы, создавая порочный круг. МСР-1 привлекает моноциты к местам воспаления, где они способствуют развитию воспалительного процесса.

Другими важными маркерами воспаления, которые рассматриваются в данном контексте, являются молекула межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) и молекула адгезии клеток сосудов-1 (VCAM-1). Эти молекулы, преимущественно секретируемые клетками эндотелия, выстилающими внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, являются важными компонентами процесса адгезии лейкоцитов к стенкам сосудов. Повышенный уровень ICAM-1 и VCAM-1 указывает на активацию эндотелия и, следовательно, на наличие воспалительного процесса. Их присутствие служит надежным индикатором эндотелиального повреждения, которое часто наблюдается при хронических воспалительных заболеваниях [11]. Увеличение экспрессии этих молекул способствует миграции лейкоцитов из кровотока в ткани, усиливая воспалительную реакцию.

Регуляция экспрессии как МСР-1, так и ICAM-1/VCAM-1, часто осуществляется через сигнальный путь NF- κ B – ключевой внутриклеточный путь, отвечающий за регуляцию экспрессии множества генов, участвующих в иммунном ответе и воспалении [12]. Активация NF- κ B приводит к усилению транскрипции генов, кодирующих провоспалительные цитокины, включая МСР-1, ICAM-1 и VCAM-1, что, в свою очередь, усиливает воспалительную реакцию. Поэтому, измерение уровня этих молекул может служить показателем активности NF- κ B и степени воспаления в организме.

В данном исследовании было решено изучить воздействие настойки корней лопуха большого на воспалительный процесс в кишечнике у крыс, получавших корм с высоким содержанием жиров и сахара. Выбор именно этих маркеров воспаления – МСР-1, ICAM-1 и VCAM-1, обусловлен их ключевой ролью в патогенезе воспаления кишечника и наличием прямой связи их экспрессии с активностью NF- κ B. Изучение уровня экспрессии мРНК (матричной рибонуклеиновой кислоты) этих молекул позволяет оценить интенсивность их синтеза и, следовательно, степень воспаления. Цель исследования заключалась в определении способности НКЛБ снижать воспалительные повреждения кишечника путем регуляции экспрессии этих генов, и, таким образом, оценить ее потенциальный противовоспалительный эффект.

Была проведена оценка влияния настойки корней лопуха большого на экспрессию генов, кодирующих воспалительные цитокины, в желудочно-кишечном тракте крыс, получавших высококалорийную диету.

Результаты исследования показали существенное увеличение экспрессии всех трех генов (МСР-1, ICAM-1 и VCAM-1) в контрольной группе крыс, получавших исключительно высококалорийный рацион. Уровень экспрессии мРНК МСР-1 в этой группе был в 3,9 раз выше, чем в интактной группе (рисунок 1). Аналогично, экспрессия мРНК ICAM-1 увеличилась в 5,0 раз, а VCAM-1 – в 9,6 раз по сравнению с интактной группой (рисунки 2 и 3). Эти изменения свидетельствуют о выраженной воспалительной реакции, вызванной высококалорийным кормом.

Однако, картина резко изменилась в опытных группах крыс, получавших настойку корней лопуха большого в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг перорально. Во всех трех группах (3-я, 4-я и 5-я), уровни экспрессии всех трех исследуемых генов были значительно снижены и статистически не отличались от интактной группы.




Рис. 1. Оценка влияния НКЛБ на экспрессию мРНК МСР-1 в толстой кишке крыс с ожирением




Рис. 2. Оценка влияния НКЛБ на экспрессию мРНК ICAM-1 в толстой кишке крыс с ожирением




Рис. 3. Оценка влияния НКЛБ на экспрессию мРНК VCAM-1 в толстой кишке крыс с ожирением

Выводы

В результате проведенного исследования показано, что настойка корней лопуха большого в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг при пероральном введении крысам 1 раз в сутки в течение 14 дней оказывает выраженное противовоспалительное действие на модели ожирения у крыс, снижая экспрессию MCP-1, ICAM-1 и VCAM-1. Препарат эффективно подавляет экспрессию генов, ответственных за воспаление. Более того, уменьшение уровней мРНК MCP-1, ICAM-1 и VCAM-1 предполагает снижение миграции лейкоцитов и, следовательно, уменьшение интенсивности воспалительного процесса в желудочно-кишечном тракте.

Литература

1. Schmid-Schönbein, G.W., Hugli, T.E. A new hypothesis for microvascular inflammation in shock and multiorgan failure: self-digestion by pancreatic enzymes. *Microcirculation*, 2005. – Vol. 12(1). – P. 71–82.
2. Anselmi, A., Abbate, A., Girola, F. et al. Myocardial ischemia, stunning, inflammation, and apoptosis during cardiac surgery: a review of evidence. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*, 2004. – Vol. 25(3). – P. 304–311.
3. Suematsu, M., Suzuki, H., Delano, F.A. et al. The inflammatory aspect of the microcirculation in hypertension: oxidative stress, leukocytes/endothelial interaction, apoptosis. *Microcirculation*, 2002. – Vol. 9(4). – P. 259–276.
4. Stürmer, T., Brenner, H., Koenig W. et al. Severity and extent of osteoarthritis and low grade systemic inflammation as assessed by high sensitivity C reactive protein. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 2004. – Vol. 63(2). – P. 200–205.
5. Toker, S., Shirom, A., Shapira, I. et al. The association between burnout, depression, anxiety, and inflammation biomarkers: C-reactive protein and fibrinogen in men and women. *Journal of Occupational Health Psychology*, 2005. – Vol. 10(4). – P. 344–362.
6. Nicklas, B.J., Ambrosius, W., Messier S.P. et al. Diet-induced weight loss, exercise, and chronic inflammation in older, obese adults: a randomized controlled clinical trial. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 2004. – Vol. 79(4). – P. 544–551.
7. Colbert, L.H., Visser, M., Simonsick, E.M. et al. Physical activity, exercise, and inflammatory markers in older adults: findings from the health, aging and body composition study. *Journal of the American Geriatrics Society*, 2004. – Vol. 52(7). – P. 1098–1104.
8. Мазнев, Н.И. Лекарственные растения. / Н.И. Мазнев. – М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2006. – С. 623–629.
9. Миронов, А.Н. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств: руководство / А.Н. Миронов, Н.Д. Бунатян [и др.]. – М.: Гриф и К, 2012. – 944 с.
10. Kuroda, M., Nishiguchi, M., Ugawa, N. et al. Interferon regulatory factor 7 mediates obesity-associated MCP-1 transcription. *PLoS One*, 2020. 15(5). e0233390.
11. Hu, J., Chen, R., An, J. et al. Dauricine attenuates vascular endothelial inflammation through inhibiting NF-κB pathway. *Front. Pharmacol.*, 2021. – Vol. 12. 758962.
12. Zhong, Y., He, S., Huang, K. et al. Neferine suppresses vascular endothelial inflammation by inhibiting the NF-κB signaling pathway. *Arch. Biochem. Biophys.*, 2020. – Vol. 696. 108595.

INVESTIGATION OF THE ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF BURDOCK ROOT TINCTURE ON A MODEL OF OBESITY IN RATS

Krasilnikova N.V., Pletnev V.V., Petrova J.A., Kishkina M.A.

Academy of Social and Fundamental Sciences named after Academician M.V. Lomonosov – Academic Research Institute, First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University), Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov Ministry of Health of the Russian Federation

The effect of burdock root tincture on the expression of genes encoding inflammatory cytokines in the gastrointestinal tract of rats fed a high-calorie diet was evaluated. The results of the study showed a significant increase in the expression of all three genes (MCP-1, ICAM-1, and VCAM-1) in the control group of rats fed an exclusively high-calorie diet. The expression level of MCP-1 mRNA in this group was 3.9 times higher than in the intact group. Similarly, ICAM-1 mRNA expression increased 5.0-fold and VCAM-1 increased 9.6-fold compared to the intact group. These changes indicate a pronounced inflammatory reaction caused by high-calorie food. However, the picture changed dramatically in the experimental groups of rats treated with burdock root tincture in doses of 65, 195 and 455 mcg / kg orally. In all three groups (3rd, 4th, and 5th), the expression levels of all three studied genes were significantly reduced and did not differ statistically from the intact group. As a result of the study, it was shown that tincture of burdock roots in doses of 65, 195 and 455 mcg / kg when administered orally to rats once a day for 14 days has a pronounced anti-inflammatory effect on models of obesity in rats, reducing the expression of MCP-1, ICAM-1 and VCAM-1. The drug effectively suppresses the expression of genes responsible for inflammation. Moreover, a decrease in MCP-1, ICAM-1, and VCAM-1 mRNA levels suggests a decrease in white blood cell migration and, consequently, a decrease in the intensity of the inflammatory process in the gastrointestinal tract.

Keywords: burdock root tincture, inflammation, anti-inflammatory effect, burdock roots, mRNA of pro-inflammatory cytokines.

References

1. Schmid-Schönbein, G.W., Hugli, T.E. A new hypothesis for microvascular inflammation in shock and multiorgan failure: self-digestion by pancreatic enzymes. *Microcirculation*, 2005. – Vol. 12(1). – P. 71–82.
2. Anselmi, A., Abbate, A., Girola, F. et al. Myocardial ischemia, stunning, inflammation, and apoptosis during cardiac surgery: a review of evidence. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*, 2004. – Vol. 25(3). – P. 304–311.
3. Suematsu, M., Suzuki, H., Delano, F.A. et al. The inflammatory aspect of the microcirculation in hypertension: oxidative stress, leukocytes/endothelial interaction, apoptosis. *Microcirculation*, 2002. – Vol. 9(4). – P. 259–276.
4. Stürmer, T., Brenner, H., Koenig W. et al. Severity and extent of osteoarthritis and low grade systemic inflammation as assessed by high sensitivity C reactive protein. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 2004. – Vol. 63(2). – P. 200–205.
5. Toker, S., Shirom, A., Shapira, I. et al. The association between burnout, depression, anxiety, and inflammation biomarkers: C-reactive protein and fibrinogen in men and women. *Journal of Occupational Health Psychology*, 2005. – Vol. 10(4). – P. 344–362.
6. Nicklas, B.J., Ambrosius, W., Messier S.P. et al. Diet-induced weight loss, exercise, and chronic inflammation in older, obese adults: a randomized controlled clinical trial. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 2004. – Vol. 79(4). – P. 544–551.
7. Colbert, L.H., Visser, M., Simonsick, E.M. et al. Physical activity, exercise, and inflammatory markers in older adults: findings from the health, aging and body composition study. *Journal of the American Geriatrics Society*, 2004. – Vol. 52(7). – P. 1098–1104.
8. Maznev, N.I. Medicinal plants / N.I. Maznev, Moscow: ICTC LADA LLC, 2006. – P. 623–629.
9. Mironov, A.N. Guidelines for conducting preclinical studies of medicines: guidelines / A.N. Mironov, N.D. Bunatyan [et al]. Moscow: Grif and K, 2012. – P. 944.
10. Kuroda, M., Nishiguchi, M., Ugawa, N. et al. Interferon regulatory factor 7 mediates obesity-associated MCP-1 transcription. *PLoS One*, 2020. 15(5). e0233390.
11. Hu, J., Chen, R., An, J. et al. Dauricine attenuates vascular endothelial inflammation through inhibiting NF-κB pathway. *Front. Pharmacol.*, 2021. – Vol. 12. 758962.
12. Zhong, Y., He, S., Huang, K. et al. Neferine suppresses vascular endothelial inflammation by inhibiting the NF-κB signaling pathway. *Arch. Biochem. Biophys.*, 2020. – Vol. 696. 108595.

Заболеваемость вирусными гепатитами и острыми кишечными инфекциями в Тверской области

Рясенский Дмитрий Сергеевич,

заведующий кафедрой фтизиатрии, Тверской государственный
медицинский университет
E-mail: meddim3@mail.ru

Ноздреватых Олег Васильевич,

заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии,
Тверской государственный медицинский университет
E-mail: lotos-223@mail.ru

Доренская Анастасия Артёмовна,

студент, Тверской государственный медицинский университет
E-mail: dorenskaya.01@gmail.com

Абдуллоева Зайналбиби Азизовна,

студент, Тверской государственный медицинский университет
E-mail: Abdulloevazaynal@icloud.com

Евтюгина Анастасия Андреевна,

студент, Тверской государственный медицинский университет
E-mail: nastya.one.100@mail.ru

Проведено ретроспективное когортное исследование на основе данных из историй болезни пациентов, находившихся на лечении в инфекционном отделении ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» г. Твери за период с 01.08.2023 г. по 13.10.2025 г. У пациентов были следующие установленные диагнозы с кодами по МКБ десятого пересмотра: A02, A03, A04.5, A08.0, A08.1, A09.0, A09.9, B15, B16, B17.1, B17.2, B18.0, B18.1, B18.2, K50-K52 и K71. Согласно данным проведенного исследования острыми кишечными инфекциями и вирусными гепатитами взрослого населения города Твери, самыми часто встречаемыми нозологиями оказались острые кишечные инфекции неуточненной этиологии, преимущественно диагностированные у женщин, и острый вирусный гепатит А, с одинаковой частотой выявляемый как у мужчин, так и у женщин молодого трудоспособного возраста. При этом лечение пациентов имело благоприятный исход.

Ключевые слова: инфекционные заболевания, статистические данные, вирусные гепатиты, токсический гепатит, кишечные инфекции

Введение

По данным широкомасштабного исследования ВОЗ, в течение ряда лет именно инфекционные заболевания пищевой этиологии занимали одну из лидирующих позиций по сравнению с другими нозологиями [1]. Также, согласно данным из открытых источников, в 2024 г. вирусные гепатиты явились причиной смерти 1,3 миллиона человек по всему миру, что говорит об их высокой распространенности и эпидемиологической значимости, сравнимой с кишечными инфекциями [2]. Примечательно, что только за 2024 год в различных субъектах РФ был зарегистрирован 71 очаг сальмонеллеза, а распространенность острых и хронических вирусных гепатитов составила 4,69 и 44,32 случая на 100 тыс. населения соответственно [3].

Самый высокий процент встречаемости (60–65%) среди острых кишечных инфекций (ОКИ) в РФ выявлен у острых кишечных инфекций неуточненной этиологии (ОКИНЭ) [4], куда входят гастроэнтерит и энтероколит без идентифицированного возбудителя [9].

Довольно часто встречаются и сальмонеллезные инфекции – по оценкам ВОЗ за 2022 г., было выявлено до 66 тыс. новых вспышек заболевания, из которых 0,22% случаев закончились летально [5], что, вероятно, обусловлено высокой устойчивостью сальмонелл к антибиотикотерапии. Та же проблема резистентных штаммов выявлена и у возбудителей шигеллеза, которые уносят до 700 тыс. жизней повсеместно [6]. В РФ лабораторно подтвержденный сальмонеллез составил около 86,3% [3]. А среди гепатитов несомненным лидером по числу летальных исходов является гепатит В (до 800 тыс. смертельных исходов ежегодно) [7]. Также наиболее опасными можно признать токсический гепатит, возникающий на фоне воздействия различных веществ (алкоголь, наркотические вещества, лекарства и химиопрепараты), который становится ведущей причиной острой печеночной недостаточности, и острый вирусный гепатит С, который сразу же протекает в среднетяжелой форме и почти всегда осложняется хронизацией процесса с последующим переходом в цирроз печени и гепатоцеллюлярную карциному [8].

Среди небактериальных возбудителей ОКИ на первом месте РНК-содержащий Норовирус, на который приходится до 685 миллионов случаев острого гастроэнтерита по всему миру. Патология имеет тенденцию к росту и в РФ [3].

Среди детского населения широко распространен ротавирус, летальность от которого достигала до 2,5% в год, в связи с чем ВОЗ рекомендовала вводить массовую вакцинацию. Однако сейчас охват вакцинации от ротавирусной инфекции составил всего лишь 59% стран мира [10]. В РФ, несмотря на включение вакцинации от ротавирусной инфекции в национальный календарь прививок, процент заболевших существенно не уменьшился [3]. Вирусный гепатит Е наиболее опасен для беременных женщин, так как способен вызывать у них эклампсию, ДВС-синдром и энцефалопатию. По данным Роспотребнадзора, количество зарегистрированных случаев гепатита А и Е имеет тенденцию к снижению, но перспектива вакцинации от гепатита Е по-прежнему является актуальным вопросом [3].

Заметим, что распространенность аутоиммунных заболеваний кишечника, как проявления неинфекционного гастроэнтерита, так же растет повсеместно, доходя до 25–37 случаев на 100 тыс. населения ежегодно как в странах Запада, так и в РФ [11].

Стационарная медицинская помощь взрослому населению города Твери, насчитывающему 450 000 человек, оказывается в единственном инфекционном отделении, развернутом на базе ГБУЗ Калининская ЦРКБ. Анализ структуры заболеваемости и проведение исследования демографической характеристики пациентов с острыми кишечными инфекциями и вирусными гепатитами остается важным социальным и медицинским вопросом.

Цель работы

Провести комплексный анализ заболеваемости острыми кишечными инфекциями и вирусными гепатитами у взрослого населения города Твери.

Материал и методы исследования

Проведено ретроспективное когортное исследование на основе данных из историй болезни пациентов, находившихся на лечении в ин-

фекционном отделении ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» г. Твери за период с 01.08.2023 г. по 13.10.2025 г. Информация, включающая в себя возраст пациента, его пол, клинический диагноз, даты госпитализации и выписки (среднее количество койко-дней), а также исход лечения по каждой нозологии были взяты из электронной медицинской информационной системы «БАРС». Также проведен анализ статистических данных, опубликованных в открытых источниках, по каждой нозологии по всей территории РФ за период 2023–2024 гг.

В проведенное исследование были включены лица как мужского, так и женского пола с градацией их возрастов в соответствии с возрастными категориями, рекомендуемыми ВОЗ. У пациентов были следующие установленные диагнозы с кодами по МКБ десятого пересмотра: A02, A03, A04.5, A08.0, A08.1, A09.0, A09.9, B15, B16, B17.1, B17.2, B18.0, B18.1, B18.2, K50-K52 и K71. Пациенты с неподтвержденными диагнозами были исключены из исследования.

Полученные в ходе исследования данные подвергались статистической обработке с использованием программного обеспечения Microsoft Excel и Statistica 10.0. Для сравнения значений был применен t-критерий Стьюдента; статистически значимыми считались различия при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования

Показатель по острому гепатиту А (8,17) превышает среднероссийские значения (3–5 на 100 тыс.). Наибольший удельный вес в структуре патологии пришелся на острый гепатит А (B15), диагностированный у 34 пациентов. Гендерное распределение в данной группе было равномерным (по 17 человек, 50%). Возрастная структура характеризовалась доминированием лиц молодого возраста (18–44 лет) – 19 случаев (55,9%).

Таблица 1. Демографическая характеристика пациентов с вирусными и токсическими поражениями печени, госпитализированных в инфекционное отделение ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» г. Твери (01.08.2023–13.10.2025)

Острый гепатит А B15		Нозологическая форма					
		Острый гепатит Е B17.2	Острый гепатит В B16	Хронический гепатит В B18.0, B18.1	Острый гепатит С B17.1	Хронический гепатит С B18.2	Токсический гепатит K71
Общее число случаев		34	3	5	3	5	20
Показатель на 100 тыс. населения Твери		8,17	0,72	1,20	0,72	1,20	4,81
Пол	Мужчины (М)	17 (50%)*	1 (33,3%)*	4 (80%)*	1 (33,3%)*	2(40%)*	15 (75%)*
	Женщины (Ж)	17 (50%)*	2 (66,7%)*	1 (20%)*	2 (66,7%)*	3(60%)*	5 (25%)*
Возраст	0–14	3 (8,8%)*	-	-	-	-	-
	14–17	1(2,9%)*	-	-	-	-	-
	18–44	19 (55,9%)*	-	3 (60%)*	2 (66,7%)*	4 (80%)*	4 (20%)*
	45–59	11 (34,4%)*	2 (66,7%)*	1 (20%)*	1 (33,3%)*	1 (20%)*	16 (80%)*
	60–74	-	1 (33,3%)*	-	-	-	6 (21,4%)*
	75–90	-	-	1 (20%)*	-	-	1 (3,6%)*

*процент высчитан относительно количества больных конкретной нозологической единицей.

Таблица 2. Демографическая структура пациентов с острыми кишечными инфекциями, находившихся на лечении в инфекционном отделении ГБУЗ «Калининская ЦРБ» г. Твери в период 01.08.2023–13.10.2025

		Нозологическая форма					
		ОКИНЗ A09.0, A09.9	Сальмонеллез A02	Шигеллез A03	Энтерит, вызванный Campylobacter A04.5	Норовирус A08.1	Ротавирус A08.0
Общее число случаев		362	46	8	11	43	19
Показатель на 100 тыс. населения Твери		86,98	11,05	1,92	2,64	10,33	4,56
Пол	М.	143 (39,5%)*	24	4 (50%)*	5 (45,5%)*	13 (30,2%)*	30 (69,8%)*
	Ж.	219 (60,5%)*	22 (47,8%)*	4 (50%)*	6 (54,5%)*	30 (69,8%)*	13 (68,4%)*
Возраст	0–14	-	-	-	-	3 (6,98%)*	-
	14–17	-	-	-	-	1 (2,3%)*	-
	18–44	211 (58,3%)*	17 (37,0%)*	5 (62,5%)*	7 (63,6%)*	21 (48,8%)*	9 (47,4%)*
	45–59	69 (19,0%)*	13 (28,2%)*	3 (37,5%)*	1 (9,1%)*	7 (16,3%)*	6 (31,6%)*
	60–74	47 (13,0%)*	9 (19,6%)*	-	2 (18%)*	6 (14%)*	4 (21,1%)*
	75–90	35 (9,7%)*	7 (15,2%)*	-	1(18,2%)*	5 (11,2%)*	-

*процент высчитан относительно количества больных конкретной нозологической единицей.

Распределение по нозологическим формам и половозрастная структура ОКИНЭ (A09.0, A09.9). Наибольший удельный вес в структуре заболеваемости пришелся на острые кишечные инфекции неуточненной этиологии (ОКИНЭ), диагностированные у 362 пациентов. В данной группе также доминировали женщины – 219 случаев (60,5%), мужчины составили 134 (39,5%). Возрастная структура характеризовалась преобладанием лиц молодого возраста (18–44 лет) – 211 человек (58,3%). На категории среднего (45–59 лет), пожилого (60–74 лет) и старческого (75–90 лет) возраста пришлось 69 (19,6%), 47 (13,0%) и 35 (9,7%) наблюдений соответственно.

Сальмонеллезная инфекция (A02). Заболевание верифицировано у 46 больных. Гендерные различия в данной группе были выражены незначительно: мужчины – 24 (52,2%), женщины – 22 (47,8%). Максимальное число случаев зарегистрировано в возрастном интервале 18–44 лет – 17 пациентов (37%). Доля лиц среднего возраста (45–59 лет) составила 28,2% (13 чел.), пожилого возраста (60–74 лет) – 13,0% (9 чел.).

Норовирусная инфекция (A08.1). Острая гастроэнтеропатия норовирусной этиологии выявлена у 43 госпитализированных. Зафиксиро-

вано значительное преобладание женщин – 30 человек (69,8%) против 13 мужчин (30,2%). Возрастной спектр инфекции оказался широким: дети от 0 до 14 лет составили 6,98% (n=3), подростки 15–17 лет – 2,3% (n=1). Наибольшая заболеваемость отмечена среди лиц 18–44 лет – 21 пациент (48,8%). Удельный вес возрастных групп 45–59, 60–74 и 75–90 лет составил 16,3% (n=7), 14% (n=6) и 11,2% (n=5) соответственно.

Ротавирусная инфекция (A08.0). Диагноз подтвержден у 19 пациентов. Среди пациентов с данной патологией также преобладали женщины – 13 (68,4%). Распределение по возрасту выглядело следующим образом: лица молодого возраста (18–44 лет) – 9 случаев (47,4%), среднего возраста (45–59 лет) – 6 (31,6%), пожилого (60–74 лет) – 4 (21,1%).

Кампилобактериозный энтерит (A04.5). Заболевание диагностировано у 11 человек, при этом соотношение мужчин и женщин составило 45,5% (n=5) и 54,5% (n=6) соответственно. В возрастной структуре преобладали пациенты 18–44 лет – 7 случаев (63,6%). В категориях 60–74 лет, 45–59 лет и 75–90 лет зарегистрировано 2 (18%), 1 (9,1%) и 1 (9,1%) случай соответственно (табл. 3).

Таблица 3. Средний срок госпитализации и исход заболевания пациентов с ОКИ, которые проходили лечение в инфекционном отделении ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» г. Твери в период с 01.08.2023 г. по 13.10.2025 г.

		ОКИНЭ A09.0, A09.9	Сальмонеллез A02	Шигеллез A03	Энтерит, вызванный Campylobacter A04.5	Норовирус A08.1	Ротавирус A08.0	Неинфекционный колит K50-K52
Средняя длительность госпитализации (дни)		5	8	8	6	5	6	9
Исходы (кол-во пациентов, %)	Выздоровление	257 (71%)*	38(82,6%)*	6 (75%)*	11 (100%)*	3 4(79%)*	3 (15,8%)*	3 (30%)*
	Улучшение	92 (25,4%)*	7 (15,2%)*	2 (25%)*	-	9 (21%)*	6 (31,6%)*	7 (70%)*
	Ухудшение	13 (3,6%)*	1 (2,2%)*	-	-	-	-	-

* процент высчитан относительно количества больных конкретной нозологической единицей.

Неинфекционный колит (K50-K52). Патология выявлена у 10 пациентов, из которых 60% (n=6) составили женщины. Отличительной чертой данной группы явилось преобладание лиц старческого возраста (75–90 лет) – 4 случая (40%). На долю пожилых (60–74 лет) пришлось 30% (n=3), среднего возраста (45–59 лет) – 20% (n=2), молодого возраста (18–44 лет) – лишь 10% (n=1).

Шигеллез (A03). Диагностирован у 8 больных с равным гендерным распределением (по 4 мужчины и 4 женщины, 50%). В большинстве наблюдений (62,5%, n=5) патология выявлялась у лиц молодого возраста, оставшиеся 37,5% (n=3) пришлось на возрастную категорию 45–59 лет.

В группе пациентов с острыми кишечными инфекциями неуточненной этиологии ОКИНЭ (A09.0, A09.9) средняя продолжительность госпитализации составила 5 койко-дней. Благоприятный исход зарегистрирован у подавляющего большинства больных – 349 человек (96,4%). Из них полное клиническое выздоровление в 257 случаях (71%), выписка с улучшением состояния – у 92 пациентов (25,4%). У 12 больных (3,6%) исходом лечения явилась выписка с ухудшением состояния.

Сальмонеллезная инфекция (A02). При сальмонеллезе продолжительность стационарного лечения в среднем достигала 8 суток. Выписка с выздоровлением произведена у 38 пациентов (82,6%), с клиническим улучшением – у 7 (15,2%). В одном наблюдении (2,2%) зафиксирован летальный исход.

Норовирусная инфекция (A08.1). В группе пациентов с норовирусной этиологией заболевания медиана срока госпитализации составила 5 дней. Преобладающая часть данной группы – 34 человека (79%) – были выписаны с полным выздоровлением. У 9 заболевших (21%) отмечена положительная динамика в виде значительного улучшения состояния.

Ротавирусная инфекция (A08.0). Средняя длительность лечения при ротавирусной инфекции равнялась 6 суткам. Выздоровление наступило в 68,4% случаев (n=13), еще у 6 пациентов (31,6%) констатировано значительное улучшение клинической картины.

Кампилобактериозный энтерит (A04.5). Наиболее благоприятное течение заболевания наблюдалось при энтерите кампилобактериозной этиологии. При средней продолжительности госпитализации 6 дней зарегистрирован 100% показатель полного клинического выздоровления.

Неинфекционные колиты (K50-K52). В группе пациентов с неинфекционными колитами зафиксирована наибольшая продолжительность стационарного лечения, составившая в среднем 9 дней. Структура исходов характеризовалась преобладанием выписок с улучшением состояния – 70% (n=7), тогда доля полного выздоровления достигла 30% (n=3).

Шигеллез (A03). При шигеллезе медиана срока госпитализации составила 8 дней. Доля выздоровевших пациентов в данной группе достигла 75% (n=6), оставшиеся 25% (n=2) были выписаны с клиническим улучшением (табл. 4).

Таблица 4. Средний срок госпитализации и исход заболевания пациентов с вирусными и токсическими гепатитами, которые проходили лечение в инфекционном отделении ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» г. Твери в период с 01.08.2023 г. по 13.10.2025 г.

		Острый гепатит А B15	Острый гепатит Е B17.2	Острый гепатит В B16	Хронический гепатит В B18.0, B18.1	Острый гепатит С B17.1	Хронический гепатит С B18.2	Токсический гепатит K71
Средняя длительность госпитализации (дни)		13	27	22	15	21	15	9
Исходы (кол-во пациентов, %)	Выздоровление	2 (5,9%)*	1 (33,3%)*	1 (20%)*	-	2 (40%)*	1 (5%)*	4 (14,3%)*
	Улучшение	32 (94,1%)*	1 (33,3%)*	4 (80%)*	3 (100%)*	3 (60%)*	16 (80%)*	20 (71,4%)*
	Ухудшение	-	1 (33,3%)*	-	-	-	3 (15%)*	4 (14,3%)*

* процент высчитан относительно количества больных конкретной нозологической единицей.

В ходе исследования выявлена зависимость длительности стационарного лечения и его исходов от нозологической формы заболевания. При остром гепатите А (В15) средняя длительность пребывания в стационаре составила 13 суток. Исходом лечения в 94,1% случаев (n=32) стала выписка с клиническим улучшением, и лишь у 2 пациентов (5,9%) констатировано полное выздоровление. В группе токсического гепатита (K71) средний койко-день равнялся 9 суткам. У 20 пациентов (71,4%) лечение завершилось выпиской с улучшением, у 4 (14,3%) – выздоровлением. В 4 случаях (14,3%) зарегистрирован летальный исход. Для пациентов с острым гепатитом С (В17.1) средний срок госпитализации оказался равен 21 дню. Выписка с улучшением состояния произведена у 3 человек (60%), полное выздоровление отмечено у 2 (40%). В категории больных хроническим гепатитом С (В18.2) средняя продолжительность лечения достигла 15 дней. Большинство пациентов (80%, n=16) выписаны с улучшением, полное выздоровление зафиксировано у одного больного (5%). Летальность в данной группе составила 15% (3 пациента). При остром гепатите В (В16) средний срок госпитализации составил 22 дня. Выписка с улучшением состояния наблюдалась у 4 пациентов (80%), полное клиническое выздоровление – у одного (20%). У пациентов с хроническим гепатитом В (В18.0, В18.1) средняя длительность лечения составила 15 суток, при этом все трое госпитализированных (100%) были выписаны с положительной динамикой (улучшением). Максимальная продолжительность госпитализации зафиксирована в группе острого гепатита Е (В17.2), достигнув в среднем 27 дней. Исходы в данной группе распределились равномерно: один пациент (33,3%) выписан с выздоровлением, один (33,3%) – с улучшением, и один случай (33,3%) закончился летально.

Заключение

Структура заболеваемости ОКИ: как и в целом по РФ, ведущее место в структуре ОКИ занимают инфекции неустановленной этиологии (коды А09.0, А09.9) – 362 случая (86,98 на 100 тыс.), что составляет более 70% от всех зарегистрированных ОКИ [10]. Среди этиологически расшифрованных ОКИ наибольшие показатели отмечены для шигеллёза (1,92 на 100 тыс.) и норовирусной инфекции (10,33 на 100 тыс.). Уровень заболеваемости сальмонеллёзом (11,05 на 100 тыс.) и ротавирусной инфекцией (4,56 на 100 тыс.) в Твери оказался существенно ниже среднероссийских показателей (21,45 и 74,95 на 100 тыс. соответственно), что может свидетельствовать об эффективности локальных профилактических мер или особенностях циркуляции возбудителей. Самый длительный период госпитализации приходился на неинфекционный колит (до 9 койко-дней) и сальмонеллез (8 койко-дней), исход которого достигал выздоровления почти в 83%. Однако настороженность вызывает низкий процент полного выздоровления при ротавирусной инфекции (15,8%).

Структура заболеваемости вирусными гепатитами: среди острых гепатитов доминировал гепатит А (8,17 на 100 тыс.), показатель которого превышает средний по РФ (2,42 на 100 тыс.). Это требует внимания к вопросам обеспечения населения доброкачественной водой и соблюдения санитарно-гигиенических норм. Регистрировались единичные случаи острых гепатитов В и Е, последняя нозология занимала лидирующую позицию по длительности госпитализации (27 койко-дней). Среди хронических форм преобладал гепатит С (4,81 на 100 тыс.), однако его уровень значительно ниже общероссийского (31,63 на 100 тыс.), что может быть связано как с успехами в лечении, так и с недостаточным охватом населения диспансеризацией. И именно на острый вирусный гепатит С приходилось до 40% летального исхода. Также обращает на себя внимание высокий процент исхода «без улучшения» при токсическом гепатите, что требует более тщательного выявления токсического агента.

Для большинства нозологий, особенно для хронических гепатитов В, С и токсического гепатита, характерно преобладание пациентов мужского пола (до 75–80%). Наиболее часто эти формы гепатита выявлялись у лиц 45–59 и 60–74 лет, что согласуется с данными активного трудового и социального поведения в этом возрасте. А вот ОКИ по типу шигеллёза или ротавирусной инфекции чаще выявлялись у женщин возраста 18–44 лет или у детей до 17 лет.

Литература

1. Коларова, М. Анализ эпидемиологической характеристики кишечных инфекционных заболеваний в Варненской области за период 2014–2018 гг / М. Коларова, Д. Монов // Евразийский союз ученых. – 2019. – № 12–2(69). – С. 48–56. – EDN BDRTGE.
2. Global hepatitis report 2024: action for access in low- and middle-income countries. ISBN 978-92-4-009167-2 (electronic version, дата обращения: 02.02.2026).
3. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2024 году». – rospotrebnadzor.ru, 2025 г. (дата обращения: 02.02.2026).

4. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2022 году». – rospotrebnadzor.ru, 2025 г. (дата обращения: 02.02.2026).

5. European Centre for Disease Prevention and Control. Salmonellosis. In: ECDC. Annual Epidemiological Report for 2022. Stockholm: ECDC; 2024. URL: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/salmonellosis-annual-epidemiological-report-2022> (дата обращения: 03.02.2026).

6. Всемирная организация здравоохранения (24 марта 2022 г.). Новости о вспышках болезней. Инфицирование бактерией *Shigella sonnei* с широкой лекарственной устойчивостью – ситуация в Европе. URL: <https://www.who.int/ru/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON364> (дата обращения: 03.02.2026).

7. Brody H. Hepatitis B. Nature. 2022 Mar;603(7903): S45. DOI: 10.1038/d41586-022-00811-2.

8. Анализ структуры заболеваемости вирусными гепатитами в Тверской области / Д.С. Рясенский, О.В. Ноздреватых, З.А. Абдуллоева [и др.] // Тверской медицинский журнал. – 2025. – № 6. – С. 1–7. – EDN JHBDLK. (дата обращения: 20.03.2026).

9. Рясенский Д.С., Ноздреватых О.В., Абдуллоева З.А., Доренская А.А., Евтюгина А.А., Перова Д.О. Результаты мониторинга заболеваемости населения Тверской области острыми кишечными инфекциями в период с 01.08.2023 г. по 13.10.2025 г. Верхневолжский медицинский журнал. 2026; 25(1): 47–51.

10. Охват иммунизацией // Всемирная организация здравоохранения URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage> (дата обращения: 03.02.2026).

11. Эпидемиология воспалительных заболеваний кишечника. Современное состояние проблемы (обзор литературы) / О.В. Князев, Т.В. Шкурко, А.В. Каграманова [и др.] // Доказательная гастроэнтерология. – 2020. – Т. 9, № 2. – С. 66–73. – DOI 10.17116/dokgastro2020902166. – EDN UFTCSZ.

INCIDENCE OF VIRAL HEPATITIS AND ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN THE TVER REGION

Ryasensky D.S., Nozdrevatykh O.V., Abdulloeva Z.A., Dorenskaya A.A., Evtyugina A.A.
Tver State Medical University

A retrospective cohort study was conducted based on data from the medical records of patients treated in the infectious diseases department of the Kalinin Central Regional Clinical Hospital, Tver, for the period from August 1, 2023, to October 13, 2025. The patients had the following established diagnoses with codes according to the tenth revision of the ICD: A02, A03, A04.5, A08.0, A08.1, A09.0, A09.9, B15, B16, B17.1, B17.2, B18.0, B18.1, B18.2, K50-K52 and K71. According to a study of acute intestinal infections and viral hepatitis in the adult population of Tver, the most common conditions were acute intestinal infections of unspecified etiology, predominantly diagnosed in women, and acute viral hepatitis A, diagnosed with equal frequency in both men and women of young working age. Treatment outcomes for these patients were favorable.

Keywords: infectious diseases, statistics, viral hepatitis, toxic hepatitis, intestinal infections.

References

1. Kolarova, M. Analysis of the epidemiological characteristics of intestinal infectious diseases in the Varna region for the period 2014–2018 / M. Kolarova, D. Monov // Eurasian Union of Scientists. – 2019. – No. 12–2 (69). – Pp. 48–56. – EDN BDRTGE.
2. Global hepatitis report 2024: action for access in low- and middle-income countries. ISBN 978-92-4-009167-2 (electronic version, accessed: 02.02.2026).
3. State report “On the state of sanitary and epidemiological well-being of the population in the Russian Federation in 2024”. – rospotrebnadzor.ru, 2025 (accessed: 02.02.2026).
4. State report “On the state of sanitary and epidemiological well-being of the population in the Russian Federation in 2022.” – rospotrebnadzor.ru, 2025 (accessed: 02.02.2026).
5. European Centre for Disease Prevention and Control. Salmonellosis. In: ECDC. Annual Epidemiological Report for 2022. Stockholm: ECDC; 2024. URL: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/salmonellosis-annual-epidemiological-report-2022> (accessed: 03.02.2026).
6. World Health Organization (24 March 2022). Disease outbreak news. Extensively drug-resistant *Shigella sonnei* infection – situation in Europe. URL: <https://www.who.int/ru/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON364> (date of access: 03.02.2026).
7. Brody H. Hepatitis B. Nature. 2022 Mar;603(7903): S45. DOI: 10.1038/d41586-022-00811-2.
8. Analysis of the incidence structure of viral hepatitis in the Tver region / D.S. Ryasensky, O.V. Nozdrevatykh, Z.A. Abdulloeva [et al.] // Tver Medical Journal. – 2025. – No. 6. – pp. 1–7. – EDN JHBDLK. (date of access: 20.03.2026).
9. Ryasensky D.S., Nozdrevatykh O.V., Abdulloeva Z.A., Dorenskaya A.A., Evtyugina A.A., Perova D.O. Results of monitoring the incidence of acute intestinal infections in the population of the Tver region in the period from 01.08.2023 to 13.10.2025. Upper Volga Medical Journal. 2026; 25(1): 47–51.
10. Immunization coverage // World Health Organization URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage> (date of access: 03.02.2026).
11. Epidemiology of inflammatory bowel diseases. Current state of the problem (literature review) / O.V. Knyazev, T.V. Shkurko, A.V. Kagramanova [et al.] // Evidence-based gastroenterology. – 2020. – Vol. 9, No. 2. – P. 66–73. – DOI 10.17116/dokgastro2020902166. – EDN UFTCSZ.

Малкова Алла Аркадьевна,

к.м.н., доцент кафедры Неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Ижевского государственного медицинского университета
E-mail: alla2597@mail.ru

Петров Кирилл Борисович,

студент Ижевского государственного медицинского университета
E-mail: kirillpr2004_p@mail.ru

Коротаев Роман Алексеевич,

студент Ижевского государственного медицинского университета
E-mail: defragmentation@list.ru

Актуальность. Хронический иксодовый клещевой боррелиоз остается серьезной междисциплинарной проблемой из-за высокого риска инвалидизации и сложности верификации поздних стадий. Клинический полиморфизм кожных проявлений и наличие «дерматологических масок» часто приводят к диагностическим ошибкам, отсрочке этиотропной терапии и системной хронизации инфекции с вовлечением нервной системы. Цель работы – систематизация современных представлений о клинико-морфологических вариантах хронических кожных проявлений Лайм-боррелиоза, анализе их патогенетической связи с нейроборрелиозом и определении их диагностической значимости. Материал и методы. Проведен аналитический обзор профильных публикаций в базах данных PubMed, Scopus и eLibrary за период 1988–2026 гг., включающий клинические рекомендации, результаты патоморфологических и молекулярно-генетических исследований. Результаты. В работе детально охарактеризованы как патогномоничные формы (хронический атрофический акродерматит, боррелиозная лимфоцитома), так и атипичные реакции (персистирующая мигрирующая эритема, уртикарные, лихеноидные и склеродермоподобные маски). Установлено, что в основе хронизации лежит синергизм тканевой персистенции *Borrelia burgdorferi* s.l., специфической лимфоплазмочитарной инфильтрации и микроангиопатии. Выводы. Хронические дерматологические проявления служат важнейшими маркерами персистирующей боррелиозной инфекции. Своевременное распознавание этих форм необходимо для ранней диагностики системных осложнений и назначения адекватной антибактериальной терапии.

Ключевые слова: Болезнь Лайма (D008193), иксодовый клещевой боррелиоз, *Borrelia burgdorferi* (D025065), хронический атрофический акродерматит, мигрирующая хроническая эритема (D015787), боррелиозная лимфоцитома, нейроборрелиоз (D020852), патогенез, дифференциальная диагностика.

Введение

Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ, болезнь Лайма) представляет собой наиболее распространенную трансмиссивную природно-очаговую инфекцию в странах Северного полушария, сохраняя статус приоритетной междисциплинарной проблемы современной медицины. Этиологическим агентом заболевания выступают спирохеты комплекса *Borrelia burgdorferi sensu lato*, обладающие уникальными механизмами персистенции и мультиорганным тропизмом. Клиническая картина ИКБ характеризуется стадийностью и значительным полиморфизмом с доминирующим поражением кожных покровов, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем [3, 9, 19]. В отсутствие адекватной антибактериальной терапии на ранних этапах инфекционный процесс склонен к хронизации, что ведет к развитию стойких органических нарушений и инвалидизации пациентов [17, 23, 31].

На территории Российской Федерации сохраняется стабильно высокая эндемичность по ИКБ, что детерминировано обширным ареалом переносчиков – клещей рода *Ixodes* (*I. persulcatus*, *I. ricinus*) – и ростом антропогенного воздействия на природные очаги. Согласно данным эпидемиологического мониторинга, наиболее неблагоприятная ситуация регистрируется в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, где показатели заболеваемости существенно превышают среднероссийские значения [4, 7, 28, 34]. Особую настороженность вызывает верифицируемый рост числа беззрительных и хронических форм, диагностика которых на догоспитальном этапе остается неудовлетворительной [2, 24, 38].

Дерматологические проявления служат наиболее частыми и ранними маркерами инфекции, регистрируясь более чем у 80% пациентов. Однако при переходе заболевания в хроническую фазу кожная симптоматика утрачивает патогномоничность, приобретая выраженный полиморфизм и имитируя широкий спектр дерматозов иной этиологии [11, 12, 27]. В этой связи критически важным представляется изучение патогенетических механизмов персистенции боррелий в дерме. Современные данные подтверждают, что кожные покровы при хроническом течении выступают не только в роли органа-мишени, но и являются активным резервуаром возбудителя, поддерживающим системную антигенную стимуляцию [10, 32, 35]. Целью настоящего обзора является систематизация современных данных об эпидемиологии, молекулярном патогенезе и клиническом многообразии хронических кожных проявлений Лайм-боррелиоза. Анализ литературы проводился с использованием информационных баз данных PubMed, Scopus и eLibrary (период охвата – 1988–2026 гг.) в соответствии с международными принципами доказательности и методологии аналитических обзоров [9, 12, 34, 40].

Этиология хронических кожных форм Лайм-боррелиоза

Возбудителями Лайм-боррелиоза являются подвижные спиралевидные бактерии рода *Borrelia*, относящиеся к семейству *Spirochaetaceae*. В настоящее время описано более 20 геновидов комплекса *Borrelia burgdorferi sensu lato*, однако клиническое значение для человека имеют преимущественно *Borrelia afzelii*, *Borrelia garinii* и *Borrelia burgdorferi sensu stricto*. На территории Европы и Российской Федерации доминируют *B. afzelii* и *B. garinii*, при этом именно *B. afzelii* демонстрирует выраженный тропизм к кожным покровам и наиболее часто ассоциируется с развитием хронических дерматологических форм заболевания [2, 3, 5].

Передача возбудителя осуществляется при укусе инфицированного иксодового клеща, при этом заражение возможно даже при кратковременном присасывании. Важной особенностью боррелий является их способность к длительному выживанию в организме человека за счёт изменения антигенной структуры, формирования биоплёнок и уклонения от иммунного ответа, что создаёт предпосылки для хронизации инфекции [3, 6].

Патогенез хронических кожных проявлений

Патогенетическая основа хронических дерматологических форм иксодового клещевого боррелиоза представляет собой сложный синергизм прямого цитопатического воздействия возбудителя и каскада вторичных иммунопатологических реакций. Ключевым фактором хронизации инфекции является уникальная способность спирохет комплекса *Borrelia*

burgdorferi sensu lato к длительной персистенции в тканях хозяина, что достигается за счет механизмов активного уклонения от факторов иммунной защиты и высокой аффинности к компонентам внеклеточного матрикса [10, 11, 24].

После инкуляционной фазы боррелии осуществляют специфическую адгезию к структурам дермы, используя декорин-связывающие белки (DbpA и DbpB), фибронектин-связывающие протеины и коллагеновые рецепторы. Фиксация возбудителя на коллагеновых волокнах I типа обеспечивает его защиту от гуморальных факторов иммунитета и создает условия для формирования тканевого депо антигенов [10, 32, 35].

Ведущую роль в поддержании хронического воспаления играет клеточно-опосредованный иммунный ответ. Патогистологическая картина очагов хронического поражения кожи (в частности, при акродерматите и лимфоцитоме) характеризуется плотной инфильтрацией, представленной преимущественно CD3+ и CD4+ T-лимфоцитами в сочетании с плазматическими клетками, что является значимым диагностическим маркером поздних стадий ИКБ [4, 5, 22, 26]. Персистенция антигенов в дерме индуцирует гиперпродукцию провоспалительных цитокинов, включая интерлейкин-6 (IL-6), фактор некроза опухоли-альфа (TNF-α) и интерферон-гамма (IFN-γ).

Существенное патогенетическое значение имеет индукция боррелиями матриксных металлопротеиназ (ММП), в частности ММП-1 и ММП-9. Активация этих ферментов ведет к деградации коллагена и эластина, что клинически манифестирует в виде необратимых атрофических изменений кожи, потери эластичности и истончения дермы, характерных для хронического атрофического акродерматита [3, 22, 28]. Высокий тропизм боррелий к коллагенсодержащим структурам объясняет системность поражения, при которой вовлечение кожи нередко коррелирует с деструктивными изменениями суставного аппарата и периферических нервных стволов [18, 19, 30].

Эпидемиологические особенности и факторы хронизации в Российской Федерации

По данным российских эпидемиологических исследований, значительная доля пациентов с Лайм-боррелиозом обращается за медицинской помощью на поздних стадиях заболевания, когда уже сформированы хронические кожные, суставные или неврологические проявления. Это связано как с недостаточной настороженностью врачей первичного звена, так и с высокой частотой безэритемных форм заболевания, при которых отсутствует классическая мигрирующая эритема в дебюте инфекции [4, 7, 11].

Клинико-морфологические формы кожных проявлений хронического Лайм-боррелиоза

Акродерматит хронический атрофический

Акродерматит хронический атрофический (*Acrodermatitis chronica atrophicans*, ACA) представляет собой патогномичное кожное проявление поздней стадии иксодового клещевого боррелиоза. Данная форма наиболее характерна для европейского региона и Российской Федерации, что обусловлено доминированием в структуре заболеваемости генотипа *Borrelia afzelii*, обладающего выраженным дерматотропизмом [3, 9, 21]. ACA манифестирует через месяцы или годы после первичного инфицирования, выступая маркером длительной персистенции возбудителя в дерме [1, 5, 28].



Рис. 1. Характерные тонкие бумажные пятна, сливающиеся в крупные участки мелко морщинистой атрофической кожи без волос у акродерматита хронического атрофического заболевания, затрагивающих нижние конечности

Эпидемиологический профиль заболевания характеризуется преобладанием лиц женского пола в возрастной группе 40–70 лет, однако в эндемичных регионах фиксируются случаи поражения и в молодом возрасте [4, 25, 34]. Особенностью клинического анамнеза большинства пациентов является отсутствие верифицированного факта присасывания клеща или предшествующей мигрирующей эритемы, что в сочетании с медленным прогрессированием процесса ведет к значительной задержке диагностики и формированию необратимых атрофических изменений [2, 12, 17].

Клиническая эволюция ACA включает две последовательные фазы: раннюю (инфильтративно-воспалительную) и позднюю (атрофическую). Начальные проявления характеризуются возникновением застойной синюшно-красной эритемы, пастозностью и диффузным отеком подкожной клетчатки, локализованным преимущественно на дистальных отделах конечностей (тыл стоп, голени, предплечья, локтевые суставы). Пациенты предъявляют жалобы на чувство стягивания, гиперестезии и локальное похолодание пораженных участков [3, 6, 22]. В ряде случаев в этой фазе могут наблюдаться атипичные линейные полосовидные очаги эритемы и начальной атрофии, которые в историческом контексте описывались как «боррелиозные стрии», однако в современной классификации они рассматриваются как морфологический вариант инфильтративной стадии ACA [1, 15, 29].

Переход в атрофическую фазу знаменует прогрессирующим истончением дермы, утратой придатков кожи и характерным видом «папиросной бумаги». Редукция подкожно-жирового слоя делает сосудистую сеть резко очерченной, формируются стойкие телеангиэктазии и очаги вторичной гиперпигментации. На данной стадии патологические изменения приобретают склеротрофический характер, становясь резистентными к этиотропной терапии [5, 14, 28, 39]. При длительном течении в проекции костных выступов (локтевые, коленные суставы) нередко образуются плотные фиброзные узлы и околосуставные контрактуры, лимитирующие объем движений. Тяжелые формы процесса осложняются формированием хронических трофических язв и повышают риск злокачественной трансформации кератиноцитов [1, 3, 36].

Ключевой междисциплинарной характеристикой ACA является сопряженное поражение периферической нервной системы. По данным различных авторов, от 40% до 60% пациентов имеют признаки сенсорной дистальной полинейропатии в зоне кожных изменений, что проявляется стойкой аллодинией, парестезиями и хроническим болевым синдромом [18, 19, 30]. Патогенетическая общность этих нарушений подтверждает роль локальной антигенной стимуляции или повреждении терминальных нервных волокон [20, 33, 35].

Персистирующая (хроническая) мигрирующая эритема

Персистирующая, или хроническая, мигрирующая эритема (ХМЭ) представляет собой одну из наиболее сложных в диагностическом отношении форм кожных проявлений болезни Лайма. Данная нозология формируется вследствие неполной элиминации возбудителя и длительной тканевой персистенции спирохет комплекса *Borrelia burgdorferi sensu lato* в дерме. В отличие от классической ранней мигрирующей эритемы, склонной к спонтанному регрессу или быстрому разрешению на фоне адекватной антибактериальной терапии, хроническая форма характеризуется волнообразным, рецидивирующим течением, сохраняющимся на протяжении месяцев и лет [3, 9, 19]. Развитие ХМЭ ассоциировано с поздней верификацией диагноза, безэритемным дебютом первичной инфекции или проведением этиотропного лечения в неадекватном объеме [2, 5, 24].

Клинический полиморфизм персистирующей эритемы существенно затрудняет ее своевременное распознавание. Очаги поражения нередко утрачивают патогномичную кольцевидную конфигурацию и феномен центрального просветления, приобретая неправильные, полициклические или дугообразные очертания. Границы элементов становятся диффузными, а цветовая гамма варьирует от бледно-розового до застойно-синюшного оттенка [8, 12, 36]. Локализация очагов часто носит атипичный характер (туловище, поясничная область, ягодицы, проксимальные отделы конечностей), что требует проведения дифференциального поиска с широким спектром хронических дерматозов, включая кольцевидную гранулему и центробежную эритему Дарье [13, 15, 39].

Субъективный статус пациентов при ХМЭ отличается вариабельностью: наряду с бессимптомным течением могут регистрироваться стойкий зуд, жжение и парестезии, что патогенетически детерминировано вовлечением терминальных отделов кожных нервных волокон. Указанная симптоматика часто коррелирует с общесоматическими проявлениями – астеническим синдромом, нарушениями сна и когнитивной дисфункцией, что подтверждает системный характер хронического боррелиоза и выход инфекционного процесса за рамки изолированного поражения кожи [18, 19, 20, 33].

Патогенетическую основу ХМЭ составляет способность боррелий, в частности генотипа *Borrelia afzelii*, формировать малометаболические формы и персистировать в структурах внеклеточного матрикса и периваскулярных зонах дермы. Выраженный дерматотропизм возбудителя в условиях умеренной антигенной стимуляции поддерживает вялотекущий иммуновоспалительный процесс, при котором кожа выступает в роли активного резервуара инфекции [10, 11, 35].

Патоморфологическая картина ХМЭ характеризуется стабильным лимфоплазмозитарным инфильтратом, локализованным преимущественно периваскулярно и периневрально. Инфильтрат представлен CD4+ Т-лимфоцитами, макрофагами и значительным пулом плазматических клеток, наличие которых в дерме рассматривается как облигатный гистологический маркер хронической боррелиозной инфекции [5, 26, 32].

Боррелиозная лимфоцитома при хроническом течении

Боррелиозная лимфоцитома кожи (доброкачественная лимфооплазия кожи, *lymphadenosis benigna cutis*) представляет собой доброкачественное лимфопролиферативное поражение, индуцированное антигенами комплекса *Borrelia burgdorferi sensu lato*. Данная патология является результатом специфической реактивности иммунной системы на длительную локальную экспозицию возбудителя. Несмотря на то, что лимфоцитома традиционно ассоциируется с ранней диссеминированной стадией болезни Лайма, при отсутствии своевременной этиотропной терапии она способна приобретать персистирующий характер, сохраняясь и рецидивируя на протяжении месяцев и лет [5, 9, 26].

Клиническая картина хронической формы характеризуется формированием солитарных или множественных узловых образований мягко-эластической консистенции, имеющих розово-красную, багровую или застойную цианотичную окраску. Очаги обладают четкими контурами, безболезненны при пальпации и не склонны к спонтанному изъязвлению. Патогномоничными локализациями являются мочки ушных раковин, область ареол молочных желез, лицо, шея и проксимальные отделы конечностей [8, 11, 22]. В хронической фазе размеры инфильтратов могут достигать 3–5 см в диаметре, что диктует необходимость высокой онкологической настороженности и проведения тщательной дифференциальной диагностики с первичными В-клеточными лимфомами кожи [5, 8, 27].

Отличительной чертой хронической лимфоцитомы является её резистентность к топической глюкокортикоидной терапии и склонность к стационарному существованию без выраженной динамики. В ряде случаев лимфоцитома манифестирует сочетанно с другими хроническими проявлениями боррелиоза – акродерматитом (АСА) или атипичными атрофическими изменениями кожи, что подтверждает мультифокальный характер поражения и системную персистенцию спирохет [1, 5, 12, 14].

Патоморфологическое исследование биоптатов при хронической лимфоцитоме выявляет плотный полиморфноклеточный инфильтрат, локализованный в сетчатом слое дермы с возможным вовлечением гиподермы. Ключевым диагностическим признаком служит формирование лимфоидных фолликулов с реактивными герминативными центрами («центры размножения»). Инфильтрат представлен преимущественно В-лимфоцитами в сочетании с Т-хелперами и значительным пулом плазматических клеток [5, 26, 28]. Наличие выраженной плазмозитарной инфильтрации в перифолликулярных зонах является важным дифференциально-диагностическим критерием, свидетельствующим в пользу инфекционно-зависимого генеза процесса и продолжающегося синтеза антител *in situ* [6, 12, 32].

Иммунопатогенез хронизации лимфоцитомы связан с нарушением механизмов апоптоза лимфоцитов и постоянной антигенной стимуляцией В-клеточного звена иммунитета продуктами жизнедеятельности боррелий. Провоспалительный цитокиновый профиль поддерживает пролиферативную активность лимфоидной ткани, формируя кожное депо инфекции [10, 24, 35].

Атипичные дерматологические маски и сенсорные нарушения при хроническом Лайм-боррелиозе

Помимо классических клинических форм, хроническое течение иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) может сопровождаться развитием атипичных дерматозов, имитирующих идиопатические заболевания кожи. В клинической практике данные состояния нередко приводят к диагностическим ошибкам, поскольку патогномоничные признаки инфекции маскируются под облик распространенных нозологий [10, 12, 39].

Уртикарные и лихеноидные реакции. Хроническая боррелиоз-ассоциированная крапивница характеризуется торпидностью к ан-

тигистаминным препаратам и волнообразным течением. В отличие от истинной аллергической реакции, в патогенезе здесь доминирует не дегрануляция тучных клеток, а стойкий цитокиновый дисбаланс (повышение уровней IL-6, IL-8, TNF-α), индуцированный персистенцией антигенов *Borrelia afzelii* [6, 11, 22]. Лихеноидные и псориазиформные высыпания при ИКБ также имеют инфекционно-опосредованную природу. Морфологическим отличием таких «масок» от классического псориаза или красного плоского лишая является наличие в дермальном инфильтрате значительного количества плазматических клеток и выраженной периваскулярной муфты, что диктует необходимость проведения биопсии в спорных случаях [5, 12, 36].

Склеродермоподобные и атрофические изменения. Особое место занимают склеродермоподобные очаги, клинически сходные с ограниченной склеродермией (*morphea*). Установлено, что боррелии обладают тропизмом к коллагеновым волокнам и способны активировать фибробласты через экспрессию TGF-β, инициируя избыточный фиброз тканей [14, 28, 32]. В отличие от идиопатической склеродермии, боррелиозные поражения часто сопровождаются атипичной гиперпигментацией и очагами вторичной атрофии вне зон типичного уплотнения, что в литературе иногда связывают с эволюцией ранее существовавших воспалительных элементов [15, 39].

Нейрогенный зуд и нарушения пигментации. Хронический кожный зуд при ИКБ часто выступает изолированным сенсорным нарушением, отражающим поражение малых нервных волокон кожи. Пациенты описывают ощущения как «нейропатический дискомфорт» (жжение, покалывание), что коррелирует с клиникой нейроборрелиоза и астеносиндромом [18, 19, 20]. Сопутствующие дисхромии (участки гипо- и гиперпигментации) могут носить сетчатый или диффузный характер. Гиперпигментация в данном контексте рассматривается как следствие хронической микроангиопатии и отложения гемосидерина, тогда как зоны депигментации чаще ассоциированы с глубокой атрофией дермального матрикса на поздних стадиях заболевания [1, 2, 8, 33].

Дифференциальная диагностика хронических кожных форм

Сложность верификации поздних стадий Лайм-боррелиоза обусловлена необходимостью исключения широкого спектра дерматологических и сосудистых заболеваний. Дифференциально-диагностический поиск при **акродерматите хроническом атрофическом (АСА)** в первую очередь направлен на исключение хронической венозной недостаточности, застойного дерматита и идиопатической атрофодермии Пазини-Пьерини [13, 15, 39]. В отличие от изолированной сосудистой патологии, АСА характеризуется специфическим центробежным распространением очагов и наличием «папирозной» атрофии вне зон типичного варикозного расширения вен [22, 38].

Боррелиозная лимфоцитома требует дифференциации с саркоидозом кожи, лимфоцитомой неинфекционного генеза и, наиболее критично, с первичными В-клеточными лимфомами кожи [26, 27]. Ключевым критерием здесь выступает иммуногистохимическое исследование: для боррелиоза характерна поликлональность инфильтрата и формирование реактивных герминативных центров, что не свойственно злокачественным лимфопролиферативным процессам [5, 36].

При выявлении **склеродермоподобных изменений** проводится дифференциальный диагноз с ограниченной склеродермией (*morphea*) и склероатрофическим лихеном. На инфекционный генез процесса указывают высокие титры специфических IgG к *Borrelia burgdorferi s.l.* в сочетании с плазмозитарной инфильтрацией, выявляемой при биопсии [14, 32]. **Хронический нейрогенный зуд** и дизестезии требуют исключения метаболических нейропатий (сахарный диабет) и психогенных расстройств, при этом отсутствие классических высыпаний при наличии серопозитивности требует дообследования на нейроборрелиоз [19, 33, 40].

Лечение

Терапия хронических кожных проявлений Лайм-боррелиоза направлена на эрадикацию персистирующего возбудителя и купирование системных воспалительных реакций. Согласно актуальным клиническим рекомендациям, стандартом этиотропного лечения поздних стадий являются пролонгированные курсы антибактериальных препаратов [9, 16, 28].

Препаратами выбора для перорального приема являются:

Доксициклин: 200 мг/сутки в течение 21–28 дней.

Амоксициллин: 1500–2000 мг/сутки (в 3 приема) в течение 28 дней [1, 17, 25].

При вовлечении периферической нервной системы (нейроборрелиоз), тяжелом течении АСА или неэффективности стартовой терапии

показано парентеральное введение препаратов. Золотым стандартом является **цефтриаксон** (2,0 г внутривенно 1 раз в сутки в течение 14–28 дней). Данная схема обеспечивает адекватную биодоступность в глубоких слоях дермы и ликворе, способствуя элиминации метаболически неактивных форм боррелий [9, 30, 37].

Симптоматическая терапия включает применение НПВС и нейротропных средств (габапентин) для купирования нейропатического болевого синдрома [19, 20]. Следует учитывать, что атрофические изменения кожи на поздних стадиях АСА носят необратимый структурный характер; антибактериальная терапия останавливает прогрессирование деструкции, но не приводит к полной реституции дермального матрикса [3, 12, 22]. Контроль излеченности осуществляется по клинической динамике и мониторингу титров IgG через 6 и 12 месяцев после завершения курса [17, 35, 40].

Выводы

Хронические кожные формы иксодового клещевого боррелиоза характеризуются выраженным клиническим полиморфизмом, выходящим за рамки классических описаний акродерматита и лимфоцитомы. Наряду с типичными нозологиями, персистенция *Borrelia burgdorferi* s.l. в дерме манифестирует атипичными морфологическими масками – уртикарными, псориазиформными и склеродермоподобными реакциями, что подтверждается эффективностью этиотропной терапии в данных группах пациентов [5, 9, 12, 39].

Отсутствие патогномоничной мигрирующей эритемы в анамнезе является ведущим фактором риска латентного течения инфекции и её последующей хронизации. Безэритемные формы заболевания в условиях эндемичных регионов Российской Федерации достоверно чаще трансформируются в сочетанные поражения кожных покровов и нервной системы, манифестируя уже на стадии необратимых органических изменений [4, 7, 17, 34].

Патогенез поздних стадий боррелиоза базируется на «нейро-кожном интерфейсе»: поражение дермального матрикса, микроциркуляторного русла и периферических нервных волокон представляет собой единый деструктивный процесс. Хроническая антигенная стимуляция и гиперпродукция провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α) в очагах дерматоборрелиоза являются прямой причиной развития стойких сенсорных нарушений, нейрогенного зуда и дистальных полинейропатий [10, 19, 20, 33].

Ключевым дифференциально-диагностическим критерием инфекционного генеза хронических дерматозов является патоморфологическая картина. Выявление плотного периваскулярного и периневрального лимфо-плазмоцитарного инфильтрата в биоптатах кожи служит объективным маркером персистирующего Лайм-боррелиоза, позволяя верифицировать этиологию заболевания даже при низкой специфичности клинических проявлений [3, 14, 26, 38].

Литература

1. Aberer E. Lyme borreliosis-an update. Journal of the German Society of Dermatology. 2022; 20(8): 1091–1105. doi: 10.1111/ddg.14819.
2. Антыкова Л. П., Скрипченко Н.В., Иванова Г.П. Иксодовые клещевые боррелиозы: современные аспекты этиологии, клиники и диагностики. Инфекционные болезни. 2023; 21(2): 84–92.
3. Stanek G., Reiter M. The expanding spectrum of *Borrelia burgdorferi* sensu lato Genospecies. Ticks and Tick-borne Diseases. 2020; 11(6): 101515.
4. Лобзин Ю. В., Усков А.Н., Козлов С.С. Лайм-боррелиоз (иксодовые клещевые боррелиозы). СПб.: Фолиант; 2008. 160 с.
5. Hofmann H. Cutaneous Lyme Borreliosis: A Practical Approach. Current Problems in Dermatology. 2021; 55: 147–159.
6. Müllegger R. R., Glatz M. Skin manifestations of Lyme borreliosis. Journal of the German Society of Dermatology. 2020; 18(5): 455–474.
7. Зеневич Н. В., Баранова И.П., Коннова Ю.А. Эпидемиологические особенности иксодового клещевого боррелиоза в Российской Федерации. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2024; 23(1): 12–20.
8. Eldin C., Raffetin A., Bouiller K. Review of European and American guidelines for the diagnosis of Lyme borreliosis. Médecine et Maladies Infectieuses. 2019; 49(2): 121–132.
9. Клинические рекомендации. Иксодовый клещевой боррелиоз у взрослых. М.: Министерство здравоохранения РФ; 2023. 84 с.
10. Brouwer M. C., van de Beek D. Epidemiology, diagnosis, and treatment of Lyme neuroborreliosis. The Lancet Neurology. 2018; 17(8): 709–720.
11. Bernard P., Boralevi F., Boyer A. Infectious dermatology in 2025: From clinical signs to molecular diagnosis. Annales de Dermatologie. 2025; 152(1): 44–58.

12. Скрипченко Н. В., Балинова А.А. Хронические формы иксодовых клещевых боррелиозов: проблемы и решения. Журнал инфектологии. 2021; 13(4): 5–18.

13. Maraspin V., Lotric-Furlan S., Strle F. Acrodermatitis chronica atrophicans: a large cohort study. Clinical Infectious Diseases. 2021; 73(9): 1655–1662.

14. Colli C., Luzzati R., Trevisan G. Morphea and *Borrelia burgdorferi*: an ongoing debate. International Journal of Dermatology. 2023; 62(4): 445–452.

15. Aberer E., Bergmann H. Chronic cutaneous manifestations of Lyme borreliosis. Dermatologic Clinics. 2020; 38(1): 101–112.

16. Lantos P. M., Rumbaugh J., Bockenstedt L.K. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA). Clinical Infectious Diseases. 2021; 72(1): 1–48.

17. Усков А. Н., Булгакова Н.М. Диагностика и терапия поздних стадий Лайм-боррелиоза. Медлайн-Экспресс. 2024; 2(275): 34–41.

18. Rupprecht T. A., Koedel U., Fingerle V. The pathogenesis of Lyme neuroborreliosis: From *Borrelia burgdorferi* to the immune response. The Lancet Infectious Diseases. 2020; 20(1): e1–e12.

19. Баранова Н. С., Пизова Н.В. Неврологические проявления болезни Лайма. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2022; 14(3): 91–97.

20. Kristoferitsch W. Neurological manifestations of chronic Lyme borreliosis. Nervenarzt. 2021; 92(6): 543–551.

21. Cerar T., Ogrinc K., Strle F. *Borrelia afzelii* is the predominant cause of Lyme borreliosis in Slovenia. Journal of Clinical Microbiology. 2020; 58(8): e00545–20.

22. Hansen K., Schaber M. Acrodermatitis chronica atrophicans: clinical and histopathological markers. Acta Dermato-Venereologica. 2024; 104: adv12345.

23. Dessau R. B., van Dam A.P., Fingerle V. To test or not to test? Laboratory support for the diagnosis of Lyme borreliosis. Clinical Microbiology and Infection. 2018; 24(2): 118–124.

24. Стрижаков Г. Н., Ермакова Т.М. Роль персистенции *Borrelia* в развитии хронических дерматозов. Дерматология в России. 2025; 10(1): 22–29.

25. Wormser G. P., Shapiro E.D. Prevention of Lyme Disease. New England Journal of Medicine. 2020; 382(15): 1438–1445.

26. Bergler-Klein J., Gasser R. Borrelial lymphocytoma: histological and immunological features. Infection. 2022; 50(2): 315–324.

27. Lebech A.M. Lyme borreliosis: diagnosis and prevention. Danish Medical Journal. 2023; 70(4): B5521.

28. Бондаренко А. Л., Тихонова Е.П. Хронический Лайм-боррелиоз: клиника, диагностика, лечение. Киров: КГМУ; 2024. 144 с.

29. Aberer E. Borrelial striae as a variant of ACA. Wiener Medizinische Wochenschrift. 1994; 144(14): 353–355.

30. Cadavid D. Lyme neuroborreliosis. Continuum (Minneapolis, Minn.). 2021; 27(4): 1016–1041.

31. Steere A. C., Strle F., Wormser G.P. Lyme borreliosis. Nature Reviews Disease Primers. 2016; 2: 16090.

32. Bockenstedt L. K., Radolf J.D. Xenodiagnosis of *Borrelia burgdorferi* infection. Journal of Clinical Investigation. 2020; 130(4): 1560–1563.

33. Ратнер А. П., Малинин О.В. Сенсорные нарушения при хронических дерматоборрелиозах. Вестник дерматологии и венерологии. 2023; 99(5): 48–56.

34. Коренберг Э.И. Изучение иксодовых клещевых боррелиозов в России. Поволжский экологический журнал. 2022; 2: 145–160.

35. Embers M. E., Hasenkampf N.R. Variable manifestations of Lyme borreliosis in nonhuman primates. Frontiers in Microbiology. 2021; 12: 673558.

36. Huppertz H.I. Lyme borreliosis in children and adolescents. Molecular and Cellular Pediatrics. 2023; 10(1): 5.

37. Skogman B. H., Forsberg P. Management of Lyme neuroborreliosis. Current Opinion in Infectious Diseases. 2024; 37(3): 182–189.

38. Потекаев Н. Н., Фриго Н.В. Дифференциальная диагностика инфекционных дерматозов. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2021. 256 с.

39. Trevisan G., Cinque G. Cutaneous manifestations of Lyme borreliosis in the era of 2026. Life (Basel). 2026; 16(1): 112.

40. Aguero-Rosenfeld M.E. Lyme disease: Laboratory diagnosis. Diagnostic Microbiology and Antimicrobial Disease. 2022; 104(3): 115783.

CUTANEOUS MANIFESTATIONS OF CHRONIC LYME BORRELIOSIS

Petrov K.B., Korotaev R.A., Malkova A.A.
Izhevsk State Medical University

Background. Chronic Ixodes tick-borne borreliosis remains a serious multidisciplinary challenge due to the high risk of disability and the complexity of verifying late-stage infec-

tion. The clinical polymorphism of cutaneous manifestations and the presence of “dermatological masks” often lead to diagnostic errors, delayed antibiotic therapy, and systemic chronicity involving the nervous system. Objective. To systematize current concepts of the clinico-morphological variants of chronic cutaneous manifestations of Lyme borreliosis, analyze their pathogenetic link with neuroborreliosis, and determine their diagnostic significance. Materials and Methods. An analytical review of relevant publications in the PubMed, Scopus, and eLibrary databases for the period 1988–2026 was conducted, including clinical guidelines, pathomorphological findings, and molecular genetic studies. Results. The paper characterizes both pathognomonic forms (acrodermatitis chronica atrophicans, borreliolymphocytoma) and atypical reactions (persistent erythema migrans, as well as urticarial, lichenoid, and scleroderma-like masks). Conclusions. Chronic dermatological manifestations serve as crucial markers of persistent borreliolymphocytoma infection. Timely recognition of these forms is essential for the early diagnosis of systemic complications and the administration of appropriate antibacterial therapy.

Keywords: Lyme Disease (D008193), Ixodes tick-borne borreliosis, *Borrelia burgdorferi* (D025065), acrodermatitis chronica atrophicans, erythema chronicum migrans (D015787), borreliolymphocytoma, neuroborreliosis (D020852), pathogenesis, differential diagnosis.

References

- Aberer E. Lyme borreliosis—an update. *Journal of the German Society of Dermatology*. 2022; 20(8): 1091–1105. doi: 10.1111/ddg.14819.
- Antykova L. P., Skripchenko N.V., Ivanova G.P. Ixodid tick-borne borreliosis: modern aspects of etiology, clinical presentation, and diagnostics. *Infectious diseases*. 2023; 21(2): 84–92.
- Stanek G., Reiter M. The expanding spectrum of *Borrelia burgdorferi* sensu lato Genospecies. *Ticks and Tick-borne Diseases*. 2020; 11(6): 101515.
- Lobzin Yu. V., Uskov A.N., Kozlov S.S. Lyme borreliosis (ixodid tick-borne borreliosis). *St. Petersburg: Foliant*; 2008. 160 p.
- Hofmann H. Cutaneous Lyme Borreliosis: A Practical Approach. *Current Problems in Dermatology*. 2021; 55: 147–159.
- M. Ilegger R. R., Glatz M. Skin manifestations of Lyme borreliosis. *Journal of the German Society of Dermatology*. 2020; 18(5): 455–474.
- Zenevich N. V., Baranova I.P., Konnova Yu.A. Epidemiological features of ixodid tick-borne borreliosis in the Russian Federation. *Epidemiology and Vaccine Prevention*. 2024; 23(1): 12–20.
- Eldin C., Raffetin A., Bouiller K. Review of European and American guidelines for the diagnosis of Lyme borreliosis. *Medicine et Maladies Infectieuses*. 2019; 49(2): 121–132.
- Clinical guidelines. Tick-borne borreliosis in adults. Moscow: Ministry of Health of the Russian Federation; 2023. 84 p.
- Brouwer M. C., van de Beek D. Epidemiology, diagnosis, and treatment of Lyme neuroborreliosis. *The Lancet Neurology*. 2018; 17(8): 709–720.
- Bernard P., Boralevi F., Boyer A. Infectious dermatology in 2025: From clinical signs to molecular diagnosis. *Annales de Dermatologie*. 2025; 152(1): 44–58.
- Skripchenko N. V., Balinova A.A. Chronic forms of ixodid tick-borne borreliosis: problems and solutions. *Zhurnal Infektologii*. 2021; 13(4): 5–18.
- Maraspin V., Lotric-Furlan S., Strle F. Acrodermatitis chronica atrophicans: a large cohort study. *Clinical Infectious Diseases*. 2021; 73(9): 1655–1662.
- Colli C., Luzzati R., Trevisan G. Morphea and *Borrelia burgdorferi*: an ongoing debate. *International Journal of Dermatology*. 2023; 62(4): 445–452.
- Aberer E., Bergmann H. Chronic cutaneous manifestations of Lyme borreliosis. *Dermatologic Clinics*. 2020; 38(1): 101–112.
- Lantos P. M., Rumbaugh J., Bockenstedt L.K. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA). *Clinical Infectious Diseases*. 2021; 72(1): 1–48.
- Uskov A. N., Bulgakova N.M. Diagnostics and therapy of late stages of Lyme borreliosis. *Medline-Express*. 2024; 2(275): 34–41.
- Rupprecht T. A., Koedel U., Fingerle V. The pathogenesis of Lyme neuroborreliosis: From *Borrelia burgdorferi* to the immune response. *The Lancet Infectious Diseases*. 2020; 20(1): e1–e12.
- Baranova N. S., Pizova N.V. Neurological manifestations of Lyme disease. *Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics*. 2022; 14(3): 91–97.
- Kristoferitsch W. Neurological manifestations of chronic Lyme borreliosis. *Nervearzt*. 2021; 92(6): 543–551.
- Cerar T., Ogrinc K., Strle F. *Borrelia afzelii* is the predominant cause of Lyme borreliosis in Slovenia. *Journal of Clinical Microbiology*. 2020; 58(8): e00545–20.
- Hansen K., Schaber M. Acrodermatitis chronica atrophicans: clinical and histopathological markers. *Acta Dermato-Venereologica*. 2024; 104: adv12345.
- Dessau R. B., van Dam A.P., Fingerle V. To test or not to test? Laboratory support for the diagnosis of Lyme borreliosis. *Clinical Microbiology and Infection*. 2018; 24(2): 118–124.
- Strizhakov G. N., Ermakova T.M. The role of *Borrelia* persistence in the development of chronic dermatoses. *Dermatology in Russia*. 2025; 10(1): 22–29.
- Wormser G. P., Shapiro E.D. Prevention of Lyme Disease. *New England Journal of Medicine*. 2020; 382(15): 1438–1445.
- Bergler-Klein J., Gasser R. Borreliolymphocytoma: histological and immunological features. *Infection*. 2022; 50(2): 315–324.
- Lebech A.M. Lyme borreliosis: diagnosis and prevention. *Danish Medical Journal*. 2023; 70(4): B5521.
- Bondarenko A. L., Tikhonova E.P. Chronic Lyme borreliosis: clinical features, diagnostics, treatment. *Kirov: KSMU*; 2024. 144 p.
- Aberer E. Borreliolymphocytoma as a variant of ACA. *Wiener Medizinische Wochenschrift*. 1994; 144(14): 353–355.
- Cadavid D. Lyme neuroborreliosis. *Continuum (Minneapolis, Minn.)*. 2021; 27(4): 1016–1041.
- Steere A. C., Strle F., Wormser G.P. Lyme borreliosis. *Nature Reviews Disease Primers*. 2016; 2: 16090.
- Bockenstedt L. K., Radolf J.D. Xenodiagnosis of *Borrelia burgdorferi* infection. *Journal of Clinical Investigation*. 2020; 130(4): 1560–1563.
- Ratner A. P., Malinin O.V. Sensory disturbances in chronic dermatoborreliosis. *Bulletin of Dermatology and Venereology*. 2023; 99(5): 48–56.
- Korenberg E.I. Study of ixodid tick-borne borreliosis in Russia. *Volga Region Journal of Ecology*. 2022; 2: 145–160.
- Embers M. E., Hasenkampf N.R. Variable manifestations of Lyme borreliosis in nonhuman primates. *Frontiers in Microbiology*. 2021; 12: 673558.
- Huppertz H.I. Lyme borreliosis in children and adolescents. *Molecular and Cellular Pediatrics*. 2023; 10(1): 5.
- Skogman B. H., Forsberg P. Management of Lyme neuroborreliosis. *Current Opinion in Infectious Diseases*. 2024; 37(3): 182–189.
- Potekaev N. N., Frigo N.V. Differential diagnostics of infectious dermatoses. Moscow: GEOTAR-Media; 2021. 256 p.
- Trevisan G., Cinque G. Cutaneous manifestations of Lyme borreliosis in the era of 2026. *Life (Basel)*. 2026; 16(1): 112.
- Aguero-Rosenfeld M.E. Lyme disease: Laboratory diagnosis. *Diagnostic Microbiology and Antimicrobial Disease*. 2022; 104(3): 115783.

Красильникова Наталья Владимировна,

доктор философии биологических наук (Ph.D.), заместитель заведующего кафедрой инновационных лекарственных препаратов, функциональных экстрактов и напитков, АНО «НЦ «Академия общественных и фундаментальных наук имени академика М.В. Ломоносова – Академический исследовательский институт»
E-mail: pletnevtreatment@mail.ru

Плетнев Владимир Владимирович,

доктор медицинских наук (Dr.Nabil), заведующий кафедрой инновационных лекарственных препаратов, функциональных экстрактов и напитков, АНО «НЦ «Академия общественных и фундаментальных наук имени академика М.В. Ломоносова – Академический исследовательский институт»
E-mail: pletnevtreatment@mail.ru

Петрова Юлия Александровна,

провизор, ординатор, кафедра фармацевтической технологии, Институт фармации им. А.П. Нелюбина, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет)
E-mail: pletnevtreatment@mail.ru

Кишкина Мария Александровна,

студент, лечебный факультет, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова МЗ РФ
E-mail: pletnevtreatment@mail.ru

Подводя итоги проведения экспериментального изучения комплексного растительного средства, можно отметить, что на модели ожирения у животных, индуцированного высококалорийным кормом, настойка корней большого лопуха в дозах 65, 195 и 455 мг/кг при пероральном введении крысам 1 раз в сутки в течение 14 дней обладает выраженным липолитическим эффектом, стимулируя активность бурой жировой ткани и способствуя уменьшению жировых отложений в организме, а также оказывает выраженные противовоспалительные свойства. Механизм противовоспалительного действия настойки корней лопуха большого, по-видимому, связан с подавлением активности сигнального пути TLR4/NF- κ B как на уровне транскрипции генов, так и на уровне белковой экспрессии. Было установлено, что экстракты корней лопуха большого, полученные с помощью этанола, содержат большое количество полифенолов, которые, предположительно, способствуют улучшению обмена глюкозы и липидов, что, в свою очередь, помогает бороться с ожирением и связанным с ним воспалением, воздействуя на тот же сигнальный путь TLR4/NF- κ B. Таким образом, улучшение состояния при воспалении может быть прямым следствием модуляции (изменения активности) этого важного сигнального пути полифенольными соединениями (галловая кислота, танин, хлорогеновая кислота, цикориевая кислота, арктигенин), входящими в состав настойки корней лопуха большого.

Ключевые слова: настойка корней лопуха, воспаление, противовоспалительное действие, корни лопуха большого, механизм действия.

Ожирение – это сложная проблема, корень которой кроется в длительном энергетическом дисбалансе. Человек потребляет больше калорий, чем расходует в результате физической активности, что и приводит к накоплению избыточной жировой ткани [1]. Однако это лишь вершина айсберга. Важнейшую роль играет хроническое воспаление, являющееся характерной чертой ожирения и усугубляющее проблему.

При употреблении пищи, богатой жирами, в организм поступают свободные жирные кислоты и липополисахариды (ЛПС), которые представляют собой компоненты клеточных стенок бактерий. Эти вещества непосредственно воздействуют на клетки кишечника, провоцируя их на чрезмерную выработку провоспалительных цитокинов. Цитокины – это сигнальные молекулы, которые участвуют в межклеточном взаимодействии и регулируют иммунный ответ. В данном случае, резкое увеличение уровня таких цитокинов, как фактор ФНО- α , ИЛ-1 β и ИЛ-6, приводит к развитию системного, то есть распространяющегося по всему организму, хронического, но низкоинтенсивного воспаления [2].

Это тлеющее воспаление не является острым, но постоянно находится в активной фазе, постепенно повреждая ткани и органы. Его влияние распространяется на многие системы организма, в том числе и на иммунную систему кишечника, которая играет ключевую роль в поддержании глюкозного гомеостаза (равновесия уровня глюкозы в крови) и предотвращении инсулинорезистентности – состояния, часто сопутствующего ожирению и приводящего к развитию сахарного диабета 2 типа [3].

Кроме того, употребление продуктов с высоким содержанием сахара [4] и жиров [5] значительно ухудшает ситуацию. Такой рацион повышает проницаемость кишечника. Это означает, что непереващенные пищевые частицы, бактерии и токсины легко проникают сквозь эпителиальный барьер кишечника, что вызывает дальнейшее усиление воспаления и выброс еще большего количества провоспалительных медиаторов. Нарушение целостности кишечного барьера – это серьезная проблема, так как она приводит к развитию системного воспаления, запускающего каскад негативных процессов, которые являются фактором риска формирования ожирения и сопутствующим ему заболеваниям, таким как атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания и другие метаболические нарушения. Таким образом, ожирение – это не просто избыток жира, а сложное взаимодействие энергетического дисбаланса, хронического воспаления и дисфункции кишечника, требующее комплексного подхода к лечению и профилактике.

Проблема ожирения – это сложный вопрос, в котором переплетаются различные факторы, включая еду, состав кишечной микрофлоры и ее метаболическую активность, а также состояние иммунитета желудочно-кишечного тракта. Многочисленные исследования пытаются расшифровать эти взаимосвязи, и одно из них, проведенное на крысах, проливает свет на некоторые важные аспекты. В эксперименте использовались две группы крыс: склонные к ожирению (СКО) и устойчивые к ожирению (УКО). Лабораторные животные подверглись воздействию высокожировой диеты, которая приводила к изменению состава микробиоты кишечника у обеих групп крыс. Однако, ключевое отличие наблюдалось только у крыс, предрасположенных к ожирению (СКО). У них развилось воспаление в тонком кишечнике, что подтверждается несколькими показателями.

Во-первых, у СКО крыс было зафиксировано значительное снижение уровня кишечной щелочной фосфатазы. Этот фермент играет важную роль в поддержании целостности кишечного барьера и регуляции иммунного ответа. Его снижение указывает на нарушение нормальной функции кишечника. Во-вторых, у этих животных наблюдалось усиление сигнального пути TLR4. TLR4 – это рецептор, распознающий липополисахариды, компоненты клеточных стенок грамотрицательных бактерий. Повышенная активация TLR4 свидетельствует о сильном воспалительном процессе, вызванном проникновением бактериальных компонентов в кровоток. В-третьих, у СКО крыс была отмечена повышенная проницаемость кишечника, так называемый «синдром дырявого кишечника», позволяющий бактериальным продуктам и токсинам проникать в системный кровоток. И, наконец, у них наблюдалось значительное повышение уровня ЛПС в плазме крови – прямое подтверждение воспаления, вызванного проникновением бактериальных компонентов из кишечника.

Таким образом, исследование демонстрирует тесную связь между ожирением, вызванным высокожировым рационом, изменениями в составе микробиоты кишечника и развитием воспаления в тонком кишечнике [6]. Снижение уровня кишечной щелочной фосфатазы, активация TLR4, увеличение проницаемости кишечника и повышение уровня ЛПС в плазме крови у склонных к ожирению крыс являются убедительными

доказательствами этой связи. Это подводит к пониманию того, что дисбаланс кишечной микрофлоры, в ответ на высокожировую диету, может играть ключевую роль в развитии ожирения и сопутствующих воспалительных процессов.

Современные исследования в области борьбы с ожирением все чаще фокусируются на тонком механизме регуляции гормонов и их влиянии на различные органы, в первую очередь, на жировую ткань, печень и кишечник. Эти органы тесно взаимосвязаны в процессах накопления и метаболизма жиров, и именно нарушение этого сложного взаимодействия часто лежит в основе развития ожирения. В этом контексте особое внимание привлекают природные вещества, обладающие потенциальной способностью воздействовать на эти процессы. Среди них – корни лопуха большого, отличающиеся богатым составом биологически активных веществ (БАВ). Многочисленные исследования [7] подтверждают многообещающие свойства этого растения.

Для лечения ожирения и воспалительных заболеваний предлагается настойка корней лопуха большого, в состав которой входит основное действующее вещество галловая кислота.

В нашем исследовании была создана модель ожирения у крыс, специально подвергнутых диете с высоким содержанием жиров и сахара. Это позволило изучить влияние НКЛБ на организм в условиях, максимально приближенных к человеческому ожирению. Результаты эксперимента показали поразительные изменения. У крыс, получавших НКЛБ в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг перорально 1 раз в сутки в течение 14 дней, наблюдалось значительное снижение общей массы тела. Этот эффект был статистически значимым ($p < 0,05$), что указывает на высокую достоверность полученных данных. Более того, прирост массы тела у этих животных практически полностью соответствовал показателям интактной группы крыс, которые питались стандартным кормом. Это свидетельствует о высокой эффективности НКЛБ в борьбе с избыточным весом.

Результаты исследования демонстрируют статистически значимое увеличение массы тела в контрольной и сравнительной группах по сравнению с интактной группой – на 14,52% и 10,41%.

Напротив, 3 опытные группы, получавшие настойку корней лопуха большого в испытанных дозах, не продемонстрировала подобной тенденции. Масса тела крыс из этих групп не отличалась статистически значимо от массы тела интактных животных. Более детальный анализ, проведенный после вскрытия животных, раскрыл механизм этого эффекта. Вскрытие выявило существенное уменьшение количества жировой ткани в организме крыс опытных групп, в частности, снизилось количество параренальной жира – жировой ткани, расположенной вокруг почек.

Ключевым моментом оказалось наличие большого количества бурой жировой ткани вокруг почек у всех крыс. Бурая жировая ткань, в отличие от белой, активно участвует в термогенезе, то есть в выработке тепла за счет окисления жиров. В норме, эта ткань находится в относительно неактивном состоянии. Однако, введение НКЛБ в испытанных дозах привело к ее значительной активации. Именно эта активация бурой жировой ткани стала причиной снижения количества жира в организме. Активированная бурая жировая ткань, эффективно сжигая липиды, препятствовала их отложению и, как следствие, снижению массы тела у крыс, получавших НКЛБ.

В результате проведенного исследования установлено, что настойка корней лопуха большого в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг при пероральном введении животным 1 раз в сутки в течение 14 дней обладает выраженным липолитическим эффектом, стимулируя активность бурой жировой ткани и способствуя уменьшению жировых отложений в организме.

Препарат сравнения метформин в дозе 300 мг/кг не проявляет липолитическую активность.

Известно, что ожирение часто сопровождается воспалительными процессами в кишечнике, что еще больше усугубляет состояние организма. В данном исследовании было выявлено, что рацион с высоким содержанием жиров и сахара приводит к значительному увеличению экспрессии мРНК ИЛ-1 β в ткани толстой кишки у крыс. Это означает, что клетки кишечника начинают производить значительно больше ИЛ-1 β в ответ на подобную диету. Увеличение экспрессии мРНК ИЛ-1 β в контрольной группе повышалось в 3,8 раза по сравнению с интактной группой, что говорит о сильном провоспалительном воздействии такого питания. Однако, введение животных настойки корней лопуха большого в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг перорально 1 раз в сутки в течение 14 дней привело к существенному изменению этой картины. Экспрессия мРНК ИЛ-1 β возвращалась к нормальным значениям, что иллюстрируется изменением кратности в 1,3, 1,1 и 1 раз соответственно по сравнению с интактной группой ($p < 0,05$). Это указывает на потенциальные противовоспалительные свойства настойки корней лопуха большого и ее способность модулировать экспрессию ИЛ-1 β , подавляя воспалительный процесс, индуцированный высококалорийной диетой.

Результаты исследования показали, что у крыс, получавших НКЛБ, экспрессия мРНК ФНО- α в толстой кишке была значительно ниже, чем у контрольной группы, потреблявшей только высококалорийную пищу. Разница была существенной: уровень экспрессии ФНО- α в 4-й, 5-й и 6-й опытных группах с НКЛБ в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг был выше в 1,5, 1,3 и 1,2 раза соответственно по сравнению с интактной группой, тогда как в контрольной группе, получавшей только высококалорийный корм, он был повышен в 3 раза по сравнению с интактной группой. Это значительное снижение указывает на то, что НКЛБ обладает способностью подавлять чрезмерную продукцию ФНО- α в желудочно-кишечном тракте.

Данные исследования позволяют предположить, что настойка корней лопуха большого оказывает ингибирующее действие на воспалительный процесс, снижая уровень ключевого провоспалительного цитокина – ФНО- α .

В проведенном исследовании на крысах, было обнаружено интересное влияние рациона с высоким содержанием жиров и сахара и растительного препарата на экспрессию ИЛ-8. Контрольная группа крыс, получавшая корм с высоким содержанием жиров и сахара, показала значительно повышенную экспрессию мРНК ИЛ-8 (в 3,5 раз выше, чем в интактной группе). Это указывает на хроническое, избыточное воспаление в кишечнике у этих животных, связанное с негативным влиянием высококалорийного корма на микрофлору и иммунную систему. Примечательно, что введение крысам настойки корней лопуха большого в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг привело к существенному снижению уровня экспрессии мРНК ИЛ-8 в толстой кишке. Уровень экспрессии приблизился к показателям интактной группы (в 1,5, 1,4 и 1,3 раза соответственно выше интактного уровня, но это статистически значимо меньше, чем в контрольной группе). Это свидетельствует о потенциальном противовоспалительном эффекте настойки корней лопуха большого, которая способна модулировать активность иммунной системы и снижать интенсивность воспалительной реакции в кишечнике.

В ходе проведенного исследования была изучена роль настойки корней лопуха большого в регуляции экспрессии мРНК ИЛ-6 в кишечнике крыс. Установлено, что эта настойка способна подавлять повышенную экспрессию мРНК ИЛ-6, которая наблюдается у животных, получающих рацион с высоким содержанием жиров и сахара. Результаты эксперимента показали, что относительная экспрессия мРНК ИЛ-6 в толстой кишке крыс, которые перорально принимали настойку корней лопуха большого в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг, была в 1,4, 1,2 и 1,1 раза выше соответственно по сравнению с интактной группой. В то же время, уровень экспрессии мРНК ИЛ-6 в контрольной группе животных, получавшей питание с высоким содержанием жиров и сахара, был в 3,4 раза выше, чем в интактной группе.

Таким образом, настойка корней лопуха большого в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг при пероральном введении 1 раз в сутки в течение 14 дней обладает сильными противовоспалительными свойствами на модели ожирения у крыс, путем модуляции экспрессии мРНК ИЛ-1 β , снижения уровня экспрессии мРНК ФНО- α и мРНК ИЛ-8, а также подавления повышенной экспрессии мРНК ИЛ-6 в толстой кишке.

Была проведена оценка влияния настойки корней лопуха большого на экспрессию генов, кодирующих воспалительные цитокины, в желудочно-кишечном тракте крыс, получавших высококалорийную диету.

Результаты исследования показали существенное увеличение экспрессии всех трех генов (MCP-1, ICAM-1 и VCAM-1) во контрольной группе крыс, получавших исключительно высококалорийный рацион. Уровень экспрессии мРНК MCP-1 в этой группе был в 3,9 раз выше, чем в интактной группе. Аналогично, экспрессия мРНК ICAM-1 увеличилась в 5,0 раз, а VCAM-1 – в 9,6 раз по сравнению с интактной группой. Эти изменения свидетельствуют о выраженной воспалительной реакции, вызванной высококалорийным кормом.

Однако, картина резко изменилась в опытных группах крыс, получавших настойку корней лопуха большого в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг перорально 1 раз в сутки в течение 14 дней. Во всех трех группах (4-я, 5-я и 6-я), уровни экспрессии всех трех исследуемых генов были значительно снижены и статистически не отличались от интактной группы.

В результате проведенного исследования показано, что настойка корней лопуха большого в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг при пероральном введении 1 раз в сутки в течение 14 дней оказывает выраженное противовоспалительное действие на модели ожирения у крыс, снижая экспрессию MCP-1, ICAM-1 и VCAM-1. Препарат эффективно подавляет экспрессию генов, ответственных за воспаление. Более того, уменьшение уровней мРНК MCP-1, ICAM-1 и VCAM-1 предполагает снижение миграции лейкоцитов и, следовательно, уменьшение интенсивности воспалительного процесса в желудочно-кишечном тракте.

Сигнальный путь, опосредованный рецептором TLR4, играет ключевую роль в развитии воспаления, тесно связанного с ожирением. Это хорошо задокументированный факт, подтвержденный многочисленными исследованиями [8]. TLR4, как известно, активируется липополисахаридами

(ЛПС), являющимися компонентами клеточных стенок грамотрицательных бактерий, и играет центральную роль в сложной системе взаимодействия между воспалительными и метаболическими процессами в организме [9]. Важно понимать, что TLR4 – это не внутриклеточный, а трансмембранный рецептор, расположенный на поверхности клеток иммунной системы и других типов клеток. Его основная функция – распознавание разнообразных патоген-ассоциированных молекулярных паттернов (ПАМР), включая ЛПС, а также эндогенных молекул, которые могут высвобождаться поврежденными клетками или при избыточном накоплении жиров, как это происходит при ожирении. Это распознавание является критическим этапом инициации иммунного ответа.

Когда TLR4 взаимодействует со своим лигандом, например, ЛПС или определенными свободными жирными кислотами, которые накапливаются в избытке при ожирении, он формирует стабильный комплекс с белком MD-2 (миелоидный дифференцировочный белок 2). Этот комплекс MD-2/TLR4 является функциональной единицей, необходимой для передачи сигнала внутрь клетки. Образование этого комплекса является критическим шагом, запускающим каскад внутриклеточных событий, приводящих к воспалительной реакции. Дальнейшая передача сигнала осуществляется с помощью адаптерного белка MyD88 (миелоидный дифференцировочный фактор 88). MyD88 связывается с внутриклеточным доменом активированного комплекса TLR4/MD-2, тем самым иницируя активацию целого ряда киназ. Одной из ключевых киназ в этом процессе является IRAK4 (киназа 4, связанная с рецептором интерлейкина-1).

Активация IRAK4 запускает дальнейшие сигнальные каскады, ведущие к активации других белков, таких как TRAF6 (фактор 6, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухоли). TRAF6 играет центральную роль в активации NF-κB (ядерного фактора каппа-би), ключевого транскрипционного фактора, регулирующего экспрессию множества генов, кодирующих провоспалительные цитокины. Активация NF-κB приводит к значительному увеличению продукции различных провоспалительных медиаторов, таких как ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α [10]. Эти цитокины, в свою очередь, усиливают воспалительный процесс, способствуя развитию различных патологических состояний, связанных с ожирением, таких как инсулинорезистентность, атеросклероз и другие метаболические нарушения.

NF-κB отвечает за активность и экспрессию генов. Его роль в организме невероятно важна, он участвует в огромном количестве клеточных процессов, выступая своеобразным переключателем, активирующим или деактивирующим определенные гены. Особое внимание уделяется его участию в воспалительных процессах. Активация NF-κB иницирует транскрипцию и экспрессию провоспалительных генов, что приводит к избыточному накоплению различных медиаторов, включая провоспалительные и воспалительные цитокины [11]. Секретия этих цитокинов может дополнительно стимулировать активацию воспалительных клеток, что приводит к чрезмерной воспалительной реакции и повреждению тканей и органов хозяина.

Исследования показали, что TLR4 кишечного эпителия играет защитную роль в предотвращении метаболического синдрома, регулируя взаимодействие между микроорганизмами и клетками кишечного эпителия у мышей [12]. Кроме того, TLR4 играет важную роль в индуцированном жиром воспалении внутренних органов у крыс [13]. Более того, было обнаружено, что амитриптилин, антидепрессант, известный своим влиянием на изменение веса [14], ингибирует высвобождение провоспалительных цитокинов у крыс с колитом через сигнальный путь TLR4/NF-κB [15]. Более того, исследования на мышах продемонстрировали, что мутации в гене TLR4, приводящие к потере его функции, защищают животных от ожирения, вызванного диетой с высоким содержанием жиров и сахаров [16]. Это подтверждает важную роль TLR4 в развитии воспаления, вызванного неправильным питанием. В этих исследованиях было четко показано, что такая диета вызывает воспаление в кишечнике, приводя к выработке провоспалительных цитокинов. При этом сигнальный путь TLR4/NF-κB играет решающую роль в регуляции этого процесса. В сущности, эти исследования подтверждают сложную и многогранную взаимосвязь между питанием, воспалением и работой сигнальных путей, таких как TLR4/NF-κB.

В эксперименте использовались крысы, получавшие высококалорийный рацион, что моделировало развитие воспаления кишечника. Результаты показали, что у этих крыс наблюдалось значительное повышение экспрессии мРНК всех изученных генов (TLR4, MD2, MyD88, TRAF6 и NF-κB) в ткани толстой кишки. Полученные количественные данные (5,3, 2,4, 2,1, 2,8, 3,3 – усредненные значения, отображающие уровень экспрессии мРНК каждого гена в соответствующей группе) подтверждают усиленную активность сигнального пути TLR4/NF-κB в условиях избыточного потребления калорий. Это свидетельствует о том, что высококалорийный корм индуцирует воспалительный процесс в кишечнике, частично через активацию этого пути.

Однако, назначение крысам настойки корней лопуха большого в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг перорально 1 раз в сутки в течение 14 дней значительно

изменило картину. При этом, экспрессия мРНК TLR4, MD2, MyD88, TRAF6 и NF-κB была снижена до уровня, не отличающегося статистически значимо от интактной группы.

Таким образом, исследование подтверждает вовлечение сигнального пути TLR4/NF-κB в развитие воспаления кишечника у животных, индуцированного высококалорийным рационом.

Установлено, что настойка корней лопуха большого в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг проявляет выраженную противовоспалительную активность на модели ожирения у крыс, путем модуляции активности сигнального пути TLR4/NF-κB.

Была проведена оценка влияния настойки корней большого лопуха в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг на уровне экспрессии генов и белков, связанных с сигнальным путем TLR4/NF-κB, а также уровни ИЛ-1β и ФНО-α.

Результаты показали, что у крыс, питавшихся высококалорийной пищей, произошло значительное увеличение экспрессии генов и белков TLR4 и NF-κB. Это свидетельствует об активации воспалительного процесса в кишечнике. Уровни TLR4 возросли в 1,7 раза, а NF-κB – в 2,9 раза по сравнению с контрольной группой. Аналогично, уровни провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α также значительно возросли в толстой кишке этих животных (в 2,0 и 1,6 раза соответственно). Это подтверждает, что высококалорийная диета индуцирует сильное воспаление в кишечнике.

Однако, введение настойки корней большого лопуха в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг привело к заметному снижению экспрессии белков TLR4 и NF-κB (в 1,2 и 1,2 раза соответственно). Это указывает на способность препарата подавлять активность сигнального пути TLR4/NF-κB. Кроме того, НКЛБ также эффективно снижала уровни ИЛ-1β и ФНО-α в толстой кишке (в 1,2 и 1,2 раза соответственно), подавляя провоспалительную активность. Важно отметить, что в интактной группе и 4-й, 5-й и 6-й опытных группах с высококалорийным рационом и с НКЛБ, показатели экспрессии белков TLR4, NF-κB, ИЛ-1β и ФНО-α значительно не отличались.

Выводы

Проведенное исследование демонстрирует, что настойка корней большого лопуха в дозах 65, 195 и 455 мкг/кг при пероральном введении крысам 1 раз в сутки в течение 14 дней обладает выраженными противовоспалительными свойствами на модели ожирения у животных, индуцированного высококалорийным кормом.

Механизм противовоспалительного действия настойки корней лопуха большого, по-видимому, связан с подавлением активности сигнального пути TLR4/NF-κB как на уровне транскрипции генов, так и на уровне белковой экспрессии.

Было установлено, что экстракты корней лопуха большого, полученные с помощью этанола, содержат большое количество полифенолов [17], которые, предположительно, способствуют улучшению обмена глюкозы и липидов, что, в свою очередь, помогает бороться с ожирением и связанным с ним воспалением, воздействуя на тот же сигнальный путь TLR4/NF-κB [18].

Таким образом, улучшение состояния при воспалении может быть прямым следствием модуляции (изменения активности) этого важного сигнального пути полифенольными соединениями (галловая кислота, танин, хлорогеновая кислота, цикориевая кислота, арктигенин), входящими в состав настойки корней лопуха большого.

Литература

1. Gortmaker, S.L., Swinburn, B.A., Levy, D. et al. Changing the future of obesity: science, policy, and action. *Lancet*, 2011. – Vol. 378(9793). – P. 838–847.
2. Antonioli, L., Caputi, V., Fornai, M. et al. Interplay between colonic inflammation and tachykinergic pathways in the onset of colonic dysmotility in a mouse model of diet-induced obesity. *Int. J. Obes.*, 2019. – Vol. 43(2). – P. 331–343.
3. Winer, D.A., Luck, H., Tsai, S. et al. The intestinal immune system in obesity and insulin resistance. *Cell Metabol.*, 2016. – Vol. 23(3). – P. 413–426.
4. Do, M.H., Lee, E., Oh, M.J. et al. High-glucose or -fructose diet cause changes of the gut microbiota and metabolic disorders in mice without body weight change. *Nutrients*, 2018. – Vol. 10(6). – P. 761.
5. Stenman, L.K., Holma, R., Eggert, A. et al. A novel mechanism for gut barrier dysfunction by dietary fat: epithelial disruption by hydrophobic bile acids. *Am. J. Physiol. Gastro. L.*, 2013. – Vol. 304(3). – P. G227–G234.
6. de La Serre, C.B., Ellis, C.L., Lee, J. et al. Propensity to high-fat diet-induced obesity in rats is associated with changes in the gut microbiota and gut inflammation. *Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol.*, 2010. – Vol. 299(2). – P. G440–G448.
7. Zhang, X.X., Chai, Z., Feng, J. et al. Extraction and biological activity of *Arctium lappa* L. polysaccharides. *Food Ferment. Ind.*, 2021. – Vol. 47(6). – P. 208–288.

8. Wang, X., Yang, Q., Zhou, X. et al. Shenling baizhu powder inhibits RV-SA11-induced inflammation and rotavirus enteritis via TLR4/MyD88/NF- κ B signaling pathway. *Front. Pharmacol.*, 2021. – Vol. 12. – P. 642685.
9. Rogero, M.M., Calder, P.C. Obesity, Inflammation, Toll-like receptor 4 and fatty acids. *Nutrients.*, 2018. 10(4). – P. 432.
10. Jialal, I., Kaur, H., Devaraj, S. Toll-like receptor status in obesity and metabolic syndrome: a translational perspective. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2014;99(1):39–48.
11. Liu, T., Zhang, L., Joo, D. et al. NF- κ B signaling in inflammation. *Signal. Transduct. Tar.*, 2017. – Vol. 2. – P. 17023.
12. Lu, P., Sodhi, C.P., Yamaguchi, Y. et al. Intestinal epithelial Toll-like receptor 4 prevents metabolic syndrome by regulating interactions between microbes and intestinal epithelial cells in mice. *Mucosal Immunol.*, 2018. – Vol. 11(3). 727–740.
13. Wang, C., Ha, X., Li, W. et al. Correlation of TLR4 and KLF7 in inflammation induced by obesity. *Inflammation*, 2017. – Vol. 40(1). – P. 42–51.
14. Puzhko, S., Schuster, T., Barnett, T.A. et al. Difference in patterns of prescribing antidepressants known for their weight-modulating and cardiovascular side effects for patients with obesity compared to patients with normal weight. *J. Affect. Disord.*, 2021. – Vol. 295. – P. 1310–1318.
15. Dejban, P., Sahraei, M., Chamanara, M. et al. Anti-inflammatory effect of amitriptyline in a rat model of acetic acid-induced colitis: the involvement of the TLR4/NF- κ B signaling pathway. *Fundam. Clin. Pharmacol.*, 2021. – Vol. 35(5). – P. 843–851.
16. Li, J., Chen, L., Zhang, Y. et al. TLR4 is required for the obesity-induced pancreatic beta cell dysfunction. *Acta Biochim. Biophys. Sin.*, 2013. – Vol. 45(12). – P. 1030–1038.
17. Parham, S., Kharazi, A.Z., Bakhsheshi-Rad, H.R. et al. Antioxidant, antimicrobial and antiviral properties of herbal materials. *Antioxidants*, 2020. – Vol. 9(12). – P. 1309.
18. Tang, H., Zeng, Q., Ren, N. et al. Kaempferide improves oxidative stress and inflammation by inhibiting the TLR4/ κ Ba/NF- κ B pathway in obese mice, Iran. *J. Basic. Med. Sci.*, 2021. – Vol. 24(4). – P. 493–498.

ANTI-INFLAMMATORY AND LIPOLYTIC PROPERTIES OF BURDOCK ROOT TINCTURE

Krasilnikova N.V., Pletnev V.V., Petrova J.A., Kishkina M.A.

Academy of Social and Fundamental Sciences named after Academician M.V. Lomonosov – Academic Research Institute, First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University), Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov Ministry of Health of the Russian Federation

Summing up the results of an experimental study of a complex herbal remedy, it can be noted that in a model of obesity in animals induced by high-calorie food, tincture of large burdock roots in doses of 65, 195 and 455 mcg / kg when administered orally to rats once a day for 14 days has a pronounced lipolytic effect, stimulating the activity of brown adipose tissue and it helps to reduce fat deposits in the body, and also has pronounced anti-inflammatory properties. The mechanism of the anti-inflammatory effect of burdock root tincture is apparently related to the suppression of the activity of the TLR4/NF- κ B signaling pathway both at the level of gene transcription and at the level of protein expression. It was found that burdock root extracts obtained with ethanol contain a large amount of polyphenols,

which presumably contribute to improving glucose and lipid metabolism, which, in turn, helps fight obesity and related inflammation by acting on the same TLR4/NF- κ B signaling pathway. Thus, the improvement in inflammation may be a direct consequence of the modulation (change in activity) of this important signaling pathway by polyphenolic compounds (gallic acid, tannin, chlorogenic acid, chicory acid, arctigenin), which are part of the burdock root tincture.

Keywords: burdock root tincture, inflammation, anti-inflammatory effect, burdock roots, mechanism of action.

References

1. Gortmaker, S.L., Swinburn, B.A., Levy, D. et al. Changing the future of obesity: science, policy, and action. *Lancet.*, 2011. – Vol. 378(9793). – P. 838–847.
2. Antoniolli, L., Caputi, V., Fornai, M. et al. Interplay between colonic inflammation and tachykininergic pathways in the onset of colonic dysmotility in a mouse model of diet-induced obesity. *Int. J. Obes.*, 2019. – Vol. 43(2). – P. 331–343.
3. Winer, D.A., Luck, H., Tsai, S. et al. The intestinal immune system in obesity and insulin resistance. *Cell Metabol.*, 2016. – Vol. 23(3). – P. 413–426.
4. Do, M.H., Lee, E., Oh, M.J. et al. High-glucose or -fructose diet cause changes of the gut microbiota and metabolic disorders in mice without body weight change. *Nutrients*, 2018. – Vol. 10(6). – P. 761.
5. Stenman, L.K., Holma, R., Eggert, A. et al. A novel mechanism for gut barrier dysfunction by dietary fat: epithelial disruption by hydrophobic bile acids. *Am. J. Physiol. Gastr. L.*, 2013. – Vol. 304(3). – P. G227–G234.
6. de La Serre, C.B., Ellis, C.L., Lee, J. et al. Propensity to high-fat diet-induced obesity in rats is associated with changes in the gut microbiota and gut inflammation. *Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol.*, 2010. – Vol. 299(2). – P. G440–G448.
7. Zhang, X.X., Chai, Z., Feng, J. et al. Extraction and biological activity of Arctium lappa L. polysaccharides. *Food Ferment. Ind.*, 2021. – Vol. 47(6). – P. 208–288.
8. Wang, X., Yang, Q., Zhou, X. et al. Shenling baizhu powder inhibits RV-SA11-induced inflammation and rotavirus enteritis via TLR4/MyD88/NF- κ B signaling pathway. *Front. Pharmacol.*, 2021. – Vol. 12. – P. 642685.
9. Rogero, M.M., Calder, P.C. Obesity, Inflammation, Toll-like receptor 4 and fatty acids. *Nutrients.*, 2018. 10(4). – P. 432.
10. Jialal, I., Kaur, H., Devaraj, S. Toll-like receptor status in obesity and metabolic syndrome: a translational perspective. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2014;99(1):39–48.
11. Liu, T., Zhang, L., Joo, D. et al. NF- κ B signaling in inflammation. *Signal. Transduct. Tar.*, 2017. – Vol. 2. – P. 17023.
12. Lu, P., Sodhi, C.P., Yamaguchi, Y. et al. Intestinal epithelial Toll-like receptor 4 prevents metabolic syndrome by regulating interactions between microbes and intestinal epithelial cells in mice. *Mucosal Immunol.*, 2018. – Vol. 11(3). 727–740.
13. Wang, C., Ha, X., Li, W. et al. Correlation of TLR4 and KLF7 in inflammation induced by obesity. *Inflammation*, 2017. – Vol. 40(1). – P. 42–51.
14. Puzhko, S., Schuster, T., Barnett, T.A. et al. Difference in patterns of prescribing antidepressants known for their weight-modulating and cardiovascular side effects for patients with obesity compared to patients with normal weight. *J. Affect. Disord.*, 2021. – Vol. 295. – P. 1310–1318.
15. Dejban, P., Sahraei, M., Chamanara, M. et al. Anti-inflammatory effect of amitriptyline in a rat model of acetic acid-induced colitis: the involvement of the TLR4/NF- κ B signaling pathway. *Fundam. Clin. Pharmacol.*, 2021. – Vol. 35(5). – P. 843–851.
16. Li, J., Chen, L., Zhang, Y. et al. TLR4 is required for the obesity-induced pancreatic beta cell dysfunction. *Acta Biochim. Biophys. Sin.*, 2013. – Vol. 45(12). – P. 1030–1038.
17. Parham, S., Kharazi, A.Z., Bakhsheshi-Rad, H.R. et al. Antioxidant, antimicrobial and antiviral properties of herbal materials. *Antioxidants*, 2020. – Vol. 9(12). – P. 1309.
18. Tang, H., Zeng, Q., Ren, N. et al. Kaempferide improves oxidative stress and inflammation by inhibiting the TLR4/ κ Ba/NF- κ B pathway in obese mice, Iran. *J. Basic. Med. Sci.*, 2021. – Vol. 24(4). – P. 493–498.

Использование 3D-визуализации и алгоритмов автоматической сегментации МРТ малого таза для планирования органосохраняющих операций в гинекологии

Тиномагомедова Заира Дибирмагомедовна,

студент, Институт клин.медицины, Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского
E-mail: devochka.mechtaa@mail.ru

Скрябина Дарина Валерьевна,

6 курс, СПбГПМУ
E-mail: darinaykt@icloud.com

Шульга Елизавета Петровна,

6 курс, Ростовский государственный медицинский университет
E-mail: elizavetasulga5@gmail.com, 89384844377

Сейт-Аджиева Лера Рустемовна,

врач-терапевт участковый, БУЗ УР «ГКБ № 8 им Однопозова И.Б.» МЗ УР
E-mail: msslera@mail.ru

Колесникова Анна Александровна,

6 курс, Институт клинической медицины, КУБГМУ
E-mail: miropolskaya1990@mail.ru

Органосохраняющие операции в гинекологии требуют особенно точного предоперационного понимания топографии патологического очага и его взаимоотношений с «критическими» структурами малого таза – мочевым пузырём, мочеточниками, прямой кишкой, сосудистыми пучками, эндометрием и шейкой матки. Несмотря на высокую информативность магнитно-резонансной томографии (МРТ), двумерное восприятие многоплоскостных срезов нередко оставляет «слепые зоны» именно там, где хирург стремится минимизировать объём резекции и избежать функциональных потерь. За последние годы глубокое обучение (deep learning) изменило практическую сторону сегментации: модели семейства U-Net и особенно «самонастраивающиеся» фреймворки (например, nnU-Net) приблизили автоматическую разметку органов и очагов к уровню, пригодному для клинического контура – при условии экспертного контроля. В этой статье рассматриваются принципы построения клинического контура «МРТ → автоматическая сегментация → экспертная коррекция → 3D-модель → хирургическое планирование», а также обсуждается, как такое представление влияет на выбор доступа, объём резекции и стратегию сохранения органа/функции. Приведены два клинически ориентированных примера (глубокий инфильтративный эндометриоз и множественные миомы матки), демонстрирующих роль 3D-моделей в принятии решений и коммуникации в мультидисциплинарной команде. Отдельно обсуждаются ограничения автоматической сегментации в условиях переменных МР-протоколов, малых размеров очагов и анатомической деформации таза, а также требования к валидации и интеграции в реальный клинический рабочий процесс.

Ключевые слова: МРТ малого таза; автоматическая сегментация; глубокое обучение; nnU-Net; 3D-визуализация; эндометриоз; миома матки; органосохраняющая хирургия; предоперационное планирование; 3D Slicer.

Введение

Органосохраняющая хирургия в гинекологии в буквальном смысле «жить» на миллиметрах: разница между радикальностью и сохранением функции часто определяется тем, насколько точно хирург понимает протяжённость инфильтрации, глубину вовлечения стенки кишки или расстояние от узла до устья мочеточника ещё до первого троакара. При этом МРТ малого таза остаётся ключевым методом для картирования анатомии и болезни, но классический формат интерпретации – мысленная сборка трёхмерной картины из серии 2D-срезов – не одинаково надёжен у разных специалистов и не всегда удобен для междисциплинарного обсуждения. Особенно это проявляется при деформированной анатомии (спайки, ретрофлексия матки, «kissing ovaries», многокомпонентные узлы), когда даже качественное описание в протоколе не всегда превращается в точный хирургический маршрут. [1]

За последние 3–4 года стало очевидно, что переход от «описательной МРТ» к «вычислительной МРТ» (quantitative/AI-assisted MRI) – не модный лозунг, а практическая необходимость. Это направление опирается на два технологических столпа: (1) автоматическую сегментацию (выделение органов/структур и очагов поражения на МР-изображениях) и (2) 3D-визуализацию как способ преобразовать сегментацию в модель, удобную для хирургического мышления и обсуждения. Современные рекомендательные документы по эндометриозу подчёркивают важность стандартизации протокола, лексикона и «компарментного» подхода к описанию, фактически признавая, что качество коммуникации «радиолог–хирург–пациент» напрямую влияет на исход лечения. [2]

С клинической точки зрения эндометриоз и миома матки – два полюса одной проблемы. Эндометриоз, по данным ВОЗ и крупных обзоров/гайдлайнов, затрагивает порядка 190 млн женщин репродуктивного возраста, а истинная распространённость, вероятно, недооценена из-за инвазивности «золотого стандарта» (лапароскопии). [3] Миома матки, в свою очередь, чрезвычайно распространена (оценки «до 70–80% к 50 годам» часто воспроизводятся в литературе), а органосохраняющие стратегии (миомэктомия, гистероскопические методы, абляционные и интервенционные подходы) требуют точного картирования узлов и эндометрия для снижения риска кровотечения, повреждения полости матки и репродуктивных осложнений. [4]

Цель настоящей статьи – на основе современных данных и двух клинически ориентированных примеров показать, как автоматическая сегментация и 3D-визуализация МРТ малого таза могут быть встроены в алгоритм планирования органосохраняющих вмешательств, какие метрики качества сегментации действительно имеют клинический смысл, и где лежат ограничения метода, о которых важно честно говорить до внедрения в рутинную практику. [5]

Материалы и методы

Концепция работы выполнена в формате клинико-методической статьи с элементами «case-based» анализа и критическим обзором публикаций 2023–2026 гг. по трём направлениям: (1) стандартизация МР-протокола и отчёта для сложной тазовой патологии, (2) автоматическая сегментация на основе глубокого обучения, (3) клиническая 3D-моделировка для предоперационного планирования. Отбор примеров иллюстраций основан на открытых (open access) источниках с воспроизводимыми клиническими сценариями и наглядной демонстрацией цепочки «МРТ → сегментация → 3D-модель». [6]

МР-протокол как фундамент

Подход к сегментации и 3D-модели начинается не с нейросети, а с протокола исследования: алгоритм «плохо обучается» на неопределённости, а хирург «плохо оперирует» по неоднозначной картине. Для эндометриоза консенсус ESUR (2025) рекомендует предобследовательную подготовку (включая голодание, антиперистальтику, умеренное наполнение мочевого пузыря, элементы подготовки кишечника) и подчёркивает, что протокол должен включать как минимум мультиплоскостные T2-ВИ, T1-ВИ (с/без подавления жира) и последовательность с визуализацией почек для оценки вовлечения мочеточников/гидронефроза. [7] В практическом смысле это означает: если мы хотим стабильную сегментацию мочеточников или хотя бы безопасную оценку риска их компрессии/инфильтрации, «почечный компонент» протокола перестаёт быть факультативным. [7]

Алгоритмы сегментации и принципы качества

В современной литературе доминируют архитектуры U-Net и производные, а фреймворк nnU-Net ценен тем, что автоматически подбирает параметры предобработки, архитектуры и обучения под конкретный датасет, снижая порог входа для клинических команд. [8] С точки зрения «медицинской инженерии», две метрики чаще всего оказываются полезными в клиническом разговоре: Dice Similarity Coefficient (DSC) как оценка перекрытия масок и метрики поверхностной ошибки (например, ASD/HD95), которые в ряде сценариев ближе к понятию «хирургического края» и риска повреждения соседних структур. В реальной клинике я бы добавил третью метрику – «время до принятия решения» (time-to-decision): сколько минут/часов требуется команде, чтобы превратить данные исследования в план вмешательства, потому что именно это определяет внедряемость, а не абстрактный рост DSC на 0.01. [9]

3D-визуализация и программная среда

Для построения моделей применяются как коммерческие решения, так и открытые платформы. В академической и клинической среде 3D Slicer остаётся одним из основных инструментов для сегментации и визуализации, что подтверждено его позиционированием как исследовательской платформы для количественных изображений. [10] Ключевой принцип, который мы считаем обязательным: автоматическая сегментация не отменяет ответственности врача-эксперта, а переводит её из режима «ручной труд» в режим «контроль качества», где критично наличие чётких правил коррекции и документирования версии модели. Это особенно актуально в анатомически «трудных» случаях (эндометриоз с деформацией яичников, множественные миомы, выраженные артефакты движения), где ошибки алгоритма не случайны, а закономерны. [11]

Клинические примеры и этические аспекты

Представленные ниже два клинических примера описаны в образовательных целях в де-идентифицированной форме и иллюстрируются изображениями из открытых публикаций (лицензии open access/CC), что позволяет воспроизводимо показать технологическую цепочку без раскрытия персональных данных пациентов. Такой подход честнее, чем имитация «собственных» снимков без возможности верификации, и одновременно подчёркивает центральную мысль: клиническая ценность 3D-модели определяется не уникальностью картинки, а качеством принятия решения на её основе. [12]

Результаты

Ниже представлены два клинически ориентированных примера, в которых 3D-модели из МРТ-данных меняют структуру обсуждения случая: вместо «где очаг?» команда обсуждает «какой минимально достаточный объём вмешательства и какие структуры под наибольшим риском». Для удобства восприятия приведены четыре иллюстрации (МРТ-срезы, сегментация и 3D-модели), доступные по ссылкам-цитатам как Рисунки 1–4.




Рис. 1. Пример цепочки «МРТ → сегментация ROI → 3D-виртуальная анатомическая модель» при ректосигмоидном эндометриозе уретрального отверстия, лонное сочленение)

Клинический пример – глубокий инфильтративный эндометриоз с поражением прямой кишки и риском уретральной вовлечённости

Клинический сценарий типичен для специализированного центра: пациентка репродуктивного возраста, длительная дисменорея, симптомы тазовой боли и признаки кишечного вовлечения, при этом задача хирурга – добиться радикальности по отношению к очагу при макси-

мально возможном сохранении функции кишки и мочевыводящих путей. В таких случаях стандартный «плоскостной» протокол МРТ часто перегружает хирурга деталями, но не всегда даёт интуитивную «карту опасностей». Консенсус ESUR (2025) предлагает компартментный подход к оценке глубокого эндометриоза и требует описывать критически важные измерения (например, протяжённость ректосигмоидного узла, расстояние до анального края, особенности стенки кишки, расстояние до устьев мочеточников при поражении мочевого пузыря).




Рис. 2. 3D-модель с включением хода мочеточников и «взрывной» (exploded) визуализацией отношений очага с органами малого таза




Рис. 3. Пример МР-изображений миомы и сопоставление исходных срезов с результатами сегментации (мультIORганный контур)




Рис. 4. 3D-модель, реконструированная из предсказанных масок сегментации (позвоночник, миомы, эндометрий, мочевой пузырь,

3D-модель, построенная путём сегментации областей интереса, в данном сценарии превращает текстовые параметры в визуализируемые отношения: очаг (эндометриоидный узел) виден не как «гипоинтенсивное образование на T2», а как объём, тесно связанный с прямой кишкой, маткой, мочевым пузырём и (в зависимости от случая) мочеточниками. На практике это позволяет заранее обосновать стратегию органосохранения: где возможна «shaving»-техника (поверхностное иссечение), а где безопаснее планировать дисковую резекцию или сегментарную резекцию, и нужно ли подключать колоректального хирурга. В открытой пилотной работе по 3D-виртуальным моделям при ректосигмоидном эндометриозе показан сам процесс построения модели (Рисунок 1) и приведены приме-

ры 3D-отношений очага, в том числе с визуализацией хода мочеточников (Рисунок 2), то есть именно тех структур, повреждение которых превращает «органосохраняющую» операцию в функциональную катастрофу. [17]

Отдельно важно, что для эндометриоза ключевая клиническая проблема автоматической сегментации — не матка как таковая, а яичники и эндометриомы на фоне деформации и спаек. Показательно, что в мультицентровом датасете по эндометриозу (Scientific Data, 2025) межэкспертное согласие по сегментации матки (DSC около 0.73 ± 0.18) существенно выше, чем по яичникам (DSC около 0.48 ± 0.24), то есть «человеческая вариативность» сама по себе велика там, где алгоритм чаще всего ошибается. [18] Это наблюдение меняет стратегию внедрения: вместо ожидания «полностью автоматического» контура целесообразнее строить workflow, где алгоритм стабильно сегментирует «крупные ориентиры» (матка, пузырь, прямая кишка, кости), а яичники/малые очаги проходят обязательную экспертную коррекцию с фиксированием времени и причин правок. [19]

Мой практический вывод после анализа подобных кейсов простой: 3D-модель не заменяет протокол, но резко сокращает число «непрояснённых вопросов» перед операцией. Это особенно заметно на консилиуме, когда вместо дискуссии о трактовке сигнала на T2 команда обсуждает конкретные хирургические решения: «уретеролизис достаточно или нужна стент-тактика?», «мы готовы к резекции кишки или целимся в органосберегающий вариант при заданной протяжённости узла?». В этом смысле 3D-визуализация работает как язык, общий для рентгенолога и хирурга. [20]

Клинический пример -множественные миомы матки и выбор органосохраняющей стратегии

При миоме матки «органосохранение» чаще всего означает сохранение матки и репродуктивного потенциала при минимизации травмы миометрия и полости матки. Это особенно критично, когда пациентка планирует беременность, а узлы расположены так, что выбор доступа (гистероскопический, лапароскопический, лапаротомный, комбинированный) определяет и риск осложнений, и вероятность рецидива. Современные рекомендации по технике миомэктомии (ESGE 2024) подчёркивают необходимость тщательного предоперационного планирования, где топография узла относительно эндометрия и серозы фактически задаёт «анатомическую цену» органосбережения. [21]

Автоматическая сегментация в этой задаче ценна тем, что переводит «картирование узлов» из субъективного описания в измеряемую геометрию: объём узла, его отношение к полости, расстояние до эндометрия, близость к мочевому пузырю/шейке, совокупный объём поражения. В открытом исследовании по применению 3D nnU-Net для сегментации миом и окружающих структур на MPT приведены значения DSC для нескольких анатомических меток: матка около 92.55%, миомы около 95.63%, мочевой пузырь около 97.75%, эндометрий около 89.63% и др., что демонстрирует клинически значимую точность именно по тем структурам, которые важны для органосохраняющего планирования (полость и пузырь как «границы безопасности»). [22]

На уровне визуализации сегментация даёт два принципиально разных продукта. Первый — срезы с наложенными масками (Рисунок 3), которые помогают радиологу и хирургу синхронизировать понимание границ узла и соседних органов. [15] Второй — 3D-модель из масок, которую можно вращать, «разбирать» по слоям и демонстрировать пациентке/команде (Рисунок 4). [23] В рассматриваемом источнике отдельно подчёркивается, что после сегментации применяются методы volume rendering для получения 3D-представления, усиливающего «трёхмерное чувство» врача; с клинической позиции это означает более надёжное планирование траектории доступа и понимание того, где миома является «центральным узлом», а где — частью многокомпонентной деформации. [24]

Если попытаться сформулировать практический эффект одним предложением, он звучит так: 3D-модель при множественных миомах снижает риск «неожиданности» в операционной. В традиционном сценарии неожиданность — это не найденный заранее мелкий узел, неожиданное вскрытие полости матки или недооценка близости узла к мочевому пузырю. 3D-контур, даже при необходимости ручной коррекции, делает эти риски прогнозируемыми и, следовательно, управляемыми: можно заранее выбрать технику гемостаза, оценить потенциальный объём ушивания миометрия и обсудить с пациенткой компромисс между радикальностью удаления узлов и безопасностью будущей беременности. [25]

Обсуждение

Что меняется в клиническом мышлении: от «описания» к «модели риска»

В эндометриозе стандартизация отчёта и компартментный подход уже признаны критически важными для коммуникации и ведения пациенток. [27] Однако даже идеальный структурированный отчёт остаётся текстом, а хирург оперирует в пространстве. 3D-модель, построенная на основе сег-

ментации, фактически создаёт «геометрию риска»: какие структуры ближе всего к очагу, где ожидается сложность диссекции, где вероятно необходимость мультидисциплинарной бригады. На этом фоне особенно интересны данные валидированных МР-скорингов сложности (например, dPEI): в крупной мультицентральной когорте (605 пациенток) более тяжёлые категории ассоциировались с большей длительностью операции и более длительной госпитализацией, то есть МР-картирование действительно предсказывает ресурсоёмкость и потенциальные риски. [28] 3D-визуализация логично продолжает эту линию, делая риск не только «оценкой», но и наглядным объектом консилиумного обсуждения.

Для миомы матки ситуация иная: здесь обычно не требуется компартментная «карта таза» целиком, но требуется высокоточное картирование узлов, эндометрия и соседних органов для выбора органосохраняющей техники. ESGE-рекомендации 2024 по абдоминальной и гистероскопической миомэктомии подчёркивают значимость выбора техники в зависимости от локализации и особенностей узлов, а 3D-модель может служить мостом между радиологической классификацией и хирургической тактикой. [21] Важный нюанс: в реальной практике именно «пограничные» узлы (например, близкие к полости, FIGO 2–3) чаще всего требуют дискуссии; здесь количественные расстояния и объёмные отношения, полученные из сегментации, могут быть более полезны, чем традиционное «узел прилежит к эндометрию». [29]

Почему автоматическая сегментация не должна внедряться «как кнопка»

Крупные цифры точности могут быть обманчивыми, если не учитывать источник сложности: вариативность протоколов, артефакты движения, низкий контраст «очаг/фон», деформация органов при спайках. Датасет Scientific Data (2025) по эндометриозу фактически демонстрирует методологическую истину: если у людей низкое согласие по структуре (овариальная сегментация), то алгоритм без специально настроенного обучения и контроля неизбежно будет нестабилен именно там. [18] Поэтому клинический workflow должен включать (а) контроль входного качества (соответствие протоколу), (б) контроль выходного качества (визуальный чек-лист на «опасных зонах»), (в) регистрацию правок и причин, чтобы не превращать ИИ в «чёрный ящик». Общая тенденция к формированию «инфраструктуры хирургических данных» и усилению требований к клинической валидации ИИ в хирургии подчёркивается и в современных обзорах по AI-in-surgery. [30]

С технологической стороны nnU-Net остаётся одним из наиболее практичных инструментов для клинических команд, поскольку автоматизирует процесс конфигурации пайплайна сегментации под конкретные данные. [31] Но и здесь целесообразно помнить: «самонастройка» не равна «самостоятельности». Ответственность за границы резекции и безопасность остаётся на враче; алгоритм должен занимать позицию ассистента, сокращающего время рутины и повышающего воспроизводимость, но не заменяющего экспертизу. [9]

Выводы

Автоматическая сегментация MPT малого таза и последующая 3D-визуализация формируют практический инструмент для органосохраняющего планирования в гинекологии, особенно в случаях, где топография очага и вовлечение соседних структур определяют объём вмешательства. Консенсусные рекомендации по эндометриозу подчёркивают значимость стандартизированного протокола и отчёта; 3D-модель становится логическим продолжением этого подхода, усиливая коммуникацию между радиологом и хирургом. [27]

Клинические примеры показывают, что ценность 3D-модели проявляется в «точках принятия решения»: выбор объёма резекции кишки при глубоких формах эндометриоза и выбор доступа/тактики при множественных миомах. При этом уровень зрелости автоматической сегментации неоднороден: крупные структуры сегментируются надёжнее, тогда как яичники и малые очаги при эндометриозе остаются зоной высокой вариативности даже среди экспертов, что требует обязательного контроля качества и гибридного (AI+эксперт) workflow. [11]

Наиболее перспективное направление ближайших лет — не просто повышение метрик сегментации, а доказательство клинического эффекта: снижение осложнений, времени операции, числа конверсий и рост предсказуемости органосохраняющих исходов. Пока этот уровень доказательности ограничен, внедрение должно идти по пути «ответственного сопровождения» (assistive AI) с ясной инфраструктурой контроля качества и документированием правок, а не по пути «автоматической кнопки». [33]

Литература

1. Becker, C. M., Bokor, A., Heikinheimo, O., Horne, A., Jansen, F., Kiesel, L., ... Vermeulen, N. (2022). ESHRE guideline: Endometriosis. Human Reproduction Open, 2022(2), hoac009. [34]

2. Doumouchtsis, S. K., et al. (2023). Three-dimensional volume rendering of pelvic floor anatomy with focus on fibroids in relation to the lower urogenital tract based on cross-sectional MRI images. *Journal of Medical Systems*. [35]
3. Fedorov, A., Beichel, R., Kalpathy-Cramer, J., Finet, J., Fillion-Robin, J.-C., Pujol, S., ... Kikinis, R. (2012/2015). 3D Slicer as an image computing platform for the Quantitative Imaging Network. [36]
4. Isensee, F., Jaeger, P. F., Kohl, S. A. A., Petersen, J., & Maier-Hein, K. H. (2021). nnU-Net: A self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. *Nature Methods*, 18(2), 203–211. [37]
5. Liang, X., et al. (2025). A multi-modal pelvic MRI dataset for deep learning-based pelvic organ segmentation in endometriosis. *Scientific Data*, 12, 1292. [18]
6. Morice, P., et al. (2024). Recommendations on fertility-sparing management of cervical cancer. *The Lancet Oncology*. [38]
7. Rousset, P., et al. (2020). Magnetic resonance imaging classification of deep pelvic endometriosis: Description and impact on surgical management. *Human Reproduction*, 35(7), 1589–1600. [39]
8. Thomassin-Naggara, I., Dolciemi, M., Chamie, L. P., Guerra, A., Bharwani, N., Freeman, S., Rousset, P., Manganaro, L., & ESUR Endometriosis Working Group. (2025). ESUR consensus MRI for endometriosis: Protocol, lexicon, and compartment-based analysis. *European Radiology*, 35, 7272–7286. [7]
9. Wang, T., Wen, Y., & Wang, Z. (2024). nnU-Net based segmentation and 3D reconstruction of uterine fibroids with MRI images for HIFU surgery planning. *BMC Medical Imaging*, 24, 233. [22]
10. Yao, Y., Chen, Y., Yang, A., Ye, Y., Wei, L., Gou, S., & Yang, H. (2025). MVT-Net: A novel cervical tumour segmentation using multi-view feature transfer learning. *PLOS ONE*, 20(6), e0325424. [40]
11. Zuo, J., Feng, F., Wang, Z., Ashton-Miller, J. A., Delancey, J. O. L., & Luo, J. (2023). Pelvic floor MRI segmentation based on semi-supervised deep learning (arXiv preprint). [41]
12. Saridogan, E., Antoun, L., Bouwsma, E. V. A., Clark, T. J., Di Spizio Sardo, A., et al. (2024). ESGE Good Practice Recommendations on surgical techniques for removal of fibroids: Part 1 abdominal (laparoscopic and open) myomectomy. *Facts, Views & Vision in ObGyn*, 16(3), 263–280. [42]
13. Clark, T. J., Antoun, L., Di Spizio Sardo, A., Tanos, V., Huirne, J., et al. (2024). ESGE Good Practice Recommendations on surgical techniques for removal of fibroids: Part 2 hysteroscopic myomectomy. *Facts, Views & Vision in ObGyn*, 16(4), 383–397. [43]
14. Thomassin-Naggara, I., et al. (2023). Multicenter external validation of the Deep Pelvic Endometriosis Index (dPEI) MRI score (основные результаты опубликованы). [44]

USING 3D VISUALIZATION AND AUTOMATIC PELVIC MRI SEGMENTATION ALGORITHMS FOR PLANNING ORGAN-PRESERVING GYNECOLOGICAL SURGERIES

Tinomagedova Z.D., Skryabina D.V., Shulga E.P., Seit-Adzhieva L.R., Kolesnikova A.A.
V.I. Razumovsky Saratov State Medical University, Rostov State Medical University,
I.B. Odopozov City Clinical Hospital No. 8, St. Petersburg Medical University, Kuban
State Medical University

Organ-preserving surgeries in gynecology require a particularly precise preoperative understanding of the topography of the pathological lesion and its relationship with critical

pelvic structures—the bladder, ureters, rectum, vascular bundles, endometrium, and cervix. Despite the high information yield of magnetic resonance imaging (MRI), two-dimensional perception of multiplanar slices often leaves blind spots precisely where the surgeon seeks to minimize the extent of resection and avoid functional loss. In recent years, deep learning has transformed the practical side of segmentation: models of the U-Net family and especially self-tuning frameworks (e.g., nnU-Net) have brought automatic organ and lesion labeling closer to a level suitable for clinical contouring—subject to expert supervision. This article examines the principles of constructing the clinical workflow “MRI → automatic segmentation → expert correction → 3D model → surgical planning” and discusses how this representation influences the choice of approach, resection extent, and organ/function-preserving strategy. Two clinically oriented examples (deeply infiltrating endometriosis and multiple uterine fibroids) are given, demonstrating the role of 3D models in decision-making and communication in a multidisciplinary team. The limitations of automatic segmentation in the context of variable MR protocols, small lesion sizes, and anatomical pelvic deformities are separately discussed, as well as the requirements for validation and integration into real-world clinical workflow.

Keywords: pelvic MRI; automatic segmentation; deep learning; nnU-Net; 3D visualization; endometriosis; uterine fibroids; organ-preserving surgery; preoperative planning; 3D Slicer.

References

1. Becker, C. M., Bokor, A., Heikinheimo, O., Horne, A., Jansen, F., Kiesel, L., ... Vermeulen, N. (2022). ESHRE guideline: Endometriosis. *Human Reproduction Open*, 2022(2), hoac009. [34]
2. Doumouchtsis, S. K., et al. (2023). Three-dimensional volume rendering of pelvic floor anatomy with focus on fibroids in relation to the lower urogenital tract based on cross-sectional MRI images. *Journal of Medical Systems*. [35]
3. Fedorov, A., Beichel, R., Kalpathy-Cramer, J., Finet, J., Fillion-Robin, J.-C., Pujol, S., ... Kikinis, R. (2012/2015). 3D Slicer as an image computing platform for the Quantitative Imaging Network. [36]
4. Isensee, F., Jaeger, P. F., Kohl, S. A. A., Petersen, J., & Maier-Hein, K. H. (2021). nnU-Net: A self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. *Nature Methods*, 18(2), 203–211. [37]
5. Liang, X., et al. (2025). A multi-modal pelvic MRI dataset for deep learning-based pelvic organ segmentation in endometriosis. *Scientific Data*, 12, 1292. [18]
6. Morice, P., et al. (2024). Recommendations on fertility-sparing management of cervical cancer. *The Lancet Oncology*. [38]
7. Rousset, P., et al. (2020). Magnetic resonance imaging classification of deep pelvic endometriosis: Description and impact on surgical management. *Human Reproduction*, 35(7), 1589–1600. [39]
8. Thomassin-Naggara, I., Dolciemi, M., Chamie, L. P., Guerra, A., Bharwani, N., Freeman, S., Rousset, P., Manganaro, L., & ESUR Endometriosis Working Group. (2025). ESUR consensus MRI for endometriosis: Protocol, lexicon, and compartment-based analysis. *European Radiology*, 35, 7272–7286. [7]
9. Wang, T., Wen, Y., & Wang, Z. (2024). nnU-Net based segmentation and 3D reconstruction of uterine fibroids with MRI images for HIFU surgery planning. *BMC Medical Imaging*, 24, 233. [22]
10. Yao, Y., Chen, Y., Yang, A., Ye, Y., Wei, L., Gou, S., & Yang, H. (2025). MVT-Net: A novel cervical tumour segmentation using multi-view feature transfer learning. *PLOS ONE*, 20(6), e0325424. [40]
11. Zuo, J., Feng, F., Wang, Z., Ashton-Miller, J. A., Delancey, J. O. L., & Luo, J. (2023). Pelvic floor MRI segmentation based on semi-supervised deep learning (arXiv preprint). [41]
12. Saridogan, E., Antoun, L., Bouwsma, E. V. A., Clark, T. J., Di Spizio Sardo, A., et al. (2024). ESGE Good Practice Recommendations on surgical techniques for removal of fibroids: Part 1 abdominal (laparoscopic and open) myomectomy. *Facts, Views & Vision in ObGyn*, 16(3), 263–280. [42]
13. Clark, T. J., Antoun, L., Di Spizio Sardo, A., Tanos, V., Huirne, J., et al. (2024). ESGE Good Practice Recommendations on surgical techniques for removal of fibroids: Part 2 hysteroscopic myomectomy. *Facts, Views & Vision in ObGyn*, 16(4), 383–397. [43]
14. Thomassin-Naggara, I., et al. (2023). Multicenter external validation of the Deep Pelvic Endometriosis Index (dPEI) MRI score (основные результаты опубликованы). [44]

Раннее прогнозирование профессиональных рисков в химической промышленности для снижения заболеваемости персонала

Самохвалов Михаил Михайлович,

аспирант, кафедра биомедицинской инженерии,
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ)
E-mail: samokhvalov1555@mail.ru

Раннее прогнозирование профессиональных рисков в химической промышленности представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной профилактической медицины и токсикологии ввиду высокой латентности патологических изменений, вызываемых хронической полиэкспозицией к токсическим агентам, включая аэрозоли, пары растворителей, тяжелые металлы, хлорорганические соединения и полициклические ароматические углеводороды в сочетании с физическими факторами производственной среды. Анализ показывает, что кумулятивное воздействие указанных агентов формирует нелинейный профиль риска, который не поддается описанию в рамках классических аддитивных моделей, что обуславливает необходимость перехода от ретроспективного мониторинга к проспективным подходам, ориентированным на идентификацию субклинических нарушений на допатологическом этапе. Особое внимание уделяется индивидуальной вариабельности биотрансформации ксенобиотиков, определяемой полиморфизмами ферментных систем CYP450, глутатион-S-трансфераз и других генетических маркеров, что разграничивает популяционные и персонализированные стратегии оценки риска. В работе проводится систематизация терминологической неоднородности ключевых категорий – профессиональный риск, опасность, экспозиция, биомаркеры – и осуществляется сравнительный анализ прогностических моделей, включая нормативное нормирование по ПДК, вероятностные оценки, байесовские сети, биомониторинговые индексы и алгоритмы машинного обучения, выявляя значительный разрыв между методологической зрелостью инструментов и степенью их практического внедрения. Рассматривается трехуровневая система биомаркеров (маркеры экспозиции, раннего эффекта и восприимчивости), а также омиксные подходы, демонстрирующие высокий прогностический потенциал для регистрации окислительного стресса, субклинической нефро- и гепатотоксичности до клинической манифестации. Сопоставление управленческих концепций – от традиционной гигиены труда до предиктивной охраны здоровья – подчеркивает необходимость многоуровневой интеграции данных физико-химического мониторинга, биологических матриц и цифровых сенсорных платформ в единую прогностическую архитектуру, способную обеспечить своевременную корректировку условий труда и снижение заболеваемости персонала. Представленный синтез позволяет определить релевантность статьи для специалистов в области профессиональной медицины, промышленной токсикологии и управления охраной труда, интересующихся переходом к персонализированным превентивным технологиям в условиях крупнотоннажного химического производства.

Ключевые слова: раннее прогнозирование, профессиональные риски, биомаркеры, химическая промышленность, полиэкспозиция.

Введение

Профессиональные заболевания в химической промышленности формируют одну из наиболее устойчивых и трудноустраняемых медико-социальных проблем современной производственной медицины. Специфика воздействия токсических агентов на организм работников отличается крайне высокой латентностью патологических изменений: большинство нозологических форм, ассоциированных с хронической экспозицией к промышленным химикатам, манифестирует спустя годы или даже десятилетия после первичного контакта, что принципиально ограничивает ценность ретроспективного мониторинга для практики управления охраной труда [3]. Именно это обстоятельство определяет особую значимость прогностических подходов, ориентированных не на констатацию уже реализовавшегося ущерба здоровью, а на заблаговременную идентификацию вероятных нарушений на этапе, предшествующем клинической манифестации.

Характер воздействия вредных факторов в химическом производстве гетерогенен по своей природе: персонал подвергается сочетанному влиянию аэрозолей, паров растворителей, тяжелых металлов, хлорорганических соединений и полициклических ароматических углеводородов при одновременном воздействии физических факторов – шума, вибрации, неблагоприятного микроклимата [7]. Кумулятивный эффект подобной полиэкспозиции не поддается описанию с позиций классической аддитивной модели токсикологического воздействия, поскольку синергетические и антагонистические взаимодействия между агентами формируют нелинейный профиль риска, существенно усложняющий интерпретацию биомаркерных данных и эпидемиологических наблюдений [1]. В специализированной литературе отсутствует консенсус относительно того, какой методологический аппарат – вероятностные модели, детерминированные пороговые подходы или байесовские сети – обеспечивает наибольшую предиктивную точность применительно к условиям крупнотоннажного химического производства.

Попытки систематизировать прогнозирование профессиональных рисков предпринимались как в рамках международных стандартов OHSAS 18001 и ISO 45001 [12], так и в национальных нормативных системах, однако практика применения этих инструментов обнаруживает существенный разрыв между декларируемыми требованиями и реализуемыми на производствах процедурами. Методологии, предусмотренные указанными стандартами, ориентированы преимущественно на ретроактивный анализ инцидентов, тогда как аппарат раннего прогнозирования – включая персонализированные биомониторинговые протоколы, экспозиционное моделирование и машинное обучение – остается либо концептуально разработанным, но не апробированным, либо внедренным на единичных производственных площадках в экспериментальном режиме [9; 14]. Данная позиция нуждается в дополнительной верификации применительно к российскому сегменту химической индустрии, где плотность опубликованных проспективных исследований существенно уступает западноевропейскому и североамериканскому корпусу литературы.

Механизм трансформации потенциального вреда в реализованный ущерб здоровью в условиях химического производства детерминирован не только токсикодинамическими характеристиками агентов, но и индивидуальной вариабельностью биотрансформации ксенобиотиков – прежде всего полиморфизмами ферментных систем CYP450 и глутатион-S-трансфераз, определяющих скорость метаболической активации и детоксикации [6]. Это обстоятельство принципиально разграничивает популяционный подход к оценке риска, оперирующий усредненными дозозависимыми характеристиками, и персонализированный – опирающийся на генетические, биохимические и иммунологические маркеры индивидуальной восприимчивости. Значимость последнего подхода неуклонно возрастает по мере расширения методологического арсенала профилактической токсикологии, включающего теперь анализ метаболома и протеома мочи и крови как интегральных индикаторов субклинических нарушений, предшествующих развернутой нозологической картине [2].

Материалы и методы исследования

В основу работы положен многоуровневый теоретико-аналитический синтез, сочетающий методы системного анализа нормативно-правовой

базы и методологических руководств в области профессиональной медицины и токсикологии с формализованным сравнительным анализом прогностических концепций. Применялись классификационный и типологический методы для структурирования существующих подходов к идентификации и ранжированию производственных рисков; метод критического сопоставления концептуальных рамок обеспечивал оценку их внутренней последовательности и верифицируемости. Логико-дедуктивный инструментарий использовался при переходе от общих положений токсикологической доктрины к частным требованиям раннего обнаружения нарушений здоровья на конкретном производственном профиле – химическом.

Корпус аналитических источников включал профильные научные публикации, международные и национальные стандарты в области охраны труда, методические руководства ВОЗ и Международной организации труда, а также нормативные документы Роспотребнадзора и Минтруда России. Контент-аналитические процедуры применялись для извлечения и систематизации данных о специфических биомаркерах экспозиции и эффекта, релевантных для химической промышленности [5]. Сравнительно-концептуальный анализ позволил идентифицировать методологические лакуны в существующих прогностических системах и сформулировать требования к их преодолению. Результаты синтеза представлены в виде аналитических таблиц, отражающих структурные различия между сопоставляемыми подходами и инструментами.

Таблица 1. Сравнительный анализ базовых понятий в системе профессиональных рисков химической промышленности

Понятие	Содержание в нормативной доктрине	Содержание в профессионально-медицинской литературе	Зоны концептуальной неопределенности
Профессиональный риск	Вероятность повреждения здоровья с учетом тяжести возможных последствий при воздействии вредных и опасных факторов	Интегральная мера возможного ущерба здоровью за период трудовой деятельности с учетом индивидуальной восприимчивости	Разграничение категорий «допустимый» и «приемлемый» риск; соотношение коллективного и индивидуального риска
Профессиональная опасность	Потенциальный источник возможного вреда, обусловленный характеристиками рабочей среды	Свойство химического агента, физического или биологического фактора причинять ущерб при экспозиции	Отсутствие единой операционализации понятия применительно к сочетанным воздействиям
Экспозиция	Концентрация или интенсивность воздействия агента на рабочем месте за регламентированный период	Совокупная доза поглощенного агента с учетом пути поступления и индивидуального биотрансформационного профиля	Дискуссионность агрегирования экспозиций при полифакторном воздействии
Биомаркер экспозиции	Измеримый биохимический показатель, отражающий поглощение агента (как правило, в моче или крови)	Молекулярный или клеточный индикатор, интегрирующий внешнюю дозу, биодоступность и метаболическую активацию	Разграничение биомаркеров экспозиции, эффекта и восприимчивости
Раннее прогнозирование	Оценка вероятного ущерба здоровью на допатологическом этапе	Идентификация субклинических изменений, предшествующих нозологической манифестации, с использованием прогностических моделей	Порог «раннего» обнаружения нормативно не определен; критерии клинической значимости субклинических маркеров дискуссионны

Терминологическая неоднородность, зафиксированная в приведенном сопоставлении, имеет не только академическое измерение. Прежде всего, именно от принятого определения профессионального риска зависит архитектура корпоративных систем мониторинга: если риск трактуется нормативно-усредненно – мониторинг строится вокруг контроля рабочей среды; если индивидуализированно – в центре оказываются биологические маркеры конкретного работника [15]. Весьма показательно, что международные руководства ВОЗ и МОТ допускают оба подхода, не устанавливая между ними иерархии, что транслирует неопределенность на уровень производственных регламентов. Отдельного внимания заслуживает категория «экспозиция»: в нормативной трактовке она сводится к среднесменной или среднегодовой концентрации в воздухе рабочей зоны, тогда как профессионально-медицинская литература настаивает на необходимости учета кожно-

Результаты и обсуждение

Центральная методологическая коллизия, с которой сталкивается профессиональная медицина в химическом секторе, состоит в принципиальном несоответствии между временными горизонтами накопления токсической нагрузки и временными горизонтами клинической диагностики. Большинство используемых в настоящее время систем медицинских осмотров ориентированы на выявление уже сформировавшейся патологии, тогда как субклинические нарушения – регистрируемые биохимически или иммунологически, но не достигшие порога симптоматической манифестации – остаются вне охвата стандартных скрининговых процедур [11]. Это порождает системный дефицит в управлении профессиональными рисками: принятие превентивных решений осуществляется либо на основе нормативных экспозиционных пределов (предполагающих усредненную индивидуальную восприимчивость), либо по факту уже реализованного вреда.

Необходимость методологической экспликации базовых понятий в данной области не является декларативной – в профильной литературе зафиксирована устойчивая терминологическая неоднородность, при которой понятия «риск», «опасность», «вредность» и «экспозиция» используются в различных нормативных и научных контекстах без строгой концептуальной демаркации [4]. Это обстоятельство существенно затрудняет межисследовательские сопоставления и ограничивает возможности метааналитических обобщений. Структурированное соотнесение ключевых категорий представлено в сравнительной форме (табл. 1).

го и алиментарного путей поступления, а также межиндивидуальной вариабельности биодоступности [8]. Этот разрыв – между нормативным и научно обоснованным пониманием дозы – по всей видимости, детерминирует системное занижение реального риска в официальных оценках.

Самостоятельный аналитический пласт составляет сопоставление прогностических моделей, применяемых в профессиональной токсикологии. Несмотря на значительный арсенал доступных методологических подходов – от детерминированного нормирования ПДК до байесовских сетей доверия и алгоритмов машинного обучения – их практическое применение в химической промышленности остается крайне неравномерным; доминируют наиболее консервативные инструменты, методологически закреплённые нормативными актами (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительная характеристика прогностических моделей оценки профессиональных рисков в химическом производстве

Прогностическая модель	Принцип действия	Методологические преимущества	Ограничения применимости	Уровень верификации
Нормативное сравнение с ПДК/ПДУ	Сопоставление измеренных концентраций с регламентированными пороговыми значениями	Простота применения; нормативная обязательность; воспроизводимость	Не учитывает индивидуальную восприимчивость; основан на популяционном усреднении; неприменим к смесям	Высокий (национальный нормативный уровень)
Вероятностная оценка риска (probabilistic risk assessment)	Стохастическое моделирование вариабельности экспозиции и токсикодинамического ответа	Учитывает дисперсию параметров; формирует распределение рисков, а не точечную оценку	Требует обширной исходной базы данных; высокая вычислительная трудоемкость	Средний (преимущественно в исследовательских протоколах)

Прогностическая модель	Принцип действия	Методологические преимущества	Ограничения применимости	Уровень верификации
Байесовские сети доверия	Прогнозирование исходов здоровья на основе условных вероятностей с обновлением при поступлении новых данных	Позволяет интегрировать разнородные источники информации; адаптируется при обновлении выборки	Зависимость от априорных предположений; ограниченная интерпретируемость для практиков охраны труда	Низкий (апробация на ограниченных пилотных площадках)
Биомониторинговые индексы (BEI/BMI)	Сравнение биологических маркеров экспозиции с референсными значениями биологического мониторинга	Интегрирует реальную поглощенную дозу; независим от пути поступления	Референсные значения установлены для ограниченного числа агентов; интерпретация при полиэкспозиции дискуссионна	Средний (использование в периодических медицинских осмотрах)
Машинное обучение (ML-алгоритмы)	Выявление нелинейных паттернов в больших массивах клинических и экспозиционных данных	Высокая предиктивная точность при обученности на репрезентативных данных; выявление неочевидных взаимодействий	«Черный ящик»: ограниченная интерпретируемость; требует значительных обучающих выборок; риск артефактной переобученности	Низкий (экспериментальный режим внедрения)

Примечательна асимметрия между методологической зрелостью инструментов и реальной практикой их внедрения: наиболее верифицированные подходы – те, что обеспечивают наименьший предиктивный охват в части раннего обнаружения субклинических изменений [13]. Нормативное сравнение с пороговыми концентрациями, будучи обязательным и массово применяемым, концептуально не способно идентифицировать работников с повышенной генетически детерминированной восприимчивостью, у которых патологические изменения развиваются при дозах, не превышающих установленных нормативов. Байесовские сети и алгоритмы машинного обучения – методологически более адекватные инструменты для задачи раннего прогнозирования – остаются, по существу, концептуальными разработками применительно к большинству производственных площадок; что может

косвенно свидетельствовать об институциональной инертности систем управления охраной труда, отдающих предпочтение нормативной ответственности перед доказательной эффективностью.

Следует особо остановиться на системе биомаркеров, поскольку именно она образует аналитический фундамент раннего прогнозирования. Биомаркеры в профессиональной токсикологии образуют трехуровневую иерархию: маркеры экспозиции (фиксируют факт поглощения агента), маркеры эффекта (регистрируют субклинические биологические изменения) и маркеры восприимчивости (характеризуют индивидуальный токсикодинамический профиль) [6]. Практическая ценность каждой группы для раннего прогнозирования принципиально различна, что требует отдельного методологического рассмотрения (табл. 3).

Таблица 3. Классификация биомаркеров раннего прогнозирования профессиональных рисков в химическом производстве

Категория биомаркера	Примеры агентов и маркеров	Биологические матрицы	Прогностический потенциал	Ограничения интерпретации
Маркеры экспозиции	Котинин (табак/никотин), транс-транс-муконовая кислота (бензол), мандалиновая кислота (стирол), неорганический мышьяк в моче	Моча, цельная кровь, выдыхаемый воздух	Подтверждение факта поглощения; основа для расчета внутренней дозы	Не отражают биологический эффект; быстро элиминируются; зависят от времени отбора пробы
Маркеры раннего эффекта	Микроальбуминурия (нефротоксичность), снижение активности холинэстеразы (фосфорорганические соединения), 8-гидрокси-2'-дезоксигуанозин (окислительное повреждение ДНК), beta-2-микроглобулин	Моча, кровь, биоптаты (ограниченно)	Высокий: регистрация субклинических нарушений до клинической манифестации	Слабая нозологическая специфичность; влияние конфаундеров (возраст, сопутствующие заболевания)
Маркеры восприимчивости	Полиморфизмы CYP1A1, GSTM1, NAT2; уровень параоксоназы-1 (PON1); генотипы репаразных ферментов XRCC1	Геномная ДНК (кровь)	Идентификация групп повышенного риска; обоснование персонализированных пороговых значений	Этические коллизии генетического тестирования; экспрессия генов модифицируется средовыми факторами; малая часть вариантов достигает статистической значимости в малых выборках
Омиксные маркеры (транскриптомика, метаболомика)	Профили метаболитов мочи и плазмы, паттерны экспрессии генов воспалительного ответа	Плазма, моча, биоптаты	Потенциально высокий: интегральная картина субклинических изменений	Высокая стоимость; сложность стандартизации преаналитической фазы; отсутствие нормативно закрепленных референсных диапазонов

Трехуровневая архитектура биомаркерного мониторинга, очерченная выше, обнаруживает принципиальное неравенство в практическом освоении отдельных категорий. Маркеры экспозиции – наиболее доступные технические и наиболее часто включаемые в биомониторинговые программы – отвечают лишь на вопрос «произошло ли поглощение агента?», но принципиально не способны предсказать индивидуальный ответ организма, варьирующий в широких пределах даже при идентичной внутренней дозе. Маркеры раннего эффекта, прежде всего индикаторы окислительного повреждения ДНК и субклинической нефро- или гепатотоксичности, располагают существенно более значимым прогностическим потенциалом, однако их низкая нозологическая специфичность – фиксируемые изменения характерны для широкого спектра патологических состояний, не связанных с профессиональной экспозицией, – существенно осложняет интерпретацию при отсутствии надежных данных об экспозиционном анамнезе.

Наиболее концептуально продвинутый уровень – омиксные маркеры – по всей видимости, формирует следующий методологический горизонт раннего прогнозирования, однако отсутствие стандартизи-

рованных протоколов преаналитической обработки биоматериала и нормативно закрепленных референсных диапазонов делает их клинически неоперациональными в рамках рутинных медицинских осмотров [2]. Параллельно существует нерешенная проблема этического измерения генетического тестирования: идентификация работников с генетически детерминированной повышенной восприимчивостью создает риск дискриминации при найме или ротации, что формирует институциональное сопротивление внедрению персонализированного биомониторинга даже там, где технические условия для него созданы.

Организационно-управленческое измерение раннего прогнозирования рисков не менее значимо, чем методологическое. Наиболее детально разработанные биомаркерные протоколы не реализуют своего прогностического потенциала вне институциональной инфраструктуры принятия превентивных решений – системы, обеспечивающей замкнутый цикл от обнаружения субклинических отклонений через информирование работника и службы охраны труда к модификации условий труда [10]. Концептуальные различия между основными управленческими концепциями, релевантными для данной задачи, систематизированы ниже (табл. 4).

Таблица 4. Сравнительная характеристика управленческих концепций профилактики профессиональных заболеваний в химическом производстве

Управленческая концепция	Фокус превентивного вмешательства	Временной горизонт	Субъекты принятия решений	Критическое ограничение
Концепция гигиены труда (традиционная)	Контроль и снижение концентраций вредных веществ в рабочей среде до нормативных значений	Реактивный; ориентирован на соответствие нормативам	Служба охраны труда; надзорные органы	Нормативы основаны на популяционных данных и не учитывают индивидуальную вариабельность; не предусматривают субклинического мониторинга
Концепция управления профессиональными рисками	Идентификация, оценка и иерархическое управление рисками на основе матриц вероятность–тяжесть	Проактивный; ориентирован на предотвращение инцидентов	Менеджмент; служба охраны труда; работники	Методологический арсенал сосредоточен на физических и аварийных рисках; хронические токсикологические риски алгоритмически слабо встроены
Концепция производственной медицины с биомониторингом	Периодическое биологическое обследование работников с целью выявления субклинических изменений и коррективы экспозиции	Смешанный; реакция на субклинические изменения до клинической манифестации	Медицинская служба предприятия; профпатологи	Нормативный перечень биомаркеров ограничен; частота осмотров нередко недостаточна для выявления быстро прогрессирующих нарушений
Концепция предиктивной охраны здоровья (predictive occupational health)	Персонализированная оценка риска с использованием генетических, биохимических и экспозиционных данных в прогностических алгоритмах	Антиципирующий; направлен на предотвращение субклинической стадии	Цифровые платформы; медицинская служба; сам работник	Не имеет нормативной базы; этически дискуссионна; требует значительной цифровой инфраструктуры

Сравнение управленческих концепций фиксирует принципиальный Принципиально важно, что ни одно из рассмотренных технических решений не реализует прогностического потенциала в изолированном применении. Архитектура раннего прогнозирования, обеспечивающая методологически состоятельный охват, предполагает многоуровневую интеграцию: данные стационарного и персонального мониторинга экспозиции служат внешним входом; биомаркеры экспозиции транслируют эти данные во внутреннюю дозу; маркеры раннего эффекта фиксируют субклинические изменения органов-мишеней; маркеры восприимчивости стратифицируют работников по индивидуальному риску – и только совокупность этих уровней создает аналитическую базу для функционирования прогностического алгоритма [1; 13]. Данная позиция представляется дискуссионной в части практической реализуемости для большинства российских химических производств в ближайшей перспективе, однако именно она очерчивает методологически обоснованный ориентир для развития отраслевых систем мониторинга здоровья персонала.

Прослеживается и системная закономерность в распределении ответственности между субъектами управления рисками. Традиционная модель – в которой ответственность за охрану здоровья работников концентрируется в службе охраны труда и у надзорных органов – плохо совместима с задачей раннего прогнозирования, требующей активного участия самого работника в сборе данных (биологические матрицы), информированности профпатолога об экспозиционном анамнезе и функционального взаимодействия между медицинской службой предприятия, аналитической лабораторией и принимающим управленческие решения менеджментом [10; 12]. Эта организационная фрагментация – вероятно, один из ключевых институциональных барьеров, которые не устраняются технологическими инновациями в области биомониторинга, но требуют самостоятельного организационного проектирования.

Заключение

Проведенный анализ позволяет констатировать устойчивое методологическое расхождение между имеющимся арсеналом инструментов раннего прогнозирования профессиональных рисков в химическом производстве и степенью их операционального освоения в производственной практике. Нормативная модель контроля рабочей среды, основанная на сравнении измеренных концентраций с предельно допустимыми значениями, обеспечивает регуляторную соответствование, однако не решает задачу доклинической идентификации патологических изменений у работников с повышенной индивидуальной восприимчивостью. Разрыв между внешней дозой, нормируемой стандартами, и поглощенной биологической значимой дозой, варьирующей в зависимости от индивидуального токсикокинетического профиля, достигает масштабов, способных полностью инвертировать оценку риска для конкретного работника при формально допустимых условиях труда.

Биомаркерный мониторинг – в части маркеров раннего эффекта – располагает достаточным теоретическим обоснованием для его включения в систему периодических медицинских осмотров в качестве обязательного элемента для работников с экспозицией к нефротоксикантам, гепатотоксикантам и генотоксикантам. Суррогатные индикаторы окислительного повреждения ДНК, ферменты канальцевой протенинурии и активность холинэстеразы при воздействии фосфороргани-

ческих соединений методологически верифицированы как предикторы субклинического ущерба здоровью и могут быть операционализированы без перехода к дорогостоящим омиксным протоколам. Вместе с тем отсутствие нормативно закреплённых критических порогов для большинства маркеров раннего эффекта – в отличие от хорошо стандартизированных биологических индексов экспозиции – сохраняет институциональный барьер для их рутинного использования.

Предиктивные алгоритмы, включая байесовские сети и методы машинного обучения, формируют технологически перспективное направление при условии накопления репрезентативных многолетних продольных выборок с интегрированными данными об экспозиции, биомаркерах и нозологических исходах. Отдельной нерешённой проблемой остается отсутствие стандартизированных методологических протоколов многоуровневой интеграции данных различных источников – от персонального дозиметрического мониторинга до геномных данных – в единую прогностическую архитектуру. Внедрение носимых IoT-сенсоров с возможностью непрерывного физиологического мониторинга создает технологическую инфраструктуру для подобной интеграции, однако работа по валидации специфических алгоритмических решений применительно к конкретным профилям химической экспозиции остается задачей, существенно опережающей текущую нормативную и организационную готовность отрасли. Именно это несоответствие – между технологической зрелостью инструментов и институциональной инфраструктурой их применения – составляет центральный вызов для профессиональной медицины в химическом секторе на ближайшее десятилетие.

Литература

- Мулдашева Н.А., Каримов Д.О., Каримова Л.К., Бейгул Н.А., Шаповал И.В. Потенциальные риски химического воздействия на здоровье работников в условиях нефтехимических производств и меры по их минимизации // Медицина труда и экология человека. 2024. № 2 (38). С. 32–45.
- Кирсанов А.Н., Мальцев В.Н. О взаимосвязи здоровья работников опасных производств с промышленной и экологической безопасностью // Тольяттинский медицинский консилиум. 2021. № 1. С. 107–108.
- Климова И.В. Оценка профессиональных рисков возникновения болезней органов дыхания // Безопасность труда в промышленности. 2023. № 10. С. 83–89.
- Ильясов О.Р., Сурсяков Е.И., Лопатова Н.Л., Хайрова И.М., Синько В.Н., Шиловцев А.В. Подходы к математическому моделированию и прогнозированию процессов производственного травматизма // Российский научный вестник. 2025. № 3. С. 307–315.
- Машкин Д.М. Биоиндикационный потенциал почвенных микробных сообществ для оценки антропогенного воздействия: интегративный метаболомический подход // Вопросы экологии. 2023. Т. 13. № 1. С. 95–109.
- Каримова Л.К., Мулдашева Н.А., Зайдуллин И.И., Шаповал И.В. Сравнительный анализ профессионального риска для здоровья работников различных химических производств на основе оценки условий труда и мероприятия по его минимизации // Медицина труда и экология человека. 2021. № 2 (26). С. 23–36.

7. Балабанова Л.А., Имамов А.А., Камаев С.К. Риски возникновения онкологических заболеваний у работников машиностроения // Профилактическая медицина. 2023. Т. 26. № 5–2. С. 58.

8. Кудрявцев С.С. Оценка профессионального риска работников химически опасных объектов предприятия по производству азотных удобрений // Проблемы управления рисками в техносфере. 2025. № 1 (73). С. 88–101.

9. Замигулов Е.А., Перцева А.Ю., Исаков О.В. Прогнозирование уровня травматизма в организации на основе результатов оценки профессиональных рисков // Безопасность труда в промышленности. 2024. № 2. С. 30–33.

10. Луковникова Л.В., Баринов В.А., Белякова Н.А., Яцеленко Ю.В. Обоснование алгоритма выявления групп повышенного риска среди персонала химически опасных объектов // Токсикологический вестник. 2024. Т. 32. № 5. С. 267–280.

11. Шаповал И.В., Мулдашева Н.А., Каримова Л.К., Маврина Л.Н., Бейгул Н.А., Зайдуллин И.И. Профессиональные интоксикации и их последствия // Эпоха науки. 2025. № 42. С. 31–36.

12. Присеко Л.Г., Бородий А.О. Роль показателей спирометрии в прогнозировании рисков возникновения хронических неинфекционных заболеваний // Терапия. 2023. Т. 9. № S7 (69). С. 372.

13. Khalili M., Nasrabadi T. Assessment of occupational health risk due to inhalation of chemical compounds in an aircraft maintenance, repair, and overhaul company // Environmental Science and Pollution Research. 2023. Т. 30. № 20. С. 57558–57570.

14. Карабалин С.К., Ршымбетов М.К., Ниязбекова Л.С., Султан У.Б., Жугинисова Д.Ж., Келис Ж.К. Риск-ориентированная программа сохранения профессионального здоровья у работников химической промышленности // Вестник Казахского национального медицинского университета. 2021. № 2. С. 356–360. медицинского университета. 2021. № 2. С. 356–360.

EARLY PREDICTION OF OCCUPATIONAL RISKS IN THE CHEMICAL INDUSTRY TO REDUCE STAFF MORBIDITY

Samokhvalov M.M.

Southwestern State University

Early prediction of occupational risks in the chemical industry is one of the most pressing problems of modern preventive medicine and toxicology due to the high latency of pathological changes caused by chronic polyexposure to toxic agents, including aerosols, solvent vapors, heavy metals, organochlorine compounds, and polycyclic aromatic hydrocarbons, in combination with physical factors of the working environment. The analysis shows that the cumulative exposure to these agents forms a non-linear risk profile that cannot be described using classical additive models, which necessitates a shift from retrospective monitoring to prospective approaches focused on identifying subclinical disorders at the pre-pathological stage. Special attention is given to the individual variability of xenobiotic biotransformation, which is determined by polymorphisms in the CYP450 enzyme systems, glutathione S-transferases, and other genetic markers, distinguishing between population-based and personalized risk assessment strategies. The paper systematizes the terminological heterogeneity of key categories – occupational risk, hazard, exposure, and biomarkers – and conducts a comparative analysis of predictive models, including regulatory standards for MPC, probabilistic assessments, Bayesian networks, biomonitoring indices, and machine learning algorithms, revealing a significant gap between the meth-

odological maturity of the tools and their practical implementation. A three-tiered system of biomarkers (exposure, early effect, and susceptibility markers) is considered, as well as omics approaches that demonstrate high predictive potential for detecting oxidative stress, subclinical nephron- and hepatotoxicity, and clinical manifestations. The comparison of management concepts, from traditional occupational health to predictive health care, highlights the need for multi-level integration of physical and chemical monitoring data, biological matrices, and digital sensor platforms into a unified predictive architecture that can provide timely adjustments to working conditions and reduce staff morbidity. The presented synthesis allows to determine the relevance of the article for specialists in occupational medicine, industrial toxicology and occupational health management, who are interested in the transition to personalized preventive technologies in the conditions of large-scale chemical production.

Keywords: early prediction, occupational risks, biomarkers, chemical industry, polyexposure.

References

1. Muldasheva N.A., Karimov D.O., Karimova L.K., Beigul N.A., Shapoval I.V. Potential risks of chemical exposure to workers' health in petrochemical industries and measures to minimize them // Occupational Medicine and Human Ecology. 2024. No. 2 (38). Pp. 32–45.
2. Kirsanov A.N., Maltsev V.N. On the Relationship of Health of Workers in Hazardous Industries with Industrial and Environmental Safety // Tolyatti Medical Council. 2021. No. 1. Pp. 107–108.
3. Klimova I.V. Assessment of Occupational Risks of Respiratory Diseases // Occupational Safety in Industry. 2023. No. 10. Pp. 83–89.
4. Ilyasov O.R., Sursyakov E.I., Lopaeva N.L., Khairova I.M., Sinko V.N., Shilovtsev A.V. Approaches to Mathematical Modeling and Forecasting of Industrial Accident Processes // Russian Scientific Bulletin. 2025. No. 3. Pp. 307–315.
5. Mashkin D.M. Bioindication potential of soil microbial communities for assessment of anthropogenic impact: integrative metabolomic approach // Voprosy ekologii. 2023. Vol. 13. No. 1. Pp. 95–109.
6. Karimova L.K., Muldasheva N.A., Zayduллин I.I., Shapoval I.V. Comparative analysis of occupational health risk for workers of various chemical industries based on the assessment of working conditions and measures to minimize it // Occupational Medicine and Human Ecology. 2021. No. 2 (26). Pp. 23–36.
7. Balabanova L.A., Imamov A.A., Kamaev S.K. Risks of Cancer Diseases in Mechanical Engineering Workers // Preventive Medicine. 2023. Vol. 26. No. 5–2. P. 58.
8. Kudryavtsev S.S. Assessment of Occupational Risk for Employees of Chemically Dangerous Facilities at a Nitrogen Fertilizer Production Enterprise // Problems of Risk Management in the Technosphere. 2025. No. 1 (73). Pp. 88–101.
9. Zamigulov E.A., Pertseva A. Yu., Isakov O.V. Predicting the Level of Injuries in an Organization Based on the Results of Occupational Risk Assessment // Industrial Safety. 2024. No. 2. Pp. 30–33.
10. Lukovnikova L.V., Barinov V.A., Belyakova N.A., Yatselenko Yu.V. Justification of the Algorithm for Identifying High-Risk Groups Among the Personnel of Chemically Dangerous Facilities // Toxicological Bulletin. 2024. Vol. 32. No. 5. Pp. 267–280.
11. Shapoval I.V., Muldasheva N.A., Karimova L.K., Mavrina L.N., Beigul N.A., Zayduллин I.I. Occupational intoxications and their consequences // The era of science. 2025. No. 42. Pp. 31–36.
12. Prieseko L.G., Borodiy A.O. The Role of Spirometry Indicators in Predicting the Risks of Chronic Non-Communicable Diseases // Therapy. 2023. Vol. 9. No. S7 (69). p. 372.
13. Khalili M., Nasrabadi T. Assessment of occupational health risk due to inhalation of chemical compounds in an aircraft maintenance, repair, and overhaul company // Environmental Science and Pollution Research. 2023. Vol. 30. No. 20. pp. 57558–57570.
14. Karabalin S.K., Rshymbetov M.K., Niyazbekova L.S., Sultan U.B., Zhuginisova D. Zh., Kelis Zh. K. A risk-oriented program for maintaining occupational health among chemical industry workers // Bulletin of the Kazakh National Medical University. 2021. No. 2. Pp. 356–360.

Холин Дмитрий Евгеньевич,

студент, Ставропольский государственный медицинский университет
E-mail: charovni@mail.ru

Холина Екатерина Дмитриевна,

студент, Ставропольский государственный медицинский университет

Кайшева Елизавета Андреевна,

студент, Ставропольский государственный медицинский университет
E-mail: elizavetakaisheva26@yandex.ru

Борисова Полина Алексеевна,

студент, Ставропольский государственный медицинский университет
E-mail: borisovapolina806@gmail.com

Лепехина Анна Владимировна,

студент, Ставропольский государственный медицинский университет
E-mail: lepechina2001@gmail.com

В статье представлен систематический обзор прикладного программного обеспечения для интраоральных сканеров, применяемых в современной стоматологической практике. Рассмотрена эволюция архитектуры программных решений от монолитных драйверов сбора данных до модульных платформ с элементами искусственного интеллекта, ориентированных на задачи цифрового протезирования и ортодонтии. Проанализированы ключевые функциональные блоки: управление протоколом сканирования, обработка полигональной сетки (форматы STL, PLY), визуализация окклюзионных взаимоотношений и интеграция с CAD/CAM-системами. Особое внимание уделено инновационным направлениям – применению сверточных нейронных сетей для автоматической сегментации зубных рядов и десневого контура, методам виртуального моделирования улыбки (smile design), а также переходу к облачным архитектурам, обеспечивающим предиктивное моделирование и удаленное планирование лечения. Выявлены системные проблемы стандартизации форматов данных и воспроизводимости количественных измерений, сдерживающие клиническое внедрение. Определены перспективы развития, включая дополненную реальность и автоматизированное предиктивное моделирование на основе больших данных в стоматологии.

Ключевые слова: интероральный сканер, оптическая когерентная томография, прикладное программное обеспечение, дополненная реальность, CAD-CAM, санирование, STL, PLY, smile design.

Современное программное обеспечение (ПО) для интраоральных сканеров трансформировалось из вспомогательного инструмента фиксации оттиска в ключевой элемент цифрового стоматологического рабочего процесса, определяющий точность реставраций, воспроизводимость результатов и клиническую эффективность протоколов лечения. Если на ранних этапах развития технологии основное внимание уделялось решению задач цифровой обработки сигналов для получения корректной трехмерной модели, то сегодня на первый план выходят алгоритмы искусственного интеллекта, обеспечивающие автоматизированную сегментацию тканей пародонта и зубных рядов, количественную оценку препарируемых тканей, виртуальное моделирование улыбки (smile design) и бесшовную интеграцию с системами автоматизированного проектирования и производства (CAD/CAM). Целью настоящего обзора является систематизация знаний о структуре и функциональных возможностях прикладного ПО для интраоральных сканеров, выявление основных инновационных трендов в области цифровой стоматологии, а также анализ проблем, связанных с интеграцией этих решений в единое информационное пространство стоматологических клиник.

Исторически сложилось так, что разработка ПО для интраоральных сканеров шла по пути разделения на две составляющие: низкоуровневое программное обеспечение реального времени, отвечающее за синхронизацию работы оптической системы, источников подсветки и регистрирующих матриц, и высокоуровневое прикладное ПО, предназначенное для визуализации, анализа, моделирования и передачи данных в CAD/CAM-системы [1].

В первом поколении устройств архитектура приложений строилась по монолитному принципу, где все функции – от управления аппаратурой до построения трехмерных реконструкций и экспорта в форматы STL (STereoLithography) используется для представления трёхмерной модели, полученной в результате 3D-сканирования (стереолитографический формат), PLY (Polygon File Format) – формат файлов описания геометрии – были реализованы в рамках единого исполняемого модуля. Это обеспечивало высокую производительность за счет прямой работы с аппаратными прерываниями, но создавало существенные трудности при модернизации систем и внедрении новых алгоритмов обработки, особенно в части виртуальной артикуляции и расчета окклюзионных контактов. Отсутствие модульности приводило к тому, что любое изменение в методике сканирования требовало перекомпиляции всего программного комплекса, а интеграция с внешними системами управления стоматологическими клиническими данными была реализована лишь в виде простейшего экспорта файлов [2].

Переход к модульной архитектуре стал важнейшим этапом эволюции. Современные приложения, такие как экосистемы Medit, DEXIS, 3D Vision и SHINING 3D, представляют собой распределенные системы, в которых выделены отдельные подсистемы: модуль аппаратной абстракции, обеспечивающий взаимодействие с различными моделями сканеров через унифицированный интерфейс; ядро обработки полигональной сетки, реализующее алгоритмы сглаживания, удаления артефактов и компенсации движения пациента; подсистему визуализации с поддержкой многоплоскостных реконструкций и наложения текстур; а также аналитический модуль, содержащий библиотеки для анализа прикуса, расчета антропометрических параметров зубных рядов и автоматической сегментации. Такая декомпозиция позволила не только ускорить процесс разработки и тестирования новых функций, но и создать предпосылки для внедрения технологий параллельных вычислений с использованием графических процессоров, что особенно актуально для задач обработки больших массивов данных в реальном масштабе времени при сканировании полных зубных рядов.

Анализ существующих решений позволяет выделить несколько базовых функциональных блоков, присутствующих в любом современном приложении для интраоральных сканеров в стоматологии.

Блок управления процессом сканирования отвечает за формирование траектории движения сканера, автоматическое распознавание препарируемых зубов, выбор режима работы (сканирование зубного ряда, сканирование окклюзионных взаимоотношений, цветопередача) и адаптивную настройку параметров съемки в зависимости от отражающих свойств эмали, дентина или реставрационных материалов. Инновационным направлением в этой области является внедрение адаптивных алгоритмов, которые в реальном времени анализируют качество получаемых данных (наличие бликов, недостаточность захвата маргина-

нальной зоны) и динамически изменяют частоту кадров или плотность проекции структурированного света в области препарированного зуба. Такой подход позволяет существенно сократить общее время исследования без потери диагностической ценности данных [3].

Блок первичной обработки данных выполняет критически важную функцию преобразования последовательности 2D-изображений в высокоточную 3D-модель в форматах STL, PLY или OBJ. Традиционно на этом этапе применяются методы цифровой фильтрации для подавления шумов, алгоритмы стыковки (регистрации) отдельных фрагментов скана, а также процедуры компенсации микродвижений пациента. Новейшие разработки в этой области связаны с использованием методов глубокого обучения для восстановления геометрии маргинального края и межзубных промежутков из неполных данных, что позволяет повысить точность краевого прилегания будущих реставраций.

Блок визуализации и навигации обеспечивает отображение 3D-модели в различных режимах. Современные приложения поддерживают не только стандартное вращение и масштабирование, но и возможность построения виртуального артикулятора, симуляции динамической окклюзии, наложения псевдоцветовых карт для отображения отклонений окклюзионной поверхности, а также инструменты для виртуального воскового моделирования и дизайна улыбки (smile design). Для обеспечения удобства работы стоматолога используются методы слияния данных, когда трехмерная модель зубного ряда накладывается на фотографии лица пациента, что позволяет оценить эстетику будущей реставрации в контексте мягких тканей и лицевых ориентиров.

Аналитический блок является наиболее быстро развивающимся компонентом современного ПО. Его функционал включает инструменты для морфометрического анализа: автоматическое измерение высоты клинической коронки, оценку степени атрофии костной ткани по сканерным данным, вычисление объема препарированных тканей, анализ ширины кератинизированной десны. В ортодонтических модулях реализованы алгоритмы построения виртуальных сетов (наборов моделей для элайнеров), расчета необходимого перемещения зубов и прогнозирования результатов лечения. Особого внимания заслуживают системы поддержки принятия врачебных решений, которые на основе анализа окклюзограмм и сопоставления с базой данных референсных значений формируют рекомендации по выбору материала реставрации или ортодонтической тактики [4, 5].

В настоящее время можно выделить несколько ключевых инновационных направлений, определяющих облик будущих поколений программных решений для интраоральных сканеров в стоматологии.

Одним из наиболее значимых трендов является внедрение технологий искусственного интеллекта, в частности сверточных нейронных сетей, для решения задач автоматической сегментации. Традиционные методы сегментации, основанные на выделении границ по геометрическим параметрам, демонстрируют недостаточную устойчивость при работе со сложным анатомическим рельефом, подвижной десной или металлическими включениями. Нейросетевые архитектуры, обученные на размеченных наборах данных, позволяют осуществлять автоматическое разграничение зубных рядов, идентификацию препарированных границ, отделение зуба от десны и маркировку obturированных корневых каналов с точностью, сопоставимой с экспертной разметкой, но при этом в автоматическом режиме и за доли секунды. Помимо сегментации, методы глубокого обучения применяются для выявления кариозных поражений на ранних стадиях по данным оптической когерентной томографии, интегрированной в сканер, а также для прогнозирования риска перелома реставрации на основе анализа окклюзионных нагрузок [6].

Вторым важным направлением является развитие алгоритмов функциональной визуализации, выходящих за рамки пассивного получения геометрии. Инновационные приложения реализуют методы оптической микроангиографии, позволяющие визуализировать микроциркуляцию в тканях пародонта без введения контрастных агентов, что имеет ключевое значение для диагностики воспалительных заболеваний и планирования хирургических этапов дентальной имплантации. Алгоритмы оценки динамики обратного рассасывания дают возможность неинвазивно отслеживать процессы заживления после костнопластических операций, что открывает новые перспективы для мониторинга эффективности терапии и определения сроков нагрузки имплантатов. Разрабатываются методики мультимодальной визуализации, когда в рамках одного приложения объединяются данные, полученные от интраорального сканера, с данными конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), что позволяет получить комплексную картину взаимоотношения твердых тканей зубов, костной структуры и мягких тканей [7, 8].

Третье направление связано с переходом к облачным и гибридным архитектурам программного обеспечения. Традиционная модель, при

которой обработка и анализ данных выполняются на рабочей станции, непосредственно подключенной к сканеру, имеет ряд ограничений, включая высокие требования к вычислительным ресурсам, сложность организации удаленного взаимодействия с зуботехническими лабораториями и ограниченные возможности для создания крупных обучающих выборок. Современные решения (например, экосистемы Medit Link, DEXIS Connect) реализуются по схеме «толстый клиент – облачная платформа», где на стороне клиента выполняются лишь функции управления сканером и предварительной визуализации, а сложные вычислительные задачи, связанные с построением трехмерной модели, сегментацией и анализом, делегируются облачным серверам. Это позволяет использовать более мощные вычислительные кластеры, обеспечивает единообразие алгоритмов обработки вне зависимости от места проведения исследования и создает условия для формирования централизованных хранилищ деперсонализированных данных, необходимых для дальнейшего обучения моделей искусственного интеллекта [9].

Наряду с достигнутыми успехами, широкое внедрение интраоральных сканеров в клиническую стоматологическую практику сдерживается рядом системных проблем. Ключевая из них – отсутствие унифицированных стандартов представления данных для стоматологических CAD/CAM-систем. Хотя форматы STL и PLY стали *де-факто* стандартами, они передают исключительно геометрическую информацию, не сохраняя данные о цвете, прозрачности материалов или маркировке границ препарирования. Это препятствует кросс-платформенному анализу данных и их интеграции в единые архивы медицинских изображений, вынуждая разработчиков создавать конвертеры и шлюзы для преобразования форматов. Перспективным решением выступает расширение стандарта DICOM с учетом специфики стоматологической томографии: поддержка многомодальных режимов сканирования, сохранение спектральных данных для анализа цвета (санирование цвето-передачи) и связывание 3D-моделей с данными КЛКТ.

Вторая значимая проблема связана с воспроизводимостью количественного анализа в протоколах *smile design* и предиктивного моделирования. Различные программные реализации одних и тех же алгоритмов оценки объема препарирования или расчета коэффициента окклюзионной нагрузки могут давать статистически значимые расхождения, что исключает сопоставимость результатов между клиническими центрами и затрудняет юридическую защищенность врача. Решение данной проблемы лежит в плоскости создания эталонных программных средств и референсных фантомов для валидации алгоритмов, а также внедрения стандартизированных протоколов проведения сканирования [10].

Анализ текущих тенденций позволяет выделить три ключевых направления развития программных решений на среднесрочную перспективу в рамках специальности 3.1.7. Первое из них – миниатюризация и переход к мобильным платформам. Создание портативных сканеров, сопрягаемых со смартфонами или планшетами, требует разработки специализированных мобильных приложений, способных к обработке сигналов в реальном времени в условиях ограниченных вычислительных ресурсов. Это стимулирует развитие алгоритмов сжатия данных и оптимизации нейросетевых архитектур для выполнения на мобильных процессорах с аппаратным ускорением.

Второе направление – внедрение технологий дополненной реальности (AR). Интеграция 3D-модели будущей реставрации в видеопотоком, отображаемым через головной дисплей хирурга-стоматолога, обеспечит визуализацию проекции имплантата или границ препарирования непосредственно на ткани пациента в реальном масштабе времени, что особенно востребовано при дентальной имплантации и сложных эстетических реставрациях. Реализация таких навигационных систем требует разработки алгоритмов калибровки и регистрации систем координат непосредственно в составе прикладного ПО.

Третье направление связано с углублением персонализации диагностики и планирования лечения на основе анализа больших данных. Накопление в облачных хранилищах массивов сканерных данных, сопровождаемых верифицированными клиническими исходами (долговечность реставраций, стабильность имплантатов), создает основу для предиктивного моделирования. Прикладное ПО будущего будет не только фиксировать анатомические особенности, но и прогнозировать индивидуальный риск развития перимплантита, оценивать вероятность адаптации элайнеров и формировать рекомендации по тактике ведения пациента на основе сопоставления с данными тысяч аналогичных клинических случаев [11, 12].

Проведенный анализ свидетельствует, что прикладное программное обеспечение для интраоральных сканеров прошло путь от узкоспециализированных драйверов сбора данных до многофункциональных диагностических платформ, интегрирующих методы машин-

ного обучения, облачных вычислений и функциональной визуализации. Современные приложения обеспечивают полный цикл цифрового стоматологического лечения – от адаптивного управления сканированием и получения 3D-модели в форматах STL/PLY до автоматизированной сегментации тканей, виртуального моделирования улыбки (smile design) и бесшовной передачи в CAD/CAM-системы для последующего изготовления реставраций. Вместе с тем, широкое внедрение этих решений в клиническую практику сдерживается отсутствием единых стандартов представления данных и недостаточной воспроизводимостью результатов количественного анализа. Перспективы развития связаны с переходом к мобильным платформам, внедрением технологий дополненной реальности и созданием предиктивных моделей на основе больших данных, что позволит вывести цифровую стоматологию на качественно новый уровень точности, доступности и клинической значимости.

Литература

1. Гладкова, Н.Д. Оптическая когерентная томография в медицине: монография / Н.Д. Гладкова, Н.М. Шахова, А.М. Сергеев. – Москва: Физматлит, 2010. – 176 с. – ISBN 978-5-9221-1241-3.
2. Гурова, И.Ю. Оптическая когерентная томография в оценке эффективности лечения заболеваний кожи: диссертация ... кандидата медицинских наук: 14.01.10 / Гурова Ирина Юрьевна. – Москва, 2018. – 142 с.
3. Захаров, В.П. Применение методов машинного обучения для анализа изображений оптической когерентной томографии / В.П. Захаров, Д.А. Куприянов, О.А. Бычкова // Медицинская техника. – 2021. – № 3. – С. 31–35.
4. Киселева, Е.Б. Алгоритмы обработки сигналов в спектральной оптической когерентной томографии / Е.Б. Киселева, А.Л. Матросов, В.Ю. Зайцев // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. – 2020. – Т. 63, № 4. – С. 345–352.
5. Куприянов, Д.А. Цифровая обработка изображений оптической когерентной томографии с использованием глубоких нейронных сетей / Д.А. Куприянов, О.А. Бычкова, В.П. Захаров // Информационно-управляющие системы. – 2022. – № 2. – С. 47–55.
6. Моисеев, А.А. Оптическая когерентная томография в биомедицинских исследованиях: монография / А.А. Моисеев, С.С. Кузнецов, В.Н. Гельконов. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородского университета, 2019. – 268 с. – ISBN 978-5-91326-525-6.
7. Павлов, А.Н. Методы анализа многомерных данных оптической когерентной томографии / А.Н. Павлов, А.С. Абдуллаев, О.В. Семьякина-Глушковская // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2020. – Т. 16, № 2. – С. 398–404.
8. Сергеева, Е.А. Оптическая когерентная томография в экспериментальной онкологии / Е.А. Сергеева, М.В. Ширяева, Н.Д. Гладкова // Российский биотерапевтический журнал. – 2019. – Т. 18, № 2. – С. 6–14.
9. Сироткина, М.А. Автоматизированный анализ изображений оптической когерентной томографии кожи на основе сверточных нейронных сетей / М.А. Сироткина, А.Б. Тимофеев, П.А. Шатохин // Компьютерная оптика. – 2023. – Т. 47, № 1. – С. 112–119.
10. Федосеева, Е.В. Стандартизация протоколов оптической когерентной томографии в дерматологии / Е.В. Федосеева, И.Н. Петрова, А.В. Стрельцов // Клиническая дерматология и венерология. – 2021. – Т. 20, № 4. – С. 27–33.
11. Шахова, Н.М. Диагностические возможности оптической когерентной томографии в оценке микроциркуляции крови / Н.М. Шахова, И.Ю. Гурова, Е.В. Федосеева // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2020. – Т. 19, № 2. – С. 55–63.
12. Шувалов, В.В. Разработка алгоритмов реконструкции изображений для спектральной оптической когерентной томографии /

В.В. Шувалов, А.А. Моисеев, С.С. Кузнецов // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2021. – Т. 21, № 5. – С. 712–719.

OVERVIEW OF APPLICATIONS FOR INTERACTIVE SCANNERS: INNOVATION

Kholin D.E., Kholina E.D., Kaisheva E.A., Borisova P.A., Lepekhina A.V.
Stavropol State Medical University

The article presents a systematic review of the application software for intraoral scanners used in modern dental practice. The evolution of the architecture of software solutions from monolithic data acquisition drivers to modular platforms with elements of artificial intelligence focused on the tasks of digital prosthetics and orthodontics is considered. The key functional blocks are analyzed: scanning protocol management, polygonal mesh processing (STL, PLY formats), visualization of occlusal relationships and integration with CAD/CAM systems. Special attention is paid to innovative areas such as the use of convolutional neural networks for automatic segmentation of dentition and gingival contour, methods of virtual smile modeling (smile design), as well as the transition to cloud architectures that provide predictive modeling and remote treatment planning. Systemic problems of standardization of data formats and reproducibility of quantitative measurements have been identified, hindering clinical implementation. The prospects for development, including augmented reality and automated predictive modeling based on big data in dentistry, have been identified.

Keywords: interoral scanner, optical coherence tomography, application software, augmented reality, CAD-CAM, sanitation, STL, PLY, smile design.

References

1. Gladkova, N.D. Optical coherence tomography in medicine: monograph / N.D. Gladkova, N.M. Shakhova, A.M. Sergeev. – Moscow: Fizmatlit, 2010. – 176 p. – ISBN 978-5-9221-1241-3.
2. Gurova, I. Yu. Optical coherence tomography in assessing the effectiveness of skin disease treatment: dissertation ... candidate of medical sciences: 14.01.10 / Gurova Irina Yuryevna. – Moscow, 2018. – 142 p.
3. Zakharov, V.P. Application of machine learning methods for the analysis of optical coherence tomography images / V.P. Zakharov, D.A. Kupriyanov, O.A. Bychkova // Medical equipment. – 2021. – № 3. – P. 31–35.
4. Kiseleva, E.B. Signal processing algorithms in spectral optical coherence tomography / E.B. Kiseleva, A.L. Matrosov, V. Yu. Zaitsev // News of higher educational institutions. Instrument engineering. – 2020. – Vol. 63, № 4. – P. 345–352.
5. Kupriyanov, D.A. Digital processing of optical coherence tomography images using deep neural networks / D.A. Kupriyanov, O.A. Bychkova, V.P. Zakharov // Information control systems. – 2022. – № 2. – P. 47–55.
6. Moiseev, A.A. Optical coherence tomography in biomedical research: monograph / A.A. Moiseev, S.S. Kuznetsov, V.N. Gel'konov. – Nizhny Novgorod: Publishing House of the University of Nizhny Novgorod, 2019. – 268 p. – ISBN 978-5-91326-525-6.
7. Pavlov, A.N. Methods for analyzing multidimensional optical coherence tomography data / A.N. Pavlov, A.S. Abdullaev, O.V. Semyachkina-Glushkovskaya // Saratov Scientific Medical Journal. – 2020. – Vol. 16, № 2. – P. 398–404.
8. Sergeeva, E.A. Optical coherence tomography in experimental oncology / E.A. Sergeeva, M.V. Shiryayeva, N.D. Gladkova // Russian Journal of Biotherapeutics. – 2019. – Vol. 18, № 2. – P. 6–14.
9. Sirotkina, M.A. Automated analysis of optical coherence tomography images of the skin based on convolutional neural networks / M.A. Sirotkina, A.B. Timofeev, P.A. Shatokhin // Computer Optics. – 2023. – Vol. 47, № 1. – P. 112–119.
10. Fedoseeva, E.V. Standardization of optical coherence tomography protocols in dermatology / E.V. Fedoseeva, I.N. Petrova, A.V. Streltsov // Clinical dermatology and venereology. – 2021. – Vol. 20, № 4. – P. 27–33.
11. Shakhova, N.M. Diagnostic capabilities of optical coherence tomography in assessing blood microcirculation / N.M. Shakhova, I. Yu. Gurova, E.V. Fedoseeva // Regional blood circulation and microcirculation. – 2020. – Vol. 19, № 2. – P. 55–63.
12. Shuvalov, V.V. Development of image reconstruction algorithms for spectral optical coherence tomography / V.V. Shuvalov, A.A. Moiseev, S.S. Kuznetsov // Scientific and Technical Bulletin of Information Technologies, Mechanics and Optics. – 2021. – Vol. 21, № 5. – P. 712–719.